
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
MARCH 3, 1849
LIBRARY

Division of Birds
G-9

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Ruß.

TRANSFERRED TO
FISH & WILDLIFE SERVICE,
1942.

Dritter Jahrgang.

Berlin, 1874.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

Gustav Goßmann.

LIBRARY
U.S. DEPARTMENT
OF AGRICULTURE

94754

Inhaltsverzeichniß und Sachregister.

Abwehr, zur, 348.
Ackerlerche, 227.
Acridotheres cristatelloïdes 81. 421; A. cristatellus 81. 421.
Aegintha 3. 408.
„Aegintha", Ornithologische Gesellschaft in Demmin, 69. 308.
Aegintha granatina 355; A. minima 3. 59; A. modesta 250. 340; A. phoenicotis 3. 355; A. polyzona 23. 29; A. subflava 59.
Aeginthidae 408.
Aeginthinae 408.
Afrika, nach, 303.
Agelaius phoeniceus 257.
Aidemosyne modesta 340.
Akklimatisationsverein von Cincinnati 346.
Akklimatisirung und Zucht der Wellensittiche 27.
Alauda cornuta 256; A. magna 272.
Alexandersittich 53. 74. 373.
Alpenmauerläufer 23.
Alpenspecht 23.
Alsine media 34.
Amadinen 408.
Amadina, vide Spermestes.
Amarant 3. 59. 107; A., Bastardbrut, 3.
Amazonenpapagei 12.
Ambystoma axolotl 195. 209.
Ameisenkern 330.
Ameisenpuppen 4. 20. 23. 181; A. für Grauedelfinken 23.
Ammern, amerikanische, 272.
Amsel 129. 130. 138. 392; A., amerikanische 266; A. von Sanssouci 130.
Anas boschas 36.
Anfragen und Auskunft 5. 23. 36. 37. 46. 53. 68. 75. 100. 143. 148. 159. 166. 182. 236. 245. 251. 299. 308. 315. 324. 331. 340. 365. 373. 388. 396.
Anstrich für Vogelbauer 32.
Anthus ludovitianus 272.
Antwerpener Versteigerung 353.
Aquila albicilla 164.
Arara-Perikit 241.
Ardea cinerea 163. 205.
Astragalinus cucullatus 250. 276.
Astrilda granatina, vide Aegintha granatina.
Astrilda, vide Aegintha.
Atlasfink 44.
Atlasvogel 288.
Auerhahn 140.
Aufruf zur Anlage eines Westphälischen zoologischen Gartens zu Münster 31.
Aufzucht, künstliche, des Geflügels 15. 127.
Aus den deutschen Vogelstuben 3. 12. 20. 53. 59.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald 4. 14. 23. 163. 235. 248. 276.
Ausstecker, Kanarien-, 35.
Ausstellungen 22. 31. 47. 53. 62. 68. 69. 75. 83. 92. 102. 109. 117. 118. 143. 177. 182. 191. 203. 219. 220. 228. 244. 245. 255. 268. 277. 282. 292. 293. 299. 331. 397. 412. 421; Ausstellung, allgemeine deutsche Geflügel-. 69; A. des Akklimatisationsvereins zu Berlin 244. 293. 331; A. des Hühnerologischen Vereins zu Görlitz 293; A. des Vereins für Geflügelzucht in Köln 191. 203. 220. 228; A. des Dr. O. Finsch 255; A. des Vereins „Fauna" in Düsseldorf 268. 277. 282. 292; A., Geflügel-, in Stettin 31. 62. 109; A., internationale landwirthschaftliche, zu Bremen 47. 143. 219; A., Schattenseiten, 177. 182; A. und Geflügelmarkt in Karlsruhe 299; A., Vogel- und Geflügel-, in Nürnberg 183; A., wunderbare Ergebnisse der, 22.
Axolotl 195. 209.
Bachstelze 392. 403.
Baltimore-Oriol 272; B.-Trupial 272; B.-Vogel 82. 272; B.-Vogel, brauner 82.
Bandfink 21. 29. 59. 240. 299. 308.
Barrabandssittich 161.
Bartfink 240; Bartkukuk 97; Bartmeise 337.
Bastardbrut 3. 13. 142. 143. 273. 307. 389; Bastarde, über die Fruchtbarkeit der, 125. 147. 155. 219; Bastard von Goldzeisig und Kanarien 273.
Bastard-Nachtigal 404.
Baumfalk 163. 330.
Benachrichtigung, zur, 94.
Bergfink 13.
Bericht, eilfter des Verwaltungsraths der zoologischen Gesellschaft in Hamburg 62. 85. 101; B. über die XX. Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft 39.
Berichtigung 221. 283. 333. 421.
Bienenfresser 404. — Bienenvogel 129.
Birkenzeisig 419. — Birkhuhn 140; -jagd in England 331.
Bischof, blauer, 30; B., dunkelblauer 30.
Blackbird 257. 266; B., Swamp-, 257.
Blasköpfe 74.
Blauheher 60. — Blaukehlchen 226. 404; B., arktisches 257; B. des Westens 257. — Blaukrönchen 91. — Blaumeise 418. — Blauracke 410.
Bluebird 256; B., red breasted, 256; B., Rocky mountain — 257; B., Western, 257.
Blutfink 226. — Bluthänfling 13. 419. — Blutschnabel 141.
Boblink 266. — Bobolink 266.
Bochumer Verein für Geflügel- und Stubenvogelzucht 143.
Bodenfink 266.
Bogenroller, Kanarien 11.
Bombycilla garrula 14. 60. 419.
Bourksittich 385.
Brachvogel 139.
Braunelle 69.
Breitschwanzlori, blauschultriger 63.
Briefliche Mittheilungen 3. 35. 46. 53. 100. 109. 127. 142. 158. 166. 213. 235. 250. 276. 307. 340. 364. 379.
Brieftauben, Aachener 21; B., militärische 364; B.-Liebhaberei 259. 267. 275. 346. 347; B.-Klub in Frankfurt a. M. 4; -Zucht 22.
Briefwechsel 8. 16. 23. 39. 47. 63. 70. 94. 102. 143. 149. 159. 175. 184. 213. 221. 237. 246. 254. 284. 294. 300. 340. 357. 365. 397. 405.
Brillenvogel 338. 368.
Brut des Gimpels 34; B. des Quäkersittichs 52. — Bruteier, Versendung der, 250. — Brutmaschinen 15. 127. 395. — Brutzeit, Wellensittiche, der, 29.
Bucco 97.
Buchfink 226. 399. 419.
Bücher und Schriften: „Achter und neunter Jahresbericht" des Thierschutzvereins in Neu-Brandenburg 405; „Am Genfersee" 413; „Archiv der Cypria" 63; „Blätter für Kaninchenzucht" 193. 397; „Das Variiren der Thiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation" 405; „Deutsches Dichterlexikon" 413; „Deutscher Gartenkalender" 193. 245; „Deutsche landwirthschaftliche Presse" 325; „Der Ausdruck der Gemüthsbewegung bei den Menschen und den Thieren" 405; „Der Hühner- oder Geflügelhof" 175. 229; „Der Tannenheher" 175; „Der Kanarienvogel" 68; „Die Arten der Haustaube" 111. 300; „Die Erziehung der Jugend" 193. 413; „Die deutsche Expedition an der Loango-Küste" 193; „Die Fasanenzucht" 193. 245; „Die fremdländischen Stubenvögel" 30. 133. 405. 407; „Die Kaninchenzucht" 193. 308; „Die Thierwelt im zoologischen Garten von Berlin" 193; „Die Tropenwelt" 405; „Diezels Niederjagd" 193. 405; „Federzeichnungen aus der Thier-

welt" 193; „Forstzoologie" II. Vögel. 70. 77; Gutzkow, „Gesammelte Werke" 413; „Handbuch für Vogelliebhaber" I. 54. 63. 75. 82. 101. 114. 141. 143. 159. 167. 235. 400; „Handbuch für Vogelliebhaber" II. 68. 126; „Harzer Kanarienvogel" 283; „Jahresbericht" des Westphälischen Vereins für Vogelschutz 193; „In der freien Natur" 57; „Lapin-Fleischbereitung" 413; „Mein Leben und Streben" von Roßmäßler 270; „Naturgeschichte aller Zimmer-, Haus- und Jagdvögel" 175. 405; „Ornithologie Nordost-Afrikas" 175; „Ornithologischer Verein in Stettin", Jahresbericht des, 175; „Praktische Anleitung zur künstlichen Ausbrütung" 193. 396. 405.; „Praktisches Kaninchen-Kochbuch" 413; „The illustrated book of Poultry" 157. 166. 175. 405; „Ueber künstliche Brut" 405; „Unsere Sänger in Feld und Wald" 340; „Unter den Patagoniern" 70; „Zeitschrift des Thierschutz-Vereins für das Großherzogthum Hessen" 193; „Zoologischer Garten in Basel", erster Geschäftsbericht 175.
Bülbül 97.
Bull-Finch 265.
Bunting, black throated, 272; B., Cow-, 272; B., Snow-, 272.
Buntsittich 123. — Buntspecht, kleiner, 418.
Bussard 377; B., vergifteter, 55.
Butterfink 30.

Cabanis, Professor, zu Ehren des, 303.
Callispiza flava 385.
Canaria, Gesellschaft in Stuttgart, 412.
Caprimulgus carolinensis 272; C. vociferus 272.
Cardinalis capitatus 29; C. virginianus 75. 265.
Cat-Bird 257.
Ceresfink 250. 340.
Certhia muraria 23.
Charakteristik der Langflügel-Papageien 113.
Chasmarrhynchus variegatus 319.
Chewink 266.
Chicadee 272.
Chrysomitris tristis 265.
Ciconia nigra 205.
Clipsparrow 265.
Coccoborus Brissonii 30.
Coereba cyanea 276; Färbung des, 3.
Collocalia nidifica 148.
Columba cruentata 351; C. passerina 291; C. percussor 6.
Conurus icterotis 54; C. monachus 52; C. patagonus 74.
Coryllis 91; C. galgulus 91.
Coryphospinga pileata 44.
Coturnix californica 321.
Cowbird 272; Cow blackbird 272; Crow blackbird 266.
Criniger 97.
Crithagra atrogularis 29; C. canicollis 30. 385; C. flaviventris 30; C. Hartlaubi 30; C. musica 29; C. sulphurata 30.
Cypria, Geflügel- und Singvögelliebhaber-Verein in Berlin, 7. 53. 62. 68. 75. 83. 92. 93. 421.
Cypselus apus 321.

Deutsche Expedition an der Loango-Küste 412.
Diamantfink 12. 364.
Didunculus strigirostris 65.
Dioch, s. Webervögel.
Distelfink 44. 226. 369. 419.
Dodo 65.
Dohlen 315. 369.
Dolchstichtauben 351. 375.
Dolichonyx oryzivora 266.
Domicella rubra 63.
Dompfaff 23. 69. 259. 295. 335. 345. 369. 419.
Doppelglucker, Kanarien-, 12.
Drescher, brauner, 257; D. von Kalifornien 257.
Drossel 14. 60. 411; D., amerikanische, 257; D., Alicen-, 257; D., braune, 257; D., Einsiedler-, 257; D., Eremiten-, 257; D., Mäuse-, 257; D., Mistel-, 411. 421; D., Pallas-, 257; D., Sing-, 411; D., Stein-, 411; D., Swainson's, 257; D., Wachholder, 411; D., Wald-, 257; D., Wander-, 257; D., Wilsons, 257.
Droste-Hülshoff, Freiherr von, 247. 279.
Dullfinch 265.

Ebereschenbeeren 162.
Edelfink 5. 13. 296. — Edelweber 141. 162.
Ehrenbezeigungen 79. 143.
Eichelheher 418.
Eierbrot 347. 421. — Eierhandel 267. — Eigelbfutter 4. 19. 38. 74. 106. 146. — Eierverbrauch in England 324.
Einfluß der Umgebung auf die Färbung der Thiere 391.
Eisvögel 39. 46.
Elster 129. 377. 392. — Elsterchen 12.
Emberiza americana 272; E. nivalis 272.
Enten 130. 380. 387; Ente, wilde, 36.
Entgegnung 381.
Entzündung der Augenlider 12.
Erlenzeisig, Zucht des, 188.
Ertrag der Kanarienvogelzucht 19. 20.
Etagenbauer 35.
Euethia canora 99.
Eulen 392; E., Höhlen-, 129.
Euphema pulchella 60. 307.
Euphona violacea 3. 276. 385; E. cayana 385.
Euspiza americana 272.

Falco ater 163; F. haliaëtus 163, F. milvus 163; F. peregrinus 163; F. subbuteo 163.
Falk 377. 394.
Fasan, Ostindischer, 24.
Fauna, Verein zu Düsseldorf, 62.
Farbe der Vögel 4.
Federvieh 7.
Feldhuhn 255. — Feldlerche 379. — Feldmäuse, Vergiften der, 55. — Feldsperling 378.
Feuerfink 141.
Finken, einheimische 13. 68. — F., fremdländische, zur Fütterung 4. — Finkenvögel 5. 29. 58. 137. 287. 295.
Fischadler 163. 205. 377. — Fischreier 60.
Fledermauspapagei 91.
Flötenvogel 130. 202.
Fluggebauer, für Kanarienvögel 9. — Flugtauben 249.
Flußadler 163.
Flügellähmung der Parkvögel 340.
Fringilla alario 30; F. atrogularis 29. 307; F. brasiliensis 263; F. butyracea 30; F. canora 99; F. cannabina 13; F. cardinalis 13; F. chloris 13; F. coelebs 13; F. canicollis 30; F. cucullata 250; F. domestica 13. 107; F. erythrophthalma 266; F. flaviventris 30. 307; F. githaginea 30; F. Hartlaubi 30. 235; F. hyemalis 265; F. Jacarini 44; F. linaria 13; F. ludovitiana 265; F. melodia 265; F. montifringilla 13; F. musica 23. 29. 59. 235. 307. 385; F. personata 30; F. pileata 44. 360; F. purpurea 265; F. socialis 265; F. spinus 13; F. sulphurata 30; F. tristis 265. 273. 331. 380.
Futter für Wellensittiche 5. 28; Futters, Gesellschaft auf Aktien zur Beschaffung billigen, 69; Futtergefäß, Luftdruck-, 32; F. für Kanarienvögel 2; Fütterung der Nachtigalen 5; F. der Vögel im Freien 54; F., Ei-, für Kanarienvögel, 19. 38; F., Einfluß der, 4; F. für fremdländische Finken 4. 20. 46; Fütterung, zur, 4. 5. 20. 38. 48. 55. 60. 90. 108. 142. 143. 145. 153. 157. 158. 162. 215. 235. 292. 330. 331. 356. 386.

Gartengrasmücke 403; Gartenrothschwanz 404; Gartentrupial 272.
Gänse 7. 130. 365.
Gebirgslori, blauer 47. 161. 392.
Gefiederte Welt im Osten 361. 369. 377. 386. 393. 403.
Geflügel, auf der internationalen Ausstellung in Bremen 219; G., französisches, 278; Geflügel, künstliche Aufzucht des, 116. 127; Geflügelzucht 6. 15. 21. 38. 126. 306.
Geflügelzüchter-Tag 279.
Geräthschaften und Apparate, neue in der Vogelstube 171. 305. 340.
Gesang der Kanarienvögel 10. 125.
Geschäft des Herrn Gudera in Wien 232.

Gesellschaft, afrikanische 303; Gesellschaft, Deutsche Ornithologische in Berlin 205; Gesellschaftsfink 265.
Gilbvogel 81. 82. 266. 272.
Gimpel 14. 34. 108. 142. 143. 419; G., amerikanischer 265; G.-Bauerchen 142; G., Wüsten-, 30.
Girlitz 13. 297; G., gelbbäuchiger 30. 307; G., gelbstirniger 30. 307; G., grauer 307; G., grünköpfiger 30.
Gitterflügel 240.
Glanzdrossel 60. 82.
Glockenvogel 319.
Glucksvögel, Kanarien- 12. 289.
Goldammer 138. 399. 419. — Goldamsel 213. 272. — Goldbauch 30. — Goldbärtchen 30. — Goldbraue 30. — Goldbrüstchen 20. 30. 59. 240. — Gold-Finch 265. — Goldfink 265. — Goldgimpel 30. — Goldhähnchen 264. 412. — Goldkehle 30. — Goldkragen 30. — Goldstirnsittich 141. — Goldzeisig 273. — Goldzügel 30.
Gracula versicolor 266.
Granatfink 355.
Grasmücke 14. 36. 58. 159. 226. 403. — Grasperekit 113.
Graudrossel 226. — Grauedelfink 22. 23. 29. 46. 59. 162, 288. 299. 389. — Graugirlitz 22. 29; G., gelbbürzeliger 29. 385. — Grauköpfchen 65. 74. 82. 89. 122. 133. 384. 401. — Graupapagei 4. 54. 92. 97. 99. 108. 115. 146. 153. 306. 347. 373; G. in Freiheit und Gefangenschaft 97. 98; G., Todesursache 99.
Grivelin 29.
Grosbeak, Rose-breasted 265; G. bleu et ciel 30.
Grenadin de la côte d'Afrique 355.
Ground-Finch 266; G.-Robin 266.
Grundfink 266. — Grundröthel 266.
Grünfink 13. 297. 419. — Grünhänflinge 13. — Grünsling 138 — Grünspecht 418.
Guinesenadler 98.
Gymnorrhina leuconota 202.
Gypohildax angolensis 98.

Haarvögel 97.
Habicht 327; Habichtskorb 158.
Hähnchen im Ei zu erkennen 126.
Halbmondsittich 141.
Hamburg, Verein für Geflügel- und Stubenvogelzucht 143.
Handelsmenagerie des Herrn C. Hagenbeck 224. 247.
Hanf für Wurmvögel 158.
Hänfling 44. 226. 297; H., amerikanischer, 265.
Hangnest 272.
Hartlaubzeisig 30. 235. 288.
Harzer Kanarienvogel s. Kanarienvogel. — Harzer Bauerchen 27. 143.
Haselhuhn 140.
Hasen, vergiftete, 55.
Haubenlerche 378. — Haubenmeise, amerikanische, 272. — Haubentaucher in der Mark Brandenburg 187.
Haushuhn 130. — Hausrothschwänzchen 314. — Hausschwalbe 329. — Haussperling 13. 107. 314. 378. 399. — Hauszaunkönig 272.
Hedrichsamen 142.
Heher 129.
Heiserkeit, Kanarien-, 37.
Heizstoff für die Vogelstube 155.
Hecke, Kanarien- 20. 83.
Helenafasänchen 20.
Heuschreckenstaar 81. — Heuschrecken zur Vogelfütterung 14. 91.
Hirse 4.
Hirundo rustica 329; H. urbica 329.
Hohlroller, Kanarien, 11; Hohlglucker, Kanarien, 12.
Holzheher 418.
Honigsauger 3. 4. 145. 250. 276.
House-Wren 272.
Hühner 15. 36. 53. 68. 93. 126. 130; H. aus Italien 7. 53. 156. 165. 172. 259. 380; H., beste Eierleger, 53; H., Inzucht der, 38; H., Pips der, 36. 61; H. von Livorno 156. — Hühnereier 26. — Hühnerfedern 356. 381. — Hühnerhof 126. — Hühnersterben (Ueberfütterung) 22. 323. — Hühnerzucht, Mittheilungen zur Hebung der, 61. 228. 275. 298.
Hüttensänger 61. 250. 256; H., aus dem Familienleben gefangener, 199.
Hyphantornis 162.
Hypotriarchis subbuteo 330.

Jagdbeute, seltene, 100.
Jahresversammlung der deutschen ornithologischen Gesellschaft 319. 343.
Jako 4. 63. 97. 153.
Jamaika-Trupial 60. 82.
Jamrach's Etablissement in London 304.
Icterus 81. 266. 272; I. cayanensis 82; I. baltimore 82; I. jamaicensis 82; I. spurius 82; I. xanthius 82.
Insektenschrot 90. — Insektenvögel, Verpflegung der, 35. — Insektenpulverspritze 32.
Inseparable 8. 65.
Junco hyemalis 265.

Kakadu, rosenrother, 367. 380.
Kalanderlerche 159. 386.
Kanarienvogel 1. 2. 9. 10. 11. 12. 15. 18. 19. 20. 24. 26. 27. 35. 36. 37. 42. 43. 44. 45. 46. 66. 67. 74. 75. 83. 105. 106. 109. 124. 125. 134. 142 143. 146. 147. 154. 155. 164. 189. 208. 217. 236. 245. 248. 251. 252. 273. 277. 289. 315. 316. 336. 340. 356. 363. 371. 375. 377. 391. 401. 421; K.-Bastarde, 125. 147. 155; K., Bogenroller, 11; K., Doppelglucker, 12. 289; K., Epilepsie bei, 44; K., freifliegende, 217. 277; K., Glucksvögel, 12. 67. 289; K., Harzer, schadet es dem Gesange, wenn dieselben zur Zucht gebraucht werden? 66. 74; K.-Hecke 20. 67; K., Hohlglucker, 12; K., Hohlroller, 11. 67. 74. 377; K.-Inzucht 20; K., Knarrroller, 11; K., Kollervögel, 289. 377; K., lautsingende, 44; K., leberkranke, 44; K., Legenoth der, 20; K., Leinsamen für, 20; K., Mauser, 44; K., Mohnsamen für, 49; K., Rollvögel, 11. 15. 18. 19. 24. 289; K., Schimmelvögel, 35; K., Sommerrübsen für, 19; K., Unterleibsentzündung der, 363. 401; K., Verhängen der, 105; K.-Markt 421; K.-Vorschläger 75. 106; K., Weißbrot für, 19; K.-Weibchen, Störung brütender durch Gewitter, 164; K., Zuchthähne, 74; K., Zudecken der, 105; K., erbliches Mal, 44; K., Fettleibigkeit, 44; K., Futtergefäße für, 2; K., gehaubte, 109; K.-Gesang 10. 74. 125. 142; K.-Handel 35; K.-Händler 4; K., Harzer, 9. 10. 15. 18. 20. 35. 37. 46. 83. 154. 289. 363. 371. 375; K., Heiserkeit, 37. 47. 363; K.-Käfig 45; K.-Krankheit 36. 37; K., Leberflecke; 44; K.-Markt 421; K.-Preise 27; K., säufischer, 18, K., Trompeter, 15; K., vierbeiniger, 27; K.-Weibchen, weshalb taugen so viele nichts? 155. 236. 245. 252; K.-Zucht, Ertrag, 19. 20; K.-Zucht in St. Andreasberg 1. 9. 18. 19. 26. 35. 42. 83. 125. 143; K.-Z., trauriges Mißgeschick einer, 189. 208; K., Erkrankung, 43; K., häufiges Sterben der jungen Harzer, 124. 133. 142. 146. 154; K., jährlicher Umsatz, 27; K., Kahlköpfigkeit der jungen, 316; K., klare Eier der, 26; K., rein hochgelbe, 26; K., Zwillinge, 26. — Kanariensamen 20. — Kanarienvogel, Kap'scher, 30; K., Pariser, 2. 15. 227; K., St. Helena-, 30; K., wilder, 124; K. des Vorgebirges der guten Hoffnung 30. 307.
Kandis, zum Kanarienfutter, 146.
Kaninchen, französische, 143; K.-Zucht und Liebhaberei 38; K.-Züchterei in Rheydt 38; K.-Z. zum Hasenstein in Kannstadt 111.
Kapaunen (Vortrag) 338. 355.
Kap-Feuerweber 162. — Kap-Kanarienvogel 307. — Kaptäubchen 385.
Kardinal, grauer, 123. 263; K., grüner, 122; K., rother, 46. 60. 75. 265. 365.
Katzen in St. Andreasberg 42. — Katzenvogel 54. 257.
Käfige, Anstrich für, 147; K. für Kanarienvögel 45. 106. 147; K. für Körnerfresser 192.
Keilschwanz-Lori 161.
Kernbeißer 43. 44; K., blauer, 30; K., rosenbrüstiger, 265.
Kerbthierfang und Verwendung zur Vogelfütterung 108.
Kibitz 58. 140.
Kiemenmolch 210.

Klatschtaube 6.
Knarrenroller, Kanarien-, 11.
Kochinchinahuhn 100. 126.
Kohlmeise 137. 337. 418.
Kolkrabe 370.
Kongreß der Geflügel- und Stubenvogelzüchter und Liebhaber 391.
Kormoran 149. 163. 248.
Kragensittich 161. 162.
Krammetsvögel 89. 126.
Kraniche 387.
Krähe 138.
Krämpfe bei kleinen Vögeln 133. 134.
Kreuzkraut 34. — Kreuzschnabelbildung bei Hühnern 412. — Kreuzschnabel 34. 60. 115. 158.
Kronenfink 44. 360.
Kröpfer 100.
Krummschnabel 257.
Krinitz 43.
Kuba-Amazone 54. — Kubafink 99. 180.
Kuhstaar 272. — Kuhvogel 272.
Kukuk 130. 138. 139. 392. 394. 418.
Kurzflügel-Papagei, rothbäuchiger, 54
Küken, Fütterung der, 228.

Lagopus alpinus 34.
Lachtaube 100.
Landhuhn 15.
Langschnabel 257.
Lärmdrossel 23.
Lasurmeise 337.
Leberfleck, der Kanarienvögel 44.
Legenoth der Wellensittiche 27.
Leghorns (Hühner) 157. 165. 172.
Leinfink 13. — Leinzeisig 419. — Leinsamen, für Kanarien, 20.
Lerchen 46. 139. 392; Lerche, Indianer-, 256; L., Mok-, 256. — Lerchen, Leipziger, 26. 69.
Leporiden 143.
Liebhabereien, anderweitige, 38. 111. 119. 195. 269.
Linnet 265.
Liotrix luteus 82. 337.
Long-tailed-chicadee 272.
Lophophanes bicolor 272.
Lori, blauer Gebirgs- 161; L., blaubäuchiger Keilschwanz 161; L., blauohriger Keilschwanz-, 63; L., von den blauen Bergen 47. 161. 392.
Loxia curvirosta 34. 60. 115.
Luftverbesserung in der Vogelstube 39.
Lungenentzündung, epidemisches Auftreten der, 264.

Madenerzeugung 61.
Magenkatarrh der Graupapageien 108.
Maikäferschrot 182.
Mandelkrähe 410.
Maneken, kap'sches, 29.
Mantelkardinal 29; Mantelkrähe 370.
Mariposa granatina 355: M, phoenicotis 355.
Maskenfink 30.
Mauerläufer 23. — Mauersegler 321.
Mauser, der Vögel, 1. 142. 410.
Mäusebussard 287. — Mäusejagd 100. — Mäuse in der Vogelstube 45. — Mäuse-Kalamität 55.
Meadow Lark 272.
Mehlwürmer 5. 159.
Meise 58. 337. 392. 399. 418; M., Blau-, 418; M., Kohl-, 418. — Meisen, amerikanische, 272.
Milan, rother, 163; M., schwarzer, 163.
Milben 43. 101; M. im Vogelbauer 43.
Mimus polyglottus 311.
Misteldrossel 421.
Mittheilungen, verschiedene, anderweitige, 195. 322. 331.
Mocking-Bird 257; M.-B., french 257; M.-B., Mountain, 257. 265.
Mohnsamen für Kanarien 19. 106.
Mohrenkopf-Papagei 114.
Molothrus pecoris 272.
Mozambique-Zeisig 30. 162. 180,
Mövchen 123; M., japanesisches, 384.
Muscicapa fusca 266.
Müllerchen 403.

Nachruf 279; N. d. Oberst v. Zittwitz 16.
Nachteule 378. 392.
Nachtigal 5. 20. 35. 137. 158. 216. 384; N., ungarische, 137; N., virginische, 265; Nachtigalenschläger, Kanarien, 12. 289.
Nachtschwalbe 411; N., amerikanische, 272.; N., karolinische, 272.
Napoleonsvogel 141; Napoleonsweber 141.
Nashornvogel 97. 129.
Nebelkrähe 370.
Nester für Bruthennen 192; Nestbehälter 164.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts 29. 44. 91. 355. 368. 385.
Nistkästen 15. 52. 54. 66. 69. 73. 83. 128. 141. 243. 340. 356; N. für Papageien 141; N., Schleusinger, 243; N. für Wellensittiche 5. 28; Nistvorrichtungen 164.
Nürnberger ornithologischer Verein 183.
Nymphe, entflogene, 386; N., Sittich, 12. 53. 158. 161. 347.

Ofen, für die Vogelstube, 15.
Ohreule (Uhu) 108. 411.
Old field Lark 272.
Organist 3. 276. 385; O., blaumackiger, 385.
Oriol 82. 272; O., kleiner brauner, 272.
Oriolus galbula 213; O. phoeniceus 257: O. regens 184; O. spurius 272.
Orchard-Oriol 272.
Ornithologische Kuriosa 327. 335; O. Neuigkeiten 49. 65.
Ornithologischer Verein „Aegintha" in Demmin 69; O. V. von Nürnberg 102; O. V. in Stettin 15. 31. 53. 62. 69. 84. 109. 135. 148. 166. 179. 192. 213. 223. 231. 239. 249. 325. 380. 397. 420; O. V. für das Toggenburg 7.
Ortygospiza polyzona 23.
Oryx 162.

Padda oryzivora 271.
Pandion haliaëtos 205.
Papageichen 91; P., blauscheiteliges, 91. — Papageien 4. 161; P., Charakteristik der Langflügel-, 113; P. graukopfige, 97.
Papstfink 46.
Paradisea papuana 389.
Paradies-Amadine 29. — Paradiesfink 29. — Paradiessittich 141. 161. 385. — Paradiessperling 29. — Paradiesvogel 389. — Paradieswitwe 53. 162; P. Gesang, der, 53.
Parus bicolor 272; P. cyaneus 337; P. septentrionalis 272.
Patagonier 74.
Perekit 54.
Perlhuhn 324. 420.
Pewee 266.
Pfaffenvogel 240. 307.
Pfingstvogel 213.
Phalacrocorax carbo 163.
Phöbe 265. — Phoebe-bird 266.
Pieplerche 49.
Pigeon batteur 6; P. claquart 6; P. tournant 6.
Pionias Maximiliani 113; P senegalus 114.
Pipilio erythrophthalmus 266.
Pips 36. 61. 126.
Pirol 138. 213. 401.
Pisangfresser 97.
Pitta 23.
Plattmönch 90. — Plattschweifsittich 53. 92. 161. 162. 163.
Platycercus Barnardi 161; P. Barrabandi 161; P. haematonotus 33. 53; P. multicolor 161; P. pulchellus 251. 307; P. pulcherrimus 161; P. semitorquatus 161.
Ploceus bengalensis 162; P. capensis 162; P. castaneofuscus 162; P. hypoxanthus 162; P. manyar 162; P. oryx 162; P. vitellinus 162.
Podiceps cristatus 187.
Port-Linkoln-Sittich 161.
Portorikopapagei 53. 54.

Poularden 338.
Prachtfinken 122. 162. 287. 407. 408; P., Eintheilung und Benennung der, 407; P. Fütterung 20; P., großschnäbelige, 408; P., kleinschnäbelige, 408.
Pratincola rubetra 263.
Preis, Kanarienvögel- 27. — Preisvertheilung des Vereins „Cypria" 93.
Psittacula cana 54. 65. 74. 161; P. passerina 54. 65. P. pullaria 65. 263; P. roseicollis 65.
Psittacus aureus 141; P. haematonotus 33. 52; P. leucocephalus 54; P. manachus 52; P. paradiseus 141; P. passerinus 65; P. patagonus 74; P. pulcherrimus 141; P. ruber 63; P. senegalus 97; P. Swainsoni 47.
Purple finch 265. — Purple grakle 266.
Purpurfink 265. 288.
Puten 127; P.-Zucht 127.
Pycnonotus obscurus 97.
Pyrrhula githaginea 30.

Quäker-Papageien 52; Q.-Sittich 74; Q.-S., Brut des, 52.
Quisqualus versicolor 266.

Raben 392; R., vergiftete, 55.
Rauchschwalbe 130. 321. 329.
Raubthiere, nützliche, 55. — Raubvögel, freie, innerhalb der Stadt Berlin, 248.
Rebhühner 23. 58. 347. 378; R., vergiftete, 55.
Reed-bird 266.
Red-bird 265. — Redstard american 272. — Red-wing 257.
Regentbird 184.
Reiher 60. 149. 163. 205. 346.
Reisvogel 140. 258. 271; R., Bruten, 140; R., amerikanischer, 266.
Rice-bird 266.
Riesenkrammetsvogel 421.
Ringelastrild 340. — Ringeltauben 14. 60. 411.
Ringschläger (Taube) 6; R., rheinischer, 6. 7. 21.
Robin 257; Robin, Swamp-, 257.
Rohrdommel 90. 139. — Rohrsänger 404. — Rohrsperling 138.
Rollvögel (Kanarien) 11. 15. 18. 19. 24. 105. 123.
Rothbrust, amerikanische, 257. — Rothbrüstchen 14. 412.
Rothkopf-Amadine 29. 170. — Rothkopffink 29. — Rothkehlchen 138. 159. 226. — Rothflügelstaar 257. — Rothrumpf 12. 33. 53. — Rothschwänzchen, amerikanisches, 272.
Rosenpapagei 65. 66. 89. 131. 132.
Ruchgras 162.
Rübsen 19. 106. 142. 146.

Saatkrähe 362.
Salangane 148.
Samoataube 65.
Sandy-mocker 257.
Sämereien (Vogelfutter), Preise, 27.
Sänger, beste einheimische, 383. 415. — Sängerfink 235. — Sänger, vortreffliche, 30.
Schaben, zur Vogelfütterung, 14.
Scharlachtangara 410.
Scheitel-Ruderfink 44. 360.
Schilffink 240.
Schildkröte, griechische, 119. — Schildsittich 161.
Schleiereule 55. 158. 321. 378.
Schmetterlingsfink 288. 355; S., Bastardbrut 3.
Schmuckfinken 161. 162. 408.
Schnabelbruch 141.
Schneeammer 272. — Schneehuhn, in Gefangenschaft brütend, 34. — Schneefink 265.
Schnepfen 392.
Schönbürzel 288. — Schönsittich 60. 251. 207. 380.
Schutzkäfig 7.
Schwalben 15. 130. 221. 276. 347. 392. — S., Verfolgung in Frankreich 49.
Schwarzamsel (Dumareau de la Malte) 129. — Schwarzdrossel 58. 129. 138. 226. — Schwarzhals 272. — Schwarzkopf 159. 226. 335. 403. — Schwarzvögel 266.
Schwefelfink 30.
Schwirrvögel 421.
Seidenschwanz 14. 60. 419.
Senecio vulgaris 34.
Sialia arctica 257; S. mexicana 257; S. sialis 61. 256.
Sicalis brasiliensis 263.
Singdrossel 138. 226. — Singsittich 12. 29. 33. 53. — Singsperling 265. — Sing- und Ziervögel, ausgestellte, 46. 93; S., Amerika's, 256. 265. 272.
Sittich, gelbwangiger, 54; S., Schmalschnabel-, 113; S., Neuseeländer, rothstirniger, 163.
Skylarck, Sprague's, 256.
Smiter 6.
Snow-bird 265. 272.
Song-Sparrow 265.
Sonnenvogel 82. 337.
Spatz, zahmer, 107.
Sperbergrasmücke 403.
Sperling 25. 42. 138. 192. 276. 392; S., rothköpfiger, 29; S., schwarzer, 149. — Sperlingspapagei 54. 65. 91. 131. — Sperlingstäubchen 291.
Spermestes 408; S. cucullata 12; S. erytrocephala 29; S. fasciata 59. — Spermestinae 408; Spermestinen 408.
Spottdrossel 166. 250. 257. 311. 373; S., amerikanische, Aufzucht der, 215; S., Berg-, 257; Spottvögel 97. 226.
Sprosser 14. 137. 141. 225. 383. 403. 415.
Staare 14. 25. 148. 163. 392. 393. 421; Staar, Baltimore-, 272; S.-Kasten 16;
Staats-Brieftaubenzucht 22.
Stämme, geringere, Kanarien-, 27.
Steinadler 100.
Stieglitz 13. 14. 138. 296. 392. 419; St., amerikanischer, 265. 273. 380; St.-Bastard 13. 146; St., Verfärbung des, 5.
Storch 25. 41. 330. 393; St., schwarzer, 205; St., weißer, sein Nutzen und Schaden, 41. 49. 57.
Strix silvestris 54.
Stubenvögel, einheimische, Alters-Kennzeichen der, 216. 225. — Stubenvogelzucht als Erwerb 171. 180. 200. 207. 218. 233. 241.
Sturnella magna 272.
Surnia uralensis 364.
Sylvia sialis 199.
Sycobius-Weber 97.

Tagebuchnotizen aus der Vogelstube 384.
Tangara, gelbe, 385.
Tanagra flava 385.
Taube 7. 21. 93. 131. 389; T., Prager Eule, 389; T., Klatscher, 6; T.-Krankheiten 364; T.-Preisfliegen auf der internationalen Ausstellung zu Bremen 210; T., Ringschläger-, 6. 7. 21; T.-Schießen in Pommern 175; Taube, Stralsunder, 389; T.-Thürme 7. — Taubenarten, fremdländische, 143.
Teichrohrsänger.
Telegraphendrähte als Vogelmörder 23.
Testudo graeca 119.
Tetrao albus 8. 34.
Thiere, Einfluß der Umgebung auf ihre Färbung, 391. — Thiergarten, Rill'scher, 258. 266. — Thierliebhaberei unter erschwerenden Umständen 21; T.-Transport aus Afrika 197; T.-Versteigerung in Antwerpen 282.
Thistle-bird 265.
Thrasher, brown, 257.
Thrush, Alice-, 257; T., gray-cheeked, 257; T., hermit-, 257; T., olive-backed-, 257; T., Pacific-, 257; T. Swainson-, 257; T. Wilson-, 257; T., Wood-, 257.
Thurmfalk 320.
Tigerfink 162. 288. 299. 410.
Tinnunculus staudarius 320.
Tit 272. — Titlark 272. — Titmice 272. — Titmouse 272.
Todesursache eines Jako 99. — Todtleger 298.
Tovisittich 241.
Towhee 266.
Trappe, große, 387; T., kleine, 387.
Trauerbotschaft 247. — Trauerzeisig 265.
Trinkgefäße für Kanarienvögel 2; T. für Vogelstuben 171. 305; T., Luftdruck-, 32. 365.
Troglodytes aëdon 272; T. hiemalis 272.
Trupial, Baltimore-, 272; T., Garten-, 272; T., goldgelber 82; T., Königs-, 184; T., Schiller-, 266.

Trychoglossus ornatus. *Linné* 63; T. Swainsoni-, 47. 161.
Tümmler 389.
Turdus Alicei 257; T. carolinensis 257; T. felifox 54; T. fuscescens 257; T. migratorius 54. 257; T. montanus 257; T. mustelinus 257; T. palasii 257; T. polyglottus 257. 311; T. rufus 257; T. viscivorus 241.
Turteltauben 392. 411.
Tyrannus fuscus 266.

Ueberwinterung, zur 155. 307.
Uhu 378; U., sonderbarer Tod eines, 108.
Unzertrennliche 65. 131. 263.
Uraleule 364.

Verein, „Aegintha" in Demmin 69. 308; V., „Badischer in Karlsruhe" 299; V., „Berolina" 267; V., Brieftauben-klub- in Frankfurt a. M. 4; V., „Canaria" in Stuttgart 412; V., „Cypria" in Berlin 7. 53. 62. 75. 397. 421; V. der Münchener Geflügel und Vogelfreunde 69. 77; V. der Vogelfreunde in Württemberg 54. 128. 316; V., Deutsche Ornithologen-Gesellschaft 39; V., Deutsche ornithologische Gesellschaft 205. 343; V., Elbinger Vogelschutz- 174; V., „Fauna" in Düsseldorf 62. 268. 277. 282. 292. 417; V., „Fauna" in Elberfeld 267; V., für Geflügelzucht in Köln 39. 55. 191. 203. 220. 228; V. für Geflügelzucht in Wien 363; V. für Vogelschutz und Geflügelzucht in Usingen 77. 128. 173; V., Gesellschaft der Vogelfreunde in Zürich 117; V., Hamburg-Altonaer, für Geflügelzucht, 245; V., Ornithologischer in Stettin 15. 31. 69. 109. 135. 173. 179. 192. 213. 223. 231. 239. 249. 325. 356. 360. 389. 397. 420; V., Ornithologischer für das Toggenburg, 7, 36; V, Ornithologischer in Nürnberg 102. 183. — Vereinen, aus den, 4. 7. 15. 31. 36. 39. 53. 54. 55. 62. 69. 75. 77. 84. 102. 109. 117. 128. 135. 143. 148. 173. 179. 183. 191. 192. 203. 205. 213. 220. 223. 228. 231. 239. 245. 249. 268. 277. 282. 292. 299. 308. 316. 325. 331. 343. 356. 360. 363. 380. 389. 397. 412. 417. 420. 421.
Verfärbung des Coereba cyanea 3; V. d. Honigsaugers 3. 145; V. d. Stieglitz 5.
Versandkäfig, Winter- 7. 45. — Versendung von Bruteiern 250.
Versteigerung in Antwerpen 353.
Vidua flaviscapulata 162; V. macroura 162; V. paradisea 162; V. serena 162.
Vielfarbiger Sittich 160.
Vogel-Ausstellung in Lichtenstein-Toggenburg und St. Gallen 36; V. in Zürich 118. — Vogelarten, Unverträglichkeiten einzelner, 263. — Vogelbauer, Anstrich für, 32. 192; V. Milben in, 43. — Vogelfang 26; V. in Deutschland 69. — Vogel-Fauna Oesterreichs 113. — Vogelfutterplätze 357. — Vogelfütterung, Heuschrecken zur, 14; V, Schaben zur, 14. — Vogelhandel in Mostau 59. —, Vogelhändlerkatzen 42. 52. — Vogelhaus, Dach des 51; V. des Herrn August F. Wiener in London 50; V., Fenster des, 51; V., innere Einrichtung des, 51; V., Wasserfall im, 123; V. (Wellensittiche) 27. 28; V. des Herrn Fabrikanten Vetter in Ludwigsburg 122; V., Boden des, 50; V., Holzwerk des, 52. — Vogelkolonie in Ostpreußen 163. — Vogelköpfe als Ziergegenstand für Damentoilette 4. — Vogelkrankheiten 12. 20. 22. 23. 26. 28. 35. 36. 37. 43. 44. 45. 47. 61. 90. 92. 93. 100. 108. 115. 124. 126. 127. 133. 134. 141. 142. 146. 153. 154. 159. 166. 180. 202. 208. 227. 235. 249. 299. 306. 316. 323. 363. 364. 373. 380. 388. 401. 410. 421. — Vogelliebhaberei 29; V. im fernen Rußland 13; V. und Lyrik 107; V. und Zucht in Oesterreich 123. — Vogelmarkt, neue und seltenere Erscheinungen des, 29. 44. 91. 355. 360. 368. 385. — Vogelmiere 34. — Vogelnester, zerstörte, 55. — Vogelschutz 5. 16. 17. 25. 26. 79. 89. 121. 169. 311. 356. 359. 389. 399. 420; V.-Gesetz 17. 26. — Vogelsprache, die im Volksmunde, 129. 137. — Vogelstuben, aus den deutschen, 3. 12. 20. 53. 59. 127. 141. — Vogelstube des Herrn Fabrikanten L. Nesmirak 400. 410; V., Mäuse in der, 45; V. des Dr. Karl Ruß 92. 169; V., des Herrn Wigand in Zeitz 127; V., lose Plauderei aus der, 287; V., Ofen für die, 15. 39. 155; V., Tagebuch-Notizen aus der, 384. 392. 401. — Vogel- und Geflügelausstellung in Stettin 31. 109. — Vogelversendungen 116. 227. 324. — Vogelzucht 73. 127. 140 141. 169. 360. 369.
Voliere 127. 155; V. für Wellensittiche 28.
Vortrag des Herrn Dr. Hansmann 314. 320. 329
Vögel, Bezug fremdländischer während des Winters, 409; V., deutsche, in Amerika 217; V., freilebende, 25; V., Guano-, 255; V., Mauser der, 1. 12; V, nistende, 5; V., nützliche, 255; V., schädliche, 255; V., Ueberwinterung, 161; V., Ungeziefer der, 346; V. zur Bereitung von Heilmitteln 392; V. von West-Afrika 97.

Wachtel 139. 386. 392; W., kalifornische, 321. — Wachtelfink 23. 29.
Walddrossel 257. — W.-Hühner 255. — W.-Ohreule 54. — Waldschnepfe 412.
Wanderdrossel, amerikanische, 54. 257; Wanderfalk 163; Wanderzug der heimischen Vögel 397.
Warnung 188.
Wasserfall im Vogelhause 123.
Webervogel 141. 161. 162; W., Baya-, 162; W., dottergelber, 162; W., Fuchs-, 162; W., gelbköpfiger, 162; W., indischer, 162; W., Manyar-, 162; W., Textor-, 163; W., weißbäckiger, 162.
Weihe 377.
Weißbrot für Kanarien 19.
Wellensittiche 158. 161. 180. 207. 218. 242. 249. 292. 308. 315. 328. 375. 379; W., Brutzeit, 29. 123; W., Fütterung, 5. 28; W., Krankheiten, 22. 36. 46. 148; W., Legenoth, 27; W., Nistgelegenheiten, 28; W., Nistkasten für, 5 28; W., Preis in Rußland, 14; W., über Akklimatisirung und Zucht der, 27; W., Verfärbung, 46; W., Vogelhaus, 27. 28; W., Volière, 28; W., Wassersucht, 28; W., Zucht der, 5. 28. 101. 133. 141. 171. 200. 233. 267. 297.
Wendehals 263. 411.
Whip-poor-will 272.
Wiedehopf 14. 138. 139. 263. 264. 392. 395.
Wiesenlerche 272. — Wiesenschmätzer 263.
Wildente 387. — Wildgans 411. — Wildtaube 14. 139. — Wild, vergiftetes, 55.
Winter-Versandtkäfig 7. 45. — Winter-Wren 272. — Winter-Zaunkönig 272.
Witwe, Dominikaner-, 162; W., gelbschulterige, 162; W., Paradies-, 162; W., Trauer-, 162; Witwenvögel 161. 162.
Würger 54. 251. 411.
Wüstentrompeter 30.

Yellow bird 265.
Yunx torquilla 263.

Zaunkönig 138. 392. 418; Z., amerikanischer, 277.
Zebrafink 288. 297. 307. 329.
Zeisig 13. 14. 259. 296; Z., schwarzköpfiger, 250. 276.
Ziegenmelker 272.
Ziegensittich 163.
Zippe 138.
Zoologischer Garten in Basel 175. 241; Z. G. in Berlin 190; Z. G. in Düsseldorf 417; Z. G. in Hamburg 62. 85. 101. 337.; Z. G. zu Münster 31.
Zosterops palpebrosa 338. 368.
Züchterei, Kanarienvögel-, in St. Andreasberg, 1. 9. 18. 19. 26. — Züchtungen in Käfigen 241; Z.-Ergebnisse, Wellensittich-, 28; Z.-Versuche mit einheimischen Finken 13. 233; Z.-V. mit Fichtenkreuzschnäbeln 115. — Zucht des Kubafink 99.
Zur Fütterung 4. 38. 60.
Zur Geschichte des Pariser Kanarienvogels 2.
Zwergpapagei, Nisten der, 65. 73. 82. 89. 121. 131. 132; Z., grauköpfiger, 54. 82. 133.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Alle 8 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 1. Januar 1874. Nr. 1.

Inhalt:

Kanarienvogel-Zucht in Andreasberg. —
Zur Geschichte des Pariser Kanarienvogels. —
Eine Brut der weißköpfigen Nonne. —
Aus den deutschen Vogelstuben: Bastardbrut, Organist, Honigsauger. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Brieftauben; Kanarienvogel-Händler; Mode als Feindin der Singvögel.
Zur Fütterung: Kanariensamen; zur Haltung des Stieglitz, zur Haltung der Nachtigal. —
Anfragen und Auskunft: Wellensittiche. —
Zum Vogelschutz: In der Schweiz.
Zur Geflügelzucht: Der Ringschläger; Italienische Hühner; Gänsetransport. — Ein Winter-Versandtkäfig. —
Aus den Vereinen: Ornithologischer Verein für das Toggenburg; „Cypria" in Berlin. —
Briefwechsel. — Anzeigen.

Kanarienvogel-Zucht in St. Andreasberg.

(Reisebericht von Kontroleur W. Böcker in Wetzlar).

Für den Liebhaber und Züchter der Harzer Kanarien giebt es keine traurigere Zeit, als diejenige der alljährlichen Mauser der Vögel. Die erste und zweite Hecke hat vielleicht nicht ganz befriedigt; die dritte Brut kann möglicher Weise den Ausfall ersetzen, aber da zeigen sich schon die ersten Spuren, die ersten nachtheiligen Folgen der eingetretenen Mauser. Die eifrigsten Brüterinnen verlassen ihre Nester; in andern Nestern findet man ein klares Gelege, ein Beweis, daß das mauserkranke Männchen sich mit dem Weibchen nicht mehr fruchtbringend paaren konnte. Der Gesang der Hähne wird schwächer und schwächer, zuletzt wol gar heiser und die sonst so lebhaften, muntern Vögel sitzen nicht selten mit gesträubtem Gefieder da und man fragt sich besorgt, wird dieser oder jener vorzügliche Sänger auch die Mauser überstehen? Auch die jungen Vögel gewähren nicht mehr das Vergnügen, als sonst. Zwar leiden sie bei dieser ersten Mauser weniger; indeß während sich ihr Gesang rasch vervollkommnete, so lange die alten Hähne sangen, bleiben sie nun zurück und gegen das Ende der Mauser singt mancher junge Vogel fast weniger gut, als vier Wochen früher. Wie mag es da wol in Andreasberg aussehen? Welche Mittel werden dort angewendet, um die Mauser zu beschleunigen und den Nachtheilen vorzubeugen, welche eine lange Rauhzeit für den Gesang eines tüchtigen Schlägers öfter im Gefolge hat?

Manches war mir in dieser Hinsicht von Händlern und Züchtern des Harzes bereits mitgetheilt, indeß der Augenschein ist der beste Lehrmeister und so entschloß ich mich denn, nicht mit leichtem Herzen, meine vorjährigen Sommerferien zu einem Ausflug in den Harz, vor allen Dingen nach Andreasberg zu benutzen.

Meine diesmalige Reise fiel in die Zeit vom 22. bis zum 29. August. Wenn man bedenkt, daß um diese Zeit der Gesang der Vögel fast auf Null gesunken ist, daß es mir vielleicht nicht möglich würde, meinem letzten Reisebericht — bitte Nr. 1 und 3 der vorjährigen „Gefiederten Welt" zu vergleichen — etwas Neues hinzuzufügen, so wird man mir zugeben müssen, daß eine Reise nach Andreasberg unter solchen Umständen schon ein kleines Wagniß war, um so mehr, als mir der Besuch von zahlreichen Kurgästen daselbst jede Aussicht benahm, in einem Privathause ein Unterkommen zu finden. Ich möchte es daher auch Niemand anrathen, während der Mauser der Vögel eine derartige Reise zu ähnlichem Zwecke zu unternehmen; es könnte ihm leicht gehen, wie jenem geistlichen Herrn, der die anziehenden Schilderungen des Herrn Julius von Wickede im letzten Jahrgange des „Daheim," — die Kanarien-Zucht in Andreasberg betreffend — gelesen und sich nun gelegentlich einer Erholungsreise über diesen merkwürdigen Erwerbszweig an Ort und Stelle unterrichten wollte. Er klagte mir im Verlaufe eines Tischgesprächs, daß er

auf die Empfehlung Dieses und Jenes verschiedene Züchtereien besucht, daß er aber nichts gehört habe, da sämmtliche Vögel, wie man ihm gesagt, in der Mauser seien. Natürlich! so en passant läßt sich das nicht abmachen; es gehört viel Geduld und, was die Hauptsache ist, eine nicht ganz geringe Vorkenntniß dazu, während der Mauser seine Studien in dieser Hinsicht zu machen. Vor allen Dingen muß man die kleinen Kunstgriffe kennen, einen jeden Vogel, dessen Gesang noch nicht ganz verstummt ist, oder der eben wieder damit begonnen, zu jeder Zeit zum Gesange zu reizen.

Der erste Nachmittag, den ich in Andreasberg zubrachte, verlief mit Einziehung von Erkundigungen, wer zur Zeit im Besitze der besten Stämme von Kanarien sich befinde; soviel ich an jenem Nachmittage Gelegenheit hatte, im Vorbeigehen auf den Gesang der Vögel zu achten, schien mir die Reise eine fast verfehlte zu sein. An den folgenden fünf Tagen habe ich aber in den verschiedenen Züchtereien, die ich besuchte, manchen vortrefflichen Sänger, leider auch, wie im vorigen Jahre, manchen geringen Vogel gehört. Zum Theil hatten dieselben in ihrem Gesange keine Pause gemacht; zum Theil fangen sie schon wieder, obgleich sie die Mauser noch nicht ganz überstanden hatten; die Mehrzahl allerdings war zur Zeit noch stumm; was ich indeß hörte, war immerhin genug, um den Werth des Gesanges, folglich auch den Werth der gesammten Hecke mit ziemlicher Sicherheit bestimmen zu können.

Die alten Zuchthähne saßen meistens schon wieder in Einzelkäfigen, in den in meinem frühern Reisebericht erwähnten, hölzernen Bauerchen, beziehungsweise in hölzernen Kasten. Letztere waren zum Theile schon wieder verhangen, obgleich die Vögel nicht vollständig ausgefedert hatten. Die Entziehung des vollen Tageslichts während der Mauser war hier unschädlich, da es den Vögeln an der erforderlichen Wärme nicht gebrach.

Die Nachzucht befand sich, nach den Geschlechtern getrennt, in großen Fluggebauern, die Weibchen waren meist in denselben Zimmern, worin sich die jungen Hähne befanden, und nur da, wo solches der Raum gestattete, hatte man ihnen ein besonderes Zimmer eingeräumt. Die zur eigenen Zucht nicht erforderlichen Weibchen waren schon in den Händen der Händler; man hatte, wie dies überhaupt geschieht, meistens nur junge diesjährige Vögel zurückbehalten.

Ein Theil der alten Zuchthähne befand sich unter der diesjährigen männlichen Nachzucht, angeblich, damit die Jungen den Gesang derselben besser hören könnten; meist waren es aber wol nur diejenigen Hähne, auf deren Gesang man zu wenig Gewicht legte, um sie ferner noch zu behalten. Sonst wäre es ja gerathener gewesen, sie in Einzelkäfige zu bringen, damit sie ihren Gesang um so ungestörter hätten einüben können.

Auch verschiedene junge Vögel befanden sich in noch unverdeckten einzelnen Bauerchen; es waren das diejenigen, unter denen die Züchter für den eignen nächstjährigen Bedarf wählten.

In einigen wenigen Züchtereien befanden sich die Vögel, ausschließlich der Weibchen noch in den eigentlichen fliegenden Hecken. Derartige Hecken gab es im Ganzen wenige; die meisten Jungen werden in großen, ganz aus Holz hergestellten Flugkäfigen gezogen. Der Raum in den fliegenden Hecken war im Verhältniß zu der Zahl der eingesetzten Zuchtvögel sehr beschränkt. In einer durch ein hölzernes Gitter hergestellten Zimmerabtheilung von ungefähr 6□ Meter Bodenfläche und 2½ Meter Höhe waren 8 Zuchthähne und die vierfache Anzahl von Weibchen eingeworfen. Die hölzernen Nistkästen hingen hier fast unmittelbar neben einander meist in halber Zimmerhöhe. In verschiedenen Züchtereien waren diese Nistkästchen mit einem Kalkanstriche versehen, zum Schutze gegen die Milben.

In den Fluggebauern saßen die Vögel ebenfalls dicht gedrängt zusammen; daher mochte es rühren, daß verschiedenen jungen Vögeln an Rücken und Schwanz die Federn ausgerupft waren. Einen bestimmten Vogel aus diesen Käfigen herauszufangen hatte seine Schwierigkeiten, meist geschah es in der Weise, daß man damit wartete, bis der Vogel sich an einen leicht zugänglichen Platz setzte, hierauf durch eine dritte Person die Fensterläden schließen ließ und nun den Vogel, der sich in der Dunkelheit ruhig verhielt, mit der Hand von seinem Platze wegnahm. Auf diese Weise war in einer Hecke ein männlicher Eierfresser, nachdem er sich mit dem Weibchen gepart, wiederholt entfernt worden.

Die im Gebrauch befindlichen Futtergefäße waren aus Holz gefertigt, 12 bis 18 Zoll lang, 2 Zoll tief und 2 bis 2½ Zoll weit. Sie wurden zur Hälfte mit Samen gefüllt; bei dieser zweckmäßigen Einrichtung konnte nur wenig Futter verstreut werden. Letzteres ging übrigens nicht verloren. Es wurde gesammelt, gereinigt und theils den Weibchen vorgesetzt, theils ließ man es, sorgfältig gewaschen und getrocknet, zu Oel schlagen. — Die Trinkgeschirre bestanden aus thönernen Näpfchen, von etwa 4 bis 5 Zoll Durchmesser oben; sie waren zum Schutze gegen einfallenden Unrat mit einem besondern Deckel aus Thon versehen, welcher drei Löcher von Zollgröße enthielt und nebenbei dazu diente, das unzeitige Baden der Weibchen während der Brut zu verhüten.

Diese Trinknäpfchen werden zum Preise von 15 Pfennigen von einer Töpferin aus Lauterberg am Harz, Frau Göden, bezogen. (Fortsetzung folgt).

Zur Geschichte des Pariser Kanarienvogels.

Herr Haushofmeister Meyer theilt uns freundlichst das Nachfolgende über die erste Einführung und Züchtung dieses Vogels in Deutschland mit.

Im Herbst des Jahres 1847 machte ich eine Reise mit J. K. H. der Frau Prinzessin Karl von Preußen nach Italien, auf der Rückreise hielten wir uns den Monat Oktober in Tirol (Meran) auf. Von dort reisten wir nach Baden-Baden, wo wir vom November 1847 bis April 1848 blieben. Während der ganzen Reise bemühte ich mich, seltene Kanarienvögel und Tauben aufzusuchen. Von letzteren fand ich gar nichts Seltenes. Von Baden-Baden aus machte ich verschiedene Ausflüge nach Straßburg, wo ich dann die schönen großen Kanarien-Vögel (Pariser) fand. Ich kaufte dort 3 Männchen und 5 Weibchen für den Preis von 115 Fr. Unter diesen 8 Köpfen waren zwei bunte, drei hochgelbe und drei blaßgelbe. In den ersten Tagen im Monat März (3. oder 5. März)

trafen wir in Berlin ein, ich setzte sofort die 3 Männchen mit 3 der schönsten Weibchen in die Hecke, jedes Paar einzeln, und die beiden noch übrigen Weibchen setzte ich mit einem schön schlagenden Harzer in die Hecke, um zu kreuzen. Gleich bei der ersten Brut sah ich, daß diese Vögel zur Zucht wenig taugten, nahm ihnen bei der zweiten Brut die Eier fort, ließ sie durch andere Kanarienvögel ausbrüten und die Jungen auffüttern, wodurch es mir denn auch gelang, fünf Echte und sieben Bastarde von dem Harzer Hahn zu ziehen. Nun war mein erstes Bemühen, den jungen Hähnen einen bessern Schlag beizubringen, dies gelang mir aber nicht, obgleich sie vom frühester Jugend an den besten Vorschläger hatten. Im zweiten Jahre benutzte ich sämmtliche Junge und auch die Alten wieder zum Hecken, es gelang mir auch wieder, mehrere gekreuzte Junge zu ziehen; letztere hatten etwas besser singen gelernt.

Nach zwei Jahren sah ich dann bestimmt ein, daß die Vögel durchaus keine Anlagen hatten, auch nur das Geringste zu lernen und dadurch verloren sie bei mir ihren Werth, da ich stets nur auf guten Gesang bei den Kanarien gehalten habe. Im dritten Jahre verkaufte ich die Alten und mehre Junge, behielt nur sechs Paar der schönsten Jungen. Das Kreuzen gab ich ganz auf, da ich die Ueberzeugung gewonnen hatte, daß aus den Gekreuzten nie treffliche Schläger hervorgehen würden. Die Gekreuzten waren im Uebrigen schöne kräftige Vögel, immer aber mit rauher und harter Stimme, auch haben sie keine anhalten Rollen lernen können, sondern brachen stets kurz ab.

Da unter den Vogelliebhabern in Deutschland diese Vögel damals noch gar nicht bekannt waren, machte ich damit viel Aufsehen in Berlin und vielen andern Städten, wo man von diesen Vögeln gehört. Im ersten Jahre des Verkaufs bezahlte man mir freiwillig das Paar mit 20 Thlr., alle wurden in Berlin verkauft an verschiedene Liebhaber. Zwei Jahre darauf faßte ich den Entschluß, alle Pariser Kanarienvögel wieder abzuschaffen, da ich ja die feste Ueberzeugung hatte, daß sie sich bei der größten Mühe doch nicht im Gesange besserten.

Im letzten Jahre des Verkaufs bekam ich 10 bis 15 Thlr. für das Paar; die meisten verkaufte ich an einen Schirmfabrikanten in Braunschweig, dessen Name mir entfallen.

Eine Brut der weißköpfigen Nonne.
(Spermestes maja).

In meiner Vogelstube, welche nur mit Prachtfinken besetzt ist, bezog ein Pärchen weißköpfiger Nonnen (Spermestes maja) ein im Eichengebüsch etwa 5 Fuß hoch früher von Diamantvögeln aus allerhand Niststoffen erbautes geschlossenes Nest mit seitlichem Eingange, stutzte es einigermaßen mit Indiafasern zurecht und hatte bald vier weiße, längliche Eier, welche das Weibchen sehr emsig bebrütete, während das Männchen dicht dabei auf einem Zweige Wache und fremde Eindringlinge fern hielt. Das sonst so scheue Weibchen war während der Brut so dreist wie wenige meiner Brutvögel. Leider kamen aber trotzdem keine Jungen aus. Nachdem ich die unbefruchteten Eier entfernt hatte, schritten die Vögelchen sofort in demselben Neste zur zweiten Brut, und hatten diesmal wieder 4 Eier, von denen sich eins nach einigen Tagen verlor. Das Weibchen brütete diesmal ebenso emsig, war aber scheuer als beim ersten Male. Da, am 9. Bruttage vertrieb ein Schilffink (Spermestes castaneothorax) das Männchen und setzte sich mit Beharrlichkeit vor das Flugloch des Nestes auf einen Zweig, worauf jedesmal das Nonnen-Weibchen heftig hervorschoß und den Störenfried vertrieb.

Der Schilffink war unermüdlich und hatte endlich am 10. Tage erreicht, daß die Nonnen das Nest ihm überließen, worauf er es sich darin bequem machte, und allein emsig auf den Eiern weiter brütete. Am 14. Tage waren zwei junge Nonnen ausgeschlüpft, von denen die eine bald verschwand, die andere aber von dem Eindringling treulich gepflegt wurde, bis plötzlich am 16. Tage des Brutgeschäfts, als das Junge also zwei Tage alt war, die alten Nonnen, die sich fast sechs Tage lang nicht im Geringsten mehr um das Nest gekümmert hatten, den Fremden aus dem Neste wieder vertrieben, es wieder bezogen, und jetzt das Junge eifrig erziehen; dasselbe ist jetzt bereits sechs Tage alt, ganz munter, und ich hoffe es aufzuziehen. Georg Lincke, Fabrik-Direktor in Lanisch.

(Wir bitten um sorgfältige Beschreibung des Jugendkleides, wenn die junge Nonne ausfliegt. — Auch Ihre übrigen uns freundlichst zugesagten Beiträge sind sehr willkommen. D. R.).

Aus den Deutschen Vogelstuben.

...Eine Bastard-Brut zwischen Amarant (A. minima) und Schmetterlingsfink (A. phoenicotis) blieb ohne Erfolg. Ich gestattete den Vögeln länger als 4 Wochen Zeit, um die Eier auszubrüten und als ich dennoch keine Jungen auskommen sah, untersuchte ich das Nest. Es enthielt fünf reine weiße, aber unbefruchtete Eier. Ich nahm das Nest fort. Aber bald nachher bemerkte ich, daß sich die Vögel wieder parten. Sie bauten ein neues, ziemlich liederliches Nest, in einem Harzer Bauerchen und es sind vermuthlich wieder Eier darin. Wenigstens besuchen die Vögel das Nest fleißig und anhaltend. Es ist sehr hoch angebracht, ich kann es daher nicht untersuchen. Späterhin berichte ich über den Ausgang.

Mein Organist (Euphone violacea), den ich jetzt bereits seit Monaten besitze, befindet sich wol und ist munter. Er hat seinen verlornen Schwanz wiederhergestellt, singt fleißig und beginnt die Mauser.

Nichts Schlimmeres kann ich von dem Honigsauger (Coereba cyanea) berichten. Der Vogel ist äußerst munter, ja er ist sehr vergnügt und ich habe von ihm schon oft einen leisen, zwitschernden, aber ganz niedlichen Gesang gehört. Auch heut ließ er ihn schon erklingen. Die Farbe des Vogels war, unmittelbar nach der Mauser abscheulich; Kopf, Hals, Rücken häßlich schmutzig-olivengrün, Kehle, Unterhals, Brust und Bauch schmutzig-graugrün, aber hell. Jetzt ist der Vogel oberhalb prächtig dunkel olivengrün und auf Kehle, Brust und Bauch färben sich einzelne Federchen in prächtiges Kornblumenblau. Ich hoffe

um so mehr, daß die alte herrliche Farbenpracht zurückkehren werde, als das prachtvolle Blau sich schon am Bürzel und zum Theil unter den Schwungfedern der Flügel, wieder vollständig eingefunden hat. Diese Verfärbung geht außerordentlich langsam vor sich. Daß ich an diesen Vögeln Freude habe, darf ich wol nicht versichern. Heer, Kreisgerichtsrath in Striegau.

(Von den sechszig Köpfen Honigsauger, welche im Herbst nach Deutschland eingeführt wurden, ist der Ihrige jedenfalls der letzte. Im Berliner Aquarium war bis vor Kurzem ebenfalls noch einer; in meiner Vogelstube aber, wie bei allen Liebhabern, von denen mir Mittheilung geworden, sind diese leider nur zu zarten Vögelchen sämmtlich gestorben. Der Letzte, in Ihrem Besitz, erscheint daher um so interessanter. Hoffentlich wird er die Verfärbung zum Prachtgefieder ebenfalls glücklich bestehen und wir bitten sehr, um freundliche Nachricht über den Verlauf derselben. — Einen Organist habe ich ebenfalls — von 5 Männchen und 4 Weibchen — ein prachtvolles Mch. am Leben erhalten. Dr. K. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Frankfurt a. M. Der hiesige Brieftauben-Klub hat entschiedenes Unglück. In den jüngsten Tagen sind ihm nicht weniger als 50 Tauben, größtentheils die besten, weggeschossen worden. Mitunter kamen die Thierchen angeschossen noch in den Schlag, wo sie alsbald verendeten. Hierbei sei zugleich den Brieftauben-Liebhabern angezeigt, daß bei dem letzten Preisflug die Brieftauben den Weg von Brüssel bis hierher in 7 Stunden zurückgelegt haben. (Frankf. Ztg.).

Gleiwitz. Vor einiger Zeit hausirte hierorts ein Kanarienvogel-Händler der seine Vögel von Haus zu Haus trug und, da dieselben verhältnißmäßig billig waren, auch gute Geschäfte machte. Allein den Schaden wurden die Käufer erst später gewahr, da es sich herausstellte, daß die gekauften Vögel sämmtlich Weibchen waren, die für 2—3 Thlr. gekauft, kaum 10 Sgr. werth sind.

**Die geschmackvollen Proben, welche die brasilianische Ausstellung im Industriepalaste der Wiener-Weltausstellung in der Verwendung von Vogelköpfen als Ziergegenstand für Damentoilette gebracht hat, fanden in Wien rasche Nachahmung und die Mode, Vogelköpfe auf die Damenhüte zu setzen, verbreitete sich von hier aus mit großer Schnelligkeit. Da unsere Fauna Kolibris und Paradiesvögel nicht aufweist, so nimmt man mit heimischen Vögeln vorlieb, die ja auch ganz zierliche Köpfchen haben. Leider müssen aber so viele Tausende kleiner Vögel zum Opfer gebracht werden und man wird jetzt um so mehr um Schutz der Singvögel rufen müssen. Die Marktbehörden könnten nun wol, um dem Gesetze zum Schutze der Singvögel Nachdruck zu verleihen, die Marktordnung strenge handhaben und durch die Ueberwachung der Märkte verhüten, daß Singvögel zum Verkauf gebracht werden. Können sie aber auch die Marchandes de Mode überwachen? Können sie es verhüten, daß sich die Damen ihre Hüte mit den Köpfen von heimischen Singvögeln putzen? Zu Tausenden werden die Thierchen nach Wien gebracht; den Kopf nimmt die Marchande de Mode oder die Federschmückerin, der Leib des kleinen Thieres wird dann zu — 2 kr. für's Stück verkauft und von den Hausfrauen als billige Delikatesse auf den Tisch gesetzt.

(Weltausstellungs-Ztg.)

Zur Fütterung.

Auch die kleinsten fremdländischen Finken füttern die Holländer mit gutem, kleinkörnigen Kanariensamen fast ausschließlich, und zwar weil sie aus langer Erfahrung die Ueberzeugung erlangt haben, daß diese Vögel dabei vorzugsweise kräftig werden und ausdauernd sich zeigen. Die Vögel daran zu gewöhnen ist in der That nicht so leicht, als man glauben mag; es erfordert viel Zeit und Geduld und eine beträchtliche Anzahl geht dabei zu Grunde, welche aber so wie so darauf gehen würde und die jetzt nur schneller verenden, weil sie schon die Kraft verloren haben, den Kanariensamen zu enthülsen. Die Gewöhnung an die verschiedenen Sorten Hirse geht leichter von statten; dieselbe ernährt aber den Vogel in der Gefangenschaft zu kläglich. Etwas ganz anderes ist es im freien Zustande, wo den Vogel Klima und Flug so begünstigen, daß er bei jeder Nahrung seine Kraft erhält.

Die Holländer lassen sich aus diesem Grunde die fremdländischen Vögel stets besser bezahlen und erwiedern trocken, wenn man mit ihnen um den Preis streiten will: die Vögel sind an Kanariensamen gewöhnt und daher kräftig und ausdauernd. Und sie haben Recht. —

Die so beliebt gewordene und mehr und mehr Nachahmung findende Fütterung der kleinen Fremdländer, selbst mancher Papageien mit frischen, trockenen und erweichten Ameisenpuppen, Eigelbfutter u. dgl. erachte ich für naturwidrig und schädlich. Denn diese Vögel haben dergleichen im freien Zustande nie gesehen, geschweige denn gekostet und trotz dieser Enthaltung befinden sie sich bei ihrem natürlichen Futter in freiem Zustande wohl, verderben sich an demselben niemals den Magen und überschreiten nicht oder doch nur mit höchst seltenen Ausnahmen, das natürliche Maß der Züchtung oder richtiger gesagt, der Vermehrung. Wie nachtheilig diese Fütterung auf die in Gefangenschaft lebenden Vögel einwirkt, hat mich nicht allein langjährige eigne Erfahrung gelehrt, sondern zur Genüge beweisen es auch die Berichte, welche zeitweilig die „Gefiederte Welt" darüber enthält. —

Daß Fütterung auf die Farbe der Vögel Einfluß hat, ist längst allbekannt; unweit stärker aber üben Luft, Klima, freier Flug einen solchen aus. Dies ist z. B. an unserm Stieglitz auffallend zu sehen; sobald er nur ein Jahr in der Zimmerluft zugebracht und nach dieser Zeit mit einem frisch eingefangenen Seinesgleichen zusammen gesellt und verglichen wird.

Unbestreitbar bleibt, daß nicht nur die kleinen fremden Finken, sondern auch viele Papageien und vorzugsweise der Graupapagei oder Jako nach dem zweiten Jahre ihrer Einwanderung vorzugsweise mit gutem Kanariensamen gefüttert, sich am besten erhalten und daß der letzt gedachte werthvolle Vogel bei dieser Fütterung sich niemals das Gefieder zerreißen (auszupfen) wird. Reiner Samen sagt den Vögeln

zweifellos besser zu, als die Fütterung mit Leipziger Allerlei. C. Lintz, Naturalist in Hamburg.

(Auch wir sind der Ansicht, daß für soeben oder kürzlich angekommene Vögel nur Sämereien und vornämlich Kanariensamen und die beste weiße Hirse am zuträglichsten sind. Ein großer Unterschied in dem Ernährungswerth von Kanariensamen und guter Hirse wird sich wol nicht ergeben, da Beide in den Bestandtheilen ziemlich übereinstimmend sind. Für nistende Vögel ist sodann aber eine Beigabe von Fleischfutter (Ameisenpuppen, Mehlwürmer, Eigelbgemisch) durchaus nothwendig, denn dieselbe muß ihnen die Insektennahrung ersetzen. Ebenso wie unser Edelfink und andere Finkenvögel zum Auffüttern ihrer Jungen Kerbthiere und deren Larven bedürfen, so ist dies auch bei vielen fremdländischen Finken der Fall und diese sucht man ihnen daher naturgemäß zu ersetzen. Dagegen gehen allerdings viele kürzlich eingeführte Vögel aller Arten daran zu Grunde, daß sie in den Vogelstuben u. s. w. solch Mischfutter fressen, und man sollte daher alle frisch angekommenen Vöge längere Zeit hindurch in Käfigen abgesondert halten, bis sie sich erst völlig eingewöhnt haben. D. R.).

In der Regel verfärbt sich das schöne Roth der Stieglitze in der Gefangenschaft sehr bald, so daß diese schönsten unser inländischen Vögel an Farbenschmuck bedeutend verlieren. Aus meiner Erfahrung kann ich die Thatsache bestätigen, daß Stieglitze, die hauptsächlich mit Distelsamen, den man sammt dem Samenkolben in den Käfig steckt, gefüttert werden, Sommer und Winter hindurch die lebhaftesten Farben behalten.

G. Göller, Pfarrer in Alfdorf bei Lorch in Würtemberg.

Die bequemste und gesündeste Fütterung der Nachtigalen scheint nach meiner vieljährigen Erfahrung die zu sein, wenn man Sommers nichts als frische Ameisenpuppen füttert und Winters gedörrte mit 6, höchstens 10 Stück Mehlwürmern. Will man im Winter etwas Uebriges thun, so legt man die nöthige Portion gedörrte Ameisenpuppen vor der Fütterung etwa 6—8 Stunden zwischen dickes, mit Wasser getränktes Löschpapier, wovon die Ameisenpuppen aufquellen, ohne daß sie zusammenkleben, wie es der Fall zu sein pflegt, wenn man dieselben in Wasser einquellt.

Von dieser Fütterung bleiben die Nachtigalen nicht blos gesund, sondern dieselben fangen auch sehr frühzeitig an zu singen. Pfarrer Göller.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Gleich der Zucht der Kanarien- und kleinern fremdländischen Schmuck-Vögel kann die Zucht der Wellensittiche zu einer der beliebtesten in neuerer Zeit für Private gerechnet werden und es wäre gewiß für viele Ihrer Leser sehr erwünscht, wenn einige Erläuterungen über die Zucht dieser unter Vogelfreunden so beliebten Papageien angegeben würden, namentlich über die Behandlung derselben in kleineren Heckkäfigen, nicht in großen Vogelstuben, denn es ist doch nicht allen Liebhabern möglich, solche einzurichten.

Schon seit einer Reihe von Jahren befasse ich mich mit der Zucht von Wellensittichen, ohne das geringste Ergebniß zu erzielen. Ich versuchte es in einem großen Heckkäfige der etwa 4 Fuß lang, 2 F. breit und 3 F. hoch ist, anfangs mit einem Paar und als das nicht gelang, mit 2, 3 ja 4 Pärchen. Die Vögel waren stets gesund und munter, dennoch gab es keine Jungen und nicht einmal Eier.

Ich ließ mir Nistkasten kommen, von Rinde, gewöhnlichem Holze, selbst von Kokosnüssen; es nützte aber alles nichts.

Mehrere meiner Freunde, welche diese Zucht gleichfalls versuchten, hatten dieselben Nichterfolge.

Ich setzte einige Zeit aus und kaufte mir ganz frische Vögel, theils importirte, theils in Deutschland gezüchtete, die mir unter der Bezeichnung als nistfähig angeboten worden sind und sehe jetzt einem besseren Ergebniß vielleicht entgegen.

Manche Züchter behaupten die Sittiche brüten im Winter, manche im Sommer; welches ist dann das richtige?

Selbst mit dem Futter habe ich verschiedene Versuche gemacht; ich mischte Kanarien-, Hanfsamen und weiße Hirse, fand aber stets, daß der Kanariensamen den Vorzug erhielt.

In vielen, ja in allen Abhandlungen, die ich über die Zucht von Wellensittichen gelesen, finde ich nur immer Berichte von glücklichen Zuchten in den sogenannten Vogelstuben, die aber nicht Jedermann einzurichten möglich sind. Sollte man denn in Heckkäfigen nicht ebenfalls diese Vögel mit gutem Erfolg züchten können?

Vielleicht hat Einer der Leser schon Junge in kleineren Käfigen gezogen und hätte dann die Freundlichkeit, recht bald von seinem Verfahren Mittheilung zu machen, was gewiß von vielen Liebhabern mit Interesse gelesen würde und Manchen, dem die Zucht überdrüssig geworden ist, zu neuen Versuchen veranlassen dürfte.

J. B. Kilian, Haupt-Kassirer der Hessischen Ludwigsbahn in Mainz.

Antwort: Die Wellensittiche werden in Deutschland jetzt bereits in ungleich größerer Anzahl gezüchtet, als von Australien eingeführt. Selbst von den Großhändlern erhält man fast nur noch hier gezogene Vögel dieser Art. Die Zucht ist daher zweifellos in Käfigen ebenso ergiebig, als frei in der Vogelstube, nur müssen einerseits die Vögel gut sein und andererseits entsprechend behandelt werden. In der ersteren Hinsicht gewinnen wir immer mehr die Ueberzeugung, daß es, ebenso wie bei den Kanarienvögeln, auch bei den Wellensittichen und allen übrigen Vögeln, welche man züchtet, lediglich auf den Stamm ankommt. Ein Stamm (d. h. also eine Familie) nistet fleißig und glücklich, der andere nicht. In der andern Hinsicht giebt mein „Handbuch für Vogelliebhaber" Rathschläge, welche in Erfahrungen beruhen und daher wol stichhaltig sein dürften. Dennoch werden wir auch hier demnächst in dem Aufsatz „Stubenvogelzucht als Erwerb" das ganze Kapitel der Wellensittich-Züchtung nach allen Seiten hin gründlich durchsprechen. D. R.

Frage: Ich erlaube mir, um Auskunft zu bitten, wie es zu erklären ist, daß einem jungen diesjährigen Harzer-Kanarien-Hahn plötzlich Morgens um 8 Uhr die Stimme völlig versagt, nachdem er noch eine halbe Stunde zuvor schön geschlagen hat. Sein Bemühen in den Gesang der anderen Vögel mit einzustimmen, ist seitdem vergeblich, indem die Stimme weg ist. Giebt es ein Heilmittel für diesen Fall?

G. Schüler, Apotheker in Rohfehlen.

(Antwort erfolgt in der nächsten Nummer).

Frage: Ein sicheres Mittel gegen den Pips des Geflügels wünscht dringend zu erfahren Julius Diß in Baden.

Zum Vogelschutz.

Bern. Im Nationalrathe rief der vom Bundesrath und der Kommission beantragte neue Artikel 23 eine längere Debatte hervor. Der Artikel lautet: „Der Bund ist befugt, gesetzliche Bestimmungen zum Schutze der für die Land- und Forstwirthschaft nützlichen Vögel, sowie über die Ausübung der Fischerei und Jagd, namentlich zur Erhaltung des Hochwildes zu treffen." Dieser Artikel stieß besonders deswegen auf Opposition, weil bezügliche eidgenössische Vorschriften in den Kantonen keine Ausführung finden würden und man doch keine eidgenössische Polizei zu diesem Zwecke errichten wolle; schließlich wurde er aber doch mit 60 gegen nur 22 Stimmen angenommen.

Zur Geflügelzucht.

Der rheinische Ringschläger.

Columba percussor; The smiter; Le pigeon batteur, claquart, tournant.

In der letzten vorjährigen Sitzung des Vereins „Cypria" in Berlin zeigte Herr Direktor Dr. Bodinus die oben genannte interessante Taubenrasse in mehreren Pärchen vor. Nach der Schilderung, welche Herr Dr. Bodinus gegeben, ferner nach der Besprechung, an welcher sich besonders die Herren Geheimrath Keller und Petzold betheiligten, sowie nach der Darstellung des Herrn Direktor Fürer (Kork'sche „Tauben- und Hühnerzeitung," 1858) und allen übrigen uns zugänglichen Quellen geben wir eine Schilderung dieser Taube.

Der Ringschläger oder die Klatschtaube wird in den Ausstellungs-Verzeichnissen auch blos als Schläger oder Klatscher aufgeführt; unter der ersteren Bezeichnung war er auf der letzten Ausstellung des „Westfälischen Vereins für Geflügel- und Singvögelzucht" in Münster vorhanden.

Herr Lenzen meint, daß der Ringschläger von Holland aus nach Deutschland gekommen sei, denn er werde auf dem platten Lande am Rhein überall Drayert genannt. Dies bestätigt auch Tegetmeier („Pigeons" S. 175: The finnikin, smiter, and turner).

Diese Taube ist jetzt bereits sehr selten und kommt nur noch am Rhein, in Westfalen, im Bergischen und an der Ruhr vor; früher soll sie besonders am Niederrhein in den Bauerndörfern sehr beliebt und ziemlich häufig gewesen sein, in den Städten dagegen niemals bei den Taubenliebhabern recht Eingang gefunden haben, weil man ihre Eigenthümlichkeiten nicht kannte, während sie im Aeußern der gewöhnlichen Feldtaube gleicht.

Ihre bemerkenswertheste Eigenschaft besteht im absonderlichen Fluge, den Fürer in folgender Weise beschreibt: Zwar fliegen die Ringschläger nie weiter, als von Dach zu Dach, allein auch nicht die geringste Entfernung, ohne nicht mit den Flügeln zusammenzuschlagen, so daß es weithin schallt; vorzüglich geschieht dies von Seiten des Täubers, wenn er seiner Täubin den Hof macht. Ein guter Schläger muß dann über seiner Täubin fünf- bis sechsmals ringschlagen, d. h. im Kreise rechts und links über ihr herumfliegen und bei jeder kurzen Wendung die Flügel laut klatschend zusammenschlagen; dies nennt man Brandschläge thun. Dieses Kreisfliegens wegen, welches der Täuber selbst im engsten Raume ausführen kann, nennt man diese Art auch Dreh- oder Wendetauben. Die Täubin schlägt ebenfalls, jedoch weniger stark, auch soll sie dem Täuber gleich kurren; im Frühlinge schlagen Beide am meisten.

Dr. Bodinus sagt, daß vollkommene Ringschläger, d. h. Täuber, welche ihre Kunst in der vollkommensten Weise üben, überaus selten gefunden werden, dann aber sehr geschätzt sind.

Im Herbst haben sich die lebhaftesten und besten Ringschläger die Flügel so zerschlagen, daß die Schwingen wie zerfetzt aussehen und daß sie kaum mehr aufliegen können, sondern leicht verunglücken. Daher pflegt man ihnen die Schwungfedern dann wol auszuziehen, und wenn dies nur alljährlich einmal geschieht, so soll es nicht schaden. Die Täuber, welche bei vielem und tüchtigem Klatschen ihre Schwingen gut erhalten, gelten als die werthvollsten, doch verlangt man dabei auch die volle, ansehnliche Größe und bei schöner und lebhafter Farbe, reine Zeichnung.

Der Ringschläger gilt als eine Feldtaube von stattlicher Größe, kräftiger Gestalt und guter Haltung. Das fest anliegende Gefieder ist in allen Farben in folgender Weise gezeichnet: „Der ganze Kopf ist weiß, die Haube weiß gefüttert, das Weiß des Kopfes läuft im Bogen zwei Strohalm breit unterhalb der Augen unter das Kinn, überall scharf abgeschnitten oder mit andern Worten, die Scheidelinie beider Farben läuft oberhalb der Haube oder unterhalb der Augen bis unter den Schnabel. Weiß sind ferner der Schwanz und Unterrücken, gegen den Mittelrücken abgeschnitten und die sechs vorderen großen Schwungfedern, so daß also der Nacken, der ganze Hals, die Brust, der Oberrücken, der Vorderleib bis an die Schenkel und hier rund um die ganze Taube gegen Unterleib und Unterrücken abgeschnitten erscheinen; farbig sind auch die ganzen Flügel mit Ausnahme der sechs großen Schlagfedern. Zuweilen geht auch die Farbe am Unterrücken bis gegen den Schwanz hin, doch muß zwischen diesen Beiden immer eine gegen den Rücken in gerader Linie abgeschnittene weiße Stelle offen bleiben."

Am seltensten findet man diese Zeichnung in schwarzer Farbe; dann ist auch gewöhnlich der Schwanz und der ganze Rücken ebenso gefärbt. Der Ringschläger mit reiner schwarzer Zeichnung nimmt den ersten Rang ein, dann folgen der gelbe, blaue und der rothe Schläger, welcher letztere am häufigsten vorkommt. Doch findet man hin und wieder auch einfarbige, besonders lichtblaue Tauben dieser Art, mit und ohne Flügelbinden und mit weißem Schwanz. Lenzen hat am häufigsten schwarzgetigerte, hier und da mit weißen Schwingen gesehen.

Der Kopf des Ringschlägers ist mit einer Spitzhaube geziert, die Stirn mittelhoch, der Schnabel hellfarbig, die Färbung des Augensterns immer der des Gefieders entsprechend, das Augenlid lebhaft fleischroth; der Hals ist kräftig, Brust und Rücken sind verhältnißmäßig breit, Lauf und Fuß glatt, die Schwingen lang und spitz.

Länge 14 Zoll; Klafterbreite 28 Z.; Schwanz 5 Z.; Schnabel 10 Linien. Die Schwingen reichen zusammengelegt bis ½ Z. vom Schwanzende. Die großen vorderen Schwungfedern, welche nach den vier ersten kommen, fallen in der Länge stark gegen jene ab; die fünfte 1 Z. gegen die vierte und 2 Z. gegen die zweite, welche die längste ist und 7 Zoll mißt. Alle diese Größenverhältnisse sind nach rheinischem Maß angegeben.

Die Geschlechter sind namentlich am vollkommneren Ringschlagen des Täubers zu unterscheiden, und im Uebrigen ist Alter und Geschlecht wie bei allen übrigen Tauben zu erkennen. Diese lebhafte Taube ist sehr zänkisch und bringt durch ihre Unruhe viele Störung im Taubenhause hervor; deshalb soll man sie nicht mit anderen Tauben zusammenhalten. Im Uebrigen hat sie viele gute Eigenschaften. Sie feldert, auch mit den gewöhnlichen Feldfliegern gemeinschaftlich, ganz vortrefflich, ist genügsam in der Nahrung und dabei sehr fruchtbar. Dennoch dürfte sie nicht leicht weiter zu verbreiten sein, da sie nach Herrn Keller's Erfahrungen in anderen Gegenden nicht gut fortkommen

und nur schwer rauheres Klima ertragen soll. Zur vortheilhaften Züchtung soll man nicht gleichfarbige zusammenparen; doch zeigt sich der Ringschläger, wie alle lebhaften Tauben bei jeder Zwangsparung oft sehr eigensinnig. Der Preis dieser Taube ist kein hoher; in dem Ausstellungs-Katalog von Münster waren sechs Pärchen in den Preisen von 2, 3½, 4 und 6 Thlr. aufgeführt. Dr. F. B.

* Der hohe Preis des Federviehes in Berlin hat es dahin gebracht, daß die dortigen Händler jetzt mit Hülfe der Eisenbahn lebende junge Hühner aus Italien über München beziehen. Ein einziger Händler allein bekam über 1000 Stück, die er mit 12½ Sgr. verkaufte, während bisher das Stück bis 20 Sgr. kostete.

* Aus Oberschlesien kommen jetzt seit einigen Wochen täglich mit der Bahn 4—5000 Stück Gänse durch Breslau, welche von Händlern aufgekauft sind und nach Berlin befördert werden. Die zum Transport dienenden Wagen haben drei Etagen, um eine möglichst große Anzahl Gänse bequem unterbringen zu können.

Ein Winter-Versandtkäfig.

(Von Karl Gudera, Vogelhändler in Leipzig).

Dieser Käfig besteht aus zwei Theilen, einem äußern und einem innern Behälter.

Der äußere Käfig ist ein Kistchen mit abnehmbaren Deckel, in dessen Vorderwand eine kleine Glasscheibe eingesetzt und vor dieser ein Drahtgitter angebracht ist. Im Innern des Käfigs sind am Boden zwei Holzleisten befestigt, welche mit einem Einschnitt, in den der innere Käfig hineinpaßt, versehen sind.

Der innere Käfig, in welchem der Vogel sich befindet und dem der Aeußere nur als Umhüllung, bezüglich als Schutz dient, besteht in einem gewöhnlichen Versandtkäfig, dessen Form und Gestalt Jedermann bekannt ist. In den Schutzkäfig hineingestellt und oben mit einem Holzriegel, der ebenfalls einen anpassenden Einschnitt hat, befestigt, so daß er dann gerade und fest in seiner Umhüllung steht und zwar in der Weise, daß rings herum ein leerer Zwischenraum von etwa zwei Zoll entsteht. Dieser Zwischenraum wird dann, die Vorderseite, durch welche das Licht zugeführt wird, ausgenommen, mit Watte, Stroh oder ähnlichem warmhaltenden und gegen das Eindringen der Kälte schützenden Material ausgefüllt und darauf mit dem Deckel verschlossen. Beim Versenken muß man darauf achten, daß die Drat-, bezüglich offene Seite des Vogelkäfigs gerade vor die Glasscheibe des Schutzkäfigs zu stehen kommt, damit die Vögel Licht haben. Die Hauptvortheile des Winter-Versandtkäfigs bestehen in Folgendem: er macht die Entwendung eines Vogels von vornherein zur Unmöglichkeit, schützt vor Kälte, gewährt durch die im Deckel befindlichen Löcher ausreichend Luft und durch das Glasfenster genügendes Licht, hält durch die zwischen die Umhüllung gestopfte Fütterung von unten, oben und allen Seiten völlig warm, schützt die Vögel vor dem ihnen lästigen Begaffen, verhindert das Eingießen von Wasser, welches meistens, anstatt nützlich, schädlich ist, indem es den Postbeamten an passenden Gefäßen zum Eingießen des Wassers fehlt, so daß stets mehr Wasser in den Käfig, als in die Näpfe kommt, und das im Käfig befindliche Futter somit naß und ungenießbar wird.

Andere Versandtkäfige, die sich sowol für den Winter als auch für den Sommer eignen, haben einen doppelten Boden, und sind dadurch sehr praktisch, daß das Futter nicht naß werden kann, indem die Wassernäpfchen auf den unteren Boden zu stehen kommen, während das Futter auf den oberen, welcher etwa 1 Zoll höher angebracht ist, gestreut wird. Der untere Boden hat Löcher, damit das Wasser ablaufen kann. Im Winter werden diese Käfige mit Leinewand umnäht und der Zwischenraum wird mit Heu und Stroh ausgefüttert.

Aus den Vereinen.

Der Aufforderung der „Gefiederten Welt" folgend, melden wir, daß auch im klassischen Toggenburg (Kanton St. Gallen) ein Vogelverein besteht, unter dem Namen:

Ornithologischer Verein für das Toggenburg,

dessen Vorstand: Ferdinand Wirth, Rentier in Lichtensteig ist. Dies also zur Vervollständigung Ihres Verzeichnisses der Vereine.

Ferner sei hieran die Mittheilung geschlossen, daß wir im letzten Juni bereits eine sehr hübsche und bedeutende Ausstellung von Vögeln aller Art, Hühnern, Tauben und Kaninchen hatten, welche letztere ausnahmsweise in den Verband aufgenommen wurden. Der Vorstand.

** In der letzten Sitzung des Geflügel- und Singvögelliebhaber-Vereins **„Cypria"** in Berlin wurde zunächst der Vorstand für das nächste Jahr gewählt. Derselbe besteht in den Herren:

Direktor Dr. Bodinus, Vorsitzender,
Geh. Hofrath Schneider, zweiter Vorsitzender,
Holzhändler Barnewitz, erster Kassenführer,
Baumeister Kratzenberg, zweiter Kassenführer,
Buchdruckereibesitzer Möser, erster Schriftführer,
Sekretär Wagenführ, zweiter Schriftführer.

Dr. Ruß lehnte Zeitmangels wegen die Annahme eines Ehrenamts ab. Die übrigen Verhandlungen boten wiederum eine Fülle des Interessanten. Herr Geheimrath Schneider machte Mittheilungen über die Taubenthürme im Orient und legte darauf bezügliche Abbildungen vor. Daran knüpfte sich eine Besprechung über die Fortsetzung der Tauben-Schilderungen innerhalb des Vereins, welche im vorigen Jahre so viel Interesse erweckt und Belehrung geboten. Die Fortsetzung derselben und Veröffentlichung in einer Form, welche die Ergebnisse für die Mitglieder dauernd mache und auch einem weiteren Publikum zugänglich werden lasse, wurde beschlossen. — Herr Breweck brachte den Fall zur Sprache, in welchem eine Katze in den Schlag gedrungen und die Tauben so scheu gemacht habe, daß nur eine kleine Anzahl derselben dorthin zurückkehre. Herr Koppe gab den Rath, die Tauben vermittelst eines aus einem Tonnenreifen gefertigten Schlagnetzes einzufangen, falls der Ort, an welchem sie zur Nachtruhe sitzen, unzugänglich ist. Herr Petzold meinte, daß die Tauben durch aus- und eingehende Junge ganz von selber wieder eingewöhnt würden. Herr Dr. Bodinus gab den Rath, daß man die Tauben bei Schneewetter einfange, zu welcher Zeit dies keine Schwierigkeit habe, daß man sie dann einsperre, um sie wieder einzugewöhnen; vor dem Ausfliegen müsse man ihnen aber aus einem Flügel die Schwungfedern auszupfen, damit sie sich unsicher fühlen und den Schlag nicht verlassen. — Herr Dr. Bodinus zeigte sodann 17 Köpfe Rheinische Ringschläger vor, eine Taubenart, welche jetzt sehr selten ist und über die sich dann eine lebhafte Besprechung entwickelte. (Die Mittheilungen der Herren Dr. Bodinus und Geheimerath Keller haben wir in die in dieser Nr. befindliche Darstellung des Ringschlägers eingefügt). Die Ringschläger, welche Herr Dr. Bodinus von Herrn Daber in Mühlheim a/R. erhalten, wurden innerhalb des Vereins von verschiedenen Mitgliedern entnommen. — Die Kommission, welche zur Beschaffung eines Lokals für die demnächst beabsichtigte Ausstellung gewählt worden, konnte noch nichts Befriedigendes mittheilen.

Briefwechsel.

Den geehrten Lesern, sowie allen Freunden und Bekannten Glückwünsche zum neuen Jahr!

Herrn Kreisgerichtsrath Heer in Striegau: Besten Dank für die Mittheilungen aus Ihrer Vogelstube. — Herrn Fabrikant P. Beines in Rheydt: Ihren Wunsch erfüllen wir gern in einer der nächsten Nummern. In Betreff der Sittiche sei Folgendes bemerkt. Es ist eine der übelsten Gewohnheiten, daß vielen Papageien, selbst den Inseparables u. a. beim Transport auf den Schiffen ein oder beide Flügel abgeschnitten werden. Die Händler können natürlich nichts dafür, wenn sie solche verstümmelten Vögel versenden; die Liebhaber jedoch haben immer den Nachtheil, daß solche Vögel nur zu leicht verunglücken, verkümmern oder in der Mauser sterben. — Herrn Fr. von Ivernois, Redakteur des „Waidmann": Verbindlichsten Dank! In Betreff des T. albus neigen wir uns zu Ihrer Ansicht. — Herrn Pfarrer G. Göller in Alfdorf: Ihre Beiträge mit Dank empfangen. Weitere sind sehr erwünscht. Herrn Pfarrer E. W. in F., Schweiz: Sehr erfreut darüber, daß Sie wieder einmal ein Lebenszeichen gegeben haben. Die Beschreibung Ihres Winter-Versandtkäfigs wollen wir in einer der nächsten Nummern gleich hinter dem des Herrn Gubera geben, doch wäre es uns sehr lieb, wenn Sie die Beschreibung selber mit genauer Angabe der Maße uns freundlichst zugehen lassen wollen. —

Die Aufsätze „Stubenvögelzucht als Erwerb", „Die Plattschweifsittiche" und „Hühnerzucht im großartigen Maßstabe" beginnen in den nächsten Nummern.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Die Großhandlung exot. Vögel und Naturalien

von **Karl Gundlach**, Leipzig

empfiehlt folgende Futtersorten:

1a	weiße Hirse	per 50 Ko.	7½ Thlr.,
2a	do.	„ 50 „	6½ „
	Algerische do.	„ 50 „	9 „
	Indische do.	„ 50 „	12 „
	Senegal- do.	„ 50 „	10 „
	do. do. in Kolben à Bund	⅔ „	

} Diese Sämereien sind als zweckmäßigstes Futter für alle exot. körnerfressenden Vögel anerkannt.

1a	Glanz	per 50 Ko.	7 Thlr.,
	Hanf großkörnig süß	„ „	6 „
	Mais do.	„ „	5 „
	do. in Kolben	„ „	6 „
	Geschälter Hafer	„ „	6 „
	Sonnenblumenkörner	„ „	22 „
	italien. Ebereschen, süß	„ „	20 „

} Werden von allen Arten von Papageien sehr gern gefressen.

(Bei Bestellungen von nur 5 Ko. etwas erhöhte Preise).

	Mehlwürmer	per 1 Ko.	7 Thlr.,
	Weißwürmer	„ 1 „	1½ „
	Kokos- u. Agavefasern zum nisten u. weben	„ 1 „	1¼ „

Ossa Sepiae in großen Stücken per Dtzd. ⅓ Thlr.

Ferner werden folgende zweckmäßige Gegenstände empfohlen:

Dn. Insectenpulverspritzen, mittelst derer man die Vögel mit feinstem Insectenpulver bis auf die Haut bestäuben kann, gefüllt à Stück ⅓ Thlr. incl. Emballage.

Pneumatische Trink- und Futternäpfe, wie in Nummer 23 d. Bl. beschrieben, à Stück ⅓ bis 1½ Thlr.

Kletterstangen für Papageien, ordinär und fein für Salons passend à 3 bis 12 Thlr.

Papageienkäfige, verzinnt à 3, 4 und 5 Thlr.,
do. Kettchen und Ringe à ⅓ und ⅔ Thlr.

Zuchtvolièren und **Zuchtkäfige** sowie **Luxusgebauer** in allen Façons laut Musterbuch.

Brütkästen aus ausgedrechselten Baumstämmen à 1 Thlr.,

Kork- & Metallnester à 3½ bis 12½ Gr. [1

H. E. Frühauf,

Holzwaarenfabrik in Schleusingen,

empfiehlt **Nistkästen** in allen Größen uns für in- und ausländische Vögel, das Dutzend von 1½ bis 3 Thlr. Bei großen Parthien bedeutenden Rabatt. [2

Die Vogelhandlung von D. Dufour,

Behrenstraße 50 (Passagen-Gebäude),

hat folgende Vögel vorräthig: Graue und grüne Papageien, zahm und sprechend, Inseparables, Wellen-Sittiche, Paradies- und Diamant-Vögel, Nonnen, Tigerfinken, Astrilds u. v. a. Zugleich mache ich aufmerksam, daß ich mehrere Hundert Kanarienvögel habe, die feinsten Schläger, Roller, Glucker und schönflötende, auch die kleinsten Hunde für Damen, zu den billigsten Preisen. [3

Naturalienhandlung

von

Wilhelm Schlüter in Halle a. S.

Die Preisverzeichnisse Nr. 35 über europäische Vogelbälge und Nr. 36 über europäische Vogel-Eier sind erschienen und stehen auf Wunsch gratis und portofrei zu Diensten. [4

Vogel-

Liebhabern, -Züchtern und -Händlern,

empfiehlt die Handlung deutscher Singvögel, amerikanischer und afrikanischer Stubenvögel des

F. Sennhenn in Hessen-Cassel,

unter Nachnahme:

ff. weiße ind. Hirse: pro Ctr. 6⅔ Thlr., pro ½ Ctr. 27½ Sgr., pro Pfd. 3 Sgr.

Sommerrübsen: pro Ctr. 6½ Thlr., pro ½ Ctr. 25 Sgr., pro Pfd. 2½ Sgr.,

Mohnsaat: pro Ctr. 11 Thlr., pro ½ Ctr. 1½ Thlr., pro Pfd. 3½ Sgr.,

ebenso billig Kanarien- und Hanfsaat ꝛc. ꝛc., alles in vorzüglicher prima Qualität. (F. 1616.) [5

Vorzüglich schöne, gutgetrocknete Steirische Ameiseneier empfiehlt **Franz Kumeyer** in **Linz** a. d. Donau. [6

Gesucht

werden mehrere Paar **virginische Wachteln** (auch Kolinhuhn genannt), und werden Anerbietungen angenommen in der Expedition d. Blattes. [7

Ein Paar **schwarze Pfauen-Tauben** wünscht zu kaufen **O. von Wulffen** auf Pietzpuhl
8] bei Burg, Reg.-Bez. Magdeburg.

Einen lebenden **Ahu**, möglichst großes Weibchen, sucht zu kaufen R. Tancré in Anclam. [9

1873er **russische Ameisen-Puppen** empfingen und empfehlen **Mey & Wengelsdorff** in Berlin. [10

Kanarienvögel

mit **vollständig** ausgebildetem **schönem** Gesang versendet selbst bei **strenger Kälte** unter Garantie des **gesunden Eintreffens** bis auf 3tägige Postentfernung zu bekannten Preisen.
11] **R. Maschke** in St. Andreasberg, Harz

Zu verkaufen:

1 Paar einjährige Schwäne, ferner Lockentauben in Weiß, Blau, Rothfahl und rothgeschildert; Maltheser und Hühnerschecken, Gimpel gelb und Braun, mit blauen Flügeln, Spiegel-Gimpel, in Gelb und braun, Seiden-Tauben, schwarz-weiß gespießt und Almonds-Tümmler.
12] **Franz Wahlhammer** in München.

Umzugshalber sind abzugeben:

Engl. schw. Karrier, Kröpfer, Almondstümmler, Gimpel, Pfaffentauben, br. Indianer, bl. Türken, 1 Paar egypt. Mövchen, 1 do. deutsche. Sehr gute Harzer Kanarienvögel mit feinen Rollen, Flötentönen, auch Nachtigalltönen.

J. Scurla,
13] **Norden** in Ostfriesland.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstraße 2, durch die Post oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Bernau.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Alle 8 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von **Dr. Karl Ruß.**

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 8. Januar 1874. Nr. 2.

Inhalt:

Kanarienvogel-Zucht in Andreasberg. (Fortsetzung). —
Aus den deutschen Vogelstuben: Wunderliche Neigungen. —
Vogelkrankheiten: Augenentzündung einer Amazone. —
Züchtungsversuche mit einheimischen Finken. —
Vogelliebhaberei im fernen Rußland. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Wildtauben. —
Zur Geflügelzucht: Fruchtbarkeit einer Haushenne; Brütmaschine. —
Ein Ofen für die Vogelstube. —
Aus den Vereinen: Ornithologischer Verein in Stettin. —
Briefwechsel. — Nachruf. —
Anzeigen.

Kanarienvogel-Zucht in St. Andreasberg.

(Reisebericht von Kontroleur W. Böcker in Wetzlar).

(Fortsetzung).

Von den kleinern Bauern waren die Kleinsten in Andreasberg selbst wenig in Gebrauch; sie wurden fast nur zu Transportkäfigen oder von den Händlern verwendet; häufiger waren die sogenannten Gimpelkäfige und ebenso häufig die größte Sorte, welche etwa 6½ Zoll breit, 7½ Zoll hoch und reichlich 8½ Zoll lang sind, im Gebrauch. In diesen letztern Bauerchen hielten sich die Vögel auch im Gefieder recht gut. Der Preis der Bauerchen stellte sich im Einzelnen je nach der Größe auf circa 2½ Sgr., 3½ und 5 Sgr. Wer sich dieselben anzuschaffen wünscht, wolle sich an den Kleidermacher Mohrich auf der Hörnstraße oder an den pensionirten Hüttenmann Herrn Schuster, dem Rathskeller gegenüber, wenden.

Die hölzernen Kasten, welche sich an den Bauerchen der alten Zuchthähne befinden — man sehe Seite 19 der „Gefiederten Welt" v. J., — waren nicht immer im Gebrauche gewesen. Vor 20 bis 30 Jahren kannte man sie noch nicht. Ein zuverlässiger alter Züchter, der Ausstecker Seifert, dessen freundlicher Mittheilung ich gar manche Mittheilungen über die dortige Zucht verdanke, erzählte mir hierüber Folgendes: „Vor etwa 25 Jahren war es bei uns noch nicht üblich, die Stuben zu scheuern; sie wurden mit Stubensand bestreut und da schadete es nicht sonderlich, wenn die Vögel den Samen zum Theil verschleuderten. Seitdem indeß das Scheuern der Zimmer aufgekommen, fanden unsere Frauen, daß die Oelflecke, die der zertretene Samen zurückließ, die Fußböden verunstalteten und es wurden nun — also lediglich aus Reinlichkeitsrücksichten — die ersten hölzernen Kasten, die den Samen auffingen, erfunden. — Der Gesang der Vögel war vorher wol ebenso zart und leise, wie gegenwärtig; dies liegt eben im Stamme und wo einmal ein Vogel zu laut wurde, da wurde der Käfig einfach mit einem Tuche verhangen. Der Gesang der Vögel war damals im Ganzen besser; obwol es auch jetzt noch einzelne vorzügliche Stämme bei uns giebt, so waren die Vögel doch meist mannigfaltiger in ihren Tönen, die einzelnen Rollen waren auch länger. Dies hängt indeß mit einem andern Umstande zusammen. Vor etwa 30 Jahren wurden die jungen Vögel nach den verschiedenen Bruten eines Jahrs getrennt; jede Brut saß dann in einer besondern Flucht — Fluggebauer — und die Jungen der ersten Bruten wurden zu Martini, die der Letzteren um Weihnachten, ja oft noch zu Anfang des Februar von den Händlern abgeholt. Wir hatten also hinlänglich Zeit, unsere Wahl an eigenen Zuchtvögeln zu treffen. Später wurden dann die Vögel um Michaeli abgeholt, wobei Alles, was gesund und entbehrlich war, ohne Rücksicht auf das Alter der Vögel mitgenommen wurde. Seit

etwa 6 Jahren, so lange die Ausfuhr nach Amerika besteht, werden die Vögel wol gar schon im Juli abgeholt und da hält es denn sehr schwer für den Züchter, gute Vögel zurückzubehalten. Was ein guter Vogel werden will, ist da fast nicht zu erkennen und mancher gute Sänger schlägt in den spätern Monaten noch um. Die Preise der jungen Vögel standen vor etwa 20—30 Jahren auf 15—20 Sgr., etwa ein Viertel des gegenwärtigen Werthes; Samen und Eifutter waren aber damals auch viel billiger.

Diese Mittheilungen sind mir von verschiedenen ältern Züchtern bestätigt worden; sie stimmen auch überein mit der Auslassung des Herrn C. Reiche Seite 159 der „Gefiederten Welt. Die abweichende Angabe in meinem frühern Reise-Bericht beruht auf den Auslassungen anderer Züchter Andreasbergs, welche auch jetzt noch behaupteten, daß man sich, des viel höhern Preises der Vögel wegen, mehr auf die Ausbildung des Gesanges lege, als ehedem. Es sei dies um so nothwendiger, als Kenner und Händler gegenwärtig größere Ansprüche an einen guten Gesang machten, wie früher. Sei dem übrigens, wie ihm wolle, so viel ist sicher, daß in den meisten Züchtereien Andreasbergs Vögel sich befinden, deren Gesang noch viel zu wünschen übrig läßt. So oft ich Gelegenheit dazu hatte, habe ich darauf hingewiesen, wie sehr es im Interesse der Züchter liege, sich in der Zucht guter Stämme durch Abgabe dazu geeigneter Vorschläger, beziehungsweise Zuchthähne gegenseitig zu unterstützen, da man ja selbst in die Lage kommen könne, seinen eignen ausgearteten Stamm abschaffen zu müssen und überdies die Züchtung mittelmäßiger Sänger unmöglich dazu dienen kann, dem Harzer Kanarienvogel in weitern Kreisen Eingang zu verschaffen. Das ließ sich nun allerdings nicht bestreiten, indeß wurde mir entgegnet, daß dadurch viele Feindschaften entstehen könnten, selbst unter Blutsverwandten. „Wenn Sie einen Bruder haben," erwiderte mir ein alter Züchter, dem es an traurigen Erfahrungen in dieser Hinsicht nicht zu fehlen schien, „so geben Sie an ihn grundsätzlich keinen Vogel ab; thun Sie es und der Vogel schlägt wider Erwartung um, so macht er Ihnen Zumuthungen, die Ihre eigne Hecke ruiniren könnten, er ist vielleicht im Stande, Sie um einen Vogel zu bitten, den Sie gar nicht entbehren können." In dieser Aeußerung mag ein Körnchen Wahrheit liegen; es existiren allerdings in Andreasberg Familienzerwürfnisse, deren erste Veranlassung ein Kanarienvogel oder vielmehr, der Wunsch des einen Theils war, ihn zu besitzen; bei alledem möchte indeß, dem Eindrucke habe ich auch mich jetzt nicht verschließen können, die leidige Sucht, eine Konkurrenz guter Stämme möglichst zu vermeiden, eine große Rolle in dieser Frage spielen. —

Der Sommersamen, der neben dem Eifutter beinahe die einzige Nahrung der Kanarien bildet, war, so weit ich ihn zu untersuchen Gelegenheit hatte, durchweg von gutem Aussehen und süßem Geschmack, ganz oder fast ganz frei vom Hederichsamen, dagegen nicht überall gehörig vom Staube befreit. Uebrigens habe ich mehrfach Samen von eben so guter Beschaffenheit, vollkommen gereinigt und frei von dem Samen des Hederich aus der Samenhandlung des Herrn L. C. Kahl zu Frankfurt am Main, Römerberg 20 u. 22, bezogen. Da ich aus eigner trauriger Erfahrung weiß, wie schwer es oft, namentlich in kleineren Städten, hält, sich guten Sommerrübsen zu verschaffen, so glaube ich an dieser Stelle auf jene Bezugsquelle aufmerksam machen zu müssen; für die Bewohner Süddeutschlands liegt sie näher, wie die von Herrn C. Reiche jüngst empfohlene Samenhandlung.

In den von mir besuchten Züchtereien war es durchweg sehr warm; man hatte der Vögel wegen bis dahin noch an jedem kühlen Morgen eingeheizt und darin mag es liegen, daß der Federwechsel dort sehr leicht von Statten geht. Die Vögel befanden sich anscheinend wohl bei der sommerlichen Hitze; sie wurden aber auch sehr vor Zugluft geschützt. Ein Züchter, den ich bat, doch auf einen Augenblick die Fenster zu öffnen, da ich in der aufsteigenden warmen Luft nicht wohl athmen könne, lehnte in aller Freundlichkeit dieses Ansinnen ab; er öffnete die Thür um eines Daumen Breite und glaubte, damit genug gethan zu haben. Mir war es aber unmöglich, länger als einige Minuten in der Stube zu bleiben.

Um den unangenehmen Geruch, der sich bei so mangelhafter Lüftung nothwendig einstellen mußte, zu beseitigen, wurde wöchentlich ein oder mehrere Male geräuchert. Es dienten dazu zollange Räucherkerzchen, bei andern Züchtern Räucherpulver. Das Letztere soll, auf glühende Kohlen geschüttet, einen übrigens unschädlichen Dampf erzeugen, aber von besserer Wirkung sein, als die Räucherkerzchen.

Die Farbe der Vögel war nicht besonders ansprechend, hochgrüne Vögel sowie hochgelbe giebt es bekanntlich in der Harzer Rasse nicht; ich habe wenigstens keinen einzigen Vogel mit diesen Farben gesehen; die meisten waren strohgelb mit mehr oder weniger unschönen graubraunen Flecken; unter den bunten Vögeln waren regelmäßige Zeichnungen äußerst selten. Es kommt hier eben alles auf den Gesang des Vogels an; Farbenvögel lassen sich daher in der Harzer Rasse nicht wol ziehen; wollte man sich hierauf verlegen, so könnte es einem Züchter leicht passiren, daß er seine hoffnungsvollsten jungen Vögel wegen unreiner Zeichnung abgäbe.

Der Gesang der alten Vögel ließ selbst in den besten Hecken mitunter noch etwas zu wünschen übrig; irgend ein Ton, der zwar nicht grade häßlich war, hätte wegbleiben, manche Vögel hätten mehr Abwechselung im Gesange zeigen können; der ganz untadelhaften Sänger waren wenige; bei alledem waren aber die Leistungen der besten Stämme im Gesange sehr bedeutend, namentlich im Vergleiche mit denen des gemeinen Kanarienvogels. Ich glaube dieses besonders hervorheben zu müssen, um die Anforderungen verschiedener Kenner auf das rechte Maaß zurückzuführen; sie mögen bedenken, daß dem feinsten Kenner immer noch etwas zu wünschen übrig bleiben wird. Allzuhohe Anforderungen können meines Erachtens leicht dahin führen, daß die Bestellungen überhaupt nicht ausgeführt werden; ich meine, grade die gewissenhaftesten Händler müssen dabei Bedenken tragen, nicht als ob es ihnen an guten Vögeln fehle, sondern weil sie etwaigen spätern Beschwerden aus dem Wege gehen wollen.

Der Gesang der jungen Vögel war zu meiner Verwunderung nicht weiter ausgebildet, wie in meiner eignen ziemlich spät angelegten Hecke; ich habe dies dem Umstande zugeschrieben, daß bei mir die Jungen

im geräumigen Heckzimmer geblieben waren, also Gelegenheit hatten, sich einerseits tüchtig auszufliegen und zu kräftigen, andrerseits auch den Gesang der alten Zuchthähne in unmittelbarster Nähe zu hören, während die durchweg um sechs Wochen ältern Jungen der Andreasberger Züchtereien in den Fluggebauern kaum etwas anders hören konnten, als den zwitschernden Gesang ihrer eignen Geschwister.

Die jungen Vögel, die man frühzeitig in besondere Bauerchen gesteckt hatte, sangen entschieden besser und in einer größern Züchterei seiner Rollvögel waren namentlich zwei Vögel aus der ersten Brut fast vollständig ausgebildet, während die Vögel der nachfolgenden Bruten, die sich in den Fluggebauern fanden, noch weit im Gesange zurück waren. Von jenen beiden Vögeln, der einzigen männlichen Nachzucht aus erster Brut, hatte der Züchter übrigens wieder zwei Junge gezüchtet; ähnliche Fälle geschlechtlicher Frühreife sind — beiläufig bemerkt, — sowol in meiner Hecke, wie in der Züchterei eines meiner Nachbarn vorgekommen; im Ganzen genommen sind sie selten.

Der Gesang der jungen Vögel war — ich bemerke dies auf eine spezielle an mich ergangene Anfrage — kaum zur Hälfte ausgebildet; es konnte dieses auch nicht wol anders sein, da es, wenige Ausnahmen abgerechnet, vor der ersten Hälfte des November aller Erfahrung nach keine gut ausgebildeten jungen Vögel giebt. Es ist daher auch ein Irrthum, wenn man annimmt, daß in Folge irgend einer, nur den Harzer Züchtern bekannten Behandlung die jungen Vögel früher im Gesange ausgebildet seien, wie außerhalb des Harzes. Das Wahre an der Sache ist, daß man in Andreasberg und den benachbarten Bergstädten die Hecke gemeiniglich um 4 bis 6 Wochen früher beginnt und die Vögel daher hier auch durchweg um so viel älter sind, wie bei uns zu Lande. Selbst nach der angegebenen Zeit bis nach Weihnachten hin vervollkommen sich die meisten jungen Vögel noch sehr erheblich im Gesange, vorausgesetzt, daß sie nicht zu früh, nicht als unausgebildete Vögel von ihren Lehrmeistern getrennt wurden. Ein Vogel, der sich vorzeitig selbst überlassen ist, kann, wenn er in die Hände von kundigen Pflegern fällt und von allen störenden Einflüssen fern gehalten wird, gut werden; er kann aber auch, und das kommt nicht selten vor, gerade die schönsten und schwierigsten Strophen seines Gesanges vergessen beziehungsweise aus Mangel an Wetteifer mit andern guten Sängern weglassen.

Es wäre demnoch auch um die Zeit meines Besuches in Andreasberg sehr schwer gewesen, aus einer Menge von jungen Vögeln den einen oder andern herauszufinden, von dem man mit Sicherheit hätte annehmen können, daß er sich zukünftig im Gesange besonders hervorthun würde. Vögel, die anhaltend und fleißig singen, dabei den Kropf tüchtig aufblähen, ruhig sitzen und den Schnabel möglichst selten weit aufreißen, versprechen, wie man gewöhnlich annimmt, gute Sänger zu werden. Denn die tiefen Knarr- und die klangvollen Hohl- und Bogenrollen, sowie die tiefen Brusttöne werden mit fest geschlossenem Schnabel, öfters auch mit sehr rascher Bewegung desselben vorgetragen, während hohe und dünne Töne durch ein weites Oeffnen desselben angezeigt werden. Selbstverständlich muß dabei darauf geachtet werden, ob der Gesang der alten Zuchthähne ohne entstellende Fehler sei.

Einen heisern Vogel habe ich auch jetzt in Andreasberg nicht gehört, wol aber einen feinen Rollvogel, dessen schwache dünne Stimme errathen ließ, daß er bei der nächsten Mauser heiser werde. Es ist das nämlich der den Kennern nicht unbekannte Vorläufer der Heiserkeit, dem sich dann später noch das sogenannte Schmatzen — Husten, Niesen — zugesellt. Die Heiserkeit äußert sich übrigens beim Vogel namentlich im ersten Stadium der Krankheit früh Morgens und spät am Nachmittage; so entgeht sie denn in der Regel dem fremden Besucher einer Züchterei, der sich bei der Abhörung der Stimme ja meistens auf die mittlere Tagesstunden beschränken muß. Der Grund, warum dort so wenig heisere Vögel vorkommen, liegt wol theils in der großen Sorgfalt der Züchter, den kleinen Geschöpfen stets die erforderliche Wärme zu bereiten, sie dabei aber möglichst vor jeglicher Zugluft zu schützen, theils in dem Umstande, daß ältere wie zwei- bis dreijährige Vögel dort selten gehalten werden. Die als erbliche Anlage auftretende Heiserkeit des Vogels äußert sich nämlich in den ersten Lebensjahren desselben in der Regel nicht, oder sie tritt doch nur vorübergehend auf. Man kannte indeß die Heiserkeit sehr wol; man hielt sie für ungefährlich, so lange sie nicht von jenem Schmatzen begleitet war; dieses aber nahm man mit Recht als die Aeußerung einer auf die Dauer unheilbaren Brustkrankheit an, gegen welche hin und wieder das Eifutter, bestehend aus Ei und geröstetem oder eingeweichtem Weißbrot mit einem Zusatz von braunem Kandis, als Linderungsmittel mit zeitweisem Erfolge angewendet wird.

Das Umschlagen — Zurückgehen — eines Vogels im Gesange kam dort nicht so häufig vor, wie außerhalb des Harzes; man hatte dort eben mehr gute Vögel eingesetzt, und so konnte denn der eine Sänger einen andern, der während der Mauser vielleicht übermäßig lange geschwiegen, wieder in die Schule nehmen. War dieser Letztere zufällig ein geringerer Schläger gewesen, so passirte es wol, daß er nach der Mauser erheblich besser schlug, wie früher — gleichwol waren indeß einzelne Stämme zurückgegangen. In einigen früher gut renommirten Züchtereien fand ich nur geringere Vögel vor. Es kann dieses Zurückgehen eines ganzen Stammes daran liegen, daß die Phantasie der alten Vögel nach einer schweren Mauser ermattet ist, daß zufällig die geringern Vögel einer Züchterei zuerst wieder anfangen zu singen und Alte und Junge mit einigen unliebsamen Touren — zuvielen Nebentouren — verderben, daß der stümperhafte Gesang eines Weibchens, der Fehler eines jungen Vogels in den Gesang der Männchen eingeschoben wird; zum Theil liegt es aber nachweislich auch daran, daß vorzügliche Sänger, die der Züchter um keinen Preis aus der Hand geben sollte, dennoch verkauft werden. In einer von mir im vorigen Jahre besuchten Züchterei, in der früher sehr vorzügliche Sänger gezogen wurden, fand ich damals nur geringere Vögel vor; jetzt soll der Stamm noch mehr zurückgegangen sein. Der betreffende Züchter hatte im vorigen Jahre, wie mir ein Augenzeuge mittheilte, einen Vogel für 25 Thlr., einen andern für 30 Thlr. verkauft. Auch in Klausthal soll, wie mir

der Vater des betreffenden Züchters versicherte, ein Vogel für 33 Thlr. verkauft worden sein.

Aus dem eben Gesagten dürfte hervorgehen, wie nothwendig es ist, die Zuchtweibchen von den Männchen außerhalb der Brutzeit so zu trennen, daß sich beide Theile nicht hören können, namentlich aber einen ausgearteten jungen Vogel von den übrigen zu entfernen. Es ist ein Irrthum, wenn man, wie häufig geschieht, annimmt, es könne ein Vogel einen Fehler in der Folge weglassen; es geschieht das nur ausnahmsweise und unter besondern Umständen, wenn man nämlich den mißrathenen Vogel bei Zeiten in einen ganz dunklen Raum oder in ein kaltes Zimmer bringt. Geht dann der Gesang wieder bis zum „Dichten" zurück, so läßt sich der Versuch machen, den Vogel wieder zu den übrigen Sängern zu hängen.

In keiner der vielen von mir besuchten Züchtereien habe ich andere Vorschläger, wie die des eignen Stammes vorgefunden; ebenso wenig wurden die Vögel durch Vogelorgeln oder Nachtigalen ausgebildet. Was man in Andreasberg an s. g. Nachtigalenschlägern zieht, sind Gluckvögel — Hohlglucker, Doppelglucker, — deren vorherschend tiefe und runde Töne an den Gesang der Nachtigal erinnern. Letztere möchte sich auch zum Vorschläger schon deswegen nicht eignen, weil sie grade zu derjenigen Zeit, in der der junge Kanarienvogel eines Vorschlägers am wenigsten entbehren kann, nicht singt. Die Züchter Andreasbergs waren, und ich glaube sehr mit Recht der Ansicht, daß eine Nachtigal sogar einen untadelhaften Rollvogel verderben könne. Mit der Vogelorgel ausgebildete Kanarienvögel hatte ein Züchter zu hören Gelegenheit gehabt. Dieselben hatten, so meinte er, keine Aehnlichkeit mit dem Gesange der Harzer, eine künstliche Melodie und, wenn ich mich recht erinnere, daneben einen geringen Gesang gehabt.

(Fortsetzung folgt).

Aus den deutschen Vogelstuben.

Wie sonderbar zuweilen Neigung und Geschmack bei den Vögeln sich verirren, hatte ich in vorigem Frühjahr Gelegenheit zu beobachten.

Ein Elsterweibchen (Spermestes cucullatus) hatte sich durch das Drahtgitter der Volière gezwängt, und war trotz aller Mühe nicht wieder einzufangen. Einige Tage trauerte das Männchen um die verlorene Gattin, dann aber sah er sich unter den Töchtern des Landes nach einer andern um und erkor sich ein Diamantfinkenweibchen. Ohne sich an das Männchen desselben zu kehren, rückte es an dieses heran um ihm tänzelnd seine Liebeserklärung mit heiserer Stimme vorzukrächzen. Ob aber Jenes die Elsterchen-Sprache nicht verstand, oder ob es nicht von gleicher Neigung beseelt war, — es flog regelmäßig davon, wenn das Elsterchen angehüpft kam. Doch dieses ließ sich dadurch nicht irre machen; auf Schritt und Tritt folgte es dem Diamantfinkenweibchen: an den Futterkasten, den Badenapf, von Zweig zu Zweig, ja bis in das eben vollendete Nest hinein. Und die Auserseh'ene, — vielleicht rührte sie die Anhänglichkeit des eifrigen Liebhabers, — duldete mit der Zeit, daß sich das Elsterchen neben sie setzen und sie im Gefieder krauen durfte.

So groß nun die Zärtlichkeit des Elsterchens gegen das Diamantfinkenweibchen war, so groß war mit der Zeit sein Haß gegen das Männchen geworden. Wenn sich Letzteres nur in der Nähe seines Weibchens oder seines Nestes blicken ließ, so schoß jenes nach ihm hin und trieb es schnell in die Flucht. Oefters, wenn der Diamantfink nichts Böses ahnend am Futternapf sich gütlich that, kam das Elsterchen, einem Raubvogel gleich, herabgestoßen und zauste ihn, daß die Federn umherstoben. Eifersucht schien übrigens der Diamantfink trotz alledem gar nicht zu kennen, und nie fiel es ihm ein, den Friedenstörer von der Seite seiner Gattin zu treiben. Dagegen versuchte er häufig durch gütliche Vorstellung seine Gattin wieder auf den rechten Weg zu bringen. Denn wenn er sich gerade vom Elsterchen unbeobachtet wähnte, so suchte er sich einen möglichst langen Strohhalm, faßte ihn mit dem Schnabel an dem einen Ende und flog damit, — wie er es sonst in glücklicheren Tagen immer gemacht, — auf sie zu, nahte sich ihr mit gemessenen Schritten und tiefen Verbeugungen und tutete ihr dann mit vielem Ausdruck sein Nachtwächterlied her. Selten kam er jedoch bis zur letzten Strophe desselben, dem tiefen tät, — tät, — tät, denn das Elsterchen kam unterdessen herangeflogen, — er ließ seinen langen Strohhalm fallen, und suchte eiligst das Weite.

So trieben es diese Drei lange fort, bis ich mich entschloß das Elsterchen heraus zu fangen, da eine Bastardbrut von diesen wol schwerlich zu Stande gekommen wäre. Der Ehefrieden unter den Diamantfinken war dadurch auch sofort wieder hergestellt, denn sie suchten wieder gemeinschaftlich ihr Nest auf und zogen auch im Laufe des Sommers noch 2 Bruten groß. —

Als Seitenstück dazu kann ich noch erwähnen, daß sich ein Rothrumpfmännchen (Singsittich) mit einem Nymphenweibchen gepart hat. Letzteres legte auch Eier, doch wurden dieselben verlassen, weil die Nymphe verlangte, daß sich das Männchen am Brutgeschäft mit betheiligen sollte, — wie ja das bei den Nymphen allgemein üblich ist, und Rothrumpf damit nicht einverstanden, weil er so etwas von Hause aus nicht gewohnt war. Leider hatte ich gerade kein brütendes Nymphenpärchen, dem ich die Eier hätte unterlegen können, und so gingen sie denn zu Grunde.

Ein ganz gleicher Fall wurde von Herrn Kaufmann Ludwig in Droyssig in diesem Frühjahr ebenfalls beobachtet.

A. Wigand, Photograf in Zeitz.

Vogelkrankheiten.

Ich wende mich mit der Bitte an Sie, mir über den Krankheitszustand eines Amazonenpapageis Aufschluß und bei dessen Heilung Ihren Rath zu ertheilen. Ich besitze diesen Pappagei, der mir und meiner Familie sehr werth und unersetzlich geworden ist, schon seit 40 Jahren. Die Krankheit, welche in Entzündung der Augenlider liegt, vor einigen Jahren begann, oft halbe Jahre aussetzte und dann wieder von Neuem auftrat, ist folgende: Das Augenlid schwillt nach dem Schnabel zu an und wird blau, nachher grün und zuletzt gelb, als ob man sich ge-

stoßen hat. Durch die Geschwulst ist natürlich das Auge ganz klein, sobald sich die Geschwulst verliert, wird das Auge wieder größer und die Sehkraft scheint gar nicht gelitten zu haben, doch wiederholt sich das Leiden seit einem halben Jahre alle Paar Wochen. Von der ersten Entzündung her bedeckt das Augenlid den vierten Theil des Augapfels, sonst ist alles in normalem Zustande. Der Vogel befindet sich immer im warmen Zimmer, wird Nachts zugedeckt, bekommt als Nahrung, früh Zwieback in Milch, Mittags Kanariensamen, sonst bisweilen Kartoffel, Buttersemmel, Zucker und von unserm Mittagstisch, seltener etwas gekochtes Fleisch als Näscherei, nie etwas, worin Mandeln oder Petersilie sich befinden. Bei der letzten Entzündung hat das Auge geblutet und gethränt, die Geschwulst steigert sich 2 bis 3 Tage und fällt auch wieder in derselben Zeit. Seit einiger Zeit wird das Auge aber nie wieder ganz aufgemacht, weil immer wieder sich eine neue Geschwulst einstellte, die sich heiß anfühlt. Der Vogel frißt aber immer gleichmäßig gut, und ist auch sonst ganz munter.

Kammerherr von Krieger in Sondershausen.

Diese Erkrankung liegt zweifellos in unrichtiger Ernährung begründet. Geben Sie dem Vogel nur Kanariensamen, in Wasser abgekochten Reis und allenfalls in Wasser erweichtes, altbackenes Weißbrot (gewöhnliche, ohne Milchzusatz gebackene Semmel) und lassen Sie dabei jede „Leckerei," besonders aber Fleisch, Buttersemmel u. dgl. für den Vogel unnatürliche Nahrungsmittel fort. Wenn Sie diese Behandlung mit vollster Entschiedenheit anhaltend ausführen, so wird der Vogel ohne Frage wieder völlig gesund werden. Andere, künstliche Heilmittel giebt es in einem solchen Falle nicht. D. R.

Züchtungsversuche mit einheimischen Finken.

Die Vogelstube, in welcher ich die meisten einheimischen Finkenarten parweise freifliegend hielt, lag unmittelbar unter dem flachen Dache, hatte ein Seitenfenster nach Süden und ein sehr großes (8 Z. l., 4 Z. b.) schräg liegendes Oberfenster im Dach mit Luftscheiben, so daß die Vögel Luft und das beste Licht von frühzeitig bis Abends spät hatten. In der Mitte der Stube befand sich eine flache Schale von 3' Durchmesser, in der Mitte $1^1/_2$" tief, am Rande auslaufend, und ein kleiner Springbrunnen versorgte dieselbe mit Wasser, welches aus einem außerhalb des Zimmers hochstehenden Gefäß floß; ein Abflußrohr hielt den Wasserstand auf einer gleichen Höhe.

In dem Zimmer waren rings an den Wänden recht dichtzweigige dürre Sträucher und außerdem in Kübeln dichtlaubige, bis zur Decke reichende lebende Sträucher, wie Lebensbaum (Thuja), Wachholder (Juniperus) und wilde Orangen (Citrus) angebracht. Als Futter verwendete ich eine Mischung aller möglichen Sämereien, auch Hafer, Grütze und während der Brutzeit hartes Ei und in Wasser erweichte, ausgedrückte altbackene Semmel.

Bald sah ich nun, nachdem die Vögelchen seit dem Herbste eingewöhnt waren, die Grünhänflinge oder Grünfinken (Fringilla chloris) nisten, in einem selbstgebauten, runden, aus Moos, Federn und Haaren hergestellten Nestchen frei in einem Lebensbaum stehend. Das Pärchen zog hier mehrmals Junge auf, indem es nach Wegnahme des alten Nestes, auf dieselbe Stelle ein neues erbaute. Die Jungen wurden mit Ei und Semmel und Sämereien aus dem Kropfe gefüttert, und gediehen ganz vorzüglich.

Ferner nisteten die Stiglitze (Fringilla carduelis) zweimal frei ebenfalls in einem Lebensbaum in selbstgebauten Nestern und erzogen einmal drei, einmal vier Junge und fütterten diese mit Ei und Semmel aus dem Kropfe. Während der Brutzeit fütterte der Hahn das Weibchen auch auf dem Nest viel aus dem Kropfe; beide brüteten abwechselnd. Die Jungen starben leider alle in der ersten Mauser; möglich daß ihnen die Insektennahrung fehlte.

In einem aus zusammengebundenen belaubten Weidenruten, einem kleinen Ballon ähnlichen Nistkörbchen brüteten die Bluthänflinge (Fringilla cannabima) im selbstgebauten Nest zweimal auf 3 und 4 Eiern, jedesmal ohne Erfolg, trotzdem das Weibchen fest saß. Das Vögelchen ging erst vom Neste, wenn man ihm mit der Hand ganz nahe kam. Das Männchen war auch während der Brutzeit in seinem Gefangenen- (Winter-) Kleide, bekam nicht seine rothe Färbung wieder, und hat sie auch nie wieder erlangt, trotzdem derselbe Vogel, noch heute in meinem Besitze, den ganzen Sommer über bis spät in den Herbst in einer großen Voliere im Freien lebt; es liegt wol an der Nahrung.

Ein Pärchen Stiglitzkanarien, zweijährig, Geschwister (graugrün mit gelben Schwungfedern, gelber Brust, goldbroncenem Kopf), bauten auch ein sehr schönes, dem des Stiglitz gleichendes Nest, außen von Moos mit Wolle und Haaren ausgefüttert, in einem Orangenbäumchen. Aus dem Gelege kam aber nichts aus, weil der Hahn während des Nestbaues sich ein Beinchen brach, was allerdings wieder vollständig gut heilte, aber später brachte ich sie nicht mehr zur Brut.

Die Haussperlinge (Fringilla domestica) nisteten natürlich auch sehr bald, zogen aber ihre Jungen nicht auf, sondern ließen sie erhungern. Nur einmal, als ich Maikäfer ins Zimmer gab, wurden die Jungen bis 10 Tage alt, dann aber starben sie auch. Es möchte dies auch ein Beweis dafür sein, daß der Sperling seine Jungen nur mit Kerfen auffüttert.

Von den Edelfinken, Bergfinken, Leinfinken und Zeisigen (Fringilla coelebs, montifringilla, linaria et spinus) konnte ich keine Bruten erlangen, doch erzielte ich mehrfach Bastarde vom Zeisig und Girlitz mit Kanarienweibchen. Einmal kam auch der Fall vor, daß ein Kanarienweibchen unter ihren Jungen von reiner Zucht auch einen Bastard hatte, dessen Vater ein Girlitz war; sie war also ihrem Gatten untreu geworden. Georg Lincke, Fabrik-Direktor.

Vogelliebhaberei im fernen Rußland.

Palmyra.

Liebhaber von Allem was da kriecht und fliegt, bin ich schon so lange, als ich denken kann; dennoch vermochte ich mich erst hier, wo ich nun schon seit 9 Jahren als Obergärtner angestellt bin, mit mancherlei beharten und befiederten Geschöpfen zu umgeben.

Meine Vogelsammlung enthält zwar nichts Bedeutendes, meist blos hier vorkommende Arten, doch zeigt deren Aussehen, wie ihr munteres Betragen, daß meine Pflege, das darf ich behaupten, ohne mir schmeicheln zu wollen, eine sorgfältige ist. Mein Geschmack wird nicht allein von einem prachtvollen Gefieder, wie herrlichen Gesange eingenommen, sondern es macht mich äußerst glücklich, wenn ich sehe, daß so ein liebes Thierchen, und wäre es nur ein Spatz, durch Zutraulichkeit, Verständniß für die ihm entgegengebrachte Liebe zeigt. Allerdings ist es längst schon mein Wunsch, mich mit einigen ausdauernden Sittichen, nebst einer Sammlung Prachtfinken-Arten zu bereichern; doch da bin ich in der unglücklichsten Lage, d. h. aber nur in der geographischen, um solches erfüllt sehen zu können. Vom Auslande Vögel zu beziehen, geht blos mit Hülfe eines Begleiters; ebenfalls nicht von Stader in Moskau, da ich von der nächsten Bahnstation noch 17 Meilen entfernt wohne und die Post solche Marterkarren Briefpostwagen nennt, in denen eine verpackte Katze nach der ersten Meile den Geist aufgeben würde, obwol sie doch gewiß ein zähes Leben hat! Der begleitende Kondukteur hätte für ein derartiges Poststück auch kein Verständniß, es käme ihm nicht darauf an, dasselbe gleich einem Wollenballen zu behandeln!

Auch erscheinen mir hier die Preise der Vögel, trotzdem, daß ich den Zuschlag recht gut verstehe, doch ein bischen stark. So wurde für ein Paar Wellensittiche 20 Rubel gefordert, ja sogar kam mir kürzlich der Spaß vor, daß ein Händler, den ich auf einer Reise traf und dessen Vorrath außer einigen Kanarien in drei Papageien bestand, für einen Alexander-Sittich 70 Rubel (dabei ein Wildfang) forderte! Da müßte der Liebhaber ein Krösus sein, um kaufen zu können.

Bei diesen Aussichten ist es schon besser zu warten, bis ich selbst vielleicht bald nach dem Auslande reisen werde, und die Einkäufe an billigeren Quellen machen kann. —

Hier in der Steppe kommen die meisten Vogel-Arten wie in Deutschland vor, doch ändern in der Zeit, wie Masse des Auftretens, klimatische und landschaftliche Verhältnisse Manches.

Seit vielen Jahren halte ich eine beträchtliche Anzahl europäischer Vögel, meistens blos Körner- und sogenannte Allesfresser, doch auch Weichfresser, obwol es mir hier, im südlichen Rußland, an den für die letzteren nöthigen Ameisenpuppen mangelte, obwol von hier aus eine bedeutende Ausfuhr derselben nach Deutschland stattfinden soll; diejenigen Handlungen aber, welche die Ausfuhr besorgen, scheinen nach meinen Erfahrungen nicht geneigt zu sein, eine kleine, natürlich nicht nach Zentnern berechnete Masse abzulassen.

Im Sommer ist hier zwar kein Mangel an verschiedenen Kerfen und mit denselben konnte ich auch die anspruchsvollsten Vögel jeden Tag reichlich versorgen. Von dem Ueberfluß ließ ich auch für den Winter einsammeln, nämlich von den hier in Masse vorhandenen kleineren Heuschrecken, die nach Tödtung und Zerdrücken des Rückenschildes, auf einer recht heißen Heerdplatte schnell geröstet wurden, worauf sie noch zum Austrocknen an einem schattigen, luftigen Ort längere Zeit dünn ausgebreitet liegen blieben und dann später in kleine Säckchen gefüllt wurden. Im Winter gebe ich nun solche, etwas gerieben, den kleineren Weichfressern unter das sogenannte Nachtigalen-Futter gemischt, wie auch frei in den Käfig gestreut. Die Drosseln, Staare u. dgl. bekommen die größten Exemplare ganz vorgelegt. Diese gedörrten Kerbthiere wurden nicht allein von den Kerffressern, sondern auch von vielen Körnerfressern als Gimpel, Stieglitze, Zeisige, wie auch mit großer Gier von meinen Kanarienvögeln verzehrt. Auch ein Pärchen Seidenschwänze zeigen sich als große Liebhaber; während dagegen von einem recht zahmen Wiedehopf Semmel in Milch geweicht vorgezogen werden.

Als Leckerbissen bekommen die kleinern Weichfresser täglich anstatt der Mehlwürmer ihre Gabe Schaben oder Schwaben, hier sogar „Preußen" genannt, welche ich, zum Glück für meine Vögel aus der hiesigen Oekonomiebäckerei in den größten Massen verfüttert, doch wol nicht im Stande sein werde, auszurotten. Diesem Futter gebe ich natürlich vor Obigem den Vorzug, da man den ganzen Winter hindurch die Weibchen sammt den großen am Leibe hafteten Eiern mit fängt, die dann die vorzüglichsten Leckerbissen abgeben, welchen mein Wiedehopf sogar nicht abhold ist. Diese beiden angeführten Stoffe werden Ameisenpuppen und Mehlwürmer nicht verdrängen, was auch gar nicht damit gesagt sein soll, sondern ich wollte nur damit veröffentlichen, daß auch ohne diese beiden, meine Sprosser, Grasmücken, Rothbrüstchen sich im besten Wohlsein befinden. Natürlich für eine große Anzahl angeführter Vögel, wäre das Beschaffen dieses Futters sehr beschwerlich. C. Lieb.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

* An meines Vaters Haus in Bautzen (Oberlausitz) stößt ein ziemlich großer Garten, in welchem, ehe der eigentliche Garten beginnt, drei majestätisch hohe und starke Eschen, mehrere Roßkastanien und Wallnußbäume stehen, die leeren Stellen zwischen diesen Bäumen sind mit blühenden Sträuchern ausgefüllt und zwischen dieser Gartenabtheilung und dem Haus ist ein breiter Sandplatz, welcher von meiner Schwester und einer Base dazu benutzt wird, um im Sommer draußen sitzen zu können.

Unmittelbar neben diesem Sitzplatze haben nun im vergangenen Frühjahre ein Paar große, wilde Ringeltauben auf so einem Ziersträuche in einer Höhe von etwa 9 Fuß ihr Nest aufgeschlagen und zwei Junge aufgezogen. Dabei waren diese Thierchen so zahm und zutraulich, daß sie das ihnen von meiner Schwester hingestreute Futter ganz ruhig aufnahmen, obschon meine Schwester kaum 2 Ellen davon saß.

Ich selbst habe, als ich im Juni dieses Jahres die ausgewachsenen Jungen auf den Eschen gesehen, gefunden, daß sich diese Thierchen, obschon ich ihnen ganz fremd, auch von mir füttern ließen und ganz in meine Nähe kamen. Wenn früh nicht gleich zur bestimmten Zeit das für sie bestimmte Futter hingestreut war, so machten sie sich ordentlich bemerkbar, indem sie auf dem Sandplatze herumliefen und dabei ihr Ruckfen hören ließen.

Albert von Otto, Hauptamtsassistent in Chemnitz.

(In Deutschland sind, alle Wildtauben allerdings fast allenthalben so scheu, daß die obige Mittheilung

immerhin interessant erscheint. In Paris fand ich dagegen die Ringeltauben im Tuillerien-Park oberhalb des lärmenden Treibens der Sonntagsbesucher furchtlos auf den Bäumen und, wenn wenige Besucher vorhanden, liefen sie auch auf der Erde, wenige Schritte von den Lustwandelnden umher. R.).

Zur Geflügelzucht.

Es ist bekannt, daß Hühner bisweilen an einem Tage zwei Eier legen, wobei dann gewöhnlich das zweite Ei schallos ist. Meines Wissens dürften aber wenige Beispiele einer solchen Fruchtbarkeit einer Henne bekannt sein, wie das nachfolgende:

Eine Bäuerin besitzt ein gewöhnliches Landhuhn, welches im Frühjahre des letzten Jahres ausgebrütet wurde und 4 Wochen vor Weihnachten zu legen begann. Dasselbe legte dann von dieser Zeit an bis Mitte August d. J. Tag für Tag und ruhte nur je den 20. oder 16. Tag bis es dann brütete und nun eine Schaar Junge hat, seither aber noch nicht wieder gelegt hat.

Das Außerordentliche bei dieser Henne besteht aber darin, daß sie fünf Mal zwei Eier an einem Tage legte und zwar in Form und Größe vollkommen ausgebildete. Das erste Ei wurde immer gegen 8 Uhr Morgens und das zweite um die Mittagszeit gelegt, ja ein Mal legte die Henne beide Eier auf einen Sitz innerhalb einer halben Stunde; eine Merkwürdigkeit die gewiß ohne Gleichen dasteht. Die Aussagen der Bäuerin sind durchaus zuverlässig und weil dieselbe nur 2 Hennen pflegte, deren Eier in Form und Farbe ganz verschieden waren, so konnte auch keine Verwechslung stattfinden.

Ferdinand Wirth in Lichtensteig, Schweiz.

** In „Ackermann's-Gewerbezeitung" erbot sich vor kurzer Zeit ein dort nicht genannter Herr, seine theoretischen und praktischen Erfahrungen in Betreff der Konstruktion von Brütmaschinen und künstlichen Aufzucht des jungen Geflügels gegen entsprechendes Honorar zur Verfügung zu stellen. Um den Namen dieses Herrn zu erfahren, muß man sich an Herrn Ackermann in Wien, VI., Magdalenenstraße 24 wenden. An erwähnter Stelle wird gesagt, daß mittelst der Maschinen des inzwischen verstorbenen Fabrikanten von Brütmaschinen, Roth von Telegt, je nach der Größe der Maschinn 100—400 Eier auf Einmal ausgebrütet werden, und zwar nicht blos Eier von Hühnern, sondern auch von Gänsen, Enten, Truthühnern, Fasanen und sonstigem zahmem oder wildem Laufgeflügel. Die Heizung erfolgt mittelst Holzkohle und bedurften sechs zugleich im Gange erhaltene Maschinen, zur Bedienung, eines Mannes und eines Knabens oder Mädchens. (Wiener Ausst.-Ztg).

Ein Ofen für die Vogelstube.

Die besondere Art Füllöfen, auf die ich jedem Besitzer einer Vogelstube aufmerksam machen möchte, verdient es, überall empfohlen zu werden. Der Heizraum, ein kleiner Gußcylinder, ist mit feiner fester Masse noch so dicht ausgelegt, daß auch nicht die geringste Spur des Glühens oder einer strahlenden Hitze bemerkbar ist. Ganz besonders für den Zweck, den ich im Auge habe passend, ist die fernere Einrichtung, daß man den Ofen bald als gewöhnlichen Blechcylinderofen, wie sie schon Jahre lang im Gebrauch sind, bald als Füllofen mit Luftheizung gebrauchen kann. Bleibt der Deckel geschlossen, so hat man eben einen Ofen, wie man solchen mit Vorliebe für Holzfeuerung in Gebrauch hatte, d. h. dieselbe angenehme Wärme, wie bei den gewöhnlichen Cylinderöfen; öffnet man den Deckel, so findet eine viel raschere Abgabe der Wärme und eine ebenso beschleunigte Cirkulation der Luft statt; da aber der Heizcylinder um seiner Ausmauerung willen nicht glühendstrahlend wirkt, sondern durch langsame Verbrennung des Cooks, des besten Heizmaterials, blos in steter angenehmer Hitze bleibt, so ist auch die Wirkung der Luftheizung eine nur angenehme. — Ich kann den Fabrikanten, Herrn Schötteldräger in Niederdorf b. Zürich, Jedermann nur bestens empfehlen. Der Preis eines kleinen Ofens, für eine Vogelstube genügend, kommt auf 60—65 fr. zu stehen. G. Winkler, Pfarrer in Fischenthal bei Zürich.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Stettin.

Sitzung vom 3. December.

Herr Prütz giebt eine Schilderung des Harzer-Kanarien-Rollers, derer er im Auftrage einiger Vereins-Mitglieder eine größere Anzahl von dem bedeutendsten Züchter, Herrn Kontroleur Boecker in Wetzlar, bezogen hat. Den Gesang beschreibt Redner folgendermaßen: Man hört einem solchen Kanarienvogel schon bei den ersten Strophen den Virtuosen an, da er seinen Gesang mit einer zarten feinen Rolle, oder auch mit zwei oder drei Pfiffen beginnt; davon reiht er mehrere Rollen aneinander, die bald stärker, bald schwächer werden, bald gerade, bald gebogen, und diese Rollen unterbricht er nur durch klangvolle Flötentöne und eine wunderschöne Tour, die halb klingel-, halb gluckartig, bei einigen in Form von rasch auf einander folgenden Pfiffen geschlagen wird. Die Hohlpfeife ist tief, sehr schön rein und wird ohne jegliche Hast vorgetragen. Alle Rollen sind im Gesange vertreten, feine Schwirr- und feine Hohlrollen, tiefere Hohlrollen, Krach-, Lach-, Schnatter- und verschiedene Rollen in der mittleren Tonlage; ein häßlicher Ton kommt niemals vor. Das Eigenartige im Gesange liegt in den schönen Uebergängen: eine Rolle fließt aus der andern, steigend und fallend, und fast in jeder liegt eine Klingeltour. Kein Ton ist zu vernehmen, der nicht voll und zart, metallisch und wohlthuend für das Ohr mit unwiderstehlichem Reiz sich einschmeichelt. — Die zum „Abhören" der Vögel ernannte Kommission hat sich einstimmig dahin ausgesprochen, diese Vögel schlagen zu hören, sei ein Hochgenuß. Um diese Sänger auch in weiteren Kreisen einzubürgern, bietet Herr Prütz noch einige Exemplare auch Nichtmitgliedern an. — Herr Dr. Oeltze macht über den diesjährigen Abzug der Schwalben folgende Mittheilungen: Der Aufbruch ging in zwei großen Zügen vor sich, der erste in der Nacht vom 24. zum 25. September, der zweite, etwas kleinere Zug setzte sich am 19. Oktober in Bewegung, und die letzten Nachzügler folgten am 24. November. — Herr Hauptmann Bödicker giebt eine Uebersicht der Zuchtergebnisse seiner Pariser Kanarienvögel, Trompeter genannt. Zur Ansicht hatte er ein altes Pärchen, ein junges Männchen und einen Blendling vom Pariser und Harzer Vogel ausgestellt, die durch ihre, an einen Falken erinnernde Gestalt und die gekräuselten Brustfedern, Jabót genannt, die Aufmerksamkeit erregten. — Zur Feier des Stiftungsfestes werden 100 Thlr. aus der Vereinskasse bewilligt, und die Herren Grimm, Dupont und Lischke zu Mitgliedern des Fest-Komitee's ernannt. — Herr Direktor van der Haegen, Brandmeister Thomas und Hauptmann Bödicker hatten verschiedene nach Glogers Angaben verfertigte Nistkästchen ausgestellt, über deren Zweckmäßigkeit sich eine längere Besprechung

entspann. Die Versammlung entschied sich schließlich für die noch etwas zu verbessernden Kasten des Direktors van der Haegen für kleinere Vögel in der Größe eines Sperlings, und für die Staarenkasten des Hauptmanns Bödicker. Von diesen Nistkästen sollen 1500 Stück noch im Laufe dieses und des nächsten Monats in der Umgegend Stettins angebracht werden; außerdem soll in dem Fenny'schen Lokale in der Oberstraße ein von Herrn Schmidt verfertigtes praktisches Blechgefäß mit einer bezüglichen Aufschrift aufgestellt werden, um die nicht mehr zu verwerthenden Samenproben, namentlich Hanf, Rübsen, Gerste, Hafer und Weizen für die in den nächsten Tagen einzurichtenden Winter-Futterplätze zu sammeln. Eine gedruckte Anleitung, den Vogelschutz betreffend, wird demnächst gratis andas Publikum zur Vertheilung gelangen.

Briefwechsel.

Herrn Schmalfuß in ...: Sie haben vergessen, Ihren Wohnort anzugeben und auch aus dem Poststempel ist derselbe mit Sicherheit nicht zu entnehmen. Sobald Sie uns eine ganz genaue Adresse angeben, wollen wir Ihnen die fehlenden Nummern zu ersetzen suchen.

Nachruf.

Einer der tüchtigsten Ornithologen der Gegenwart, Oberst **von Zittwitz**, Präsident der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz, ist am Weihnachtstage Abends in Görlitz gestorben. Der Verstorbene, welcher bereits als Officier mit Vorliebe sich mit ornithologischen Studien beschäftigt hatte, widmete seit seiner Verabschiedung seine volle Thätigkeit dieser Wissenschaft und der Leitung der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz, deren ornithologische Sammlung unter seinem Präsidium eine so bedeutende Vermehrung erfuhr, daß sie gegenwärtig in mancher Beziehung alle Sammlungen in Deutschland übertrifft. Oberst v. Zittwitz hat die meisten unter seinem Präsidium für den Verein erhaltenen Vögel selbst gestopft, worin er Meister war. Mit allen bedeutenden Naturalienhändlern des In- und Auslandes stand er im regen Verkehr, ebenso mit den hervorragendsten Gelehrten seines Faches. Bei großer persönlicher Liebenswürdigkeit zeigte er eine so hingebende und aufopfernde Thätigkeit für die Wissenschaft, daß die jüngern Gelehrten ihn mit hoher Achtung behandelten. Noch bei der letzten Jahresversammlung der deutschen ornithologischen Gesellschaft in Berlin war ihm bei der Hauptzusammenkunft der Vorsitz übertragen. Oberst von Zittwitz hat ein Alter von 66 Jahren erreicht.

(Schlesische Zeitung.)

Der Herausgeber der „Gefiederten Welt" ehrt nicht allein das Andenken des Verstorbenen als das eines hochstehenden Gelehrten, sondern er betrauert ihn auch als einen im persönlichen Umgange liebenswürdigen und hochachtbaren Mann.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Zu verkaufen

3 Paar einjährige Goldfasanen à Paar 12 Thlr.,

ferner zu Kauf oder Tausch

gegen zuchtfähige Wellensittiche oder Prachtfinken, 1 Paar zuchtfähige Rosella (Omnicolors) (Prachtexemplare) à 18 Thlr. — und sieht Anträgen entgegen **Oskar Vetter,**

14] Ludwigsburg bei Stuttgart.

Die zoolog. Handlung von R. Hieronymi in Braunschweig

hat stets großen Vorrath der gangbarsten Vögel, namentlich z. B. eine besonders reiche Auswahl der schönsten Kanarien-Hähne wie auch Astrilden, Amaranten, Zebrafinken, kleine und zweif. Elsterchen, Nonnen, Reisvögel, div. amer. Staararten, Wander- u. Lachtauben, prachtvolle Inseparables, Sperlingspapageien u. Wellensittiche, große u. kl. Weber, Stieglitzbastarde, Zeisige, Hänflinge, Elstern, Uhus u. andere Eulen 2c. Dann auch div. Affen, Ichneumons, Marder, Frettchen, Aguti, Prairiehunde, Meerschweinchen, dän. Doggen u. Bären, so auch Goldfische, ferner hält dieselbe eine reichhaltige Auswahl der feinsten verzierten Käfige (s. g. Gesundheitsbauer) am Lager, wie billige und gebrauchte von 7½ Sgr., Harzbauer von 2½ Sgr. pro Stück an. — Außerdem sind Muscheln, alle Arten Futterämereien, Ameiseneier 2c. 2c. daselbst en gross und en détail stets preiswerth zu haben. — [15

Um den mittellosen Landschulen des hiesigen Kreises bei Anschaffung einer kleinen Sammlung nützlicher Vögel und einiger nützl. Säugethiere behülflich zu sein, wünscht der unterzeichnete Verein folgende Vögel und Säugethiere ausgestopft, gut erhalten, zum Aufstellen fertig, jedes Thier in einer größern Anzahl von Exemplaren, (bis 10) zu möglichst billigen Preisen zu kaufen, und nimmt der unterzeichnete Vorsitzende Anmeldungen entgegen:

Gartenrothschwänzchen,	Buntspecht, (großer od. mittler),
Rothkehlchen,	Baumläufer,
Fliegenschnäpper (grau),	Wiedehopf,
Grasmücke (gemeine),	Kukuk,
Laubvogel (Garten-),	Kiebitz,
Goldhähnchen, (feuerköpf.),	Eule- (Wald-, Ohr-, Schleier-),
Meise (Kohl-, Blau-, Sumpf-),	Bussard,
Bachstelze, (weiße),	Igel,
Lerche,	Spitzmaus,
Saatkrähe,	Maulwurf.

Elbing, den 1. Januar 1874. **Foertsch,**
Oberl., Vorsitzender
16] des Elbinger Vogelschutz-Vereins.

Kanarienvögel

mit **vollständig** ausgebildetem **schönem** Gesang versendet selbst bei **strenger Kälte** unter Garantie des **gesunden Eintreffens** bis auf 3tägige Postentfernung zu bekannten Preisen.

17] **A. Maschke** in St. Andreasberg, Harz.

Vorzüglich schöne, gutgetrocknete Steirische Ameiseneier empfiehlt **Franz Kumeyer** in **Linz** a. d. Donau. [18

Eine größere Anzahl gesunder diesjähriger Dompfaffen, vortrefflich zur Zucht zu gebrauchen, roth und grau, zu 25 resp. 10 Sgr., und eine diesjährige, sehr schön singende Singdrossel zu 2 Thlr. sind zu haben. **W. Riese** in Coesfeld. [19

Gut getrocknete Ameiseneier à Pfd. 20 Sgr. empfiehlt
20] **August Dietz** in Burg bei Magdeburg.

Die Vogelhandlung von D. Dufour,

Behrenstraße 50 (Passagen-Gebäude),

hat folgende Vögel vorräthig: Graue und grüne Papageien, zahm und sprechend, Inseparables, Wellen-Sittiche, Paradies- und Diamant-Vögel, Nonnen, Tigerfinken, Astrilds u. v. a. Zugleich mache ich aufmerksam, daß ich mehrere Hundert Kanarienvögel habe, die feinsten Schläger, Roller, Glucker und schönflötende, auch die kleinsten Hunde für Damen, zu den billigsten Preisen. [21

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstraße 2, durch die Post oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Hernau.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 15. Januar 1874. Nr. 3.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Kanarienvogel-Zucht in Andreasberg. (Fortsetzung). —
Aus den deutschen Vogelstuben: Glückliche Züchtungen. —
Thierliebhaberei unter erschwerenden Umständen. —
Zur Geflügelzucht und -Liebhaberei: Ergänzung zu dem Aufsatz „Der Ringschläger;" Aachener Brieftauben; Staatsbrieftaubenzucht; Hühnersterben durch Reisfütterung. —
Wunderbare Ergebnisse der Ausstellungen. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Vergiftete Vögel; Telegraphendräte. —
Anfragen und Auskunft: Verlorene Stimme. —
Briefliche Mittheilungen: Grauedelfink. —
Briefwechsel. — Anzeigen. —

Zum Vogelschutz.

In den Berliner Zeitungen finden wir die folgende Nachricht: Wie aus den hiesigen diplomatischen Kreisen verlautet, trifft die österreichische Regierung die nöthigen Vorbereitungen, um den Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel durch internationale Verträge mit allen europäischen Staten zu sichern. Es soll zunächst durch eine zu berufende internationale Kommission von Sachverständigen ein genaues Verzeichniß der zu schonenden Vögel ausgearbeitet werden. Die preußische Regierung und hoffentlich auch alle übrigen deutschen Regierungen werden sich den Wünschen Oesterreichs anschließen. Es bedarf natürlich auch des Erlasses eines Vogelschutz-Gesetzes in den einzelnen Staten. Bei den im Februar d. J. 1870 im preußischen Abgeordneten-Hause stattgehabten Berathungen über den Gesetz-Entwurf betreffend die Schonzeit des Wildes, wurde bereits die Staatsregierung ersucht, dem Landtage einen Gesetz-Entwurf über Schonung aller nützlichen Vögel vorzulegen.

Selbstverständlich begrüßen wir sowol von den Gesichtspunkten der Ornithologie, als auch des allgemeinen Wohles aus diesen Fortgang der Angelegenheit mit großer Freude. Wir haben in den beiden ersten Jahrgängen der „Gefiederten Welt" eine solche Fülle von Material aufgespeichert, daß dasselbe wol als Grundlage für die betreffende Gesetzgebung dienen könnte. Einerseits aber von dem Gesichtspunkte aus, daß eine solche Angelegenheit doch in der That garnicht eingehend genug beleuchtet werden kann, bevor sie durch Gesetze geregelt werden darf und andererseits auch nach den Wünschen unserer Leser, fahren wir noch fort, den Vogelschutz und die für ihn zweckmäßigen und nothwendigen Maßnahmen hier zu besprechen, bezüglich den uns zugehenden Besprechungen Aufnahme zu gewähren.

Von den vielen uns zugekommenen beistimmenden Zuschriften sei es uns gestattet, die nachfolgende zu veröffentlichen, indem wir zugleich auch um fernere Meinungsäußerungen aus dem Kreise unserer Leser sehr bitten:

Die Vogelschutz-Frage verfolge ich mit vielem Interesse, wünsche aber, daß man über sie die Frage des Wohls der Menschen nicht vergesse. Glauben Sie nicht, daß eine Grasmücke oder dgl., wenn sie dem Armen in der Dachstube manche Stunde erheitert, der Menschheit mehr nützt, als wenn sie im Freien mithilft, Insekten zu vertilgen? Ich denke, wenn zur Hegezeit nicht gefangen werden darf und wenn außerdem der gestattete Vogelfang vernünftig geregelt und gesetzlich überwacht wird, so wäre das

Richtige getroffen. Selbstverständlich sollte aber eben so wol das Morden in Italien, als auch jeder Vogelfang im Großen, gleichviel wo er auch betrieben wird, durchaus unterdrückt werden. Der Vogelliebhaberei schneide man aber nicht jede Möglichkeit ab, die herrlichsten Sänger zu halten — denn das wäre geradezu unmenschlich und würde jedenfalls zu zahllosen Gesetzesübertretungen führen. (J. F. Engelhard in Nürnberg).

Wir werden hiernach in der Veröffentlichung der uns bereits vorliegenden und noch zugehenden Mittheilungen auf diesem Gebiete fortfahren.

Die Leser, welche sich vorzugsweise für diese Angelegenheit interessiren, werden sich wol darüber wundern, daß wir noch immer nicht von Redaktionsseite die längst versprochene Uebersicht gegeben haben. Dieselbe ist jedoch jetzt nicht allein äußerst schwierig zusammenzufassen, sondern sie ist vorläufig auch völlig zwecklos, weil die Meinungen und Ansichten gerade der Ornithologen von Fach jetzt in vielen Punkten wiederum soweit auseinander gehen, daß der Streit über den Nutzen und Schaden dieses oder jenes Vogels geradezu wieder beim Abc anfängt. Mit deutscher Gründlichkeit beginnt man in dieser Weise mit dem Sperlinge, Storch, Staar u. s. w.

Zur sachgemäßen Regelung einer Angelegenheit, besonders wenn dieselbe auf dem Wege der Gesetzgebung stattfinden soll, erscheint es allerdings durchaus nothwendig, daß dieselbe in allen ihren Einzelheiten so eingehend erforscht und so klar gelegt werde, als dies für menschliches Wissen überhaupt möglich ist. Keineswegs wird eine solche Ergründung der Angelegenheit aber entsprechend gefördert und sachgemäß zum Ziel geführt, wenn durch Inkonsequenz oder noch schlimmer durch unlautere Beeinflussungen die hervorragendsten Gelehrten auf diesem Gebiete Anlaß zu Verwirrungen geben. Dies ist bei der Vogelschutz-Frage leider thatsächlich der Fall. Ornithologen, welche großen Rufes sich erfreuen und in poetisch-schwungvollen Aufsätzen und Büchern gleichsam mit glühender Begeisterung Vogelschutz gepredigt, haben dann, sei es, daß sie wirklich die Meinung gewechselt oder daß Rivalität und Konkurrenz ihnen andere Gesichtspunkte eröffnet, sich dem Gegentheil zugewandt und die Angelegenheit des Vogelschutzes „mit einem ganz andern Licht" beleuchtet. Dazu kommt, daß einerseits jede Stimme in dieser Sache doch vorzugsweise nur von den Gesichtspunkten ihres persönlichen Interesses aus sich vernehmen läßt und daß andererseits die Behörden, denen die Feststellung der Normen des Vogelschutz-Gesetzes obliegt, gerade die befähigsten und berechtigsten Männer garnicht zu berücksichtigen scheinen. Unseres Wissens ist weder an die Deutsche ornithologische Gesellschaft, noch an die Deutsche Ornithologen-Gesellschaft, weder an die hervorragendsten einzelnen Vogelkundigen, noch an die Redaktionen der betreffenden Zeitschriften, wie „Journal für Ornithologie," „Der zoologische Garten," „Gefiederte Welt" u. s. w. eine Aufforderung zur Theilnahme geschehen.

Offenbar bedarf es aber keineswegs mehr einer hitzigen Erledigung vieler Streitpunkte. Die Fragen, von denen aus der Vogelschutz sich gesetzlich regeln läßt, sind einfach folgende:

1. Ist die Hegung und ein besonderer Schutz für die Vögel, bezüglich freilebende Thiere überhaupt, erforderlich oder nicht?

2. Welche Vögel sind es, deren Thätigkeit als nützlich für das Menschenwohl angesehen werden muß?

3. Durch welche Maßnahmen läßt sich dieser Vogel-, bezüglich Thierschutz am geeignetsten ermöglichen?

Die Beantwortung dieser Fragen ist aber, wenigstens vorläufig, soweit sie für die Feststellung der Gesetzgebung nothwendig erscheint, keineswegs eine sehr schwierige. Ganz in der Kürze wollen wir es versuchen, dieselbe zu erledigen, hoffend, daß es uns gelinge, zur Aufstellung der Gesichtspunkte, von denen aus die Gesetzgebung geschehen muß — mindestens einen Anhalt zu gewähren.

(Fortsetzung folgt).

Kanarienvogel-Zucht in St. Andreasberg.

(Reisebericht von Kontroleur W. Böcker in Wetzlar).

(Fortsetzung).

War, so wird Mancher fragen, der Gesang der alten Hähne in den bessern Züchtereien Andreasbergs vorzüglicher, wie der Schlag der Harzer Vögel die „im Lande" gezogen werden? - Ja und Nein! In manchen Gegenden, namentlich in kleinern Städten, hält es sehr schwer, gute fehlerfreie Vögel zu erlangen. Die Bewohner des Harzes haben es in dieser Hinsicht viel besser. Einsichtige Händler geben an diese Züchter zu dem nämlichen Preise, den sie für die Nachzucht zahlen, Vorschläger beziehungsweise Zuchthähne von vorzüglichem, reinem Gesange ab. Diese Züchter können demnach mit geringen Geldopfern eine beliebige Anzahl von Zuchtvögeln erwerben und haben daneben noch den Vortheil des billigern Brennmaterials voraus; sie können ihre Heckräume ohne besondern Kostenaufwand heizen. Ferner haben sie nicht zu leiden von der großen Zahl überaus schlechter Sänger, wie sie in andern Städten gehalten werden, ja wol gar zu Dutzenden auf öffentlichen Straßen hängen. Endlich verstehen sich dieselben besser auf die Behandlung; was sie selbst etwa noch nicht wissen, kann ihnen der nächste Nachbar mittheilen. Außerhalb des Harzes werden in verschiedenen Gegenden unter dem Namen „sächsische oder Harzer Kanarien" Vögel verkauft, die nicht in Andreasberg und den benachbarten Bergstädten gezogen sind, deren Gesang allerdings entschieden besser ist, als der des gemeinen deutschen Kanarienvogels, der aber doch noch sehr weit entfernt ist von dem mustergültigen Gesange eines feinen Rollvogels. So war es z. B. mit denjenigen Vögeln, die vor 25 bis 30 Jahren in Lüdenscheid, Altena, Hagen, Dortmund, Hamm ꝛc. zum Preise von 1 Thlr. 10 Sgr., höchstens 2 Thlr. verkauft worden. Unter allen diesen Vögeln, die ich damals zu hören Gelegenheit hatte, war nicht ein einziger guter Rollvogel.

Der Preis guter Harzer Vögel beträgt im Einzelkauf das drei- ja vierfache des Preises, der beim An-

kauf in Stämmen gezahlt wird und deswegen beschränken sich meistens die Liebhaber und Züchter außerhalb des Harzes auf den Erwerb einzelner wenigen Vögel. Es kann nun bei zweckmäßiger Behandlung derselben, so wie der gezüchteten jungen Vögel auch in solchen kleinen Züchtereien ein guter Gesang erzielt werden; das haben die Hecken meines Wohnorts bewiesen; indeß kommt es doch dabei nicht selten vor, daß die Vögel von Jahr zu Jahr etwas zurückgehen, daß man daher zur Anschaffung neuer Zuchthähne schreiten muß. Die Nothwendigkeit dieser Neubeschaffung wird aber meist unterschätzt. Man sucht sich dadurch zu helfen, daß man den Jungen einen andern, angekauften Vorschläger beigiebt, und nicht selten soll dieser Vorschläger nach der Absicht des Züchters gar noch ein junger Vogel des nämlichen Jahrgangs sein. Das hat in der Regel keinen andern Erfolg, als daß der Vorschläger in beständiger Gefahr ist, zurückzugehen und die auszubildenden Jungen durchweg nichts Ordentliches lernen.

Stehen dem Züchter außerhalb des Harzes hinlänglich Mittel und Kenntnisse zu Gebot, so kann er, darin hat Herr Reiche ganz Recht, in einer größern Hecke ganz dieselben Erfolge erzielen, wie dies im Harz geschieht. Meine eigne Hecke, so viel sei mir gestattet, an dieser Stelle darüber mitzutheilen, besteht aus 12 Zuchthähnen feiner Rollvögel und meine selbst gezogenen Jungen sind besser, wie die angekauften. Ferner ist mir wenigstens eine bedeutende Hecke bekannt, in welcher alljährlich ebenfalls vorzügliche Vögel gezogen werden, obgleich der Züchter noch ziemlich weit vom Harze wohnt. —

Die diesjährige Züchtung hatte im Allgemeinen ein geringes Ergebniß geliefert; verschiedene Züchter erklärten, sie würden noch ein Mal so viel Vögel gezogen haben, wenn sie nicht so viele Nestjunge in den ersten acht Tagen nach dem Ausschlüpfen verloren hätten. Obgleich tagtäglich geheizt worden, seien doch die Weibchen zu wenig abgeflogen; sie hätten theils ungenügend, theils gar nicht gefüttert. Als Ursache sahen sie die naßkalte Witterung des letzten Frühjahrs an. Klare Eier waren auch bei ihnen vorgekommen, namentlich in der ersten Brut und ein Züchter hatte unter seinen zehn Zuchthähnen auch in diesem Jahre wieder einen Eierfresser gehabt. Einige, aber im Ganzen wenige Züchter waren indeß mit der Zucht zufrieden. In 19 Züchtereien waren von zusammen 165 Zuchthähnen im Ganzen 1343 junge Männchen gezogen. Unter den jungen Hähnen saßen indeß verschiedene Vögel, die man irrthümlich für Hähne hielt; es giebt demnach auch dort Züchter, die sich in Bezug auf das Geschlecht der Jungen leicht irren. Auf einen alten Hahn mögen hiernach für dieses Jahr kaum 8 Stück männliche Nachzucht kommen. Den größten Ertrag hatten einige Hecken bestehend aus 3 Zuchthähnen und 42 jungen Männchen, beziehungsweise 8 alten Hähnen und 114 jungen und endlich 6 Zuchthähnen und 85 jungen Männchen geliefert; in einer Hecke von 6 alten Hähnen waren dagegen nur 5 Männchen gezogen. Das Gesammtergebniß bleibt demnach um etwa 20 pCt. hinter dem Ertrag eines mittelguten Jahres zurück.

Man hatte durchweg auf einen Hahn vier Weibchen eingeworfen, ausnahmsweise auch 6 Wbch., wobei die Eier der Letztern noch mit wenigen Ausnahmen befruchtet worden waren.

Die geringe Ausbeute dieses Jahres war um so befremdlicher, als es den Vögeln weder an Wärme, noch an gutem nahrhaften Futter und sorgfältiger Pflege gefehlt hatte. Die Züchter waren ihrer Vögel wegen des Morgens mit Tagesanbruch aufgestanden, und von Morgens halb fünf Uhr bis Nachmittags fünf waren, nach Bedürfniß zu verschiedenen Tagesstunden Wasser, Samen und Eifutter gereicht worden, das Letztere so viel, als die Vögel nur fressen konnten. Der Samen war nur in einigen wenigen Hecken einige Stunden vorher eingeweicht worden, dagegen fütterten alle Züchter denselben doch auch nicht ganz trocken. Er wurde etwa 6 Minuten vor der Fütterung mit Wasser übergossen, das man demnächst wieder ablaufen ließ. Bis zum Füttern war er dann wieder so trocken, daß er rollte; er war auf diese Weise vollkommen vom Staube befreit und dabei ganz so weich, wie frisch eingeheimster Samen. Die Vögel konnten ihn um so besser enthülsen und so wurde er dann auch weniger verstreut. Dieses vorherige Ausschwemmen des Samens machte das vollständige Einweichen denn auch entbehrlich. Andere Sämereien außer dem Sommersamen — Sommerrübsen — waren während der Hecke in der Regel nicht gereicht worden; nur Hafergrütze als Mittel gegen den Brand — Unterleibsentzündung — war hin und wieder verwendet worden, außerdem aber Mohnsamen in allen Hecken als eine Zuthat zum Eifutter. Dieser Samen wurde in mäßiger Menge unter das Letztere gemischt, „bis daß es bunt wurde". Der Mohnsamen giebt dem jungen Vogel erst das erforderliche Fett, meinte ein Züchter. Das ist gewiß insofern richtig, als er den Durchfall und die dadurch entstehende Abmagerung verhütet. In meinem frühern Reisebericht habe ich der Verwendung des Mohns aus Versehen nicht gedacht.

In Ansehung des größern oder geringern Ertrages der Hecke war es ohne Bedeutung geblieben, ob das dem Ei zugesetzte Weißbrot eingequellt, gestoßen oder gerieben worden war; ein Züchter hatte aber mit gutem Erfolge Abends und früh Morgens diejenigen Nestjungen, welche bei der Abfütterung durch die Weibchen leer ausgegangen waren, selbst gefüttert; es war dieses mit Eigelb, welches vorher im Munde verdünnt worden, geschehen.

Nur wenige Züchter hatten eingeweichtes Weißbrot dem Ei zugesetzt; die meisten zogen gestoßenes oder geriebenes vor. Gestoßen wurde dem Gemenge etwas Wasser zugesetzt, damit die Vögel nicht das bloße Ei vorweg nehmen konnten. Zum Reiben eignet sich das Weißbrot schon am zweiten Tage. Es wurde übrigens in drei verschiedenen Formen und Größen angeblich ohne einen Zusatz von Hefe gebacken und für 1 Pfennig als geröfteter Zwieback, für 6 Pfg. als weicher Doppel-Zwieback und endlich für 1 Groschen als Eierbrot verkauft. Die beiden ersten Sorten schienen Butterteig, die letztern Milchbrötchen zu sein. Auf einen Zwieback wurde ein halbes Ei, auf einen Doppel-Zwieback 2 Eier und auf ein Eierbrot 4 bis

5 Eier genommen. Das Ei wurde auf einem gewöhnlichen Reibeisen gerieben und das gestoßene, geriebene, oder eingequellte Weißbrot mit der Hand darunter gemengt.

Zur Verhütung der Legenoth der Weibchen war während der Hecke Speck gereicht worden; auch gestoßene Eierschale wurde verwendet. Des Sandes dagegen entbehrten alle Vögel; man hatte statt dessen in verschiedenen, aber nicht in allen Züchtereien alten Lehm verwendet.

Das Einwerfen in der Hecke hatte in der Zeit von Mitte Februar bis Anfangs März, bei einigen Züchtern bis zum halben März stattgefunden. Mit Anfang, spätestens Mitte Juli hatte ihr die Mauser ein Ende gemacht, in zwei Züchtereien fand ich aber noch junge Vögel, die theils vom Züchter, theils noch von dem alten Weibchen gefüttert wurden.

Es wurde den jungen und alten Männchen noch zweimal täglich Eifutter gereicht, die Weibchen erhielten entweder bloßen Rübsamen mit einem kleinen Zusatz von Leinsamen oder auch daneben noch etwas Kanariensamen. Von Leinsamen, der nach der Mauser und während derselben in allen Hecken gefüttert und in mäßiger Menge den Vögeln ohne Unterschied des Geschlechts gereicht wurde, war man allgemein der Ansicht, daß er dieselbe sehr befördere.

Einige wenige Züchter fütterten auch die jungen und alten Hähne mit einem kleinen Zusatz von Kanariensamen zum Sommerrübsen; man konnte es dem scharfen, harten Gesange der Alten anhören.

Ameiseneier wurden weder in noch außer der Brutzeit verwendet. Sie finden sich zwar reichlich in den nahen Waldungen vor; allein es scheint sich kaum Ein Züchter auf das Einsammeln zu verstehen. Sie sind bekanntlich ein ganz vorzügliches Futter für junge und alte Vögel und werden daher auch namentlich in Herborn und den benachbarten Städten zur Kanarienzucht mit gutem Erfolg verwendet.

In allen Züchtereien ohne Ausnahme wurde Inzucht getrieben, obgleich die Züchter die Bedeutung des Wortes nicht kannten. Man hielt sie für ungefährlich. Ich will ihr hier das Wort nicht reden, glaube aber, daß man außerhalb des Harzes der Sache doch eine Bedeutung beilegt, die ihr nicht zukömmt. Mit Geschwistern, ja mit Eltern und Kindern lassen sich nach meiner Ansicht, wenn beide Theile gesund sind, wiederum gesunde und gut befiederte Vögel erzielen, wie man dann anderseits mit einem nicht blutsverwandten Männchen oder Weibchen, welches mit einer erblichen Krankheit behaftet oder während der Hecke krank ist, so leicht keine gesunden Jungen ziehen wird. Es scheint mir demnach auch der Gesundheitszustand des alten Pärchens sowie sein größeres oder geringeres Alter viel wichtiger in Bezug auf die Nachzucht zu sein, als eine etwaige Blutsverwandtschaft.

Daß Weibchen der ersten Brut sich zur Zucht nicht eignen sollten, bestritt man durchaus; man verwendet sie sehr gerne dazu, war indeß der Ansicht, daß die Weibchen der letzten Brut ebenso früh zu legen beginnen wie die der ersten Hecke. Einjährige Weibchen sollen nach der Ansicht eines sehr erfahrenen Züchters in der ersten Brut weniger Eier legen, als in den spätern.

Klare Eier wurden für ein Ergebniß allzureichlicher Eifütterung gehalten; doch sollen grade in dieser Hinsicht viele Ausnahmen vorkommen. So soll ein Züchter einen Hahn gehabt haben, der in den ersten drei Bruten nicht ein einziges Ei befruchtet hatte. Auch in der vierten Hecke, die dieser Hahn bei einem andern Züchter mit einem andern Weibchen gemacht hatte, waren die Eier des Letztern klar geblieben. Dagegen waren auch Fälle ungewöhnlicher Fruchtbarkeit vorgekommen. So hatte ein Züchter vor zwei Jahren von einem Männchen und neun Weibchen 67 Vögel gezogen, darunter 31 Hähne; ein anderer Züchter hatte im vorigen Jahre von 2 Hahnen 52 junge Männchen gezogen.

Daß von spitzen, langen Eiern nur Männchen, von runden Eiern nur Weibchen zu erwarten, wurde mehrfach bestritten. Einer der erfahrensten ältern Züchter äußerte hierüber folgendes: „Ich habe öfter Versuche dieserhalb angestellt, habe in das eine Nest nur spitze, in das andere nur runde Eier gelegt und aus solchen Nestern dennoch Junge beiderlei Geschlechts erhalten. (Fortsetzung folgt).

Aus den deutschen Vogelstuben.

. . . Ein Pärchen Helenafasänchen, die ich im April d. J. zusammen mit einem Pärchen Goldbrüstchen von Hieronymi in Braunschweig erhielt, und die ich mit Kanarienvögeln, Dompfaffen, Zeisigen und Stieglitzen zusammen in einem Raum hielt, fingen und zwar beide Paare, an, zum Nest einzutragen, erstere frei in einem an die Wand gehängten, vorn offenen, mit Reisig lose ausgestopften sogenannten Weinkorb, die letzteren in einem für Kanarienvögel bestimmten Nistkästchen. Während das Goldbrüstchenweibchen beim Eierlegen starb, bald gefolgt von seinem sich sehnenden Männchen, ging die Brut der Helenavögel vortrefflich vor sich. Ich hatte mir fest vorgenommen, die Brut weder durch Berühren des Nestes, noch Hineinsehen die Vögel zu stören, nur aus dem eifrigen Füttern der Alten ersah ich den guten Fortgang der Brut. Nach etwa 4 Wochen hatte ich die Freude, vier allerliebste junge Vögelchen aus dem Neste schlüpfen zu sehen. Ohne weitere Unterbrechung folgte nun eine zweite Brut, von der 3 Junge groß wurden. Wegen der Fütterung habe ich gar keine Umstände gemacht; die Vögel nehmen ohne Weiteres das für die Kanarienvögel bestimmte Eifutter (1 hartgekochtes Ei fein gehackt auf eine recht altbackene Sechser-Semmel, die im Wasser eingeweicht und gut wieder ausgedrückt, dann ebenfalls fein gehackt wurde). Ich habe sie nie etwas Anderes füttern sehen, will indeß nicht leugnen, daß ihnen dann und wann eine Ameisenlarve zugekommen sein mag. Es hing nämlich im selben Raum ein Bauer mit einer Nachtigal, die ich ausschließlich mit solchen fütterte und die, wie es Weichfresser gern thun, recht mit dem Futter schleuderte; nach solcher Leckerei waren indeß auch die Kanarien sehr gierig. Von diesen Vögeln habe ich nun noch das alte Pärchen, so wie ein Weibchen der ersten Brut, und

2 Männchen der letzten Brut, die übrigen 4 Stück habe ich bereits verkauft. Das Bandfinkenpaar erstand ich in den ersten Tagen des Juni von einem Privatmann, bei dem dieselben soeben eine Brut von 2 Jungen groß gezogen hatten. Bei mir fingen sie erst Ende Juni wieder an zu nisten und zwar in einem bis auf das Flugloch ganz geschlossenen Pappkästchen, in dem ein Korbnest hing. Sie verließen das Gelege von 3 Eiern sofort, als ich gezwungen war, das Kästchen, das mir in Gefahr schien, herunterzufallen, fester an die Wand zu nageln. Nach Verlauf von 9 Tagen legten sie indeß in einem ebenso hergerichteten Kästchen wieder 3 Eier, die glücklich auskamen; ein Junges starb, dagegen wurden die beiden andern, beide Männchen, groß, und habe ich sie nachher hier im Orte verkauft. Die Vögel zeigten, beide Pärchen, noch große Brutlust, als ich sie der kälter werdenden Nächte wegen aus dem Raume nehmen mußte. E. Gaedicke, Apotheker in Kindelbrinck.

Thierliebhaberei unter erschwerenden Umständen.

An der Weidendammerbrücke, nach der Seite der Markthalle hin, liegt ein Schifferkahn, dessen Besitzer mit seiner Thierliebhaberei das Publikum anlockt. In der Mitte des Kahnes steht auf dem Deck desselben eine große Kiste, die durch einen Boden in zwei Theile getheilt ist, wovon der obere Theil einen Taubenschlag, der untere den Hühnerstall bildet. An dem Taubenschlage ist ein viereckiges Loch mit einem zum Zuklappen eingerichteten Brette als Ausflug angebracht. Der untere Kistentheil, also der Hühnerstall, hat eine kleine Thüre, durch welche man eine Sitzstange und in der Ecke ein Nest sieht. Der Taubenschlag ist durch 10 gewöhnliche Feld- und 1 Paar weiße Pfautauben (deren Aussehen freilich dafür bürgt, daß dieselben nicht aus der berühmten Sammlung unseres Herrn Pausch bezogen sind) bevölkert. Der Hühnerstall dient einem Hahn und zwei Hühnern zur Schlafstelle.

Außerdem befindet sich auf dem Schiffe noch eine kleine schwarze Katze und ein kleiner zottiger Hund, dessen Hütte etwas erhöht an der Spitze des Kahnes steht, und der die Ordnung auf dem Deck nach allen Richtungen mit großer Gewissenhaftigkeit aufrecht erhält.

Wenn des Morgens die Ausflugklappe geöffnet wird, so fliegen sämmtliche Tauben in kleinen Kreisen um den Kahn und fallen dann auf dem umgelegten Mast ganz ordnungsmäßig an. Bei schönem Wetter sonnen sie sich auf dem Dache des zunächst stehenden Hauses am Schiffbauerdamm. Das Interessanteste ist die Fütterung. Tauben und Hühner fressen ganz vertraut aus einem großen Napf, wobei es öfter vorkommt, daß der Hahn die Tauben zu verscheuchen sucht. Diese finden dann an dem aufmerksam zuschauenden Hunde einen Vertheidiger, der es versucht den Hahn wegzujagen. Er kommt aber dabei schlecht an, denn der Hahn geht dem kleinen Hunde so tapfer zu Leibe und sieht dabei so kampfesmuthig und siegesgewiß aus, daß der treue Wächter allerschleunigst in seine Hütte flüchtet. Langsam kommt er wieder näher, bleibt jedoch in respektvoller Entfernung stehen, um sich, nach muthvoll unternommenem neuen Versuche, wieder in seine Hütte zurück jagen zu lassen. Die ganze Angelegenheit geht jedoch recht harmlos vor sich und scheint dem braven Schiffer und Eigenthümer, der sein Pfeifchen behaglich rauchend zuschaut, viel Spaß zu machen. Dieser Kahn mit seiner Bevölkerung lag in frühern Jahren einmal an der Börse, ein andres Mal an der Marschallsbrücke. Fährt der Schiffer von hier ab, so läßt er seine Taubenschlagklappe zu, öffnet solche auf der Reise aber wieder und die Tauben verlassen dann nicht den Kahn. —

In meiner Nachbarschaft wohnt ein Milchpächter, der in seinem offnen Keller sechs Tauben frei herumlaufen läßt und dabei auch eine Katze hält. Die Thiere sind natürlich ganz jung an einander gewöhnt und vertragen sich recht gut.

Vor 20 Jahren hielt ein Gärtner, Unter den Linden, in seinem Blumenkeller wol 50 Köpfe frei herumlaufender und nicht an den Flügeln gestutzter Tauben, die bis auf die Straße kamen und dann wieder gemüthlich die Kellertreppe hinabspazirten. Diese angeführten Fälle sind vollgültige Beweise dafür, daß sich Tauben überall und an scheinbar Unglaubliches gewöhnen lassen. Aus meiner eigenen Erfahrung werde ich später noch eine Mittheilung über das Aneinandergewöhnen von Hund, Katze, Hühnern und Tauben folgen lassen. —

Hermann Köhne, Kaufmann in Berlin.

Zur Geflügelzucht und -Liebhaberei.

Ergänzung zu dem Aufsatz „Der Ringschläger."

Herr Friedrich Engelbert Bergmann in Wiesbaden schreibt uns freundlichst, unter Bezugnahme auf die Schilderung dieser Taube von Herrn Direktor Fürer, Folgendes: Man muß den Ringschläger wol zu den Hoftauben zählen, da es mit den Feldern schlecht steht, wenn er die Spieße zerschlagen hat. Er ist allerdings sehr selten geworden, doch glaube ich, daß er im Bergischen und in Westfalen noch ziemlich häufig und in den Hauptfarben zu finden sein wird, wenn man nur gehörig nachforschen wollte.

* Ein interessantes Beispiel von der Orientirungsfähigkeit der Aachener Brieftauben und deren Anhänglichkeit an die Heimat lieferten zwei dieser Vögel, welche ein Brieftaubenliebhaber in Hamburg vom Bürgermeister Adolf Zurhelle in Churzelt bei Aachen erhielt. Nachdem dieselben bereits 14 Tage in Hamburg aus- und eingeflogen waren und „gewöhnt" zu sein schienen, gingen sie plötzlich an einem vom Wetter begünstigten Tage fort und trafen am selbigen Abend in Aachen ein. Die Tauben hatten diesen Sommer Reisen von Paris, Tours, Bordeaux auf Aachen gemacht, waren aber nie in Hamburg gewesen und fanden den Weg trotz der entgegengesetzten Richtung in kurzer Zeit wieder in die Heimat. Die Tauben wurden sodann mit der Post wieder nach Hamburg zurückgesandt. („Hambrg. Nachr.").

Staats-Brieftaubenzucht.

Die bekanntlich in Deutschland, wie in Frankreich für Kriegszwecke angeordnete Züchtung von Brieftauben scheint nach den neueren Veröffentlichungen über die hierbei bisher gemachten Erfahrungen eine Fülle von völlig unvorhergesehenen Schwierigkeiten zu bieten. Dieselben bedingen sich theils aus der Züchtung, theils aus der Abrichtung der Thiere, vor Allem aber aus der Schwierigkeit, diese ganze Züchtung den vorhandenen militärischen und staatlichen Einrichtungen einzufügen oder, wenn dieselbe Privaten anvertraut werden sollte, über diese noch eine ausreichende Kontrole auszuüben. Auch erweist sich der Kostenpunkt sehr beträchtlich höher, als ursprünglich angenommen worden war. Besonders interessant erscheint jedoch, daß nach den erwähnten Mittheilungen das nähere Eingehen auf diese Züchtung neben dem jedenfalls nur sehr eng begrenzten Vortheil derselben auch sehr ernste Bedenken nachgewiesen hat. Es stellen stellen sich nämlich die Vorbedingungen für die Benutzung der Brieftauben wesentlich anders, als früher allgemein vorausgesetzt wurde. Es kann, wie sich jetzt ausgewiesen hat, durch diese Thiere die Verbindung einer belagerten Festung mit der Außenwelt mit noch einiger Sicherheit des Erfolges nur bis zu einem höchstens dreimeiligen Umkreise unterhalten werden. Natürlich gilt dies aber genau in gleicher Weise für die Tauben der Privaten, wie für die von Staats wegen unterhaltenen Brieftauben, und muß dadurch für die Grenzplätze mit einer gemischten Bevölkerung, wie Metz, Diedenhofen, Straßburg ꝛc. dem Verrath und dem geheimen Kundschaftswesen Thür und Thor geöffnet erscheinen. Es sind deshalb auch schon für den Kriegsfall die strengsten Maßregeln wider das Halten von Tauben von Seiten der Privaten in belagerten oder von einer Belagerung bedrohten Festungen in Vorschlag gebracht worden. Andererseits hat namentlich der „Soldatenfreund" angeregt, die Staats-Brieftaubenzucht ganz aufzugeben und dafür in den Festungen als die bestgeeignete Luftpolizei eine Habichtzucht einzuführen. Noch ein anderer Vorschlag geht dahin, das Halten von Tauben während eines Kriegsfalles in den von einer Belagerung bedrohten Festungen und dem dreimeiligen Umkreis derselben als kriegsrechtlichen Fall zu behandeln und geeigneten Falles mit den von dem Kriegsgesetz vorgeschriebenen Strafen zu ahnden, und bleibt wol bereits als gewiß anzunehmen, daß für den gedachten Fall derartige, hierauf bezügliche, strenge Maßregeln auch unbedingt in Vollzug gesetzt werden würden. —

Wir stellen die obigen, Berliner Zeitungen entnommenen Aussprüche vorläufig der Beurtheilung unserer Leser anheim und behalten uns vor, späterhin darauf zurückzukommen. D. R.

Hühnersterben durch Reisfütterung.

Von meinen Zwerg- und Kukukshühnern starben mehrere Tage hinter einander zahlreiche Köpfe, ohne daß ich die Ursache dieser Unglücksfälle auffinden konnte. Anfangs glaubte ich an eine Vergiftung, wie eine solche vor mehreren Jahren schon einmal von einem Mitbewohner des Hauses verübt worden. Ihn hatte wahrscheinlich das frühe Krähen der vielen Hähne gestört und so suchte er sich derselben in einer freilich nichts weniger als rechtschaffenen Weise zu entledigen. Als ich damals die gestorbenen Hühner untersuchte, kam mir bei der Oeffnung aber sogleich Phosphordampf entgegen und ich fand dann auch die blauen Köpfe, von Streichhölzern in Brot eingeknetet vor. Diesmal war die Todesursache aber eine ganz andere. Ich fand in dem Kropfe einen festen Ballen von Reiskörnerne welche denselben vollständig anfüllten. In der Mitte waren dieselben ganz trocken, trotzdem das Huhn sie bereits vor 24 Stunden verzehrt hatte; am Eingang des Kropfes und rings an den Wänden waren die Körner dagegen mindestens zur dreifachen Größe aufgequollen, durch das Wasser nämlich, welches das Huhn darauf getrunken. So bildete der Reis einen festen Ballen und der Tod war durch Erstickung oder Herzschlag erfolgt. Ein Spezereihändler, welcher in demselben Hofe eine Lagerremise hat und der die Hühner ebenfalls sehr liebt, gab durch wohlgemeintes reichliches Füttern derselben die Veranlassung zu diesem Tode und wurde ihr unfreiwilliger Vertilger.

Hermann Blum, Apotheker in Frankfurt a./M.

(Kürzlich wurde uns von Herrn Apotheker v. Rosenberg in Kruschwitz ein gestorbener Wellensittich zur Untersuchung gesandt, welcher in ganz derselben Weise den Tod gefunden hatte. Die Untersuchung ergab einen ebenfalls mit Hirse und Spitzsamen gefüllten Kropf, in welchem die gequollenen Samenkörner augenscheinlich die Todesursache geworden. Abgesehen von Zufälligkeiten, wie bei den Hühnern des Herrn Apotheker Blum, ist aus diesen Vorkommnissen die Erfahrung zu beherzigen, daß man namentlich bei der Fütterung sehr hungriger Vögel, nicht minder aber bei jedem Lieblingsfutter alle Ursache hat, sehr vorsichtig zu sein, damit die Vögel nicht in einer Weise ihren Untergang finden, an die man wol am wenigsten denkt und die man vielleicht nachher garnicht einmal ermittelt.

D. R.).

Wunderbare Ergebnisse der Ausstellungen.

Obwohl ich dem Vorstande des ... Vereins in ... meine Graugirlitze oder Grauedelfinken als selbstgezüchtet ausdrücklich angezeigt, war dieser Zusatz im Katalog doch keineswegs zu finden. Nach der Ausstellung wurde mir nicht einmal eine Anerkennung zu Theil, ich blieb für meine Bemühungen nur schadlos durch den Verkauf von einem Paar der jungen Vögel auf der Ausstellung selbst, wovon die Gesellschaft noch 15 Sgr. Provision erhob.

Da ich mit der Züchtung dieser Vogelart, durch alle Mühe, Aergerlichkeiten und Kosten unbeirrt, mich nun schon seit 3 Jahren beschäftigt, so kann ich nicht anders sagen, als daß das Verfahren der Preisrichter in ... mich verdroß und zwar umsomehr, da doch die gewöhnlichsten überseeischen Vögel, die gehalten wurden oder soeben erst vom Vogelhändler entnommen waren, prämiirt worden sind, ja, da sogar einfache Bastarde von Kanarienvögeln mit Stieglitzen und

Zeisigen hoch prämiirt wurden, die doch heutzutage sehr häufig und von mir und schon von meinem Vater in größerer Anzahl gezüchtet worden. Ich habe jedoch die Sache einfach auf sich beruhen lassen und mich mit dem Rathe meines Vaters getröstet, man solle, um Freude an der Vogelzucht zu behalten, von den Ausstellungen wegbleiben. Ich werde deshalb nie wieder eine Ausstellung beschicken. Da aber, mit einem Male erhalte ich von ... aus (jetzt 8 Monate nach der Ausstellung) ein mit schlechten Zeichnungen von Vögeln u. dgl. bedrucktes Blatt, worauf geschrieben steht, der Verein ... ertheilt dem Herrn H. Dorpmüller in Elberfeld für ausgestellte Vögel einen ersten Preis. Nun frage ich doch: was soll ich davon halten? Dieser Verein scheint mir ein wenig unbegreiflich zu werden. Wenn die Leute glauben, bei dem nicht unbedeutenden Geschäft, welches sie aller Wahrscheinlichkeit nach mit der Ausstellung gemacht haben, die Freude an der Vogelzucht mir durch ein 8 Monat nach der Ausstellung zugeschicktes Blatt Papier zu erhalten, ohne bis dahin ein Wort der Anerkennung für meine Mühe zu haben, so irren sie sich denn doch sehr. Es dürfte für das Organ der Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler wol eine Pflicht sein, sich auch einmal über die Ausstellungen und das meistens ganz ungebührliche Verfahren dabei auszulassen, namentlich darüber, daß doch ein Verzeichniß der Prämien und worauf dieselben gegeben worden, immer so bald als möglich veröffentlicht werde (am einfachsten und besten in der „Gefiederten Welt"), damit doch alle Betheiligten darüber ein Urtheil gewinnen können, ob auch Alles in rechtschaffener Weise zugegangen sei.

H. Dorpmüller z. Z. in Kl. Gladbach.

(Wir halten diesen zuletzt ausgesprochenen Wunsch für durchaus berechtigt, denn auch uns ist es vorgekommen, daß wir erst viele Monate nach einer Ausstellung das Ergebniß der Prämiirung erfahren konnten, während inzwischen bereits viele Klagen bei uns eingelaufen und wir den Vorstand des betreffenden Vereins wiederholt und dringend um Erledigung gebeten. In dem Umstande, daß wir den Namen des von Herrn D. angeklagten Vereins fortgestrichen, wolle man auf unserer Seite nur den dringenden Wunsch erblicken: alle Streitigkeiten und unfriedlichen Erörterungen von unsern Lesern abzuwenden. Wir hoffen, daß alle, auch die bisher lässigen Vereins-Vorstände die Nothwendigkeit einsehen müssen: die doch einmal übernommenen Verpflichtungen prompt zu erledigen — und daß daher die Ausstellungen nicht mehr Veranlassung zu derartigen Klagen geben werden. D. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

** „Die Lokomotive" in Oels berichtet: Einige Knaben fanden in der Nähe des Bahnhofes in kurzer Zeit 27 Sperlinge, 8 Lerchen, 5 Goldammern und 1 Taube, welche sämmtlich durch vergifteten Weizen getödtet worden waren. Nach der Versicherung eines Bahnbeamten waren vor einigen Tagen die todten Vögel in noch weit größerer Anzahl vorzufinden.

*Es wird nicht selten die Beobachtung, namentlich im Herbst gemacht, daß die Rebhühner im vollem Fluge auf die an den Eisenbahnen sich hinziehenden Telegraphendräte losstreichen und sich häufig die Köpfe und Flügel zerstoßen. Außer den Feldhühnern sind es besonders die Wachteln, Regenpfeifer, Brachvögel u. a. m., welche sich an den Telegraphendräten zu Tode fliegen, auch wilde Tauben finden sich öfter mit eingestoßenen Schädeln. Andere Vögel wie Raben, Falken, Gänse, Enten streichen immer über die Dräte weg, auch manche kleinen Vögel wie Neuntödter, Ammern, Steinschmätzer u. a. sehen die Dräte sehr gut und benutzen dieselben häufig zum Ausruhen.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Giebt es ein Mittel, einem Dompfaff, der bisher sehr gut pfiff, aber vor Kurzem die Stimme verloren hat, zu derselben wieder zu verhelfen? W. Berduschek in Berlin.

Antwort: Für Sie sowol, als auch für Herrn Apotheker Schüler werden wir die Antwort, über die Heiserkeit und den Verlust der Stimme der Vögel aus der Feder eines Sachverständigen in der nächsten Nummer bringen.

Briefliche Mittheilungen.

... In der letzteren Zeit habe ich mit der Züchtung der Grauedelfinken (Fringilla musica) wieder recht gute Ergebnisse erzielt, im Sommer sind zwei Bruten von 6 Köpfen, allerdings bei Fütterung mit kleinen Ameiseneiern wieder flügge geworden und jetzt im Herbst, bezüglich kurz vor Weihnachten ist auch eine Brut von 4 Köpfen ohne Ameiseneier groß geworden, nämlich bei Fütterung mit recht eihaltigem Bisquit, welches ich in 2 Portionen täglich, in Milch eingeweicht, den Vögeln gereicht habe. Die Jungen sind dabei munter und recht bald flügge geworden.

W. Dorpmüller, Architekt z. Z. in Gladbach.

Briefwechsel.

Herrn H. Korholt in Solingen: Ihre Beobachtung ist für jeden Vogelfreund, namentlich aber für die Ornithologen von Fach hochinteressant und da wir nach Ihrer Beschreibung in der That nicht daran zweifeln dürfen, daß Sie den Vogel richtig bestimmt haben, so wollen wir den seltenen Fall auch unsern Lesern mittheilen. In einem Steinbruch bei Solingen haben sich im vergangenen Sommer ein Pärchen Mauerläufer (Certhia muraria, Alpenmauerläufer oder Alpenspecht) aufgehalten, von denen leider der eine geschossen wurde. Da sich jedoch annehmen läßt, daß die herrlichen Vögel in diesem Jahre wieder dorthin zurückkehren, so seien alle Freunde der Vogelwelt gebeten, dafür zu sorgen, daß sie geschont und geschützt werden. — Zugleich sei darauf hingewiesen, daß der zoologische Garten von Berlin durch die Güte des Herrn Dr. Girtanner in den Besitz von zwei Pärchen dieser geradezu wundervollen und den meisten Bewohnern des platten Landes völlig unbekannten Vögel gelangt ist.

Herrn August Wiener, London: Der uns freundlichst zuletzt übersandte Vogel ist ein Wachtelfink (A. — Ortygospiza — polyzona) aus West-Afrika, vom Senegal aus Abessinien oder Kaffernland, und zwar war es ein Männchen. Diese liebliche Prachtfinkenart ist bis jetzt auf dem europäischen Vogelmarkt noch höchst selten, doch war sie bereits im Berliner Aquarium vorhanden. Sehr bedauern wir, daß Ihre Lärm-

drossel nun doch zu Grunde gegangen ist. Für die gütige Zusendung des Körpers sind wir aber sehr dankbar, denn jeder hinzukommende neue Vogel, selbst der todte, bereichert unsere Kenntniß und erweitert unsere Uebersicht der gesammten fremdländischen Vogelwelt, welche der europäische Vogelmarkt zu bieten hat. — Sollte es Ihnen gelingen, eine Sendung zahlreicher Eier von jenen herrlichen ostindischen Fasanen glücklich zu erhalten und aus denselben wirklich Junge zu erzielen, so wäre das ein wundervoller Erfolg. Wir wünschen im Voraus viel Glück dazu. — Herrn G. Weber in Gera: Feine Rollvögel des besten Harzer Stammes können Sie fortwährend noch von Herrn Kontroleur Böcker in Wetzlar beziehen. Wir können Ihnen diese Kanarienvögel aus bester Ueberzeugung empfehlen, da wir sie nach dem Augenschein kennen und wissen, daß sie entschieden zu den besten gehören, welche in Deutschland gefunden werden. — Herrn F. E. Bergmann in Wiesbaden: Ihre freundliche Mittheilung haben wir, wie Sie aus dieser Nummer ersehen wollen, benutzt. Wir danken, und ganz besonders für die liebenswürdige Weise, in der Sie uns dieselbe zukommen ließen. —

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Verein für Geflügelzucht in Cöln

unter dem Protektorate

Ihrer Königlichen Hoheit Frau Prinzeß Carl von Preußen.

II. Allgemeine Geflügelausstellung

vom **28. Februar** bis **2. März**

im Kaisersaal.

Programme sind durch unsern Sekretair Herrn Th. Hesse zu beziehen.

Der Vorstand.

Die Naturalien- & Zoologische Handlung
von **H. Hromoda** Dresden

empfiehlt jetzt großen Vorrath Chinesischer und Egyptischer Mövchen in blau, weiß und gelb, Indianer und verschiedene feine Racen Tauben und Hühner, hält stets großen Vorrath kleiner überseeischer Vögel, Papageien, zahme Affen, feine Hündchen; empfiehlt jetzt echte französische Trompeter, sowie feine Harzer Kanarienvögel, Kalanderlerchen, Hirschgeweihe, Mineralien und Versteinerungen, Aquarien in allen Größen mit Naturtischen, (Zeichnungen eingesandt) Goldfische, Amphibien, Muscheln, Tuffsteine. Volieren für Gärten und Zimmer von Naturholz und Drat werden praktisch geliefert, (Zeichnungen eingesandt). Praktische Nistkästen für alle Vögel und empfehle meine von Herrn Dr. Ruß empfohlenen praktischen Nester für Kanarienvögel ganz besonders. Nachverzeichnetes gesundes Futter liefere: Hanf, Ctr. 6½ Thlr., Glanz, Ctr. 7, weiße Hirse, Ctr. 6½, Sommerrübsen, Ctr. 7½ Thlr. (incl. Säcke); Ameiseneier à Pfd. 25 Groschen; Aloefasern à Pfd. 12 Groschen; Mehlwürmer, 60 Stück 1 Gr. NB. Feine Hündchen werden stets gekauft, Vögel nach Auswärts gut nnd billig gestopft, sowie alle Bestellungen prompt ausgeführt. Hochachtungsvoll d. Ob. [22

Gesucht:

Junge Feldhühner, Wachteln, Feldhasen, Eichhörnchen. Offerten nimmt entgegen:
Emil Born,
23] Herzogenbuchsee (Schweiz).

Brieftauben und englische Karrier bei
24] **Robert Peltzer** in Rheydt.

Ein Wiedehopf und ein Seidenschwanz werden zu kaufen gesucht von **G. Eißen** in Nürnberg, Spitalplatz. [25

Ein Paar kl. **Alexandersittiche** hat zu verkaufen oder zu vertauschen Gymnasiallehrer **Ohlendorf** in Lingen, Provinz Hannover. [26

Gesucht wird zu kaufen ein Chrysomitris cucullata Männchen oder auch gegen ein Paar Pfaffenfinken einzutauschen.
27] Dr. **F. Franken** in Baden-Baden.

Die beiden ersten Jahrgänge dieses Blattes werden antiquarisch zu kaufen gesucht von [28

Apotheker A. Schuster, Rössel O.-Pr.

Um den mittellosen Landschulen des hiesigen Kreises bei Anschaffung einer kleinen Sammlung nützlicher Vögel und einiger nützl. Säugethiere behülflich zu sein, wünscht der unterzeichnete Verein folgende Vögel und Säugethiere ausgestopft, gut erhalten, zum Aufstellen fertig, jedes Thier in einer größern Anzahl von Exemplaren (bis 10), zu möglichst billigen Preisen zu kaufen, und nimmt der unterzeichnete Vorsitzende Anmeldungen entgegen:

Gartenrothschwänzchen,	Buntspecht, (großer od. mittler),
Rothkehlchen,	Baumläufer,
Fliegenschnäpper (grau),	Wiedehopf,
Grasmücke (gemeine),	Kukuk,
Laubvogel (Garten-),	Kiebitz,
Goldhähnchen, (feuerköpf.),	Eule- (Wald-, Ohr-, Schleier-),
Meise (Kohl-, Blau-, Sumpf-),	Bussard,
Bachstelze, (weiße),	Igel,
Lerche,	Spitzmaus,
Saatkrähe,	Maulwurf.

Elbing, den 1. Januar 1874. **Foertsch,**
Oberl., Vorsitzender
29] des Elbinger Vogelschutz-Vereins.

Eine weibliche **Hubataube** (Columba cyanocephala) wünscht zu kaufen **Heinr. Müller,** Musiklehrer in Köthen. [30

Böhmische Fasanen, 1,000 Köpfe,

darunter jedoch nur höchstens **250 Hähne** werden zu kaufen gesucht. Die Herren, welche früher diese Fasanen angeboten, werden ersucht, Ihre Adressen an die Redaktion der „Gefiederten Welt" wieder einzusenden. [31

Ein Schmetterlingsfinken-Weibchen und ein Paradieswitwen-Weibchen, beide im besten Zustande wünsche ich zu kaufen und erbitte Angebot an d. Red. [32

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstraße 2, durch die Post oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Bernau.

Dieser Nummer liegt ein „Programm nebst Anmeldebogen" zur Geflügel- und Vogel-Ausstellung des ornithologischen Central-Vereins für Sachsen und Thüringen in Halle a./S. in den Tagen vom 7 bis 10 März 1874 bei.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 22. Januar 1874. Nr. 4.

Inhalt:

Zum Vogelschutz (Schluß). —
Kanarienvogel-Zucht in Andreasberg (Fortsetzung). —
Ueber Akklimatisirung und Zucht der Wellensittiche. —
Neue und seltenere Erscheinungen des Vogelmarkts. —
Aus den Vereinen: Aufruf zur Anlage eines Westfälischen Zoologischen Gartens; Ornithologischer Verein zu Stettin. —
Briefwechsel.
Anzeigen. —

Zum Vogelschutz.

(Schluß.)

Nachdem sich über die erstere Frage die bedeutendsten Gelehrten und nicht minder zahlreiche Liebhaber nach allen Seiten hin ausgesprochen, ist dieselbe wol von Allen, mit verschwindend geringen Ausnahmen, bejaht worden.

Man halte also zunächst den Grundsatz fest: die Vögel müssen geschont und geschützt werden.

Die zweite Frage darf man von zwei Gesichtspunkten aus erwägen und zwar: einerseits, kommt denn diesen Thieren gegenüber nur der praktische, gleichsam handgreiflich wahrnehmbare Nutzen zur Geltung oder vielmehr auch der ideelle? Im ersteren Falle würde es allerdings ganz außerordentlich schwierig sein, mit haarscharfer Sicherheit das Für und Wider der Nützlichkeit eines jeden einzelnen Thieres festzustellen. Um dies blos bei den vorhin genannten drei Vögeln: Sperling, Storch, Staar, welche doch zu den uns am nächsten umgebenden, allerbekanntesten gehören, zu erreichen, bedürfte es, im hitzigen Streit der Meinungen, Anschauungen und Sonderinteressen, noch vielleicht manches Jahres. Schon die Erörterung der Begriffe „Nutzen für den Naturhaushalt", „Nützlichkeit für das Menschenwohl", „Nützlichkeit und Schädlichkeit" an und für sich ist so weitführend, daß ihre Erledigung, ihre sichere Feststellung — wenn eine solche überhaupt möglich ist — geraume Zeit erfordern würde.

Sehr einfach und unserer Meinung nach durchaus befriedigend läßt sich diese Frage aber entscheiden, wenn man von vornherein von dem zweiten Gesichtspunkte ausgeht. Man sagt dann ganz einfach: die gesammte Thierwelt ist doch keineswegs dazu vorhanden, daß sie dem Menschen blos schaden oder blos nützen solle. Abgesehen von dem Selbstzweck und der vollen Daseinsberechtigung eines jeden einzelnen Thieres, dürfte die humane Anschauung zweifellos die richtigste sein, nach welcher jeder Mensch, der überhaupt Sinn und Empfänglichkeit für die Natur und die von ihr gebotenen Gaben und Genüsse hat, sich eines Jeden seiner Mitgeschöpfe erfreut, insofern dasselbe ihm nicht geradezu Gefahren oder Nachtheile bringt. Nun, von diesem Gesichtspunkte aus verdienen die bei uns freilebenden Vögel Schutz und Hegung sämmtlich, bis auf sehr wenige Ausnahmen.

Die Frage: ob der Schutz und die Hegung der Vögel wirklich überhaupt nothwendig sei, ob man in der That eine Abnahme mancher Vogelarten an Familien- und Kopfzahl festgestellt habe, dürfte dann garnicht weiter in Betracht kommen — selbst wenn sie auch

noch nicht nach allen Seiten hin längst genugsam erörtert wäre.

Wenn das Vogelschutzgesetz nun aber wirklich zu Stande kommt und als allgemeiner Grundsatz die Beschützung sämmtlicher freilebenden europäischen Vögel festgehalten wird, so ist die Erörterung der dritten Frage ebenfalls keine schwierige. Das Gesetz darf in das Nutzungsrecht, welches jeder einzelne Mensch der Thierwelt gegenüber ganz zweifellos hat, doch nur so weit eingreifen, als die Beschränkung des persönlichen Interesses dem allgemeinen Interesse gegenüber durchaus nothwendig ist.

Hiernach sind die Normen des Vogelschutz-Gesetzes in Betreff der dritten Frage sehr einfach in folgender Weise festzustellen:

1. Die wichtigsten und nothwendigsten Maßnahmen des Vogelschutzes müssen sich darauf erstrecken, daß die natürlichen Daseinsbedingungen der Vögel, soweit dieselben durch die menschlichen Kulturen gestört oder aufgehoben werden, möglichst wieder herzustellen oder zu ersetzen sind.

2. Muß jedem Massenfang und Massenmord der Vögel, gleichviel wo er nur stattfinde, ein entschiedenes Ende gemacht werden. Daher ist ebenso wol der Fang der Krammetsvögel, Leipziger Lerchen u. s. w. in Deutschland, als auch der Vogelfang in Italien und im übrigen Südeuropa durch internationale Gesetze zu unterdrücken.

3. Jeder Vogelfang, der im Sinne der neueren, verständigen Auffassung des Thierschutzes verurtheilt werden muß, ist ebenfalls gesetzlich abzustellen. Der vernünftigen, zweifellos berechtigten Liebhaberei, ist dagegen ihr Recht durch Gestattung des Vogelfangs zu bestimmten Zeiten einzuräumen.

4. Jeder Vogelfang ist aber einerseits durch das allgemeine internationale Gesetz und andererseits durch lokale polizeiliche Bestimmungen zu regeln.

In diesen wenigen Punkten, selbstverständlich unter Voraussetzung des sorgfältigen Ausbaues im Einzelnen, haben wir einfach und übersichtlich den gesammten Inhalt des Vogelschutz-Gesetzes vor uns und wir dürfen wol die Ueberzeugung aussprechen, daß diese Grundregeln ganz entschieden zur Geltung kommen müssen, wenn das Gesetz ein lebensfähiges, bezüglich dem Volkswohl nützendes sein soll.

Obwol wir von Redaktionsseite die Frage hiermit als erledigt erachten, so stellen wir uns doch selbstverständlich durchaus nicht auf den Standpunkt der Unfehlbarkeit, sondern räumen nach wie vor auch jeder weiteren Erörterung, bezüglich anderen Meinung sehr gern das Wort ein. Namentlich wird es wünschenswerth sein, wenn die zweite Hauptfrage: welche Vögel sind es, deren Thätigkeit als nützlich für das Menschenwohl angesehen werden muß, einer immerwährenden regsamen Erörterung, insbesondere im praktischen, gleichsam reinfachlichen Sinne fortgesetzt wird. Und über dies Thema gedenken wir jetzt die längstversprochenen Darstellungen gleicherweise aus den Federn von Fachgelehrten und Liebhabern zu bringen.

Dr. Karl Ruß.

Kanarienvogel-Zucht in St. Andreasberg.

(Reisebericht von Kontroleur W. Böcker in Wetzlar).

(Fortsetzung).

Auch ist es nicht richtig, wenn man annimmt, daß die erste Brut vorherrschend Männchen, die folgende vorherrschend Weibchen ergiebt. Ich habe z. B. von einem Pärchen in einem Jahre 19 Vögel gezogen; aus der ersten Brut stammten 5 Junge, darunter ein Hahn; aus den folgenden Bruten erhielt ich 14 Vögel, welche sämmlich Weibchen waren. Auch ein Weibchen, das in einem Jahre viele Männchen gebracht hat, kann in den folgenden Jahren weniger befriedigen. So habe ich von einem Weibchen, das, beiläufig bemerkt, auch im höhern Alter einen glatten Fuß und kurze Krallen behielt, in einem Jahre 11 Vögel, darunter 10 Hähne, im darauf folgenden Jahre 10 Vögel, darunter 2 Hähne, gezogen". Ein anderer Züchter hatte in diesem Jahre von 10 Hähnen in erster Brut nur 2 oder 3 Hähne, im Uebrigen lauter Weibchen erhalten. So beachtenswerth, wie diese Mittheilungen erfahrener Züchter immerhin sind, so kann ich mich doch von der Ansicht, daß es in der Regel in der ersten Brut mehr spitze, in der folgenden mehr runde Eier, in jener mehr Männchen, in dieser mehr Weibchen giebt, noch nicht trennen. Ich meine, diese Erfahrung häufig in meiner eignen Hecke gemacht zu haben. Zahlreiche Ausnahmen sind indeß nicht zu leugnen. So haben ein Andreasberger Züchter und ich selbst Weibchen gehabt, die in allen Bruten eines Jahres nur lange, spitze Eier gelegt. Mehrere Bruten dieses Weibchens verunglückten bei mir, so daß ich über das Geschlecht der Jungen nicht ins Klare kommen konnte. Von Hühnerologen habe ich häufig die Behauptung gehört, daß die spitzen Hühnereier Hähne, die runden dagegen Hühner bringen würden. Es lohnte sich vielleicht der Mühe, dieserhalb Versuche anzustellen; das Naturgesetz müßte bei Hühnern und Kanarien doch ein und dasselbe sein.

Man hält allgemein dafür, daß schwächliche Vögel, namentlich die schwächlichen rein hochgelben Vögel überwiegend Weibchen ziehen; die eben erwähnten Ausnahmen lassen sich daher möglicher Weise zurückführen auf die größere oder geringere Zeugungsfähigkeit der Männchen und wenn in der ersten Brut ausnehmend viele Weibchen vorgekommen sind, so könnte das der Umstand erklären, daß grade beim Beginn der Hecke viele Hähne an zu reichlich genossenem Eifutter oder aus andern Ursachen krank werden, sich aber später wieder erholen. —

Als ein Gegenstück zu klaren Eiern wurden mir einige Fälle mitgetheilt, in denen in frühern Jahren aus einem Ei zwei Junge hervorgegangen waren. Ein Züchter, derselbe, dessen eigne Auslassung ich oben mitgetheilt habe, äußerte hierüber Folgendes: „Zwillinge habe ich zu zwei verschiedenen Malen aus einem Ei gezüchtet. Die Vögel waren beim Ausschlüpfen klein, wie die Hummeln; sie waren äußerst rührig und kamen in beiden Fällen glücklich auf; ein drittes Mal verunglückten bei mir Zwillinge im Ei. Dasselbe ist bei einem andern Züchter passirt. Die

Eier, welche Zwillinge enthalten, sind stets erheblich größer, wie die übrigen Eier; es wird auch jedesmal nur eins, oder wenn es hoch kommt, noch ein ganz kleines Ei daneben in einer Brut gelegt." Diese Mittheilungen wurden von andern Personen bestätigt, ebenso die nachfolgende Aeußerung eben desselben Züchters über einen ganz ungewöhnlichen Fall. „Vor 12 bis 14 Jahren", so erzählte der Züchter, „kam in meiner Hecke ein vierbeiniger Vogel aus. Das eine Paar Beine saß an gewöhnlicher Stelle, es war gestaltet als bei jedem andern Vogel. Hinter diesen Beinen hatte sich aus einer Verknorpelung des untern Rückgrats ein anderes Paar Beine gebildet. Sie hingen zu jeder Seite des Körpers herunter, waren übrigens ganz normal gebildet, nur fehlte am linken Fuße eine Klaue. Der Vogel war ein Weiben; er wurde fast vollständig flügge, hatte aber noch im Neste das Unglück, von einem andern jungen ausgeflogenen Vogel an einem der hintern Beine, die unterm Leibe etwas hervorstanden, angenagt zu werden und er starb an den Folgen dieser Verletzung nach kurzer Zeit. Ich beabsichtigte, den Vogel ausstopfen zu lassen, legte ihn Abends auf einen Schrank und am andern Morgen mußte ich gewahren, daß er an der Brust von Mäusen angefressen war. So war ich denn auch um den Balg gekommen. Es haben mir damals die Leute fast das Haus eingerannt mit ihren Besuchen; alle wollten den merkwürdigen Vogel sehen. Ein hiesiger Händler bot mir gleich für denselben fünf Thaler; er wäre nur aber für zwanzig Thaler nicht feil gewesen." So weit mein Gewährsmann; ich würde den Fall nicht mitgetheilt haben, wenn er mir nicht, wie gesagt, von verschiedenen Personen bestätigt worden wäre. —

Die Nachfrage nach guten Vögeln war außerordentlich stark gewesen. „Es verging", so erzählte mir der Besitzer eines guten Stammes, „fast keine Woche, in der nicht ein Vogelhändler bei mir angesprochen hätte". Die bessern Stämme waren fast alle verkauft, — „behandelt", — nicht selten schon im vergangenen Herbst und Winter. Die damit gewartet hatten bis zum Sommer, hatten die höchsten Preise erzielt. Der Preis ganzer Stämme wechselte zwischen 2 Thlr. 5 Sgr. und 3 Thlr. Geringere Stämme waren noch genug zu haben. Durchschnittlich war der Preis um 20 bis 25 pCt. gegen das vorige Jahr in die Höhe gegangen. Der Umschlag im Ganzen wurde auf 50,000 bis 60,000 Thaler veranschlagt. Ob dieser Angabe statistische Erhebungen zum Anhalt dienen, weiß ich nicht; ich habe es leider versäumt, auf dem Magistratsbureau darüber Erkundigung einzuziehen. Herr Rittmeister von Wickede giebt im „Daheim" den jährlichen Umschlag auf 100,000 Thaler an. Es ist das übrigens nicht der einzige Erlös, den die Zucht der Kanarien in Andreasberg im Gefolge hat. Gar viele Personen beschäftigen sich dort mit dem Anfertigen der bekannten Harzer Bauerchen und verdienen dadurch in ihren Mußestunden noch manchen Thaler. Der Preis des Samens hatte zwischen 2 Thlr. 28 Sgr. und 3½ Thlr. für einen Gimpten — 50 Pfd. — gewechselt; die Eier waren mit 1 Thlr. und 1 Thlr. 2½ Sgr. für jedes Schock — 60 Stück — in diesem Frühjahre bezahlt worden und später bis zu 1 Thlr. 10 Sgr. im Preise heraufgegangen. Grünzeug und Hanf waren meines Wissens nicht gefüttert worden. (Fort. folgt.)

Ueber Akklimatisirung und Zucht der Wellensittiche.

(Von Friedr. Bellingrodt, Apothekenbesitzer in Oberhausen).

Zwei Jahre hindurch hatte ich in meiner 150 Quadratmeter großen, 3 Meter hohen, mit einem großen Fenster, dessen Oberlicht mit vergittertem Ausflug eingerichtet ist, versehenen und freundlich nach Südosten gelegenen Vogelstube, die mit 60 Köpfen afrikanischer Prachtfinken und verschiedenen andern ausländischen Sperlingsvögeln besetzt war, die Züchtung der Wellensittiche mit einem Bestand von 3 bis 4 Paaren ohne Erfolg versucht. Nicht ein einziges Mal brachten es diese Vögel weiter als bis zu einigen Eiern, die unbebrütet blieben, dagegen gab es aber sehr häufig das Unglück, daß die Weibchen an Legenoth hinstarben. Ein Versuch, den ich zuletzt noch mit 4 Pärchen in einem sehr geräumigen 2 Meter langen, 1 Meter hohen und 1 Meter tiefen, in 2 Theilen abgetheilten Heckkäfig machte, blieb ebenso erfolglos. — Schon war mir dadurch die Lust an weiteren Versuchen beinahe verleidet, als ich, angeregt durch die mir bekannt gewordenen Erfolge belgischer Züchter, mich entschloß, meine Versuche unter anderen Bedingungen wieder aufzunehmen. Ich beschloß, die in meinem Hausgärtchen liegende Voliere, in welcher ich bisher Inländer untergebracht und in den letzten Jahren auch meine Kanarien, die für die Zucht bestimmt waren, im Freien mit Glück überwinterte und große Erfolge erzielte, ausschließlich zur Zucht der Wellensittiche zu verwenden und damit auch zugleich die Ueberwinterung derselben in unserem Klima zu versuchen. Das Vogelhaus ist 4,5 Meter lang, 3 Meter breit und 3,5 Meter hoch, aus Winkeleisen erbaut und mit Drahtgeflecht versehen; es liegt sehr geschützt in einer Ecke, die vom Hause und der Gartenmauer gebildet wird und ist dadurch gegen Nord und Ost geschützt. Die dritte nach Südwesten gelegene, bisher offene Seite bekleidete ich mit Dachpappe um Zugwind und Regen abzuhalten, so daß nur die nach Südosten gelegene Seite offen blieb. Das Dach ist dicht und mit einer etwa 20 Centimeter hohen Decke aus Gerberlohe bedeckt. Im Innern befindet sich ein durch Springbrunnen unterhaltenes Badebecken von etwa 1 Meter Durchmesser und nur 2½ Centimeter Höhe. In demselben liegen zerstreut, über das Wasser herausragend diverse Stücke Lavaschlacken, im Sommer darüber fortwährend erneuerte grüne Zweige, sperrig gegeneinander aufgerichtet. Auf der einen Seite des Bassins steht ein hohler Weidenstamm von etwa 2 Meter Höhe und 30 Centimeter Dicke, der oben in dicken, knorrigen, kurzen Aesten ausgabelt, in Nistabtheilungen abgetheilt; diesem gegenüber, auf der anderen Seite des Bassins ein verkrüppelter Birkenstamm mit verknorpelten Astauswüchsen als Sitzgelegenheit. An den Mauern befestigt hängen bis dicht zur Decke reichend, ausgehohlte Weidenstämme mit

Nistabtheilungen und außerdem noch 4 Stück Nistkasten Größe Nr. 1 und 2 Stück Größe Nr. 3. (Siehe Ruß' „Handbuch" I. S. 283), von Frühauf in Schleusingen.

In die so vorgerichtete Voliere siedelte ich am 20. November 1872 meine 4 Paar Wellensittiche über. Nach wenigen Tagen eingehender Untersuchung der ihnen gebotenen Wohnungen fanden sie sich ganz heimisch und sehr vergnügt darin. Als Futter reichte ich genau dasselbe, was den Vögeln auch bis dahin zur Verfügung gestanden hatte: Hirse, Kanariensamen, Hanf, Leinsamen, Hafer auf dem Halm, Salz, Speck, Vogelbeeren, Weintrauben, Sepia und später, sobald ich junge Vögel hörte, auch Weichfutter mit trocknen Ameiseneiern gemischt. Die Sepia blieb fast unbeachtet, dagegen wurden aber die Mörtelfugen des Mauerwerks mit Vorliebe benagt, sogar tief ausgehöhlt. — Das erste Drittel des Dezembers 1872 brachte uns bald eine Temperatur von 6° R. Kälte und einigem Schnee; die Sittiche blieben munter und guter Dinge. Gar possirlich war es anzusehen, wie dieselben in dem ins Vogelhaus hinein gewehten leichten Schnee herumwatschelten. Schon in den ersten Tagen des Dezember blieben zwei Weibchen anhaltend in den Nistkasten, so daß ich vermuthen mußte, daß diese bereits zur Brut geschritten seien. Ich hatte mich nicht getäuscht, da ich in der Sylvesterwoche durch ein lebhaftes Gepiepe aus dem Nistkasten belehrt wurde, daß Junge ausgefallen seien. Die Temperatur war bisher noch immer unter 0° geblieben. — Am Mittag des 1. Januar 1873 fand ich am Futternapf ein an der Kehle ganz mit Blut bedecktes Weibchen. Nach einigen Minuten flog dasselbe in einen der Nistbehälter, in dem ich Junge vermuthete. Ich ahnte Schlimmes und fand meine Vermuthung bestätigt. Im Nistkasten lag auf fünf prächtigen, schon ziemlich herangewachsenen, blutig zerhackten Jungen ein Weibchen mit zerhacktem Kopf, vollständig weggerissener Wachshaut und blutendem Rücken im Verenden. Der Missethäter wurde selbstverständlich sofort herausgefangen und beseitigt. Nach ungefähr 3 Wochen, während derer die Temperatur einige Nächte auf — 11° R., und eine Nacht sogar auf — 13° R. gesunken, war das andere Nest flügge geworden und wagten sich die Jungen vereinzelt aus dem Neste heraus. In den kälteren Nächten hatte ich die offene Seite der Voliere mit einem Vorhang aus Segeltuch geschützt.

Inzwischen schritten die beiden anderen Paare, deren eines ich durch Beschaffung eines Weibchens wieder vollzählig gemacht hatte, auch zur Brut und ließ sich von da ab eine genaue Beaufsichtigung der einzelnen Paare nicht mehr durchführen. Die Bruten gingen, ohne Unterbrechung sich aneinander reihend, gedeihlich weiter; obwol Nistgelegenheiten in Ueberzahl vorräthig, so richtete sich ein Paar doch in einem der morschen Weidenstammköpfe eine etwa 25 Centimeter tiefe Höhlung ein und zog darin 6 Junge auf. Bei der Wahl der Nistkästen wurden für alle Bruten, die höher hängenden Kästen und Brutstätten der Stämme vorzugsweise in Anspruch genommen. Ich habe keine Brut in Kästen, die unter Mannshöhe hingen, vorgefunden.

Trotzdem natürlich nicht alle ausgefallenen Junge der Bruten glücklich bis zum Ausfliegen gebracht und einzelne volle Gelege verlassen und auch ein Weibchen auf der Brut im September 1873 starb, so war doch die Fruchtbarkeit, wie die unten folgende Aufstellung erweist, eine sehr beträchtliche. In mehreren Fällen brüteten oder halfen die zuerst ausgefallenen Jungen die später gelegten Eier ausbrüten, so daß ich in einem Neste Junge, die beinahe flügge, andere die 16 Tage und solche die wenige Tage alt waren zugleich fand.

Im August und September ließ der Bruteifer nach; nur einige Nester waren Mitte September noch besetzt, die aber bis Ende September alle flügge wurden. Ende September fand ich noch ein brütendes Weibchen auf einem Gelege von 6 Eiern, das ich sofort als krank erkannte. Die Besichtigung desselben ließ mich einen außergewöhnlich aufgetriebenen und straff gespannten Unterleib finden. Tags darauf war das Thierchen todt. Bei der von mir vorgenommenen Untersuchung fanden sich in der Gegend des Eileiters verschiedene bis haselnußgroße Bläschen, die mit einer klaren wasserhellen Flüssigkeit gefüllt waren. Das Gewicht der gesammelten Flüssigkeit betrug 22 Gramm und ist anzunehmen, daß der Vogel an Wassersucht die ich bisher noch in keinem Handbuch unter den Vogelkrankheiten vermerkt gefunden, gestorben ist.

Das gewiß sehr günstige Ergebniß der Züchtung des ersten Jahres ist übersichtlich zusammengestellt Folgendes:

Die eingesetzten 8 Stück Vögel lieferten 111 Eier, deren Brutergebniß war

65	Junge,	die ausgeflogen und sich sehr gut entwickelt haben,
13	„	die vor dem Ausfliegen in den Nestern gestorben sind,
5	„	die durch ein anderes Weibchen getödtet wurden,
1	„	mit nur einem Flügel geboren und nach dem Ausfliegen im Badebecken ertrunken.
27	nicht ausgefallene Eier.	
111	in Summa.	

An Futter ist verbraucht in einem Jahre, vom 1. Januar 1873 bis zum 1. Januar 1874: 240 Pfd. Hirse, 30 Pfd. Kanariensamen, ungeschälten Hafer etwa 30 Pfd.; von den anderen Sämereien je 2 bis 3 Pfd. Vorzugsweise gerne wurde der Hafer auf dem Halm, und am liebsten der unreife Hafer angenommen. Das oben bezeichnete mit trocknen Ameiseneiern vermischte Weichfutter besteht aus geriebenen Mören, trocknem Weißbrot, geriebenem, vorher gekochtem Kalbsherz (wenn ich dies gerade frisch haben konnte, andernfalls blieb es weg) und fein zerhackten Feigen. Zur Zeit, wo Junge in den Nestern waren, zeigten sich die Alten so erpicht darauf, daß mir die Vögel beim Eintreten ins Vogelhaus, auf den in der Hand gehaltenen Teller, der dies Futter enthielt, stürmisch hinflogen. Meine vorigjährige Zucht habe ich bis auf 45 Stück (22 Paare und 1 Weibchen)

vermindert und sind alle bis heute im Freien verblieben. Seit 5 Tagen habe ich in 3 Nestern wieder hier und scheint demnach nunmehr die Brutzeit Eieder zu beginnen. Nach Verlauf des Jahres 1874 wosse ich dann ein gleich günstiges Ergebniß mittheilen zu können.

Am Schlusse dieser Aufzeichnungen mache ich übrigens noch die Mittheilung, daß ich im April 1873 in dieselbe Voliere zu den im eifrigen Brutgeschäft befindlichen Wellensittichen, ein Paar Singsittiche brachte. Ich hatte dieselben in meiner Stube seit Herbst 1872 gepflegt. Im Juni ließen mich alle Anzeichen darauf schließen, daß Paarung stattgefunden habe, und fand ich dann auch bald darauf in einem der Nistkasten Nr. 3 auf einer Unterlage von Hirsehülsen und Strohhalmen ein Gelege von 5 Eiern; das Weibchen brütete etwa 28 Tage ununterbrochen und mit großem Eifer, leider jedoch ohne Erfolg, und verließ dann das Nest. Einen zweiten Versuch machte das Paar nicht. Uebrigens bewohnt dasselbe heute noch (am 8. Januar 1874) in bester Gesundheit die Voliere im Freien, obgleich im Laufe des Dezembers die Temperatur mehrere Nächte bis — 6° R., und auch in den letzten Nächten auf — 4° R. gesunken war. —

Nachschrift. Heute habe ich die Nester meiner Wellensittiche untersucht und fand schon acht derselben mit brütenden Weibchen besetzt; je zwei Nester waren mit 3 Eiern, vier mit 4 Eiern und zwei mit 6 Eiern belegt. Ich wollte nicht unterlassen, die vorhin gemachten Angaben hiermit zu ergänzen. Fr. B.

Neue und seltenere Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der Wachtelfink (A. polyzona). Ein Pärchen dieser Vögel erhielt ich vor etwa fünfviertel Jahren. Dieselben hatten damals kaum eine Feder am Körper, erholten sich aber gut, bis beim Nisten sich ein Haar um den einen Fuß des einen Vögelchens wickelte und dadurch zwei Zehen abstarben. Seitdem haben die Vögel keine weiteren Nistversuche meines Wissens gemacht. Diese Art war mir vollkommen neu und stammt, so viel ich weiß, aus Afrika*). Das Pärchen lebte friedfertig und ziemlich stille mit Helenafasänchen, Orangebäckchen u. a. Im Benehmen waren sie den Helenafasänchen ähnlich.

August Wiener in London.

Zu den erfreulichsten Erscheinungen auf dem Gebiete der Vogelliebhaberei gehört, nächst den immer bedeutender zunehmenden Erfolgen der Züchtung, nächst der immer gründlicher festgestellten zweckmäßigsten Verpflegung aller verschiedenen Vögel — doch zweifellos die überaus regsam fortschreitende Einführung neuer Arten. Wir haben wieder ein beträchtliches Verzeichniß von solchen aus der letzteren Zeit unsern Lesern mitzutheilen.

Eine Anzahl vorzugsweise interessanter und lebend sehr selten, theils noch gar nicht zu uns gelangter Finkenvögel können wir heute den Lesern vorführen.

*) Wir bitten den Briefwechsel in Nr. 3 zu vergleichen. D. R.

Der Mantelkardinal (Cardinalis capitatus), ein Vogel, welcher dem allbekannten Dominikaner-Kardinal fast vollständig gleicht und vornämlich nur dadurch sich unterscheidet, daß er ganz bedeutend kleiner als jener ist. Auch erscheint das Scharlachroth des Kopfes dunkler und feuriger und geht unterhalb der Kehle in eine spitz zulaufende schwarzbraune Zeichnung über. Fräulein C. Hagenbeck in Hamburg, welche diesen Vogel jedenfalls zuerst in den deutschen Vogelhandel eingeführt, hatte nur wenige Pärchen erhalten, die ziemlich hoch im Preise standen. Ich werde über das in meiner Vogelstube befindliche Pärchen späterhin weiter berichten.

Ebenfalls eine ganz neue Erscheinung auf dem deutschen Vogelmarkt ist der nächste Verwandte des allbekannten Bandvogels, der ungleich hübschere Rothkopffink (A. erytrocephala; Rothkopf-Amadine, Paradies-Amadine, Paradiesfink, Paradiessperling und rothköpfiger Sperling genannt; der Grivelin Vieillot's) aus Angola, von welchem ich ebenfalls von Fräulein Hagenbeck, leider jedoch nur zwei einzelne Männchen erhielt. Der Vogel gleicht in der Gestalt, Größe, sowie im ganzen Wesen dem Bandfink; auch die Färbung und Zeichnung, bis auf den ganz rothen Kopf, ist diesem sehr ähnlich. Daher wunderte ich mich natürlich garnicht darüber, als er auch ganz denselben kuriosen Sang erschallen ließ, begleitet von dem gleichen Tänzeln. Immerhin erscheinen diese beiden Rothköpfe als die ersten Ankömmlinge ihrer Art vorzugsweise interessant und ich werde in Ermangelung der eigenen Weibchen jetzt Züchtungsversuche mit ihnen und Bandfinken-Weibchen machen.

Während der Graugirlitz aus Afrika, allbekannt unter dem Namen grauer Edelfink oder Grauedelfink (Fringilla—Crithagra—musica) zu den häufigsten und beliebtesten Stubenvögeln gehört, namentlich weil er nicht allein einer der vortrefflichsten Sänger ist, sondern sich auch mit guten Erfolgen züchten läßt, ist sein allernächster Verwandter noch niemals lebend in Deutschland vorhanden gewesen. Herr Jamrach in London schickte mir unter der Bezeichnung: kleines kapsches Maneken in mehreren Pärchen diesen Vogel, welchen ich zum Unterschied von dem Graugirlitz den deutschen Namen Gelbbürzeliger Graugirlitz (F.—Cr.—atrogularis) geben möchte, da er einen solchen bis jetzt noch nicht hat. Er ist im Berliner zoologischen Museum nicht vorhanden; in einigen nicht aufgestellten Bälgen soll er jedoch da sein. In Cabanis' „Museum heineanum" und „Journal für Ornithologie" ist er nicht zu finden und ebenso wenig haben ihn v. Heuglin in „Ornithologie Nordost-Afrikas"; Finsch und Hartlaub in „Die Vögel Ost-Afrikas" erwähnt. Er dürfte daher nur in Südafrika vorkommen und in der Literatur ebenso neu, als im Vogelhandel sein. Ich hoffe wol, demnächst hier und dann in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" Näheres über ihn berichten zu können. Der Vogel gleicht in jeder Hinsicht dem Graugirlitz und ist von ihm nur durch den gelben Bürzel verschieden.

Ein naher Verwandter ist sodann das kleine, oberhalb dunkelbraune, unterhalb weiße Vögelchen, mit schwarzem Kopf und schwarzem Brustschild, der Maskenfink (Fringilla personata s. alario) ebenfalls aus Afrika. Er ist sehr niedlich und wird als trefflicher Sänger gerühmt. Eins der neuesten Lehrbücher sagt über ihn: „Auch zu uns gelangt er zuweilen lebend, immer aber nur sehr einzeln und durchaus zufällig; ich selber habe ihn weder in einer Sammlung lebender Vögel gesehen, noch in einem vollständigen Verzeichniß aufgeführt gefunden". Den Herrn Verfasser könnte ich jetzt dazu einladen, nahezu ein Dutzend dieser Vögel in meiner Vogelstube zu schauen — und somit freue ich mich um so mehr darüber, daß es meinen unablässigen Bestrebungen gelingt, der deutschen Liebhaberei immer wieder neue und interessante Vögel zugänglich zu machen.

Ein Streit herrscht seit längerer Frist unter mehreren Vogelkundigen über den von Dr. Bolle als Hartlaubszeisig (F.—Crithagra—hartlaubi) benannten Vogel, der im Handel auch Mozambique-Zeisig heißt. Der Eine wirft diesen Vogel mit dem Butterfink oder Gelbstiringen Girlitz (F. butyracea) zusammen, während die meisten Andern beide Vögel als zwei durchaus verschiedene Arten trennen. Wer diese Vögel neben einander sieht, wird sie nimmermehr für ein und dieselbe Art halten können. Ich erhielt nun von allen nahestehenden Verwandten mehrere Pärchen. Der Hartlaubszeisig ist allbekannt und im Vogelhandel durchaus nicht selten; viel weniger kommt aber der Gelbstirnige Girlitz vor und noch viel seltener, oder noch garnicht lebend in Deutschland eingeführt gewesen, sind die drei andern nahestehenden Arten, welche ich sämmtlich ebenfalls von Herrn Jamrach, theils in mehreren Pärchen, theils in einzelnen Männchen, erhalten habe. Herr Jamrach hat dieselben, sowie auch die beiden vorhin genannten, sämmtlich mit einer Sendung vom Vorgebirge der guten Hoffnung bekommen und schickte sie mir als „verschiedene Arten kapscher Kanarienvögel". Der eigentliche Kanarienvogel des Vorgebirges der guten Hoffnung, von den Ansiedlern so bezeichnet, hat noch keinen deutschen Namen und könnte wol am richtigsten Grünköpfiger Girlitz (F.—Cr.—canicollis) genannt werden. Er ist bisher in Deutschland wol noch niemals lebend vorhanden gewesen. Wenn auch selten, so doch vorhanden auf dem deutschen Vogelmarkt ist der von Jamrach als St. Helena-Kanarienvogel bezeichnete Gelbbäuchige Girlitz (F.—Cr.—flaviventris), den ich bereits vor Jahren einmal von Herrn Hagenbeck und dann später auch von Herrn Gudera erhielt und der sich ebenso in der reichen Sammlung des Herrn E. Linden in Radolfzell befindet. Wiederum noch nicht lebend hier vorhanden gewesen, ist der Schwefelfink (F.—Cr.—sulfurata), ein überaus stattlicher und größerer Vogel, als alle vorhergehenden, von welcher Art ich leider nur zwei Männchen von Jamrach erhielt.

Weshalb man diesen Vogel Goldkehle, den Gelbbäuchigen Girlitz aber Goldbauch, dabei ferner einen andern Vogel Goldzügel, noch einen andern Goldkragen, einen Goldbärtchen, einen Goldbraue, außerdem eine kleine Sippe Goldgimpel u. s. w. benennen will, ist mir unerfindlich. Solche weit hergeholten Namen verwirren das Verständniß leider nur zu sehr und wenn man bedenkt, daß im Sprachgebrauch das rothgelbe, wirklich goldig erscheinende Goldbrüstchen sich eingebürgert, so ist es zu bedauern, daß alle diese vielmehr grüngelben, theils recht mattgelben Vögel mit so prunkenden Bezeichnungen belegt werden. Die gelehrten Ornithologen, welche hierin ihre goldenen Träume zur Geltung gebracht, ließen sich offenbar beeinflussen, von der glücklicherweise dahingeschwundenen goldigen Gründungsperiode; andernfalls würden sie mehr der Wirklichkeit Rechnung getragen und Messingbauch, Messingkehle, Messingkragen u. s. w. gesagt haben. — Die von uns diesen Vögeln gegebenen Namen wünschen wir aber auch noch keineswegs als endgültig festgestellt betrachtet zu sehen. Nach reiflicher Erwägung, gemeinsam mit allen unsern Freunden und Mitarbeitern, werden wir in dem Buche: „Die fremdländischen Stubenvögel" alle auf den europäischen Vogelmarkt gelangenden Vögel ebenso sachgemäß und gewissenhaft zu benennen, als überhaupt zu schildern bestrebt sein.

Alle diese Vögel sind zweifellos mehr oder minder vortreffliche Sänger, ebenso wie ihre nächsten Verwandten, der Kanarienvogel einerseits und der Graugirlitz andererseits. —

Zu gleicher Zeit erhielt ich ebenfalls von Herrn Jamrach drei Köpfe jenes Vogels, welche durch eine der reizenden Schilderungen Dr. Bolle's eine große Berühmtheit erlangt hat. Dies ist der Wüstentrompeter (Fringilla—Pyrrhula—githaginea), ein kleiner Gimpel, der auf den ersten Blick unscheinbar hellgrau, bei näherer Betrachtung aber prachtvoll rosenroth überhaucht erscheint. Vielen Lesern wird es bekannt sein, daß Herr Dr. Bolle zehn Köpfe dieser herrlichen Vögel von seiner Reise nach den Kanarischen Inseln mitbrachte, und nach sorgfältiger und verständnißvoller Verpflegung und Züchtung in seiner anziehenden Weise beschrieben hat („Journal für Ornithologie"). Seitdem hat, nach vielen Jahren, Herr Buchhändler Fiedler in Agramm diesen Vogel gehabt, außerdem dürfte er aber wol kaum im Besitze eines andern deutschen Vogelliebhabers lebend vorhanden gewesen sein. Die meinigen werde ich natürlich hier späterhin schildern. —

Einen wiederum vorzugsweise interessanten Vogel, leider jedoch nur ein einzelnes Weibchen, erhielt ich von Herrn Naturalist Lintz in Hamburg. Es ist der nächste Verwandte des blauen Bischof oder blauen Kernbeißers, welcher ebenfalls nur ziemlich selten zu haben ist. Während der Bischof aus Mittelamerika und Westindien, Mexiko oder dem Süden der Vereinigten Staten zu uns kommt, ist diese dunkler blaue Art, die noch keinen deutschen Namen hat (Coccoborus brissoni; der Grosbec bleu et ciel Azara) in Brasilien heimisch. Man könnte ihn zur Unterscheidung von seinem Verwandten Dunkelblauer

Bischof nennen, oder auch einen andern Phantasienamen für ihn erfinden, wenn er häufiger in den Vogelhandel gelangen würde.

Aus den Vereinen.

Aufruf zur Anlage eines Westfälischen zoologischen Gartens zu Münster.

Während man sich bis vor wenigen Jahrzehnten damit begnügte, die Thierwelt in Wort und Bild kennen zu lernen, verlangen wir in unserer Zeit zoologische Gärten, in denen die Thiere selbst in ihren verschiedensten äußeren Formen, wie in ihrer anziehenden Lebensweise und Entwickelung uns vor Augen geführt werden. Die angrenzenden Landestheile besitzen seit Jahren ausgezeichnet eingerichtete und verwaltete zoologische Gärten, unsere Provinz sollte eines solchen belehrenden und unterhaltenden, und dabei doch einträglichen Institutes ebenfalls nicht entbehren. Die Gelegenheit zur Anlage eines zoologischen Gartens am hiesigen Orte war augenblicklich äußerst günstig. Von dem unterzeichneten Komité ist bereits ein hinreichend großes Grundstück, nämlich die unmittelbar an der Stadt belegene „Insel" für den Kaufpreis von 14,000 Thlr. erworben worden. Wir beabsichtigen, auf dieser Besitzung folgenden Plan auszuführen, der bei vorzugsweise praktischer Seite die wissenschaftlichen Interessen nicht vernachlässigt.

Der zoologische Garten umfaßt: 1. Einen Geflügelhof. Das Geflügel in seinen verschiedensten Arten und edlen Rassen, wie wir dasselbe bereits seit einigen Jahren auf unserer allgemeinen Geflügel-Ausstellung kennen gelernt haben, soll einerseits in untadelhaften Exemplaren dem Publikum fortwährend zur Schau gestellt werden, und anderseits wird die in größerem Maßstabe betriebene Zucht desselben es ermöglichen, einen großen Theil der laufenden Unkosten zu decken und das Unternehmen zu einem finanziell vortheilhaften zu machen.

2. Hübsche Volieren werden alsdann in- und ausländische Sing- und Schmuckvögel bergen, welche durch herrlichen Gesang und glänzendes Gefieder und durch ihre nie rastende liebenswürdige Munterkeit die Ohren- und Augenweide der täglichen Besucher sein würden.

3. Die in Europa einheimischen Säugethiere sind möglichst vollzählig zur Belehrung von Jedermann in passenden Behältern und Käfigen unterzubringen. Keiner der bisher vorhandenen zoologischen Gärten hat es sich bis jetzt zur Aufgabe gemacht, die europäische Fauna zur Schau zu stellen und wissenschaftlich zu beobachten unternommen. Unsere Anstalt soll in dieser Hinsicht die Erste dieser Art werden. Außerordentlich bedeutende Kapitalien stehen uns für den Ankauf von Löwen, Tigern, Giraffen u. s. w. nicht zu Gebote, aber die europäische Thierwelt enthält des Anziehenden wie Belehrenden soviel, daß daraus ein höchst interessanter zoologischer Garten zusammengestellt werden kann. Dabei bleibt jedoch nicht ausgeschlossen, daß etwa ein Affenhaus und dgl. zur Belustigung aufgeführt würde. Die einheimischen Säugethiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische werden lebend, die niederen Thiere meistens in gut präparirten und konservirten Sammlungen verhanden sein.

4. Das hügelige Gebiet der „Insel," geschmückt durch prächtige schattenreiche Bäume, bietet uns nicht allein den geeignetsten Raum zu einer unvergleichlichen Parkanlage, sondern auch zu einer ausgedehnten und sehr einträglichen Kaninchenzucht.

5 Bienenzucht und Seidenbau werden in Musterständen belehrende Anregung geben.

6. Anstatt der für unsere Kräfte zu kostspieligen lebenden Thier-Arten werden wir dem Publikum in einem zooplastischen Kabinet nicht nur Ersatz, sondern sogar eine ungleich anziehendere Unterhaltung bieten. Herr Prof. Dr. Landois stellte bereits hierfür seine zoologischen Präparate zur Verfügung.

7. Größere Aquarien werden die Bewohner des Wassers und verschiedene Terrarien die Amphibien und Reptilien beherbergen.

8. Ein geräumiger Saal, welcher neu zu erbauen sein wird, bietet hinreichendes Unterkommen für zeitweise größere Ausstellungen der verschiedensten Art, welche bisher wegen Mangel an passendem Raum in unserer Provinz nicht haben veranstaltet werden können. Derselbe wird b gut bewirthschafteter Restauration auch größere gesellige Zusammenkünfte und Festlichkeiten ermöglichen. Bei der großen Beliebtheit, welcher sich „die Insel" beim Publikum schon jetzt zu erfreuen hat, steht zu erwarten, daß auch der tägliche Besuch in einem Etablissement, welches so mannigfaltige und anregende Genüsse bietet, ein lebhafter sein werde, so daß wir auch von dieser Seite der Einträglichkeit des Unternehmens entgegen sehen können.

Der Westfälische Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht, sowie die zoologische Sektion für Westfalen und Lippe, beide Sektionen des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst, welche sich sowol in praktischer wie in wissenschaftlicher Beziehung einen höchst ehrenvollen Namen erworben haben, bieten durch ihre engste Betheiligung die größtmögliche Garantie. Die unmittelbare Leitung haben die Direktoren dieser Gesellschaften

Dr. H. Landois, Professor der Zoologie an der Kgl. Akademie dahier, und **Freiherr Ferdinand von Droste,** Präsident der deutschen Ornithologen-Gesellschaft, sowie der Vicedirektor **Freiherr von Schellersheim,** in bereitwilligster Weise übernommen.

Die nächste und dringendste Aufgabe war es, das für unsere Aufgabe nothwendige Grundstück die „Insel" käuflich zu erwerben. Gelegener konnte ein Platz für derartige Zwecke nicht gefunden werden. Die nahe Lage an der Stadt, ihr hügeliges Terrain, unmittelbar angrenzendes Fluß- und Teichwasser, die vorhandenen Baulichkeiten, die Bewachsung mit altem Gehölze, geben der ganzen Anlage von vornherein die Gestalt und alle Bedingungen eines schon lange bestandenen zoologischen Gartens. Dieses für unsere Zwecke so geeignete, so unvergleichliche Terrain glaubte das unterzeichnete Komité sich nicht fortkaufen lassen zu dürfen, als sich jetzt eine Gelegenheit zur Erwerbung bot, und darum haben wir es gewagt, im Vertrauen auf die gute Sache dasselbe käuflich zu erwerben.

Somit wäre der erste Schritt gethan, indem wir in Voraussicht einer zahlreichen Betheiligung festen Fuß faßten, und wir zweifeln nicht, daß binnen Kurzem der „Nervus rerum", das noch erforderliche Kapital zusammenfließen wird. Wir laden hiermit Alle und Jeden ein, sich uns anzuschließen und durch Zeichnung von ein oder mehreren Aktien nicht nur eine der gemeinnützigsten Anstalten der Provinz fördern zu helfen, sondern auch sein Geld in einem durchaus sicheren und einträglichen Unternehmen anzulegen. Von höchster Seite wurden uns Unterstützungen weitgreifender Art bereits zugesichert, unter denen schon jetzt eine Gabe von 2000 Rthlr. verzeichnet steht. Wohlan denn, prüfet das Unternehmen, die beiliegenden Statuten und den Plan*); sie können das Licht vertragen, und Niemand wird es bereuen, an der Errichtung des westfälischen zoologischen Gartens mitgeholfen zu haben.

Prof. Dr. H. Landois, Ferdinand Baron von Droste, Freiherr von Schellersheim, H. Heidenreich, P. Kentling, C. Krawinkel, Fr. Oermann, von Olfers, Wenzel, Dr. Wilms. Münster, den 10. Dezember 1873.

Ornithologischer Verein in Stettin.

Sitzung vom 17. December.

Der Vorsitzende Herr Crentz liest das vom Vorstande durchgesehene und erweiterte Statut vor, welchesvon der Versammlung mit großer Majorität angenommen wird. — Das Komité, welches die Feier des Stiftungsfestes berathen, legt ein Programm vor, dem wir Folgendes entnehmen: Das einjährige Bestehen des Vereins wird am 17. Februar im großen Saale des Schützenhauses durch ein Abendessen, dem eine Festrede vorangeht und musikalische und komische Vorträge sich anschließen, unter den Mitgliedern und deren Damen gefeiert werden. Am Sonntag vorher findet eine Vogel- und Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Vogelmarkt, Prämiirung

*) Dieselben sind für Auswärtige von Herrn Professor Dr. Landois in Münster oder auch von der Red. d. Bl. zu beziehen. D. R.

und Gratis-Verloosung von Sing- und Schmuckvögeln, Hühnern und Tauben unter sämmtlichen Vereinsmitgliedern statt. Das Gedeck kostet 25 Sgr. und zur Bestreitung der bedeutenden Ausgaben für Ausstellung, Verloosung, Tafelmusik, Lokal- und Fest-Anordnungen wird ein Zuschuß von 10 Sgr. von jedem Theilnehmer erhoben werden. Auch Nichtmitglieder können als Gäste eingeführt werden. Herr Dupont spricht als Vorsitzender des Ausstellungs-Komités die Bitte aus, daß die Mitglieder, welche Vögel zur Ausstellung schicken wollen, ihm oder dem Vorsitzenden dies möglichst bald anzeigen möchten. — Herr Mellin hatte neue Geräthschaften für Vogelliebhaber ausgestellt. 1. Eine Insektenpulverspritze, welche es ermöglicht, daß man das Pulver nicht allein in allen Ritzen des Käfigs, sondern auch dem Vogel selbst, vermittelst Luftdruck tief ins Gefieder blasen kann und die daher sehr zu empfehlen ist. 2) Ein Luftdruck-Trink- und 3) ein Luftdruck-Futtergefäß; ad 2 verhindert das Baden und erhält das Wasser kühl; ad 3 verhindert das Verschütten des Futters. Beide lassen nur so viel Futter oder Wasser hervor, als zum augenblicklichen Bedürfniß nothwendig ist. Genannte Geräthschaften sind aus der Vogelhandlung von Karl Gudera in Leipzig bezogen; jedoch zeigte Herr Mellin ein vom Klempnermeister Rohnke hier, wie ad 3 angefertigtes Futtergefäß, welches wegen seines billigeren Preises ebenfalls zu empfehlen ist. — Eine eingegangene Frage: „Welches ist der beste Anstrich für Vogelbauer?“ beantwortet Herr Creutz dahin, daß ein hellgrauer oder blauer Anstrich von giftfreien Farben, bereitet aus Zinkweiß und etwas Grau oder Ultramarinblau mit Firniß, oder noch besser mit Kopallack der empfehlenswertheste sei; besser sei es jedoch, wenn verzinkter Drat zur Anfertigung der Käfige genommen werde, da dieser keines Anstriches bedürfe. Eisendrat streiche man am billigsten mit Asphaltlack. — Zum Schluß bringt der Vorsitzende 30 vorgeschlagene neue Mitglieder zur Kenntniß der Versammlung, deren Aufnahme vom 1. Januar 1874 ab erfolgen wird und theilt mit, daß die nächste Vereinssitzung am 7. Januar stattfindet.

Briefwechsel.

Herrn Ritter von Tschusi-Schmidhofen auf Villa Tännenhof: Herzlichen Dank für Ihre Glückwünsche und nicht minder für die Beiträge. Ueber Corvus corax wird uns sehr erwünscht sein. — Herrn Regierungsrath von Schlechtendal in Merseburg: Dank für den uns freundlichst gesandten Beitrag; Näheres brieflich. —

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Verein für Geflügelzucht in Cöln „Columbia“.

Die elfte Geflügel-Ausstellung des Vereins findet statt in den Tagen vom **1. bis 4. März**. Anmeldungen nimmt bis zum 22. Februar der Schriftführer H. J. Lenzen, Steinfeldergasse 25 entgegen.

33] Der Vorstand.

Naturalienhandlung von Wilhelm Schlüter in Halle a. S.

Die Preisverzeichnisse Nr. 37 über Vogeleier in Gelegen und Nr. 38 über Säugethiere in Bälgen, ausgestopft und in Spiritus sind erschienen und stehen auf Wunsch gratis und portofrei zu Diensten. [34

Gut getrocknete Ameiseneier à Pfd. 20 Sgr. empfiehlt
35] **August Dietz** in Burg bei Magdeburg.

H. E. Frühauf,

Holzwaarenfabrik in Schleusingen,
empfiehlt **Nistkästen** für inländische Vögel, in allen Größen nach Dr. Gloger's Angabe, das Dutzend von 1½ bis 3 Thlr. Bei großen Parthien wird bedeutender Rabatt gewährt. [36

E. Genpel - White

Leipzig,
Gewölbe und Magazin am Barfußberg, Connewitz-Thiergarten.

Reisende Vogelhandlung in Deutschland, Rußland, England und der Schweiz

empfiehlt den geehrten Liebhabern zur beginnenden Saison seine reiche Auswahl in- und ausländischer Vögel, als Papageien, Kakadus, Gesellschaftsvögel, Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Fasanen 2c. 2c.

Ferner habe stets vorräthig Gold- u. Silberfische, im Frühjahr Amphibien aller Art, worunter Schildkröten.

Aquarien von Glas, Blech, Zinn; die neuesten Arbeiten von Tuffstein.

Sämereien, als Mais, Hirse, Kanariensamen, Rübsen, Hanf 2c., Ameiseneier; überhaupt alles Futter für Vögel und Amphibien.

Affen, Bären, Hunde in schönen Exemplaren jetzt am Lager, andere Säugethiere werden schnellstens besorgt.

Käfige für Papageien und kleine Vögel, auch große Heckbauer und Volieren in großer Auswahl am Lager.

Preislisten auf Wunsch franco zugesandt. Indem ich wegen Zeitmangel nicht fortwährend meine neu angekommenen Vögel annoncire, bitte öfters Preislisten zu verlangen. [37

Zwei **Zebrafinken-Männchen** sucht und bietet dagegen im Tausch an 3 Blutschnabel- und 2 Rothkopfweber.
38] **Emil Kratz** in Glauchau.

Brieftauben und englische Karrier bei
39] **Robert Pelzer** in Rheydt.

Kanarienvögel

mit mehreren Rollen und anderen schönen Stücken à 4—8 Thlr., Emb. für 1—2 Vögel 8 Sgr., versendet unter Garantie des **gesunden Eintreffens** bis auf 3tägige Postentfernung
40] **R. Maschke** in St. Andreasberg, Harz.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstraße 2, durch die Post oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Bernau.

Ausland.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 29. Januar 1874. Nr. 5.

Inhalt:

Weitere Mittheilung über den Singsittich. —
Zähmung und Brüten des Gimpels. —
Das Schneehuhn in Gefangenschaft brütend. —
Kanarienvogel-Zucht in Andreasberg (Fortsetzung). —
Briefliche Mittheilungen: Etagenbauer und Vogelpflege; Ausstellung im Toggenburg; Instinkt oder Ueberlegung. —
Anfragen und Auskunft: Heiserkeit der Kanarienvögel; Pips der Hühner; Wellensittich. —
Vogelkrankheiten: Kur einer Grasmücke. —
Antw. auf die Anfrage des Herrn Apothekers Schüler in Rohfehlen. —
Zur Fütterung: Hartgekochtes Ei. —
Zur Geflügelzucht und -Liebhaberei: Verhinderung der Inzucht unserer Hühner. —
Anderweitige Liebhaberei: Kaninchen. —
Zur Luftverbesserung. —
Aus den Vereinen: Verein für Geflügelzucht in Köln.
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. — Anzeigen. —

Weitere Mittheilungen über den Rothrumpf oder Singsittich.

Vielleicht ist es für die Freunde des hübschen kleinen Singsittichs (P. — Platycercus — haematonotus) von einigem Interesse, die Beobachtungen, welche Herr Dr. Steinhausen in Nr. 26 des Jahrgangs 1873 dieses Blattes veröffentlicht hat, auch von andrer Seite her bestätigt zu finden. Zu Anfang vorigen Jahres erhielt ich durch die Freundlichkeit des Herrn Wiegand in Zeitz, der diese Sittiche in einem, im Freien stehenden Fluggebauer züchtet, ein schönes zweijähriges Männchen und ein desgleichen einjähriges Weibchen, beide von demselben Elternpaar abstammend. Ich brachte beide Vögel in einem geräumigen Käfige unter und befestigte an der einen geöffneten Seitenthüre desselben einen von Frühauf bezogenen Nistkasten.

Sehr bald wurde dieser angenommen und einige Zeit darauf konnte ich bemerken, daß das Weibchen fest brütete. Das Brutgeschäft verlief ganz so, wie es Herr Dr. Steinhausen beschrieben und darf nach diesen übereinstimmenden Beobachtungen als feststehend angesehen werden:

1. daß vom Singsittich das Weibchen allein brütet, vom Männchen dabei gefüttert wird, und das Nest nur verläßt, um sich zu entleeren und das Gefieder nothdürftig zu ordnen,

2. daß die Jungen schon das Kleid der Alten tragen, im Nest schon nach dem Geschlecht zu unterscheiden sind und nur die Farben des Gefieders etwas matter erscheinen,

3. daß diese Vögel mehrere Bruten hintereinander machen.

Ich füge dem Gesagten hinzu, daß die Fruchtbarkeit meiner Vögel eine nur geringe war. Es wurden erbrütet und glücklich aufgezogen: in der ersten Brut ein Männchen, in der zweiten Brut ein Männchen und ein Weibchen. Die drei Jungen bewohnen noch jetzt mit den Eltern zusammen den Käfig ihrer Geburt.

Ob an der geringen Fruchtbarkeit der Umstand Schuld war, daß die alten Vögel Geschwister sind, lasse ich dahin gestellt sein. Jedenfalls werde ich die jungen Vögel nicht mehr mit einander nisten lassen, sondern für Einführung neuen Blutes Sorge tragen.

Was schließlich noch die Fütterung betrifft, so habe auch ich gefunden, daß die Samenkapseln der

Vogelmiere (Alsine media) mit den noch unreifen oder halbreifen Samen, sowie die halbreifen Samenköpfchen des Kreuzkrauts (Senecio vulgaris) die Lieblingsspeise der Rothrümpfe bilden.

Ich fütterte an Sämereien: Kanariensamen, weiße Hirse (in neuerer Zeit nebenbei auch die von Carl Gudera eingeführten andern Hirse-Arten), gespelzten Hafer und Mohn, daneben im Frühjahr Zweige mit Knospen (hauptsächlich von Flieder [Syringa vulgaris] und verschiedenen Weiden-Arten), im Sommer und Herbst halbreife Aehren von Hafer, Kanariengras, weißer und Kolbenhirse (ich hatte diese Gräser selbst angebaut) und im Herbst und Winter Morrüben und Ebereschenbeeren, zu allen Zeiten aber, in denen diese Pflanzen zu beschaffen waren, Vogelmiere und Kreuzkraut und zwar stets so frisch wie möglich. Während der Brutzeit erhielten die Vögel auch ein mit Ameisenpuppen versetztes Weichfutter sowie täglich einige Mehlwürmer. Letztere wurden gern gefressen, der Verzehr an Weichfutter war dagegen gering.

v. Schlechtendal, Regierungsrath in Merseburg.

Zähmung und Brüten des Gimpels (Pyrrhula vulgaris).

Pfarrer Bl. Hanf in Mariahilf in Steiermark, der den Lesern der „Gefied. Welt" durch seinen Versuch*) die Kreuzschnäbel (Loxia curvirostra) in der Gefangenschaft zur Fortpflanzung zu bringen, bereits bekannt sein dürfte, hat in einer im Jahre 1856 in den Schriften des K. K. zoolog. bot. Gesellschaft in Wien veröffentlichten Arbeit, die Vögel in der Umgebung des Furlleiches betitelt, seine mit Gimpeln erzielten Zähmungsversuche mitgetheilt, welche manchen Leser interessiren dürften, und die ich hier wörtlich folgen lasse:

„Als Stubenvogel ist Pyrrhula, wenn er vom Neste aufgezogen wird, hinlänglich bekannt; daß er aber zu einem zutraulichen Begleiter in der freien Natur erzogen werden könne, möchte noch nicht so allgemein bekannt sein. Ich besaß im Jahre 1855 ein Pärchen so zahmer Gimpel, welche aus meinem Wohnzimmer in den sehr passend gelegenen, mit Obst- und Zierbäumen und vielen Johannisbeerstauden bepflanzten Garten durch das Fenster frei aus- und einflogen, und in diesen Stauden zweimal nach einander brüteten, indem sie ihr Nestchen aus im Garten gefundenen Materialien bauten, das erste Mal mit 6 und das zweite Mal mit 5 Eiern belegten, aber leider schon nahe daran Junge zu erhalten, verunglückten.

Die Zähmung erzielte ich auf folgende Weise: Im Jahre 1854 zog ich Junge vom Neste auf und da ich sie fähig hielt, sich selbst im Freien fortbringen zu können, wollte ich die Weibchen im Garten in Freiheit setzen und behielt nur ein Männchen zurück. Allein, da ihnen von Jugend auf das Haus mehr zur Gewohnheit wurde, als die Bäume und Gesträuche im Garten, so suchten sie im gewohnten Hause wieder ihre Zuflucht und Nahrung, und kamen in einoder dem anderen Fenster wieder ins Haus, bis endlich ein besonderes intelligentes Weibchen auch das Fenster meiner Wohnung, und in derselben ihren bekannten Nestkonsorten wieder fand. Ich sperrte es dann ein und ließ es nach einigen Tagen wieder fliegen, es kam wieder und so ging es den ganzen Herbst hindurch, bis endlich der Winter solches untersagte. Im Winter ließ ich sie im Zimmer öfter frei herumfliegen, damit sie die Flugfertigkeit nicht verloren. Im nächsten Frühjahre ließ ich wieder das Weibchen zuerst fliegen, nachdem dieses den schon bekannten Weg einige Male gemacht hatte, sperrte ich es ein und ließ das Männchen in die Freiheit, welches sich nicht lange von seinem Weibchen trennte, sondern selbes bald auf meinem Fenster im Vogelhause aufsuchte und auch den Weg in meine Wohnung kennen lernte. Da nun beiden der Weg in meine Wohnung bekannt war, ließ ich beide mit einander ausfliegen, und es kamen auch beide täglich zurück, wo sie auch bis zur Brutzeit in ihrem Hause Nachtquartier hielten. Natürlich sorgte ich nicht allein für die gewöhnliche Nahrung, sondern auch für besondere Leckerbissen, als da sind, Zirbel-Nüsse, Mehlwürmer ꝛc.; letztere haben eine so unwiderstehliche Gewalt über sie, wie über viele andere Vögel, so zwar, daß, wenn ich meine Mehlwürmerschachtel aus der Tasche zog, mir meine Gimpel auch im Freien zuflogen".

Mitgetheilt von Herrn Ritter Viktor von Tschusi-Schmidhofen.

*) Ich berichtete über denselben in Nr. 8 v. J. und werde die weiteren Resultate nächstens mittheilen.

Das Schneehuhn (Lagopus alpinus) in Gefangenschaft brütend.

Gehört schon das längere Erhalten des Schneehuhns in Gefangenschaft zu den Seltenheiten, (mir wenigstens ist kein Fall bekannt, das dies durch längere Zeit gelungen wäre) so verdient sein Brüten um so mehr Beachtung.

Hanf theilt im Jahrgang 1854 der oben citirten Vereinsschriften folgenden Fall mit:

„Im Jahre 1852 wurde von den Hirten ein Schneehuhn auf den Eiern sitzend gefangen und von einem Gutsbesitzer in meiner Nähe in einen Käfig eingesperrt über ein Jahr erhalten. Im Frühjahr 1853 legte dasselbe Eier, welche leider zu Grunde gingen. Statt dieser unbefruchteten Eier legte man ihr Wachteleier unter, welche sie ausbrütete und diese jungen Wachteln mit vieler Sorgfalt groß zog. Da man ihr nebst diesen von ihr selbst ausgebrüteten auch noch andere beim Schnitt gefangene junge Wachteln übergab, welche sie mit gleicher Sorgfalt großzog, so mochte wol die übermäßige Anstrengung sie so angegriffen haben, daß sie durch gänzliche Abzehrung den Tod fand. Dieses Schneehuhn hat auch in der Gefangenschaft sein dreifaches Kleid bekommen".

R. V. v. T.-S.

Kanarienvogel-Zucht in St. Andreasberg.

(Reiseberich von Kontroleur W. Böcker in Wetzlar).

(Fortsetzung).

Ein Züchter, der bis in die neueste Zeit hinein sich zugleich mit dem Vogelhandel befaßt hatte, war der Ansicht, daß bei den gegenwärtigen Einkaufspreisen die Vogelhändler kaum noch ihre Rechnung finden könnten. „Unbegreiflich!" wird der freundliche Leser dieser Zeilen vielleicht denken; „müssen wir doch einen guten Vogel mit dem dreifachen Betrage bezahlen!" Jener Züchter hatte indeß so Unrecht wol nicht. Man möge bedenken, daß die meisten Ankäufe zu einer Zeit gemacht werden, wo der Gegenstand des Handels, die junge Nachzucht, noch gar nicht existirt, daß gute junge Vögel nur von guten Zuchthähnen zu erwarten sind, und daß, wenn diese bis zur Abnahme der jungen Vögel umschlagen, der Händler eine Menge mittelmäßiger Vögel erhält, die er an Kenner nicht abgeben kann, die sogar im Stande sind, andere bessere Stämme zu verderben. Selbst innerhalb eines vorzüglichen Stammes wird vielleicht kaum die Hälfte gut. Und nun bedenke man den unvermeidlichen Verlust an jungen und alten Vögeln, die große Last des täglichen Fütterns und des öftern Reinigens der Bauerchen, die Kosten der mehrmonatlichen Unterhaltung in eigens geheizten, vielleicht gemietheten Räumen und die erheblichen Zehrungs- und Reisekosten der reisenden Händler! Vögel, die der Händler zum höchsten Preise abgeben kann, sind im Allgemeinen rar und, wenn er sein eignes Interesse versteht, so wird er noch manche derselben an seine Züchter zum Kostenpreise abgeben. Jedenfalls haben derartige Vögel auch für ihn einen hohen Werth, denn, sowie ein geringer Vogel andere bessere leicht verderben kann, so kann anderseits ein vorzüglicher Sänger auch die jüngern, der Ausbildung noch bedürftigen Vögel zu guten Schlägern heranbilden. Uebrigens sind vorzügliche Vögel in Andreasberg im Einzelkauf ebenso theuer, wie bei den Händlern; ich selbst habe noch in diesem Jahre für einen dem Züchter entbehrlichen Vogel vergeblich sieben Thaler geboten und um Weihnachten vorigen Jahres wurden, um nur einen Fall unter vielen hervorzuheben, in einer dortigen Züchterei vier Vögel zum Gesammtpreise von fünfzig Thalern verkauft.

Die Trennung der Geschlechter nach beendeter Brutzeit geschieht nach der Farbe; jeder Züchter besorgt sich das selbst; Vogelhändler ziehen beim Sortiren mit wenigen Ausnahmen einen „Ausstecker" zu. Große Behutsamkeit erfordern beim Sortiren die Schimmelvögel. Diese haben auf Scheitel, Brust und Rücken viel weiß, die Spitzen der Federn entbehren nämlich der dem Männchen eigenthümlichen gelben Färbung; auch der Halsring, besonders am Oberhalse sieht sich an, wie der eines Weibchens; man erkennt diese Männchen an der lebhaft gefärbten gelben Stirn. Im Gegensatze zu den Schimmelvögeln zeigen die übrigen jungen und alten Hähne eine an der Stirn sehr lebhafte, übrigens gleichmäßig gelbe Färbung des ganzen Kopfes selbst bei sonst matter Färbung des Gefieders; ein weißgrauer Flecken auf dem Scheitel, sei er auch noch so klein, ist bei diesen Vögeln das Kennzeichen des Weibchens. Auch gehaubte und gemeine Vögel sind bezüglich des Geschlechts nicht immer so leicht zu bestimmen; bei dem Ausstecken eines Stammes kam der Fall vor, daß der zugezogene Ausstecker und ich bezüglich dreier jungen Vögel verschiedener Ansicht waren und wir waren doch Beide, wie ich behaupten darf, keine Neulinge in diesem Geschäft.

Die Besichtigung des Unterleibes beim Ausstecken der Vögel gewährt nach der Mittheilung eines Ausstechers noch den besondern Vortheil, daß man bei gut genährten Exemplaren auf das Futter schließen kann, das sie erhalten haben. Semmel und Kanariensamen macht weißes Fleisch (Fett), Ei und Sommerrübsen dagegen gelbes Fett. Diese Ansicht hat gewiß viel für sich; sie ist insofern nicht ohne Wichtigkeit, als es fast unumgänglich nöthig ist, von einem angekauften Vogel zu wissen, wie er früher gefüttert wurde; damit man ihm das gleiche Futter reichen kann. — (Schluß folgt.)

Briefliche Mittheilungen.

In Nr. 5 d. Bl., Jahrgang 1872 erschien eine Zeichnung eines Etagenbauers, welche ich Ihnen zugesandt und die Sie so freundlich waren aufzunehmen. In Folge dessen trafen und treffen noch jetzt zuweilen Bestellungen für solche Käfige bei mir ein. Da ich aber nicht Fabrikant bin, sondern rein aus Liebhaberei, gestützt auf Erfahrungen, mir diese Bauer hergestellt habe, kann ich solche nicht liefern, sondern nur möglicherweise anfertigen lassen, was aber nach der Zeichnung wol überall geschehen kann. Ich bitte Sie deshalb gelegentlich in Ihrem Blatte anführen zu wollen (was hiermit gern geschieht. D. R.), daß ich keine Vogelbauer verkaufe, sondern nur, aber gern, jeden Rath hierüber ertheile. Uebrigens bewähren sich diese Etagenbauer recht gut und mir ist im letzten Jahre kein einziger Vogel gestorben, trotzdem ich verschiedene Arten halte. Wie dies geschehen will ich zur beliebigen Benutzung kurz mittheilen. Vor allem wird die größte Reinlichkeit beobachtet und haben alle Vögel Gelegenheit, sich täglich zu baden. Die zahmeren gehen Morgens durch die geöffneten Thüren in die Stube, vergnügen sich durch Herumfliegen und Baden, und kehren, nachdem dies geschehen, auch von selbst in den Käfig wieder zurück. Grünfutter und Obst bekommen Alle. Die Insektenvögel fein geschnitten mit dem Mischfutter, welches aus zerstoßenem Zwieback, Mohnsamen, etwas Glanz und Rübsamen, Ameisenlarven, allerlei weichem Fleisch, ohne Auswahl, aufgeweichten Hollunderbeeren und geschnittenen Vogelbeeren bereitet wird. Auch etwas Salz und Kalk darf nicht fehlen. Es wird nur so viel gemacht, daß das Futter 24 Stunden ausreicht; zuviel halte ich nicht für dienlich. Mehlwürmer giebts nur ausnahmsweise und dann ist die Freude auch groß. Ein einziges Mal nur ward mir eine Weichsel-Nachtigal krank und lag, als ich dies bemerkte, schon in Krämpfen auf dem Boden. Bald überzeugte ich

mich, daß das neue Futter, kurz nach ihrem Empfang, Ursache sein mußte. Der After war aufgetrieben und das Thierchen konnte nicht mehr stehen. Ein Tropfen Baumöl in den Schnabel und ein Klystir von demselben machten den Vogel bald wieder gesund und heute singt er prächtig.

R. Fresenius in Mühlheim.

... Es freute mich sehr, auch von der kleinen, aber ganz vortrefflich ausgefallenen Vogelausstellung in Lichtensteig, Toggenburg und St. Gallen, bezüglich von dem Bestehen jenes ornithologischen Vereins zu lesen, dessen Mitglied auch ich bin. Ihr Berichterstatter, wol Herr Wirth selbst, mein spezieller Freund, vergaß leider aus Bescheidenheit, daß wir während der ganzen Ausstellung, die 10 Tage dauerte und oft ganz fabelhaft überfüllt war, mit Besuchern nämlich, auch nicht einen einzigen Vogel einbüßten, trotzdem die zartesten Weichfresser, In- und Ausländer vertreten waren. Die Ordnung und Reinlichkeit waren aber auch musterhaft; täglich blieb das Direktorium und besonders Herr Wirth vom frühen Morgen bis späten Abend mit Rath und That anwesend. Letzterem, vornämlich seiner Ausdauer, seinem Geschick und seiner Umsicht, haben es Alle zu danken, daß sie ihre Lieblinge alle gesund wieder zurückerhielten. E. W.

... Ich erhielt einen wilden Entrich (Anas boschas) und derselbe lebte etwas über 1 Jahr mit andern Enten auf meinem Weiher. Im letzten Frühlinge, nachdem die verschnittenen Schwingen sich wieder gehörig ergänzt hatten, suchte der Undankbare das Weite. — Vor etwa 4 Wochen kam eines Tages mein Wilder in Begleitung der indessen gewonnenen Gattin wieder herbei und nachdem das Terrain genau rekognoszirt war, wurde Platz genommen und während einiger Tagen festgestellt, daß genügende Sicherheit vorhanden sei; hierauf wurde wieder für kurze Zeit Abschied genommen und beim Wiederkommen begleiteten 5 Stück junge Wildentchen die Eltern nach dem gelobten Land. Daß ich die Vögel nicht im geringsten störe, ist selbstverständlich. Kaltenmeyer in Basel.

Anfragen und Auskunft.

Antwort: Auf die Anfrage in Betreff des jungen Kanarienvogels, der plötzlich aufgehört hat zu schlagen, Folgendes:

Die Ursache ist gewöhnlich Zugluft oder Erkältung. Mir ist dieser Fall im vorigen Jahre dreimal vorgekommen und zwar bei zwei Kanarienvögeln und einem Sprosser. Alle drei sind jedoch in folgender Weise geheilt worden.

Ich packte den Vogel in Watte, so daß blos das Gesicht frei blieb, setzte ihn in ein Körbchen, unter welchem ein Topf mit heißem Wasser steht. Hier muß der Vogel eine Stunde lang aushalten, dann setzte ich ihn wieder in den Käfig, wenn möglich hinter den Ofen, denn nach dem Bade muß der Vogel am meisten vor Zugluft geschützt werden. Dies Verfahren habe ich bei jedem Vogel 3 Tage hintereinander wiederholt und meine Vögel schlugen bald wieder wie vorher.

Auch der Schnupfen wird durch diese Kur am sichersten beseitigt. A. Franziskus in Wittenberg.

* In einer der letzten Nr. fragt ein Hühnerzüchter nach einem zuverlässigen Mittel zur Heilung des sog. Pipses. Gestatten Sie, meine Ansicht und Erfahrung in dieser Hinsicht hier darzulegen. Mancherlei Beobachtungen haben bei mir die Meinung bestärkt, daß bei kranken Thieren die Wärme ein Haupt-Heilmittel sei. Demgemäß werden bei mir diejenigen Hühner, welche jenen bekannten heiseren Ton vernehmen lassen, mit welchem sich der Pips ankündigt, sofort eingefangen, mit einer Umhüllung von erwärmter Watte oder Werg in einen alten Deckelkorb gesteckt, so daß nur der Schnabel so weit frei ist, um athmen zu können. In den Schnabel werden einige Stückchen Speck oder Unschlitt (Talg) gestopft und dies öfter wiederholt. Dazwischen hinein giebt man der Henne etwas verschlagenes Wasser zu saufen. Den Korb aber mit der Henne stellt man hinter den warmen Ofen, oder auf den warmen Heerd. Die übrigen Hühner erhalten unter ihr Futter einige Mal gehackten Talg oder Speck, um etwaige Ansteckung nicht weiter um sich greifen zu lassen.

Seitdem ich dies Mittel gebrauche, ist mir keine Henne mehr am Pips gestorben; meist sind die erkrankten Thiere nach 2 — 3 Tagen wieder genesen. Auch bleibt die Krankheit selbst bei ungünstigster Witterung auf wenige Exemplare beschränkt. Ganz auf dieselbe Weise hilft man sicher auch den Hühnern, denen der Legesack ausgetreten ist. Es kam mir dieser Fall einige Mal vor, anfangs wußte ich mir nicht zu rathen. Die angedeutete Behandlungsweise retteten mir stets die oft werthvollen Hennen. G. Göller, Pfarrer in Alfdorf (Würtemberg).

Frage: Vor etwa zwei Monaten erhielt ich ein Paar Wellensittiche, die durchaus gesund waren; seit etwa 14 Tagen aber kränkelt das Männchen, es springt nicht mehr unter Geschrei und Flügelschlagen mit dem Weibchen herum, sondern sitzt ruhig auf der Stange mit aufgeblasenem Gefieder und athmet sehr schnell und stark, so daß sich dabei der ganze Körper hin und her bewegt. Seit etwa 5 Tagen steht es — nicht liegt — auf dem Boden im Sande und zwar mit geschlossenen Augen und wenn ich an den Bauer herantrete, hört es mich, was am Hin- und Herbewegen des Kopfes zu merken ist, doch macht es die Augen nicht auf, sondern klettert sogar mit geschlossenen Augen am Dratgitter herum bis es eine Sitzstange erreicht, wo es dann für einige Zeit die Augen öffnet und auch wol einmal hin und her springt, immer mit aufgekrauftem Gefieder. Die Augen sind durchaus klar und sowol an ihnen, als auch an den Lidern kein krankhafter Zustand zu bemerken. Für die Aufmunterung des Weibchens, das viel schreit, es anpickt und umschwirrt, ist es durchaus unempfindlich. Die Abwartung und Pflege ist eine durchaus geregelte, die Temperatur im Zimmer durchschnittlich 12° R., am Tage auch 2° mehr. Die Vögel brauchen auffallend wenig Wasser und zerscharren das Futter — Hirse und Kanariensamen — sehr.

A. Schuster, Apotheker in Rössel.

Antwort: Aus Ihren Angaben ist schwer zu erkennen, ob der Vogel an Lungenentzündung oder Unterleibsentzündung erkrankt ist. In beiden Fällen haben wir neuerdings ganz winzig kleine Gaben von Kalomel*) und zwar etwa ¼ bis ½ Hirsekorn groß zweistündlich in den Schnabel gebracht, versucht und schlagen vor, daß Sie dasselbe thun und uns dann über den Erfolg freundlichst berichten. D. R.

Vogelkrankheiten.

Es fiel mir eines Morgens auf, daß meine sonst immer sangeslustige Grasmücke sich so still verhielt. Als ich nach der Ursache forschte, lag dieselbe auf dem Boden des Käfigs wie sterbend, die Augen geschlossen und nur noch mit dem Schnabel nach Luft schnappend. Sie schien den Tag vorher bei der Fütterung vergessen worden zu sein; denn es fand

*) Aus der Apotheke. Ein Arzneimittel, das in vielen Fällen sehr wohlthätig wirkt, aber große Vorsicht erfordert, weil es sonst Unglücksfälle bei Menschen oder Thieren verursachen kann.

sich keine Spur von Futter mehr vor, was sonst immer noch der Fall war. Ich suchte nun dem Vogel frische Ameisencier beizubringen, aber vergeblich. Schon wollte ich den Kranken aufgeben und ich war über den Verlust des munteren Vogels sehr bekümmert. Da dachte ich, vielleicht läßt er sich doch noch retten! Ich holte ein Schächtelchen herbei, füllte es mit Watte, setzte den Vogel, der schon die Füße wie zum Sterben nach hinten gestreckt hatte, hinein, deckte ihn wieder mit Watte zu, so daß nur der Schnabel herausssah und die Watte selbst beschwerte ich mit einem Briefbeschwerer. So stellte ich das Schächtelchen auf den Ofen, der wegen des kühlen Morgens geheizt war. Ich machte mir im Zimmer zu schaffen, um den Vogel zu beobachten. Wie erstaunt war ich aber, nach etwa einer Viertelstunde von dem Ofen her den Vogel im Schächtelchen unruhig werden zu sehen. Er strampelte so gut er konnte mit Füßen und Flügeln und sperrte den Schnabel nach Luft schnappend weit auf. Das Schächtelchen war unten ziemlich heiß. Dem Vogel scheint es zu warm geworden zu sein. Schnell lief ich nach frischem Wasser und träufelte mit einem Federchen einige Tropfen davon in den Schnabel und siehe da, er schluckte. Nun war ich hocherfreut, versuchte auch einige Ameisencier dem Schlunde zuzuführen und siehe, er schluckte wieder. Ich fütterte, so lange er den Schnabel öffnete und stellte alsdann das Schächtelchen an den Fenstersims, so daß die warme helle Sonne durch das Fenster ihm gerade ins Gesicht schien. Ehe aber eine weitere Viertelstunde vergangen war, hatte sich die Grasmücke aus der Umhüllung frei zu machen gewußt und hüpfte nun auf dem Fenstergesims hin und her. Nun holte ich den Käfig herbei, brachte den Vogel mit frischem Wasser und reichlichem Futter hinein und stellte den Käfig im Zimmer so, daß die Sonne recht warm hineinschien. Noch am Abend desselben Nachmittags sang die Grasmücke wieder, wie wenn nichts geschehen wäre.

Pfarrer Göller in Alsdorf.

Antwort auf die Anfrage des Herrn Apothekers Schüler in Rohschlen.

(Vergl. Nr. 1 d. Jahrgangs.).

Die Ursache der Heiserkeit des in der Anfrage erwähnten Kanarienvogels läßt sich mit einiger Sicherheit nicht bestimmen, so lange nicht das Allgemeinbefinden desselben, insbesondere, ob derselbe an Magerkeit oder Fettleibigkeit leidet, ferner die ihm zu Theil gewordene Wartung und Pflege und namentlich das dargereichte Futter und der Platz, wo der Käfig gehangen hat, endlich ob der Letztere verhangen war oder nicht, — angegeben ist. Im Allgemeinen sei über die Ursache einer solchen Krankheitserscheinung hier Folgendes bemerkt:

Es ist nicht grade selten, daß Harzer Kanarienvögel heiser werden; wenn solches plötzlich geschieht, so wird man in der Regel nicht irre gehen, wenn man annimmt, daß dem Uebelstande eine Erkältung zu Grunde liegt. Zugluft schadet in dieser Hinsicht sehr und den feinsten und besten Harzer-Vögeln fast immer, namentlich dann, wenn der Stamm an erblicher Lungenschwindsucht leidet. Aber auch eine kalte Nacht kann den Vögeln gefährlich werden; in diesem Falle zeigt sich die Heiserkeit durchweg früh Morgens, verliert sich aber, sobald der Vogel einige Male durchgesungen, von selbst. Die Heiserkeit kann aber auch eine Folge des Ueberschreiens sein. In einer größern Gesellschaft Harzer Kanarienvögel giebt es fast immer einige Exemplare, die lediglich in Folge des anhaltenden lauten Singens heiser werden und so lange heiser bleiben, bis sie allein oder mit einigen wenigen Vögeln in ein anderes Zimmer gebracht werden. Endlich ist die Heiserkeit eine Folge der Lungenschwindsucht; in diesem Falle tritt sie aber in der Regel nicht im ersten Lebensjahre des Vogels auf, obwol ausnahmsweise auch ein junger Kanarienvogel davon befallen werden kann.

Als Heilmittel gegen Heiserkeit dienen Veränderung des Platzes, Vermeidung jeglicher Zugluft, weshalb es sich auch empfiehlt, den Käfig mit einem hellen Tuche zu verhängen, ferner eine Zuthat von Eifutter zum Sommerrübsen und Entziehung des Kanariensamens, wenn der Letztere gereicht ist. Das Eifutter besteht in solchen Fällen gewöhnlich aus einer Mischung von hartgekochtem Hühnerei und geriebenem oder eingeweichtem Weißbrot zu gleichen Theilen. Bei geriebenem Weißbrot wird das Gemenge mit etwas Wasser angefeuchtet; in beiden Fällen muß demselben eine kleine Quantität von zerstoßenem braunem Kandis (Brustzucker) beigegeben werden. Sehr zweckdienlich ist es, das Schlagen des Vogels für die nächsten Tage auf irgend eine Weise zu verhindern. Es geschieht dies meist, indem man denselben ganz nahe zu einem andern Sänger hinhängt, oder auch, indem man ihn vollkommen dunkel, aber warm und zugfrei stellt, endlich durch Beigabe eines Weibchens. Im letztern Falle muß man den Käfig aber in ein anderes geheiztes Zimmer bringen, um die übrigen Sänger nicht zu sehr aufzuregen. Statt des Eifutters soll Manna, im Trinkwasser des Vogels aufgelöst und auf ein paar Tage gegeben, zur Wiederherstellung einer reinen Stimme dienen können; ich habe indeß selbst keine Versuche damit angestellt. Die Heiserkeit als Folge der Lungensucht kann meines Erachtens auf die eben angegebene Weise nur gelindert, nicht geheilt werden; sie ist an dem häufigen Schmatzen des Vogels kenntlich. Da die Lungensucht bekanntlich erblich ist, so ist nicht anzurathen, einen Vogel mit unreiner Stimme in die Hecke zu setzen; das Uebel kann also auf diese Weise in etwa verhütet werden.

Böcker.

Zur Fütterung.

Die Fütterung der Vögel während der Brutzeit mit hartgesottenem Ei geschieht in der Regel so, daß das Ei gerieben oder gehackt wird. Ich halte dieses Verfahren nicht blos für zeitraubend, sondern auch für schädlich. Denn nur zu schnell wird das Eiöl im Dotter ranzig und jedenfalls Eiweiß und Dotter bald trocken.

Ich pflege daher meinen Zuchtvögeln das Ei in der Schale vorzustellen, indem ich das Ei sammt der Schale in der Mitte durchschneide und die Schale als Teller benutze. Die angeschnittene Seite ist also nach oben gekehrt. Die Vögel picken nun die der Luft zugekehrten Theile immer wieder zuerst weg, so daß das Futterei frisch bleibt bis zuletzt. Auch picken sie sehr gerne die Schale selbst mit, was wiederum den Vögeln, namentlich den Weibchen sehr zuträglich ist. Für den Fall, daß man aber kein ganzes Ei auf einmal vorsetzen will, bewahrt man die nicht sofort zu benützende Hälfte so auf, daß die angeschnittene Seite unten liegt und die Schale nach oben steht. So bleibt diese Hälfte an einem kühlen Ort bis zum andern Tag ganz frisch.

G. Göller, Pfarrer in Alfdorf.

Zur Geflügelzucht und -Liebhaberei.

Verminderung der Inzucht unserer Hühner durch die Ausstellungen.

Es ist eine allbekannte Thatsache, daß die jahrelange Inzucht die Freude und den Ertrag an jeder Geflügelzucht sehr stark benachtheiligt. Zu ihrer größeren Beschränkung geschieht immer noch zu wenig. Die auf den Ausstellungen angekauften Hühner-Stämme sind regelmäßig Geschwister und dennoch wird von ihnen oft in vielen Generationen selbst weiter gezüchtet und ebenso werden Bruteier weiter begeben. Bei unsern hiesigen Liebhabern habe ich das Zurückgehen der Hühner in allen ihren guten Eigenschaften und die große Sterblichkeit der jungen Küken wiederholt beobachtet.

Die Herren Vorsitzenden und Leiter der Ausstellungen sollten es sich recht angelegen sein lassen, die Käufer auf den Ausstellungen zur Austauschung der Hähne bei gleichen Stämmen zu veranlassen. Bei den zur Verloosung angekauften Stämmen haben es die Herren selbst in der Hand mit Leichtigkeit Abhilfe zu schaffen. Die Hähne bei Stämmen derselben Rasse müßten grundsätzlich immer vertauscht werden. Es dürfte nicht unwichtig sein, bei der jetzt beginnenden Ausstellungsperiode darauf aufmerksam zu machen.

Hermann Köhne in Berlin.

Anderweitige Liebhabereien*).

Zur Kaninchen-Zucht und -Liebhaberei.

Im Interesse der Sache sei auch hier auf ein gemeinnütziges Unternehmen hingewiesen, mit dessen praktischer Ausführung der hiesige Architekt und Civil-Ingenieur, Herr Adolph Bantau gegenwärtig beschäftigt ist. Es handelt sich darum, nachdem die Fleischpreise in Berlin seit 20 Jahren um mehr als hundert Prozent gestiegen und für die ärmeren Klassen der Residenz fast unerschwinglich geworden sind, diesem Nothstande gegenüber eine wohlschmeckende, gesunde und doch billige Fleischnahrung zu beschaffen. Herr Bantau hofft dies mit Sicherheit durch eine in großartigem Maßstabe angelegte Zucht ausländischer Kaninchen-Rassen zu erreichen, deren Einzelgewicht bis auf 10 Pfd. steigt und deren Vermehrung bekanntlich sehr zahlreich stattfindet. Zur Anlage dieser Zucht hat Herr Bantau unweit des Hoppegartens ein Grundstück von etwa 63 Morgen käuflich erworben, und steht nun im Begriff daselbst die nöthigen Baulichkeiten aufzuführen, um seinen Plan so rasch als möglich zu verwirklichen. Im Interesse der gesunden volkswirthschaftlichen Idee hat sich ein Komite gebildet, das Herrn Bantau mit Rath und That zur Hand geht. Es gehören dazu die Herren Direktor Dr. Bodinus, der sich gleichzeitig bereit erklärt hat, die technische Oberaufsicht der Anlage zu übernehmen, Apothekenbesitzer Augustin, Medizinalrath und Prof. Dr. Hertwig, Kommerzienrath Jürst, Redakteur Dr. H. Kletke, Restaurateur J. Pinkow, Kommerzienrath Schering, Prof. Dr. Virchow.

Dieser, den Berliner Zeitungen entnommenen Mittheilung fügen wir noch die folgende aus Rheydt an.

Hier wird ebenfalls eine Kaninchenzüchterei im großen Maßstabe, so daß jährlich etwa 15,000 Kaninchen gezüchtet werden sollen, durch den Herrn Fabrikbesitzer P. Beines eingerichtet. Herr B. hat schon seit Jahren dieser Zucht sein Interesse zugewandt und ansehnliche Scharen von Kaninchen bereits in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz verbreitet. Jetzt hat er das zur Anlage nöthige Grundstück bereits angekauft, die nöthigen Bauten sind geplant und im Frühjahre soll mit denselben begonnen werden. Wenn wir ein wenig aus der Schule plaudern dürfen, geben uns die Versicherungen des Unternehmers die Gewißheit, daß außer der Kaninchenzucht in großem Maßstabe hiermit ein zoologischer Garten im kleinen Maßstabe, hauptsächlich für Geflügel, in- und ausländische Vögel u. dgl. verbunden sein wird, welcher dem Publikum zum Besuche geöffnet sein soll. Wir dürfen uns wol etwas darauf einbilden, daß also Rheydt nächst der Kaiserstadt

*) In dieser Rubrik werden wir hin und wieder auch einen ferner liegenden Gegenstand behandeln. D. R.

Berlin die zweite Anstalt dieser Art (wir meinen die Kaninchenzüchterei — nicht etwa den zoologischen Garten) in Deutschland binnen Kurzem aufzuweisen haben wird und wünschen dem Unternehmer den günstigsten Erfolg. (Rheydter Ztg.).

Zur Luftverbesserung.

Da, namentlich im Winter die Ventilation durch geöffnete Fenster für Zimmer, in denen Vögel gehalten werden oder auch für wirkliche Vogelstuben nicht so ausreichend stattfinden kann, wie in anderer Jahreszeit und somit die Zimmerluft oft jene Trockenheit annimmt, die allen Insassen unzuträglich sein muß, so finde ich es sehr gut und dem Wohlsein der Vögel förderlich, durch einen sog. Refraicheur, — sei es ein einfacher von Glas oder Metallröhrchen, sei es ein komplizirter mit Flasche und Gummischlauch — täglich einen Sprühregen zu veranstalten. Die feinen Wassertheilchen zertheilen sich sofort in der Luft und verbreiten eine angenehme Feuchtigkeit. Einzelne Papageien, so ein Gelbwangen-Kakadu (P. sulfureus) und ein Halsbandsittich (P. torquatus) ließen sich von mir mit größtem Behagen ihr Gefieder von dem feinen Staubregen einnäßen.

Pf. W. in F.

Aus den Vereinen.

Verein für Geflügelzucht in Köln.

Der soeben gewählte Vorstand des Vereins für das Jahr 1874 besteht aus den Herren

W. H. Pepys,	Direktor der Gasfabrik,	Präsident,
N. Funk,	„ des Zool. Gartens,	Vicepräsident,
Th. Hesse,	Kaufmann,	Sekretair,
Dr. O. Dumont,	prakt. Arzt,	Protokollführer,
Ch. J. Wintz,	Kaufmann,	Rendant,
C. J. Henkeshofen,	„	Bibliothekar,
L. Adler,	„	Inventarverw.

Bücher- und Schriftenschau.

„Bericht über die XX. Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft

zu Braunschweig, 5.—8. Juni 1873." Unter Mitwirkung des Sekretairs, Prof. Dr. Wilh. Blasius zu Braunschweig. Herausgegeben vom Präsidenten der Gesellschaft Ferd. Baron Droste (Braunschweig, Vieweg und Sohn). Es ist eine lobenswerthe Sitte gelehrter Gesellschaften, daß sie in Jahresberichten die Uebersicht ihrer Thätigkeit in dem letztvergangenen Zeitabschnitt geben. Dies ist insbesondere nothwendig für solche Vereine, welche keine eigene Zeitschrift für fortdauernde Veröffentlichungen besitzen. Durch derartige Jahresberichte, die in vielen Fällen noch ein mehr oder minder großes Opfer (Nachschuß) der Mitglieder erfordern, gewinnt die Thätigkeit eines solchen Vereins einen dauernden Werth weithin über seine eigenen Grenzen hinaus. Denn das wissenschaftliche Material in denselben kann für Forscher und Schriftsteller von hoher Wichtigkeit sein. In diesem Sinne war besonders der „Bericht über die 19. Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft" sehr reichhaltig. Auch der jetzt vorliegende bietet viele interessante und wichtige Mittheilungen:

Bericht über die Verhandlungen der Versammlung. — Ueber Telmatias gallinula (Sumpfschnepfe)-Eier aus Hannover, vom Postdirektor Pralle. — Ueber Varietäten des Rebhuhns (Perdix cinerea Briss.), von Ferdinand Baron Droste und Anderen. — Ueber Gallinago heterocerca (eine von Cabanis neu beschriebene ostsibirische Wasserschnepfe) von Prof. Dr. Wilh. Blasius. — Debatte über die Artselbstständigkeit von Anser minutus Naum. (Zwerggans) u. s. w. — Bericht über einige Publikationen des Jahres 1872, welche die europäische Ornithologie berühren, von Ferdinand Baron Droste und Prof. Dr. Wilh. Blasius. — Briefliche Mittheilungen, von Robert Collet: Bastard von Lagopus lapponicus und Tetrao tetrix L. (Lappländisches Huhn und Birkhuhn) im südlichen Norwegen; von Constantin: Surnia nisoria Behst. (Sperbereule) bei Potsdam; Friedrich Freiherr von Droste-Hülshoff: Seltene Gäste bei Königsberg und die Schwäne in Preußen; P. Höpfner: (Surnia nisoria Behst) bei Braunsberg; J. P. van Wickevoort-Crommelin: Kritisches aus Systematik und Nomenklatur, ferner über seltene Gäste in Holland (Rallus minutus Pall. [Zwergralle], Syrrhaptes paradoxus Pall. [Steppenhuhn] und dergleichen); H. Albarda: Seltenere Vorkommnisse in Holland; F. von Schilling: Merops apiaster (Bienenfresser) wahrscheinlich brütend am Kaiserstuhl in Baden. — Einige ornithologische Mittheilungen aus den Vogesen, vom Stabsarzt Dr. R. Blasius. — Gutachten im Betreff einer für das Herzogthum Braunschweig zu erlassenden Verordnung über Vogelschutz in (auszugsweiser Umarbeitung) von Prof. Dr. Wilh. Blasius.

Briefwechsel.

Herrn **H. H.** in Nürnberg: Ein Paar eingewöhnte Eisvögel, wie Sie solche gehabt und wieder gern zu erhalten wünschen, können wir Ihnen leider nicht beschaffen. Vielleicht meldet sich aber hierauf Jemand, der Ihren Wunsch erfüllen könnte. — Herrn Apotheker Bellingrodt: Mit bestem Dank erwarten wir demnächst gern Weiteres. — Herrn E. Dorovius, Werkstättenchef in Andritz: Sie haben Unrecht daran gethan, daß Sie Ihre guten Kanarienvögel so ohne weiteres an eine andere Fütterung gewöhnen wollten und auch der Rübsen, von welchem Sie uns eine Probe gesandt, taugt nicht zur Fütterung, denn er enthält sehr viel Hederichsamen beigemischt. Zuverlässige Quellen, aus denen der beste Sommerrübsen bezogen werden kann, sind hier in der „Gefiederten Welt" ja vielfach mitgetheilt. Um aber Kanarienvögel zu kaufen, „Sänger, deren Töne gleich denen der Nachtigal zur Seele dringen," wie Sie sagen, wenden Sie sich nur vertrauensvoll an Herrn Kontroleur Böcker in Wetzlar, auf dessen Reellität und Sachkenntniß Sie sich verlassen können. Er wird zur Absendung auch einen Zeitpunkt wählen, in welchem die kleinen Reisenden keinerlei Gefahr durch die Witterung mehr ausgesetzt sind.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Vogel-Ausstellung.

Die Ornithologische Gesellschaft in Basel beabsichtigt ihre 4. Allgemeine Ausstellung, verbunden mit Verloosung **am 6., 7., 8.** und **9. März 1874 im Stadtkasino dahier** abzuhalten

Besitzer von ausstellungswürdigem Geflügel als, **Zier- & Singvögel, Hühner, Tauben, Enten** 2c., werden zur Betheiligung freundlichst eingeladen.

Auszustellende Vögel sind bis **20. Februar** bei Herrn **Gustav Heitz dahier** anzumelden, müssen am 4. und 5. März hier eintreffen und sind lediglich an das Ausstellungs-Komité im Stadtkasino zu adressiren.

Loose à **50** Cts., sowie **Programme** welche das Nähere bezeichnen, können bei Herrn **Siegfried Merian dahier** bezogen werden.

Entrée für die ersten 2 Tage fr. 1 — für die folgenden Tage 50 Cts.

Basel, im Januar 1874. [58

Das Ausstellungs-Komité.

Verein für Geflügelzucht in Cöln „Columbia".

Die elfte Geflügel-Ausstellung des Vereins findet statt in den Tagen vom **1. bis 4. März**. Anmeldungen nimmt bis zum 22. Februar der Schriftführer H. J. Lenzen, Steinfeldergasse 25 entgegen.

42] Der Vorstand.

C. Hagenbeck's Handelsmenagerie in Hamburg

empfiehlt:

dunkel- und hellrothe Araras, Inka-, Nasen- und Rosa-Kakadus, Nymphen, Vaza-, Surinam-, Amazonen-, kleine Gelbkopf-, Brillen- und graue Papageien; kleine und große Alexander-, Halbmond-, gelbwangige, Gras-, auch einige junge hyacinthrothe Keilschwanz-Sittiche, (Conurus jendaya); blaue Gebirgslori, an Saat gewöhnt, zu heruntergesetzten Preisen, sowie auch noch einige Paare rothstirnige Neuseeländer (Ziegensittiche); importirte Undulatus oder Wellenpapageien; Madagaskar-Inseparables (Psittacula cana) zu heruntergesetzten Preisen; und schöne Sperlingspapageien; rothe, graue und Dominikaner Kardinäle, Rothbrust-Staare von Chili, Kuh- und Epauletten-Staare, gemeine indische Maina zu billigen Preisen. Kleine und große Beo, Jamaika-Trupiale, Wander- und Spottdrosseln, chinesische Spottdrosseln, chinesische Heber-Drosseln, (Garrulax chinensis), ihrer schönen flötenden Töne halber in Indien und China sehr beliebt; Fuchs-, Gold-, Madagaskar- und Rothkopf-Weber; 2 Arten indische Weber, (Ploceus hypoxantus und Ploceus bengalensis), Safranfinken, brasilianische Silberschnäbel; Muskat- und Reisvögel; getigerte Bengalisten, Helenafasänchen und Zebrafinken.

Gleichzeitig mache ich hiermit die vorläufige Anzeige, daß ich in den nächsten 14 Tagen eine bedeutende Sendung indischer Vögel bekomme, worunter sich mehrere seltene Arten befinden. [43

Kanarienvögel

mit mehreren Rollen und anderen schönen Stücken à 4—8 Thlr. Emb. für 1—2 Vögel 8 Sgr., versendet unter Garantie des **gesunden Eintreffens** bis auf 3tägige Postentfernung

44] **R. Maschke** in St. Andreasberg, Harz.

C. Reiche in Alfeld

erhielt neue Zufuhr von rothen Kardinälen. Am Lager sind noch einige Spottdrosseln. [45

Zu verkaufen:

1 amerikanische Spottdrossel, 1 Nachtigal, 1 rothrückiger Würger, 1 Singdrossel, 1 schwarze Amsel, gesunde und gute Vögel.

46] **J. Ch. Romeiser**, Frankfurt a. M.

Schwarze Schwäne zu verkaufen, (Cygnus atratus),

1 Paar zweijährig, 1 Paar einjährig. Sehr schöne und gesunde Exemplare. **J. J. Scheitlin** in St. Gallen.

47] Hausvater des Bürgerspitals.

Gesucht werden

2 Paar Amaranths,
1 Paar Gürtelgrasfinken,
1 Weibchen „
1 Paar Helenafasänchen,
1 Paar grüne Bengalisten,
1 Weibchen „ „

und **angeboten**

2 Paar 1jährige Goldfasanen, à Paar 12 Thlr. } incl. Em-
1 „ Texter Weber, à „ 4 „ } ballage.

[48 durch **Oskar Vetter** in Ludwigsburg.

Ein prächtiges Pfauenpaar ist billig zu verkaufen bei

49] **Heinrich Franke** in Arnstadt i. Th.

Gesuch.

Zwei Paar lebende wilde **Stockenten**, oder auch nur ein Männchen wünscht man zu haben. Adressen an d. Expd. [50

„Ein Paar **Grasittiche** (Brotogerys tirica) sind um 3 Thaler (incl. Emballage) zu verkaufen oder gegen Prachtfinken zu vertauschen. **Jos. Sell**, Deggendorf,

51] Niederbaiern".

Angeboten: Kalifornische Wachteln, 10 Thlr. pro Paar.
Gesucht: weiße und scheckige Pfauen.
Bestellungen und Offerten unter Nr. 17. N. Z. befördert die Expedition d. Bl. [52

H. E. Frühauf,

Holzwaarenfabrik in Schleusingen,

empfiehlt **Nistkästen** für inländische Vögel, in allen Größen nach Dr. Gloger's Angabe, das Dutzend von 1½ bis 3 Thlr. Bei großen Partien wird bedeutender Rabatt gewährt. [53

Für Kanarienzüchter!

Empfiehlt solide gearbeitete Nistkästen, à Dtzd. 1 Thlr. 18 Gr., große Flugbauer, in welchem circa 25—30 Vögel bequem Raum haben, à Stück 2½ Thlr.

54] **C. Lange** in St. Andreasberg am Harz.

Vorläufige Benachrichtigung.

Die vielfachen geehrten Anfragen um Auskunft über künstliches Brüten und Brütapparate bin ich, wegen mangelnder Zeit, nicht immer im Stande genügend und prompt zu beantworten, weshalb ich mich zu der Mittheilung veranlaßt sehe, daß durch mich keine Brütapparate mehr zu beziehen sind, und daß eine zweite Auflage meiner Anleitung über künstliches Brüten und Aufzucht des Geflügels unter der Presse ist und in kürzester Zeit im Buchhandel erscheinen wird. Diese zweite Auflage enthielt 3 Zeichnungen verschiedener Apparate, so wie Beschreibungen noch mehrerer anderen Apparate mit genauer Maßangabe der Größen, und nebst meinen neuesten Erfahrungen über das künstliche Brüten.

Das Erscheinen der Anleitung wird hier angezeigt.

55] **J. H. Krantz.**

Naturalienhandlung von Wilhelm Schlüter in Halle a. S.

Die Preisverzeichnisse Nr. 37 über Vogeleier in Gelegen und Nr. 38 über Säugethiere in Bälgen, ausgestopft und in Spiritus sind erschienen und stehen auf Wunsch gratis und portofrei zu Diensten. [56

Rudolph Schmidt,

Samenhandlung, Erfurt, empfiehlt

Sommerrübsen	à Ctr.	6¼ Thlr.,
Kanariensamen	„	6⅔ „
Mohn, in hellblau u. weiß	„	9⅓ „
Hirse, weiße	„	7¼ „
„ Blut-	„	4½ „
Hanf	„	5½ „
Sonnenblumenkörner	„	18 „
Mehlwürmer	½ Liter	1⅓ „

57] sowie alle Sorten Blumen- und Gemüse-Sämereien.

Abgerichtete („gelernte") **Gimpel** oder **Blutfinken** wünscht in größerer Anzahl zu kaufen die Vogelhandlung von

D. Dufour

58] in Berlin, Behrenstraße 50.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Bernau.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 5. Februar 1874. Nr. 6.

Inhalt:

Der weiße Storch, sein Nutzen und sein Schaden. —
Kanarienvogel-Zucht in Andreasberg (Schluß). —
Neue und seltenere Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts. Scheitel-Ruderfink. —
Noch ein Winter-Versandtkäfig. —
Käfige für Kanarienvögel. —
Mittel gegen Mäuse in der Vogelstube. —
Anfragen und Auskunft: Wellensittiche; rother Kardinal. —
Briefliche Mittheilungen: Lerchennest; Prämiirung, Züchtung. —
Die Internationale landwirthschaftliche Ausstellung zu Bremen. —
Briefwechsel. — Anzeigen. —

Der weiße Storch, sein Nutzen und sein Schaden.

Von E. Michelsen, Direktor der landwirthschaftlichen Lehranstalt in Hildesheim.

Im Frühling erlaubte ich mir die Bitte an sachverständige Männer, ihre Erfahrungen über den fraglichen Gegenstand im Interesse der Sache mittheilen zu wollen.

Diese Aufforderung hat einen erfreulichen Erfolg gehabt, indem mir von den nachfolgend genannten Herren, denen ich hiermit öffentlich meinen Dank ausspreche, Zuschriften in der fraglichen Angelegenheit zugegangen sind. Es haben Mittheilungen gemacht die Herren: G. Berlin, Königl. Feldmesser in Greifswald; Julius Hagemeister in Stralsund; Christiansen, pens. Oberförster und Forstrath in Rensing bei Kellinghusen; J. H. Fries, früher in Hadersleben, jetzt in Kiel; Pastor Koch in Gressow bei Grewesmühlen (Mecklenburg); Thierarzt G. P. A. Hansen (in Chr. Alb. Koog's „Sonntagsblatt der Flensburger Nachrichten" 1873, 13); Küster K. Hagemeister in Retzelkow bei Zinnowitz; Privatförster Dall in Drosedow bei Loitz (Neu Vorpommern); Wirthschafts-Inspektor Haulbach in Nixdorf bei Ploen (Holstein); E. Regenborn auf Schloß Gilgenburg (Ostpreußen); Prof. Dr. Altum in Neustadt-Eberswalde (durch den „Zoologischen Garten"); Gutsbesitzer Hein in Dorf Paaris, Kreis Rastenburg (Ostpreußen); Scholten in Kl. Bürgersdorf, Kreis Rastenburg (Ostpreußen); Postagent G. Rogge in Tiegenort (Westpreußen); Horn in Oslanin bei Putzig (Westpreußen); stud. agr. J. Brümmer z. Z. in Halle a. S.; Bürgerschullehrer C. Palm in Wormditt (durch „Allg. Ztg. f. d. Land- und Forstwirthe", 1873, 41); S. Goeze in Owschlag (Schleswig); endlich Revierförster C. Haberkorn in Stockfee bei Ploen (Holstein).

Die Zuschriften bieten eine Reihe interessanter Einzelbeobachtungen, welche zu veröffentlichen ich für angebracht halten darf, weshalb ich im Nachfolgenden den Haupt-Inhalt der einzelnen Beiträge mittheile:

1. Herr Berlin: „Der Storch ist landwirthschaftlich betrachtet überwiegend nützlich, abgesehen von Fällen, in denen sich große Schaaren „güster" (d. h. unbeweibter) Störche sammeln. Frösche, Kröten und Schlangen sucht er hauptsächlich im Frühjahr; später zieht er Gewürm, namentlich Engerlinge vor, auch zum Füttern der Jungen, so lange selbige noch klein sind. Die größeren Jungen werden mehr mit Mäusen u. dgl. gefüttert, wobei freilich ein gelegentliches Wegfangen von jungen Hasen, Feldhühnern,

Schnepfen, Strandläufern, Kiebitzen u. s. w. vorkommt. Auch ist er als Bienenräuber ertappt. Sein Fischfang ist nur unbedeutend, in Nothfällen; sonst würde er den leicht fangbaren Karauschen in klaren Teichen mehr nachstellen. Eigentlicher Fischfang des Storches ist von dem Einsender besonders bei dem starken Schneefall vom 7.—9. April 1837 beobachtet, wo der Storch auch um Nahrung bettelnd in die Dörfer kam".

2. Herr J. Hagemeister: „Der Bruder meines Vaters, Besitzer von Kl.-Bremerhagen (Kreis Grimmen, Reg.-Bezirk Stralsund), liebte die Thiere sehr, besonders aber sein Storchpaar, welches, wie er behauptete, schon seit dem Jahre 1792 auf der Scheune sein Heim hatte. Zugleich war mein Oheim aber eifriger Bienenzüchter, und hatte für diese seine Lieblinge in der Nähe des Bienenstandes stets ein Stück Feld mit weißem Klee besäet, um denselben eine leicht zugängliche Nahrung zu verschaffen. Nun hatte er bemerkt, daß sein Storchenpaar mit Vorliebe den Klee besuchte und von den Blüten pickte, ihm stieg der Verdacht auf, daß die Störche seinen Bienen nachstellen. Nachdem die Sachverständigen des Orts, d. h. der Förster und der Schullehrer, mit seiner Wahrnehmung bekannt gemacht waren, wurden auch von Diesen Beobachtungen angestellt, welche den Verdacht gegen die Störche bestätigten. In Folge dessen wurde der alte Hausfreund von den drei Richtern zum Tode verurtheilt, der Förster erschoß ihn, und es zeigte sich beim Oeffnen des Kropfes, daß derselbe 182 Bienen enthielt."

3. Herr Christiansen: „Vor längeren Jahren hatten sich in verschiedenen Dörfern im nördlichen Angeln (Herzogth. Schleswig) die Störche stark vermehrt, so daß wahrscheinlich ihre gewöhnlichen Nahrungsquellen nicht ausreichten. Als daher zahmes junges Federvieh, vorzüglich junge Enten und Gänse, stark von den Störchen mitgenommen wurde, vereinigten sich die Einwohner der betr. Ortschaften zur Vertreibung der Störche".

4. Herr Fries hält das Engerlingfangen des Storches nach seinen Beobachtungen für so bedeutend, daß landwirthschaftlich dadurch aller andere Schaden aufgewogen wird; derselbe sah oft 20—30 Störche hinter seinen 3—5 Pflügen hergehen und emsig sammeln. Ziemlich große Fische fange der Storch auch, aber nur selten.

5. Herr Koch hat ein Storchnest 20 Jahre lang unmittelbar vor seinen Augen beobachtet, aber nie gesehen, daß der Storch größere lebende Thiere, z. B. junge Hühner, Hasen und große Schlangen, ins Nest getragen habe, auch ihn nicht beim Fischen ertappt. Der Storch sei entschieden nützlich, abgesehen vom Bienenfressen.

6. Herr Hansen räth, aus jedem Storchnest ein fast flügges Junge zu nehmen, selbigem die Flugfedern zurückzuschneiden und ihn im Winter zu füttern, um ihn als Mäusefänger zu behalten.

7. Herr K. Hagemeister giebt das Fangen von Gras- und Wasser-Fröschen, Maulwürfen, Lerchen und anderen Erdnistern zu, leugnet aber den Fischfang nach seinen Beobachtungen an der sehr fischreichen Peene. Das gelegentliche Fangen von Hasen berühre die Volkswohlfahrt nicht. Vielmehr sei der Storch durch sein massenhaftes Wegfangen von Mäusen, Engerlingen, Maikäfern, Regenwürmern, Schnecken, Kreuzottern u. s. w. einer der allernützlichsten Vögel. — „In manchen Dörfern Neu-Vorpommerns giebt es 30—40 Storchnester; doch wird man alle die nützlichen Thiere, welche der Storch gelegentlich mit vertilgt, dort ebenso häufig finden, wie in denjenigen Gegenden, wo es keine Störche giebt." Den täglichen Verbrauch an Ungeziefer für ein Storchpaar mit 4—5 Jungen berechnet Herr H. auf zwei Metzen.

8. Herr Dall, Förster in Neu-Vorpommern, hält den Storch für einen großen Räuber; er hat eine gute Viertelmetze Bienen auf einmal im Kropfe des Storches gefunden; daher will er höchstens ein Storchnest in jedem Dorfe dulden.

(Fortsetzung folgt.)

Kanarienvogel-Zucht in St. Andreasberg.

(Reisebericht von Kontroleur W. Böcker in Wetzlar).

(Schluß).

Außerhalb des Harzes hört man nicht selten die Klage, daß ein guter Sänger von Sperlingen verdorben sei. Obgleich meiner Ansicht nach ein schlechter Kanarienvogel mehr verderben kann, als zehn Sperlinge, so sind diese mit ihrem beständigen Schilpen doch unläugbar eine Last für den Kanarienzüchter, namentlich, wenn sie sich in der Nähe des Brutzimmers einnisten. In Andreasberg gab es nur sehr wenige Sperlinge. Flüge von zwölf Köpfen und darüber waren schon selten. Sie waren hier auch nicht beliebt; gelegentlich wurde wol unter sie geschossen; eine große Bedeutung legte man aber der Sache nicht bei. Ihre geringe Zahl war Folge von unzureichenden Nahrungsmitteln. Es wird dort keine Körnerfrucht gezogen und Pferde, von deren Nahrung sie hätten mitzehren können, werden dort auch wenig gehalten. Dagegen gab es daselbst auffallend viele Katzen; fast in jeder Züchterei waren deren eine oder zwei. Meine Frage, ob denn dieselben den Vögeln nicht gefährlich würden, wurde überall verneint. Die Katze eines Züchters saß, während ich mich bei ihm aufhielt, längere Zeit so nahe bei einem auf dem Tische stehenden Kanarienvogel, daß sie ihn mit einem kleinen Sprunge hätte erreichen können. Sie machte keine Miene dazu, bekümmerte sich überhaupt nicht um den Vogel und auch dieser ließ sie ganz unbeachtet; er sang fast ununterbrochen. Die Frau eines andern Züchters erzählte mir über die Harmlosigkeit der Katzen in Beziehung auf die Vögel folgenden von einem andern Züchter verbürgten interessanten Vorfall: „Vor einigen Jahren hatten wir unsere Vögel in Bauerchen gesteckt und diese reihenweise in einem Zimmer aufgeschichtet. Die Mäuse machten sich das bald zu Nutze, sie fraßen den Vögeln das Eifutter weg. Wir haben darauf unsere einjährige Katze des Abends auf eine halbe Stunde in das Zimmer ein-

gesperrt, nachdem wir vorher die Reihen von der Wand abgerückt hatten, damit die Katze von allen Seiten Zutritt zu den Mäusen hatte. Die Katze wurde dabei nicht im Geringsten beaufsichtigt und die Maßregel wurde sogar an mehreren Abenden wiederholt. Die Katze hat die Mäuse fortgefangen, aber keinem Vogel etwas zu Leide gethan".

Ein Züchter, dessen wörtliche Auslassungen ich oben mehrfach wiedergegeben, theilte mir folgenden ebenso interessanten Vorgang mit: „Vor drei Jahren, begann er, waren mir eine große Anzahl Vögel aus einem Fluggebauer entkommen; sie flogen in der Stube umher, in der sich unsere Katze zufällig eingeschlossen befand. Es war Niemand von uns zu Hause. Als ich von der Arbeit heimkehrte, sah ich zu meinem Schrecken die Katze am Fenster sitzen und die Vögel über ihr hin und herfliegen. Sie drehte dann den Kopf nach den kleinen Wagehälsen um, machte aber keinerlei Anstalten, sie einzufangen und so habe ich denn auch keinen einzigen Vogel dabei eingebüßt. Die Katze war damals neun Jahr alt, sie ist noch heute ein rüstiges Thier." Die Wahrheit dieser Mittheilung bezweifle ich nicht im Geringsten; habe ich doch bei einem hiesigen Züchter mich mehrfach von dem guten Einvernehmen zwischen Katzen und Vögeln überzeugen können. Dieser Züchter hatte eine dreistufige Treppe zu einem Käfig eingerichtet und mit verschiedenen Vögeln besetzt. Der Käfig stand beständig am Boden und die Katzen schlichen dicht um ihn herum, kümmerten sich aber um die Vögel gar nicht, wie diese dann ihrerseits sich vor ihnen nicht fürchteten.*)

Die Gewohnheit scheint auch der Katzen andere Natur zu sein, und das beständige Zusammenleben derselben mit den Vögeln ihre natürliche Feindseligkeit gegen diese zu unterdrücken. Gleichwol versäumen es die Züchter in Andreasberg nicht, wenn sie sich eine neue Katze angeschafft, diese einer kleinen Dressur zu unterwerfen, indem sie ihr einen Vogel — meist wird dazu ein Kernbeißer genommen — vorhalten und ihr dabei einige Püffe versetzen.

Der Vogel wird dann losgelassen; zeigt die Katze noch irgend ein Verlangen nach dem schmackhaften Bissen, so wird die Strafe wiederholt. Es soll selten vorkommen, daß im Laufe der Zeit mit der Katze eine kleine Wiederholung dieses Verfahrens vorgenommen werden muß. Es giebt noch eine ergötzliche Art, den Katzen von vornherein die Lehre mit auf den Weg zu geben, sich vor den Vögeln zu hüten. Die Frau eines Bergschmiedes theilte mir hierüber Folgendes mit. „Wenn wir eine neue Katze erhalten, so nehmen wir einen Krünitz — Kernbeißer — und halten ihn der Katze, die eine andere Person unterdessen festhalten muß, unmittelbar vor das Gesicht. Der muthige Krünitz beißt dann die Katze in die Nase. Wir lassen ihn hierbei so lange gewähren, bis die Katze blutet. Beide Thiere werden dann losgelassen. Der Krünitz, dem vorher die Flügel beschnitten waren, hüpft in der Stube herum, die Katze läuft schreiend zur Thür und sucht das Weite. Wenn bei uns einmal ein Vogel aus dem Bauer entwischt, flüchtet sich die Katze unter den Sopha".

Ich gebe diese Mittheilung, wie ich sie empfangen habe; mir will es scheinen, daß man der Katze bei einer derartigen Behandlung nicht gut verwehren könne, die Liebesbezeugungen des „Krünitz" in gleicher Weise zu erwidern.

Da, wo die Katzen den Mäusen nicht beikommen können, in den eigentlichen fliegenden Hecken, bedient man sich zur Vertilgung der lästigen Nager der Lochfallen.

Zur Vertreibung der Milben wendet man verschiedene Mittel an. Der eine Züchter gebrauchte dagegen Anisöl, ein anderer gewöhnliches Rüböl, ein dritter Petroleum und ein vierter endlich eine Mischung von Petroleum und Tabakssaft. Mit diesen Mitteln werden die Ritzen der Nistkästchen und des Käfigs, die Enden der Springhölzer, überhaupt alle Stellen, wo sich Milben eingenistet, täglich bestrichen. Um sie aus den Nistkasten fernzuhalten, gebrauchte man, von dem oben erwähnten Kalkanstrich abgesehen, in einigen Züchtereien noch eine besondere Vorsicht. Man hatte, statt die Nistkasten dicht zu fügen, etwa zwei Millimeter breite Spalten gelassen. „In diesen klaffenden Fugen", meinte ein Züchter, „halten sich Milben schon nicht auf; sie bedürfen dazu enger Ritzen". Allerdings; sie finden solche Ritzen aber auch immer in den hölzernen Bauern und oft an Stellen, die den Züchtern nicht leicht zugänglich sind. Springhölzer von ausgehöhltem Hollunder oder Rohr werden in den von mir besuchten Hecken nicht verwandt.

Verschiedene Züchter finden die eigentliche Wirkung der erwähnten Oele in dem lästigen Geruch derselben; das ist meist, wie ein Züchter auch richtig bemerkte, ein Irrthum. Die tödtliche Wirkung jener Mittel liegt darin, daß man, indem man die bezüglichen Stellen des Bauers und der Brutkästchen bestreicht, die seitlichen Luftlöcher der Milben, ihre Athmungswerkzeuge, mit den fettigen Oelen überzieht, sie verschließt. Die Milben ersticken demnach, wie eine Fliege in einem Glase Oel. Rüböl, dessen Geruch doch die Vögel nicht belästigt, reicht bei öfterer Anwendung hiernach auch vollkommen aus, die Milben auf eine möglichst geringe Zahl zurückzuführen; ganz frei davon ist kein gebrauchter Käfig, kein Nistkasten nach der ersten Brut.

Da in Andreasberg mit wenigen Ausnahmen nur ein- bis dreijährige Vögel gehalten werden, so können Erkrankungen derselben auch nicht häufig vorkommen. Am meisten tritt die Unterleibsentzündung auf, namentlich unter den jungen Vögeln. Ueber die dort beobachteten Krankheiten lasse ich einen sehr erfahrenen Züchter, dem zugleich als Händler viele Tausende von Vögeln im Laufe der Zeit durch die Hände gegangen sind, reden: „Verschiedene Vögel," so äußerte derselbe, „leiden auch außerhalb der Brutzeit an großen, weichen Exkrementen; es ist eine Art Unverdaulichkeit, eine Folge von vielem Weichfutter, daher auch trocknes Futter als Heilmittel dient. In der Hecke kann ein derartiger, von kranken Vögeln herrührender

*) Mit Bezug hierauf werden wir demnächst einen Aufsatz „Des Vogelhändlers Katze" hier bringen. D. R.

Auswurf, der von den andern Exkrementen sich durch eigenthümliche Färbung unterscheidet, leicht zu Ansteckungen führen, da die Exkremente von den Vögeln häufig verzehrt werden. Es ist mir namentlich ein Fall bekannt, wo in einer Züchterei eine derartige Epidemie ausgebrochen war. Um dieselbe möglichst einzuschränken, entfernte der Züchter alles Moos aus seiner Hecke. Ein anderer Züchter sah dasselbe auf dem Hofe liegen; er wußte nicht von jener Epidemie, nahm das Moos an sich und verwandte es in seiner eigenen Hecke. Dasselbe mochte aber wol etwas beschmutzt sein; denn die Vögel dieses Züchters wurden nun ebenfalls krank.

„Gegen Unterleibsentzündung verwende ich viel Ei mit etwas gestoßenem Zwieback. Vor etwa acht Jahren habe ich einmal für einen Händler, der nach Montevideo und Buenos Ayres handelte, eine ganze Hecke solcher rothkranken Vögel ausgesteckt. Die Vögel waren im warmen, dunstigen Zimmer gewesen, wie wir denn überhaupt unsere Vögel nach der Mauser zu warm halten; sie waren zwar von Hause aus sehr stark, hatten aber alle roth entzündliches Fleisch und ein fühlbar vortretendes Brustbein; sie machten mir nicht wenig Sorge. Die Vögel wurden zunächst ins Freie gebracht und hier wurden sie mit Sommerrübsen und einem kleinen Zusatz von Kanariensamen, den sie früher ebenfalls bekommen, außerdem aber mit vielem Ei und etwas gestoßenem Zwieback gefüttert. Zwei der Vogel gingen ein; die übrigen wurden aber bei solcher Behandlung in kurzer Zeit gesund.

„Ein bräunlicher Flecken unterhalb des Brustbeins, der sogenannte Leberfleck, kommt bei verschiedenen Vögeln ebenfalls vor

„So lange dieselben dabei eingefallen sind, d. h. so lange der Unterleib nicht aufgetrieben ist und der Flecken sich blos auf der einen linken Seite des Leibes befindet, hat es damit nicht viel auf sich. Man wendet dagegen mit gutem Erfolg trockenes Futter und namentlich Hanf an. Hanf ist auch bei magern Vögel gut, da er sehr fett macht; auch Winterrübsen — Winterraps — hat Fettleibigkeit zur Folge, er wird aber hier nicht gefüttert.

„Beim Aussstecken der Vögel habe ich öfter die Warnehmung gemacht, daß bei den Männchen hin und wieder ein erbliches Mal, eine sich fettig ansehende kleine Warze mitten auf dem Bauche vorkommt. Dieselbe hat etwa die Größe eines Nadelknopfes; sie ist vollständig unschädlich.

Bei den Weibchen habe ich ein derartiges Mal nie wahrgenommen.

„Bei einigen Vögeln kommen am Kopfe kleine Bläschen vor; ein solcher Vogel verlor in Folge einer Eiterung seinen Schnabel. Die Krankheit ist eine unheimliche, nicht zu heilen und sehr ansteckend.

„Vögel, die an entzündlicher Fettdrüse litten, habe ich auch gekannt: man drückt letztere sanft aus; weiter ist nichts nothwendig.

„Vögeln, die während der Mauser erkranken, giebt man wol Bolus — rothe Kreide — ins Trinkwasser.

„Epilepsie tritt häufig als erbliche Krankheit auf; die damit behafteten Vögel zirpen eigenthümlich, wenn sie, was namentlich beim Füttern geschieht, geängstigt werden. Sie ängstigen sich überhaupt sehr leicht. Man behandelt sie daher behutsam, und gießt ihnen bei einem Anfall etwas Wasser auf den Kopf. Das hilft wenigstens in einzelnen Fällen.

„Kranke junge Vögel in der Hecke rühren häufig von leberkranken Alten her. Vögel mit einem Leberfleck sollte man daher nicht zur Zucht verwenden.

„Heiserkeit kann mitunter eine Folge von unzweckmäßiger Fütterung sein; namentlich werden manche Vögel vom Kanariensamen heiser.

„Kranke Vögel erkennt man schon an ihrem trüben Auge, ihr Gesang ist meist matt, er kann aber in der Folge sehr lang werden; laut singende Vögel bekommen selten lange Touren; sie müssen stets dunkel hängen.

„In der Hecke kann man manchen jungen Vogel ohne vorherige Erkrankung verlieren, wenn die Weibchen dieselben verlassen. Man vertheilt solche Jungen in andere Nester; ich habe dabei die Erfahrung gemacht, daß die Männchen solche Ziehkinder leicht annehmen, während sich einige Weibchen nicht um sie kümmern".

Soweit mein Gewährsmann, dessen freundliche Mittheilungen gewiß den Dank aller Züchter verdienen. —

Andere Vögel, außer den Kanarien, habe ich nur in einem Hause angetroffen, wo letztere nicht gehalten wurden; es waren einige Distelfinken, ein Kernbeißer und irre ich nicht, auch ein Hänfling. Die Züchter der Kanarien haben an deren Gesange vollständig genug; zur Zeit befindet sich nicht einmal eine Nachtigal in Andreasberg und dieser Umstand dürfte zur Genüge beweisen, wie sehr die Zucht guter Kanarienvögel geeignet ist, die Liebhaberei an einheimischen Sängern allmälig zu unterdrücken und so in der Frage des Vogelschutzes eine Rolle zu spielen, mit der jeder Freund der gefiederten Geschöpfe sich einverstanden erklären wird.

Neue und seltenere Erscheinungen des Vogelmarkts.

Im zoologischen Garten von Berlin sind, außer vielen andern neuangekommenen und vorzugsweise interessanten Vögeln, ganz besonders beachtenswerth vier Köpfe einer höchst seltenen oder ganz neuen Finkenart (Fringilla — Coryphospinga — pileata) aus Brasilien. Nach Cabanis' „Museum heineanum" ein Scheitel-Ruderfink, welcher dem bekannten kleinen Kubafink (Gold- oder Gelbkragen; F.—Euethia—canora verwandt ist. Noch näher verwandt ist der Atlasfink (F. jacarini); wol zu unterscheiden von dem Atlasvogel, (A. ultramarina); auch Springfink*) genannt, welcher, obwol selten, doch in den Vogelsammlungen ebenfalls lebend vorkommt.

H. W.

*) Beschrieben in Nr. 4 der „Gefiederten Welt" v. J. In meiner Vogelstube mehrmals parweise vorhanden gewesen; auch in der des Herrn Graf Roedern in Breslau. D. R.

Noch ein Winter-Versandtkäfig.

Mit Freuden las ich die Beschreibung des Winter-Versandtkäfigs von Herrn Gudera; denn einen solchen benutze ich schon seit dem Spätherbst d. J. 1872, wie er auch von einem hiesigen Tischler angefertigt im März d. J. 1873 auf der Ausstellung in Zürich mit Nr. I. prämiirt wurde. Der innere Käfig wird bei mir in den Schutzkäfig so hineingeschoben — der Verschluß wird von der Rückwand gebildet, — daß er überall gleich weit von den Außenwänden absteht. An den beiden seitlichen Außenwänden befinden sich 2 Löcher, etwa $1^1/_2$ Centimeter, an einem andern 3 Cm. weit, im letzteren Falle vergittert, damit, wenn die Thüren an dem Käfig etwa über Nacht offen bleiben sollten, keine Mäuse den Insassen störenden Besuch abstatten können. Durch diese Löcher bildet sich nun rings um den Innenkäfig herum ein gehöriger Luftaustausch. Die Vorderseite besteht bei meinem Käfige aus einer Scheibe, mit ganz feinem Gitter gegen Anprall geschützt. Das feine Gitter hindert auch das allzuleichte Einblicken und Aufscheuchen der Vögel.

Der Verschluß besteht in einem Brettchen, das in 2 Falzen gehend von oben nach unten eingeschoben, oben mit Blechriegel geschlossen wird. Durch die Schleife des Blechriegels wird eine Schnur oder ein Drat gezogen und der Verknüpfring unter Siegel gelegt. Trink- und Futtergefäße können wie in jedem anderen Versandtkäfig eingehängt werden. Mit Vortheil sind diese meine Käfige bei Winter- und auch Frühlingszeit nach Berlin, Wetzlar ꝛc. gebraucht worden. Da die Käfige allerdings schwerer ins Gewicht fallen als die einfachen, kommt das Porto ziemlich hoch, doch um des Wohlseins der befiederten Lieblinge willen zahlt gewiß jeder Liebhaber gerne einige Groschen mehr.

Pfarrer Winckler in Fischenthal.

Käfige für Kanarienvögel.

Nach verschiedenen mislungenen Versuchen, fertigte mir Herr Frühauf in Schleusingen, Rollerkäfige mit Schiebvorrichtung an, die ich allen Liebhabern und Züchtern empfehlen kann. Dieselben sind 36 Cm. lang, 21 Cm. hoch, 17 Cm. tief und vorn mit Dratgitter versehen. Die Futter- und Trinkgeschirre sind an beiden Seiten in drehbaren Erkern angebracht. Die Reinigung läßt sich leicht und gründlich vornehmen. Die Schiebvorrichtung, um dem jungen Roller das Licht zu entziehen, ist zweckentsprechend. Ohne weitere Mühe lassen sich ein Dutzend Käfige aufeinanderstellen. Der Preis ist angemessen und berechnet Herr Frühauf das Dutzend mit 12 bis 14 Thlr.

Pfannenschmid in Emden.

Mittel gegen Mäuse in der Vogelstube.

In der festen Ueberzeugung, daß nur sehr wenige Vogelliebhaber den Kriegspfad gegen die listigen, ruhelosen und gefräßigen Mitbewohner der Vogelstuben nicht betreten haben, will ich Ihnen von einer bedeutenden Schlappe berichten, die ich diesen ungebetenen Gästen soeben beibrachte. Die reiche Literatur der beständigen Fehde zwischen vernunftbegabtem Zweibein und instinktvollem Vierbein*) verzeichnet ja leider fast nur Niederlagen oder kaum nennenswerthe Erfolge unsererseits und so dürfte es den Vogelfreunden angenehm sein, wenn ich ein einfaches Verfahren angebe, durch welches dem höchstentwickelten Erdengeschöpfe sein berechtigtes Uebergewicht auf einem kleinen Gebiete dieses Riesenkampfes ums Dasein wieder verschafft wird.

Meine Vogelstube war lange Zeit frei von der Stadtplage der Mäuseeinquartierung, bis sich vor etwa 4 Wochen deren Anwesenheit doch bemerklich machte.

Sie hatten von den angrenzenden Räumen aus geschickt minirt und so endlich mittelst doppelter Bresche in das gewitterte Eden Eingang gefunden. Was war zu thun? Ruhig den kleinen Siegern ihren Erfolg ausnützen lassen, wäre mit dem Ruin der Liebhaberei gleichbedeutend gewesen. Katze und Gift waren nicht anwendbar; Fallen hätten die Thiere bei der sonstigen Futtermenge klüglich gemieden und auch der empfohlene süße Gipsbrei schien mir eher die zart organisirten Vögel zu gefährden, als die zähllebigen Mäuse. Da kam mir die Idee, die Thiere durch ihren starken Fortpflanzungstrieb zu verderben. Eine mittelgroße Kiste wurde mit weichem Stroh gefüllt, überall zugeschlagen und nur an einem Kistenwinkel die beiden aneinander stoßenden Bretter etwas von einander entfernt, so daß in halber Kistenhöhe eine enge, längliche Oeffnung hergestellt ward. Diese Kiste setzte ich in einen Stubenwinkel dicht an die Wand, sodaß auch das kleinste Vögelchen sich nicht dort verkriechen, dagegen die gewandte Maus sehr leicht hineinschlüpfen konnte. Nach einigen Tagen verstopfte ich die Mauselöcher an den Wänden kunstgerecht und, nachdem ich eine hinreichende Eingewöhnung der Thiere in dem verlockenden Schlupfwinkel — sonst zeigt die Stube unten nur kahle Wände — nach einiger Zeit annehmen konnte, trug ich eines schönen Wintertags die Kiste, das Loch vorsichtig zuhaltend, in den Hof, goß heißes und kaltes Wasser quantum satis in die Oeffnung und nahm den Deckel ab. Ein Paar Thiere entkamen noch durch kühne Flucht; die Masse aber, alte und junge wurden, schon halbtodt, mitleidslos erschlagen. Einige 30 Opfer bedeckten das Schlachtfeld.

Seitdem bin ich frei von dieser Plage; sehe auch nun einem neuen Einbruch in meinem Vogelstuben-Frieden gefaßter entgegen, da ich ein verhältnißmäßig praktisches Vertilgungsmittel jetzt besitze. Dies sei hiermit empfohlen; denn welcher Freund der gefiederten Welt ließe von diesen gefräßigen Vogelliebhabern seine Anlagen durchstöbern und das beste Futter ungestraft verzehren und verderben und wer fände Gefallen an diesen pfeifenden und kletternden Langschwänzen!

Dr. St. in Straßburg.

---

*) Wir meinen, daß der Unterschied zwischen dem hochtrabenden Worte Verstand, gegenüber dem noch von keinem Verständigen erklärten „Instinkt“ nur zu häufig unhaltbar sei.
D. R.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Sie versprachen Herrn Kilians Anfrage in No 1. binnen Kurzem ausführlich zu beantworten, und da erlaube ich mir zu der angeregten Frage noch Einiges hinzuzufügen. Mein Pärchen Wellensittiche oder vielmehr das Männchen musicirt fast den ganzen Tag. Das Weibchen nimmt indessen seine Werbung schief auf, und so zärtlich auch die Vögelchen einander krauen und aus dem Kropfe füttern — die junge Frau scheint weiland Krimhildens Gürtel zu besitzen; sie fertigt den minnenden Gatten mit Schnabelhieben ab und jagt ihn mit furchterregendem Kreischen im Bauer umher. Dabei knabbert sie wol am Flugloch eines der Brutkästen und verweilte auch oft minutenlang darin. Auffallend war es, daß die bräunliche Wachshaut des Weibchens sich beim Eintritt der Mauser ganz allmälich blau färbte. Seitdem ist die Schnabelwachshaut hellblau geblieben, während sie beim Männchen sich dunkler blau färbte. Ich erwähne diesen Umstand, da ich ihn in keinem Handbuch für Vogelliebhaber erwähnt gefunden. Die Färbung des Gefieders ist beim Männchen entschieden lebhafter, so daß man sie in weitester Entfernung unterscheiden kann. Des Nachts habe ich schon mehrere Male die Vögel ängstlich umherflattern hören und fand am Morgen den Boden des Käfigs mit Federn bestreut. Was ich vermuthete bestätigte eine Beobachtung meiner Frau, die eines Abends bemerkte, wie eines der Vögelchen von der Spreße herabfiel und zu flattern begann. Ich habe von vornherein Stäbe verschiedener Stärke und einen Ast vom Kirschbaum hineingesteckt. Wenn es ein Mittel giebt, das Herabfallen zu verhindern, so bitte ich, dasselbe freundlichst mitzutheilen, da das Fluggeräusch auch meine übrige kleine Gesellschaft beunruhigt und ihnen oft die schönsten Federn kostet. Ich füttere nur mit Hafer und Kanariensamen. Letzteren fressen sie mit Vorliebe.

Böhmer, Gymnasiallehrer in Konitz.

Antwort: Jedenfalls hat es in einer Kränklichkeit des Weibchens seine Ursache, daß die Vögel nicht nisten. Ein Beweis hierfür ist es auch, daß die Vögel Abends von den Sitzstäben herunterfallen. Ein ganz gesunder Vogel kann nur durch Aufscheuchen und Beängstigung dazu gebracht werden; wenn also keinerlei Störungen — die Sie doch hoffentlich von den Vögeln fern halten — dies veranlassen, so leidet das Weibchen vielleicht an einer krankhaften Schwäche, leichten Lähmung oder dergleichen. Beobachten Sie die Vögel nun genau oder greifen Sie das Weibchen einmal heraus und untersuchen Sie es sorgfältig. Im Uebrigen verfahren Sie nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber". Der Aufsatz über die Zucht der Wellensittiche kommt noch in diesem Vierteljahr, doch wird er etwas verzögert durch die Herstellung von Abbildungen der Nistkasten. D. R.

Frage: Im Herbst erhielt ich einen rothen Kardinal geschenkt, der aber recht traurig im Gefieder beschaffen war. Derselbe hat sich schön herausgemustert, aber bis jetzt noch keinen Laut von sich gegeben. Heute finde nun an dem Kopfe desselben, geschwürartige Auswüchse, wie eine Erbse groß, woran der Vogel viele Schmerzen zu haben scheint, obwol er sonst noch ziemlich munter ist. Ich füttere Hanf und Kanariensamen, auch nimmt er manchmal einen Mehlwurm, jedoch nicht immer. Alle andern Sämereien, als: Hirse, Mohn, Rübsen und auch Grünzeug verschmäht er. Giebt es gegen diese Auswüchse ein Mittel und warum singt der Vogel nicht?

Friedr. Mahnfeld in Mirow.

Antwort: Die Auswüchse ätzen Sie vorsichtig mit Höllenstein fort. Dabei geben Sie dem Vogel täglich 8—10 Tropfen wässrige Rhabarbertinktur ins Trinkwasser. Hoffentlich wird er durch diese Kur, die Sie durch 14 Tage fortsetzen können, gesund und dann, zumal im nahenden Frühjahr wird er auch singen.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ende Oktobers entdeckte ich bei einer Jagdpartie in Estorf an der Sieg, ein Nest mit noch unbefiederten Lerchen, sicher eine Merkwürdigkeit zu dieser Zeit. Ebendaselbst kommt der sehr bunte Eisvogel vor, der an Farbenpracht den prächtigsten Tropenvögeln nicht nachstehen dürfte.

Th. Hesse in Köln.

. . . In Nr. 3 lese ich eine Klage des Herrn Dorpmüller, über die Nichtbenachrichtigung, ob man prämiirt worden ist, und stimme dieser Klage vollkommen bei, wie ich auch aus dem jener Nummer beiliegenden Ausstellungsprospekte des thüringischen Centralvereins mit Freuden gesehen habe, daß dieser die Prämiirung der Vogelhändler von Profession nicht zuläßt, und mit Recht; denn es ist für den Liebhaber nicht möglich, neben dem Händler mit einer kleinen Sammlung zu konkurriren, wenn er nicht gerade über sehr bedeutende Mittel zu gebieten hat Dazu kommt noch, daß bei den meisten Ausstellungen die Mehrzahl der Herren Preisrichter leider mitnichten ein sicheres Urtheil über die ausgestellten Sing- und Ziervögel haben, wenigstens in Süddeutschland, wo, von fremdländischen Ziervögeln abgesehen, die Prämiirung sich meist auf möglichst unschöne, aber daher um so werthvollere(?) Kanarienvögel, ohne Rücksicht auf den Gesang, erstreckt. Da dies leider so ist, so kann sich Herr Dorpmüller auch nicht wundern, daß seine selbstgezüchteten Grauedelfinken kein großes Aufsehen gemacht haben, denn wer sieht es diesem unschönen Vögelchen an, welch' herrliche, unübertreffliche Stimme dasselbe hat! Mit den andern Klagen aber hat Herr Dorpmüller Unrecht; er kann nicht verlangen, daß er ohne Weiteres dafür prämiirt werde, da es doch unmöglich ist, Jeden, der selbstgezüchtete Vögel ausstellt, zu prämiiren.*) Anders natürlich, wenn diese Vögel zum ersten Male gezüchtet sind. Eine besondere Schwierigkeit in der Züchtung habe ich übrigens bei diesen Sängern nicht gefunden; ich züchte dieselben seit vier Wintern und habe — abgesehen davon, daß frische Weibchen etliche Male am ersten Ei zu Grunde gingen, was am Ende meine eigene Ungeduld verschuldete — jeden Winter mehrere Bruten aufgebracht und kann in der Art, wie die Vögel sich betragen, nichts finden, was die Zucht gegenüber von anderen Vögeln schwieriger erscheinen ließe. Nebenbei gesagt, trenne ich, sobald das Gelege fertig ist, das Pärchen. Viel schwieriger erscheint mir die Zucht der Päpste, obgleich das Weibchen im Brüten sich nicht stören läßt, aber sobald die Jungen da sind, geht der Aerger an, und doch glaube ich, daß es an nichts liegt, als am Futter; ich vermuthe nämlich, daß in der frühesten Morgenstunde diese Vögel schon das Bedürfniß nach Grünzeug und Mehlwürmern haben, und sich nicht mit Ameiseneiern u. s. w. begnügen; wenn nun dieß beim ersten Erwachen fehlt, so sehen sie in der Noth um Fleisch nicht mehr darauf, woher es kommt und hauen ihren eigenen Jungen die Köpfe ein, um zum Hirne zu gelangen. Dadurch bin ich zum Ent-

*) In Anbetracht dessen, daß glückliche Züchtungen vorzugsweise interessanter oder seltener Vögel bis jetzt im Ganzen doch verhältnißmäßig erst selten erreicht werden, hat Herr Dorpmüller, unseres Erachtens, doch recht. Die Züchtung des Grauedelfinken ist bis jetzt doch erst höchstens vier Liebhabern gelungen. D. R.

schluß gekommen, immer noch spät Abends den mit Jungen gesegneten Vögeln frisches Aetzfutter zu reichen, so daß dieselben Morgens in der Frühe versorgt sind, ohne zu einer Zeit, wo bekanntlich viele Vögel der Begattung obliegen, zu stören. Natürlich gebe ich dann sobald als möglich neues Futter. Auf diesem Wege, brachte ich auch in diesem Winter meine Prachtfinken auf, hier wo an manchem Tage es erst um 9 Uhr hell wird und um 4 Uhr Nacht ist. Den vollkommenen Beweis werde ich allerdings erst erhalten, wenn ich auf diesem Wege heuer meine Päpste wieder aufbringe*).

Dr. Fr. Franken in Baden-Baden.

Die Internationale landwirthschaftliche Ausstellung zu Bremen

findet vom 13.—21. Juni 1874 unter dem Protektorat des deutschen Kronprinzen statt. Der bekannte und hochgeschätzte Ornithologe Dr. Otto Finsch, Konservator am Museum in Bremen, ist Sektions-Chef für die III. Abtheilung, umfassend: Geflügel Sing- und Schmuckvögel. Anmeldungen bis spätestens zum 1. April bei dem Bureau der Internationalen landwirthschaftlichen Ausstellung zu Bremen. Es wird gewünscht, daß man angebe, ob die angemeldeten Thiere selbst gezüchtet, importirt oder angekauft sind. Einlieferung der Thiere spätestens bis zum 11. Juni Abends 6 Uhr, ebenfalls an das Bureau. Singvögel, welche auf Gesang prämiirt werden sollen, sind zwei Tage früher einzuliefern. Für zweckmäßige Behälter der Thiere wird von Seiten des Ausstellungs-Komité's gesorgt, die Sing- und Schmuckvögel werden jedoch in den mitgesandten Käfigen in einem passenden Lokale ausgestellt. Jede auszustellende Nummer darf nur aus einem Paare oder einem Stamm von 3 Stück derselben Rasse oder einem einzelnen Thiere bestehen, bei Sing- und Schmuckvögeln wird eine Ausnahme gestattet und für die Nummer dieser ist keine Stückzahl vorgeschrieben. Für jede Nummer Geflügel, Sing- oder Schmuckvögel wird eine Anmeldungsgebühr und Standgeld von zusammen $7\frac{1}{2}$ Sgr. erhoben. Singvögel, welche auf Gesang prämiirt werden sollen, haben pro Stück 15 Sgr. extra zu bezahlen. An Futtergeld wird für jede Nummer Sing- und Schmuckvögel $7\frac{1}{2}$ Sgr., für jede Nummer Tauben, Fasanen und Wildhüner, Wachteln 10 Sgr., für jede Nummer anderes Geflügel 15 Sgr. bezahlt. Alle diese Gebühren sind bei Rücksendung des Anmeldebogens zu entrichten und verfallen als Neugeld, falls die angemeldeten Thiere nicht, oder nicht rechtzeitig gestellt werden. Falls ein Verkaufspreis nicht angegeben ist, dürfen die ausgestellten Thiere auf der Ausstellung nicht verkauft werden. Von allen Verkäufen wird eine Provision von 10 pCt. erhoben. Zum Zwecke der Verloosung wird ein Theil aller ausgestellten Thiere vom Ausstellungs-Komité angekauft. Die Rücksendung der nicht verkauften Thiere geschieht auf Kosten und Gefahr der Aussteller; doch werden voraussichtlich sowol die Dampfschiffe des Norddeutschen Lloyd als auch sämmtliche Eisenbahnen entweder ganz freie Rückfracht oder doch sehr ermäßigte Preise bewilligen. Für die III. Abtheilung sind im Ganzen 3000 Mark Banko (1000 Thlr.) zur Preisertheilung ausgesetzt, und zwar: I. für ausgezeichnete Hühner 1400 Mark; II. für ausgezeichnete Fasanen, Wildhühner, Wachteln, in- und ausländische 200 M.; III. für ausgezeichnete Trut- und Perlhühner 100 M.; IV. für ausgezeichnete Pfauen 50 M., V. für ausgezeichnete Schwäne 50 M.; VI. für ausgezeichnete Gänse 200 M.; VII. für ausgezeichnete Enten 200 M.; VIII. für ausgezeichnete Tauben 250 M.; IX. für ausgezeichnete Singvögel, Kanarienvögel, Wildvögel, in- und ausländische, sowie Bastarde 300 M.; X. für die besten Käfige oder einzelne Exemplare ausgezeichneter Schmuckvögel 250 M. Alle Zuschriften sind an das „Bureau der Internationalen landwirthschaftlichen Ausstellung in Bremen" zu richten. Von demselben kann man auch die Anmelde-Formulare, sowie das Programm beziehen, aus welchem letzteren wir eben nur die hauptsächlichsten Bestimmungen im Auszuge hier gegeben haben.

*) Sobald meine Papstfinken an bloßes eingeweichtes und gut ausgedrücktes Eierbrot, neben Mehlwürmern und Mischfutter, sich gewöhnt hatten, fütterten sie regelmäßig glücklich die Jungen auf, ebenso die Sonnenvögel. Dr. R.

Briefwechsel.

Herrn A. F. Wiener in London: Schade, daß Ihnen die Pitta eingegangen ist. Die Untersuchung hat eigentlich keinerlei bemerkenswerthe Ursachen ergeben. Der Lori von den blauen Bergen (P.—Trychoglossus—swainsoni) war ein altes Männchen und sehr fett. Die Untersuchung hat gezeigt, daß er an einer Gehirnaffektion gestorben ist, also war vielleicht irgend eine Aufregung oder auch zu starke Hitze die Ursache Im Uebrigen vielen Dank und Näheres brieflich. —

Herrn **W. S.** in Wismar: Hier ist ja bereits oft die Rede davon gewesen, daß man Kanarienvögel auch in einem ungeheizten Raume ohne Schaden überwintern kann. Weiteres über die Pflege und Fütterung lesen Sie in meinem Büchelchen „Der Kanarienvogel" (welches für 15 Sgr. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) nach. — Herrn G. H. Möller in Rippentrup: Aus Ihrem Briefe werden wir gelegentlich einige Mittheilungen veröffentlichen.

Anzeigen.

Vogel-Ausstellung.

Die Ornithologische Gesellschaft in Basel beabsichtigt ihre 4. Allgemeine Ausstellung, verbunden mit Verloosung **am 6., 7., 8. und 9. März 1874 im Stadtkasino dahier** abzuhalten.

Besitzer von ausstellungswürdigem Geflügel als, **Zier- & Singvögel, Hühner, Tauben, Enten** ꝛc., werden zur Betheiligung freundlichst eingeladen.

Auszustellende Vögel sind bis **20. Februar** bei Herrn **Gustav Heitz** dahier anzumelden, müssen am 4. und 5. März hier eintreffen und sind lediglich an das Ausstellungs-Komité im Stadtkasino zu adressiren.

Loose à **50** Cts., sowie **Programme** welche das Nähere bezeichnen, können bei Herrn **Siegfried Merian** dahier bezogen werden.

Entrée für die ersten 2 Tage fr. 1 — für die folgenden Tage 50 Cts.

Basel, im Januar 1874. [59

Das Ausstellungs-Komité.

Verein für Geflügelzucht in Cöln „Columbia".

Die elfte Geflügel-Ausstellung des Vereins findet statt in den Tagen vom **1. bis 4. März.** Anmeldungen nimmt bis zum 22. Februar der Schriftführer H. J. Lenzen, Steinfeldergasse 25 entgegen.
59] Der Vorstand.

Die zweite allgemeine

Vogel- und Geflügelausstellung

des

Nürnberger ornithologischen Vereins

findet

vom 21. Februar bis 2. März 1874

in den Sälen des **Contumazgartens zu Nürnberg** statt.

Auszustellende Thiere, sowie Käfige, Volieren, Nistkästen 2c. sind spätestens bis **12. Februar l. J.** bei dem Vereinssekretär Herrn **Fr. Schönberg,** Königsstraße 87, schriftlich unter Angabe des etwaigen Verkaufspreises anzumelden und müssen den **19. Februar** in dem Ausstellungslokale franco eintreffen, adressirt an das **Ausstellungs-Komité des Nürnberger ornithologischen Vereins im Contumazgarten.** Standgeld wird nicht erhoben. Die Rücksendung erfolgt franco. Verkaufsprovision 10 Procent.

Eine **Prämiirung,** in Diplomen bestehend, findet am 2. Ausstellungstage statt. Das Resultat derselben wird seiner Zeit in der „Gefiederten Welt" und den „Blättern für Geflügelzucht" bekannt gemacht werden.
60] Der Vorstand.

Kaufgesuch.

Große schwere franz. Kaninchen 10—14 M. alt. Fr. Offerten unter K. 100 an die Expedition dieser Zeitung! [61

---

1 Stamm **Aylesbury-Enten** und 4 Paar **französische rothe Rebhühner** (Perdrix rouge) werden **zu kaufen gesucht.** Preis-Offerten erbittet das

Dominium Tiefensee bei Bitterfeld
62] (Prov. Sachsen).

Wünsche ein Paar Singsittiche gegen hier gezüchtete Wellensittiche umzutauschen. **W. Eichentopf,** Detmold. [63

C. Reiche in Alfeld

erhielt frische Zufuhr an rothen Kardinälen, Grundröteln, blauen Glanzstaaren von Kuba und Gelbwangen Sittichen. [64

Zu verkaufen:

1 Paar nistfähige Nymphen, 8 Thlr.,
1 „ „ Wellensittiche, 7 Thlr.
65] **Gustav Meyer,** Werther in Westfalen.

Fünf einjährige und ein zweijähriger Schwan, schöne Exemplare, sind billig verkäuflich. Adressen in der Expedition d. Bl. [66

Sechs bis acht Paar lebende Rebhühner werden zu kaufen gesucht. Adressen an die Exped. d. Bl. [67

Gut getrocknete Ameiseneier à Pfd. 20 Sgr. empfiehlt
68] August Dietz in Burg bei Magdeburg

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Die

„Gefiederte Welt",

herausgegeben

von Dr. **Karl Ruß.**

Jahrgang I. & II. (1872/73).
69] Preis à Thlr. 2 — broch.

Kanarienvögel

mit mehreren Rollen und anderen schönen Stücken à 4—8 Thlr. Emb. für 1—2 Vögel 8 Sgr., versendet unter Garantie des **gesunden Eintreffens** bis auf 3tägige Postentfernung
70] **A. Maschke** in St. Andreasberg, Harz.

Schwarze Schwäne zu verkaufen,

(Cygnus atratus),

1 Paar zweijährig, 1 Paar einjährig. Sehr schöne und gesunde Exemplare. **J. J. Scheitlin** in St. Gallen.
71] Hausvater des Bürgerspitals.

Für Kanarienzüchter!

Empfiehlt solide gearbeitete Nistkästen, à Dtzd. 1 Thlr. 18 Gr., große Flugbauer, in welchem circa 25—30 Vögel bequem Raum haben, à Stück 2½ Thlr.
72] **C. Lange** in St. Andreasberg am Harz.

Ich habe noch 10 Stück echte **Harzer Kanarien-Hähne,** schöne Roller à Stück 8, 10, 12 Thlr. abzugeben und garantire für gesunde und fehlerfreie Thiere! — Roller-Weibchen habe noch 20 Stück à 10 Sgr. abzulassen!
Hannover, Januar 1874. **Carl Tolle.** [73

Ein Beo-Beo oder Pagodendrossel, (Gracula religiosa), Männchen, Pracht-Exemplar, jung und zahm, auch schon einige Worte sprechend, ist à Thlr. 50 zu verkaufen.

Reflektanten belieben sich sub La. H. Nr. 100. an die Expedition zu wenden. [74

Ein Paar Paradies-Wittwen, 1 Paar Napoleonsvögel, 1 Astrild, 1 Tigerfink, M., 1 Silberfasänchen, M., sind billig zu verkaufen. Auch werden gute, ausländische Sänger dagegen in Tausch genommen. Offerten sub A. Nr. 200 besorgt die Expedition. [75

Ein Kanarienvogel,

echter Nachtigalschläger,

welcher so rein und täuschend wie eine Nachtigal schlägt und wie es selten einen solchen Zweiten giebt, (ist bei Nachtigalen in der Lehre gewesen und daher werthvoll für Kenner) steht verkaufen. — Auch sind noch 1 und 2jährige sehr schöne Schwäne preiswürdig zu verkaufen.

H. Schulze, Altenburg (Herzogth. S.)
76] Wallstraße 9.

Ein prachtvolles kanadisches Hirschgeweih (Wapiti), Sechszehnender, 33 Pfund schwer, ferner ausrangirte Kistenkäfige mit Zinkkasten, passend als Zuchtgebauer für Prachtfinken und dgl. hat billig abzugeben **R. Hieronymi,** Braunschweig. [77

Ein großer, weißhaubiger, ganz zahmer **Kakadu** ist billig zu verkaufen. **Fritz Ritzsch,** Frankfurt a. O. [78

Carl Capelle, Hannover,

empfiehlt alle Sorten Vogelfutter in Prima, staub-, geruch-, und hederichfreier Waare zu billigen Preisen, als

ff. Sommersaat,
„ Kanariensaat,
„ blaue u. weiße Mohnsaat,
„ weiße span. Hirse,
„ Hanfsaat,
„ do. gebrochen od. gequetscht,
„ gesch. Hafer,
„ do. Buchweizen. [79

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Bernau.

Dieser Nummer liegt ein Programm der landwirthschaftlichen Ausstellung zu Bremen bei.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 12. Februar 1874. Nr. 7.

Ausland.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Verfolgung der Schwalben in Frankreich. — Ornithologische Neuigkeit. — Der weiße Storch, sein Nutzen und sein Schaden (Fortsetz.) — Das Vogelhaus des Herrn Wiener in London. — Eine Perl der Singsittiche. — Aus den deutschen Vogelstuben: Paradies-Widahfink. — Briefliche Mittheilungen: Ueberwinterung im Freien; Singsittich. — Anfragen und Auskunft. — Ausstellungen: „Cypria" in Berlin. — Aus den Vereinen: Ornithologischer Verein in Stettin; Jahresbericht des Vereins für Geflügelzucht in Köln: Monatsbericht der 3. Sektion des Vereins für Vogelfreunde in Würtemberg. — Anzeigen. —

Zum Vogelschutz.

Verfolgung der Schwalben in Frankreich.

Im Departement der Gironde werden alljährlich etwa 1,076,000 Schwalben unter dem Vorwande, Piplerchen zu fangen, getödtet und zum Verspeisen verkauft. Anfangs September werden die Sümpfe und Wiesen in der Umgebung von Blahe, St. Ciers, Bourg, Magrine, Ambes, Cubzac, Gauriaguet und St. Fevla-Grande abtheilungsweise mit Netzen von 15 bis 20 Meter Länge bedeckt. Kurz vor Beginn der Wanderung der Schwalben sammeln sich dieselben aus den verschiedensten Gegenden Europas an diesen Orten in berächtlicher Zahl. In dem Augenblicke, da sie sich zum Antritte der weiten Reise gemeinschaftlich erheben und noch niedrig am Boden hinstreichen, werden die Netze angezogen, die Vögel zu Gefangenen gemacht, sogleich getödtet, ihrer Federn beraubt, und so für die Beamten der Regierung, welche für den Vogelschuß bestellt sind, unkenntlich gemacht, oder, was wahrscheinlicher ist, die Wächter sind bestochen und lassen sich gerne täuschen. Darf es unter solchen Verhältnissen Wunder nehmen, wenn die Schwalben immer seltener werden?

Die maßgebenden Behörden, denen die Regelung des internationalen Vogelschutzes jetzt obliegt, seien auf diese in den Zeitungen veröffentlichte Notiz dringend hingewiesen. D. Red.

Ornithologische Neuigkeit.

Das Neueste und Interessanteste in der Vogelkunde ist, daß man wahrscheinlich den für längst ausgestorben gehaltenen Dodo-Dronte noch lebend auf den Samoa-Inseln, (im südlichen stillen Ocean, zu den Navigatoren gehörend), aufgefunden hat. Diese Nachricht bringen Zeitungen aus Hawaii und zwar veröffentlicht es der brittische General-Konsul auf der Havaiigruppe, Mr. Manley Hopkings; es wird also nicht daran zu zweifeln sein. H. W.

Der weiße Storch, sein Nutzen und sein Schaden.

Von E. Michelsen, Direktor der landwirthschaftlichen Lehranstalt in Hildesheim.

(Fortsetzung).

9. Herr Kaulbach schoß einen Storch, der 12 junge Karpfen von Fingerlänge im Kropfe hatte, sah ein anvermal, daß er 2 junge Hasen nach einander niederschluckte, ferner, daß ein Storch eine ganze Kette von 12 jungen Rebhühnern vertilgte und be-

hauptet auch seine große Schädlichkeit unter jungem Hausgeflügel.

10) Herr Regenborn bestätigt die Beobachtungen von Nr. 9 in Bezug auf junge Hasen und Rebhühner, meint aber, daß das Fischfangen nur gelegentlich vorkomme.

11. Herr Dr. Altum (s. „Ill. landw. Z.") hält im Allgemeinen den Storch für überwiegend schädlich, in Mäusejahren aber für sehr nützlich. Derselbe fand bei Neustadt-Eberswalde eine solche Masse von Storch-Gewöllen, aus Mäusehaaren und Käferresten zusammengesetzt, daß man einen großen Wagen damit hätte anfüllen können.

12. Herr Hein: „Vor etwa 50 Jahren erhielt ich von meinem Lehrer die Aufgabe, die Storchnester des Dorfes zu zählen, es waren damals deren 72. Thurm und Kirche hatten 5 Nester, unter den 15 Gehöften gab es einen Hof mit 12, einen zweiten mit 11 Nestern. Heute sind überhaupt nur 22 vorhanden, davon 6 auf einem Hofe. — Ein zurückgebliebener junger Storch verschlang zu einer Mahlzeit bis zu 21 Mäuse, ebenso bis 13 ungerupfte Sperlinge. Thiere, welche länger als 24 Stunden vorher getödtet waren, mochte er nicht mehr. Bei vorkommenden Schlächtereien war er sehr eifrig im Verschlingen von Fleischabgängen und geronnenem Blute. Ungereinigte Gedärme nahm er nicht, gut gereinigte schienen ihm jedoch sehr zu munden. — Der Volksglaube prophezeit bei einem aus dem Neste geworfenen Ei ein nasses, bei einem herausgeworfenen Jungen ein trockenes Jahr".

13. Herr Scholten bestätigt namentlich das Fangen von Rebhühnern durch den Storch.

14. Herr Rogge legt ein gutes Wort für „meinen Herrn" ein, den er, als Wirthschafts-Inspektor in Pommern und Preußen, liebgewonnen hat. Feldheimchen, Mäuse und selbst Wasserratten vertilgt er, Fische nur aus austrocknenden Gräben; auch der Schaden an Erdnistern sei nicht bedeutend. Daß er junge Enten verzehre, sei ihm nur einmal in einem dürren Jahre vorgekommen.

15. Herr Horn schoß einen Storch herunter, als er das 12. junge Rebhuhn den Jungen zutrug; ebenso hat er die Schädlichkeit des Storches für junge Hasen, Wiesenschnarrer, Lerchen u. a. beobachtet. Fischerei betreibt der Storch dort im Juni und Juli oft bis gegen Mitternacht. Freilich zählte Herr H. auch, daß ein Storch in dem Mäusejahre 1861 in einer halben Stunde 32 Mäuse und einen Maulwurf verschlang. — Im Jahre 1847 fand Herr H. auf einem Kleefelde 88 „güste" Störche bei einander, 1872 sogar 98 Köpfe, die alles Eßbare verschlangen. Ein dem Herrn H. bekannter Bienenzüchter fand über 300 Bienen in dem Kropf eines geschossenen Storches.

16. Herr Brümmer erklärt, nur in Mäusejahren sei der Storch überwiegend nützlich. Unter den Fischen fange der Storch namentlich viele Aale. Auch müsse man den an den Strohdächern verursachten Schaden berücksichtigen. Ebenso sei in den baumlosen Marschen sein Wegfangen der Lerchen recht unangenehm, indem andere Singvögel sich dort wenig halten können. Das Wegfangen junger Hühner und Enten hat Herr B. nicht bemerkt.

17. Herr Palm hält den Storch für desto entbehrlicher, jemehr die Sümpfe, Brüche und moorastigen Wiesen (wo ihm die Natur die Polizei über die kleinen Sumpfthiere übertragen) durch die Kultur verschwinden. In manchen Orten werde der Storch schon jetzt durch die veränderten Verhältnisse, namentlich als Vertilger nützlicher Vögel überwiegend schädlich.

18. Herr Goeze meint, daß der Schaden des Storches gegen seinen Nutzen nicht ins Gewicht falle, und daß er Fischfang nur aus Noth im Frühjahr betreibe.

19. Herr Haberkorn, Revierförster in Stockfee endlich, der als Knabe längere Zeit einen schwarzen und einen weißen Storch zahm besessen, hat denselben mehrfach unschädliche und giftige Schlangen zu gleicher Zeit vorgeworfen; erstere suchten sie mit Begierde zu erlangen, letztere umgingen sie aber jedes Mal, und wenn ich sie am Umgehen hinderte, zogen sie mit Flügelschlag und struppigem Gefieder ab, obschon sie Hunger hatten." Trotzdem Herr H. aber als Jäger den Storch zu den überwiegend schädlichen Vögeln zählt, will derselbe doch nicht zu einem Vertilgungskriege auffordern, vielmehr begrüßt er „den alten Stelzfuß in jedem Frühjahre mit besonderem Vergnügen."

(Schluß folgt).

Das Vogelhaus des Herrn August F. Wiener in London.

(Eigene Mittheilung).

Bevor ich die Einzelheiten meines neuen Vogelhauses beschreibe, möchte ich vorausschicken, aus welcher Ursache ich dasselbe so eingerichtet, wie es jetzt ist.

In einer früheren Anlage hatte ich einen 60 Fuß langen, 10 Fuß breiten und ebenso hohen Raum, in einer treibhausähnlichen Bauart, d. h. mit einer soliden Rückmauer, einem halb beschattetem Dache und vollständig verglaster Fronte. Diese 60 Fuß hatte ich in drei Abtheilungen von je 20 Fuß getheilt. Die mittlere Abtheilung enthielt Fonteine, Felsengrotte und Farrnkräuter. In den Abtheilungen rechts und links befanden sich die Vögel hinter einem Drahtgitter, welches 4 Fuß von der Glasfronte entfernt einen Gang von dieser Breite dem ganzen Vogelhaus entlang frei ließ. Zwischen dem Drahtgitter und der Rückmauer blieben also 6 Fuß Breite für die eigentliche Vogelstube.

Die Heizung geschah vermittelst Heißwasser-Apparat. Die Röhren lagen verstärkt dem Boden des Ganges entlang durch gußeiserne Gitter versteckt und der eigentliche Gang war mit Steinguttäfelchen gepflastert. Der Boden der Käfige aber bestand aus Portland-Cement, mit welchem auch alle Wände verputzt waren.

Die Einrichtung sah wundernett aus, zeigte sich aber in der Hauptsache als verfehlt, und zwar aus folgenden Ursachen.

1) Die Temperatur erreichte im Sommer sehr leicht einen für die Thiere schädlichen Höhepunkt, weil

das nach Treibhausart konstruirte Dach die Sommerwärme unmäßig steigerte; und dagegen half alle Ventilation nichts.

2) Das Herumfliegen von zwei bis dreihundert Vögeln veranlaßte, daß die Pflanzen in der Nebenabtheilung trotz vielfältigen Bespritzens staubig wurden und meist abstarben.

3) Es bleibt räthselhaft, wo die ersten Mäuse hergekommen, aber die Blumentöpfe und die künstlichen Felsen boten dem ersten Mausepaar so vorzügliche Schlupfwinkel, das Vogelfutter so vorzügliche Nahrung, daß die Mäuse sich in schrecklicher Weise vermehrten und ich dieselben nie mehr loswerden konnte, während sie Vogelnester, Eier und junge Vögel nach einander vernichteten;

4) Der Beschauer trat zwischen das äußere Licht und die Vögel, wodurch die Thierchen unnöthig aufgeregt und gleichzeitig die Anlage eines Vorkäfigs in freier Luft unmöglich gemacht wurde.

Diese Nachtheile suchte ich in der Anlegung eines neuen Vogelhauses zu umgehen. Vor Allem suchte ich den Vögeln möglichst viel Sonnenschein zu bieten, dabei aber eine übermäßige Sonnenhitze zu vermeiden. Aus diesem Grunde brachte ich zunächst die Vögel unmittelbar an die Fenster, welche ich so groß wie nur immer möglich herstellen ließ. Das Dach, anstatt es wie ein Treibhaus nach der Sonnenseite zu senken, ließ ich der Sonne entgegen aufsteigen und erzielte dadurch wesentlich mehr Sonnenschein und bedeutend weniger Gluthitze. Das Dach besteht aus zolldicken Brettern, auf welche Filz gedeckt ist und dieser ist wiederum mit Zink belegt. Diese einfache Einrichtung bewährt sich als kühl im Sommer und warm im Winter und ist dabei hier zu Lande billiger als Schiefer.

Die Fenster meines Vogelhauses gehen nach Süd-Ost und Süd-West. Die solide Mauer der Rückseite schützt also gegen Norden und Westen. Die einfache Backstein-Mauer recht warm und trocken herzustellen, war leicht dadurch zu erreichen, daß die Mauer, anstatt solide, hohl gebaut wurde, der Art, daß zwischen den äußern und innern Backsteinen etwa 4 Zoll freier Raum blieb.

Um den Mäusen das Eindringen zu den Vögeln unmöglich zu machen, habe ich die Käfige 2 Fuß höher als den Gang gelegt und ebenso viel höher als das äußere Terrain und alle möglichen Schlupfwinkel vermieden.

Am anschaulichsten beschreibe ich die innere Einrichtung vielleicht dadurch, daß ich die Leser bitte, mit mir aus dem Billiardzimmer in das Vogelhaus zu treten. Drei Stufen führen herunter in den Gang, der 6 Fuß breit und mit Steingut gepflastert ist. Rechts haben wir also die Rückmauer, welche, wie vorhin beschrieben, hohl und warm gebaut ist und eine Verkleidung von Gips und Cement hat. Vier Fuß vom Boden längst dieser Mauer läuft ein 2 Fuß breiter Sims von Schieferplatten und diese bilden die kleinen Seitenkäfige, deren jeder 3 Fuß breit, und $4\frac{1}{2}$ Fuß hoch ist. Vorder- und Seitenwände dieser Wandkäfige sind aus Drahtgitter von etwa $\frac{5}{8}$ Zoll Weite geflochten und so eingerichtet, daß das Gitterwerk leicht herausgenommen werden kann, wenn die Mauer abgewaschen oder das Holzwerk gereinigt werden soll. Schiebladen habe ich ganz vermieden. Ueber der Schieferplatte ist eine etwa 3 Zoll breite Holzleiste, die klappenartig geöffnet wird. Durch diese Klappen wird der Schieferboden mit Sand bestreut und alle Unreinlichkeit mit Leichtigkeit herausgekehrt. Durch dieselbe Klappe wird den Vögeln Wasser und Nahrung in Porzellannäpfchen gereicht. Das Sonnenlicht erhalten auch diese Käfige durch die kleinen Fenster über den größeren (Käfigen) Abtheilungen auf der andern Seite des Ganges.

Wenden wir uns links beim Eintreten, so sehen wir in die großen Flug-Käfige, deren Boden, wie bereits erwähnt, 2 Fuß über dem Boden des Ganges liegt. Dieser Boden besteht aus Portland-Cement und in der Mitte jeder Abtheilung ist ein Springbrunnen aus demselben Material angebracht. Diese eigentlichen Vogelstübchen sind 6 Fuß tief vom Gang bis zum Fenster und abwechselnd 9 und 6 Fuß breit. Die Scheidewände, welche die Stübchen von einander trennen, sind abwechselnd Drahtgitter oder Mauer, so daß jede Abtheilung stille Ecken enthält, in welche sich die Vögel zurückziehen können. Die Heizung geschieht mittelst Heißwasser-Röhren, welche dem ganzen Vogelhaus entlang unterhalb der Drahtwand, welche die Vogelstübchen von dem Gange trennt, angebracht sind. Die Ventilation geschieht dadurch, daß sich jedes zweite der Fensterchen über dem Gange aufstellen läßt, dabei aber sorgsam vergittert ist.

Dieser vorstehend beschriebene erste Theil des Vogelhauses ist 40 Fuß lang, enthält rechts 13 Käfige, je 3 Fuß breit, 2 Fuß tief und $4\frac{1}{2}$ Fuß hoch und links fünf Flugkäfige 6 Fuß tief, 7 Fuß hoch und drei derselben 9 Fuß und zwei 6 Fuß breit.

Das Ende dieses ersten Raumes ist mit einer Glasthüre verschlossen, welche auf einen Zwischenraum führt, der den Winkel zwischen den beiden Flügeln des Vogelhauses ausfüllt.

Hier befindet sich die Vorrathskammer, in welcher alle Sämereien in Blechbüchsen aufbewahrt werden. In einer Ecke ist ein Wasserkran angebracht, wo die Futtertröge gereinigt werden. Aus dieser Vorhalle Thüre ins Freie, eine andere in den zweiten Flügel des Vogelhauses.

Dieser zweite Flügel ist etwa 58 Fuß lang und enthält rechts 19 Seitenkäfige mit Schieferboden, etwa $2\frac{1}{2}$ Fuß breit, in den übrigen Größenverhältnissen aber gleich dem ersten Flügel. Links sieben größere Flugkäfige, die auch 6 und 9 Fuß breit sind, bis auf den letzten, der 12 Fuß breit ist. Im Uebrigen ist die Einrichtung dieselbe wie im ersten Flügel, nur erhalte ich hier eine weniger hohe Temperatur und habe die Fontainen in den Käfigen weggelassen, da ich sie hier durch Wassergefäße nach Bedarf ersetze.

In beiden Abtheilungen ist alles Mauerwerk, längst dem Boden mit Portland-Cement, oberhalb mit einem gipsartigen, in's Rosenrothe schimmernden Cement vertüncht. Das Holzwerk ist sämmtlich weiß angestrichen und mit lichtblauen Linien ausgeputzt.

In das Innere der Flugkäfige stelle ich immergrüne Bäume in Töpfen je nach Bedarf, und den kleinen Prachtfinken biete ich Harzer Vogelbauer und andere Nistvorrichtungen.

Außerhalb der ganzen äußeren Fronte beider Flügel befinden sich Flugkäfige zur Benutzung im Sommer. Zu diesem erhalten die Vögel den Zutritt durch das Oeffnen einer Scheibe. Diese Sommerkäfige sind vor dem ersten und kürzeren Theil des Vogelhauses 6 Fuß tief und vor dem zweiten und längeren Flügel 9 Fuß tief. Dieselben sind sämmtlich mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt und bieten den Vögeln dadurch, daß das Dach 1 Fuß vorspringt und dicht unter demselben Sitzstangen angebracht sind, selbst bei Regenwetter eine Zuflucht, ohne die Thierchen zu nöthigen in das Vogelhaus zurückzukehren. Frisches Wasser befindet sich in allen Vorkäfigen, indem der Abfluß einer jeden der kleinen Fontainen ein Becken im äußeren Käfig füllt, und in der Abtheilung, welche keine inneren Fontainen enthält, wird das vom Dache abfließende Regenwasser zur Herstellung eines kleinen Baches und Füllung eines kleinen Teichs benutzt; freilich durch eine kleine Fontaine bei trockenem Wetter ergänzt. Diese Wasserbecken befinden sich sämmtlich unterhalb der Fenster, so daß, wenn Mäuse in die Vorkäfige gelangen sollten, diese erst ihre Füße nässen müßten, ehe sie am Fenster emporklimmen können. Da nur eine mittlere Scheibe des Fensters geöffnet wird, müßte die Maus mit nassen Füßen entweder am Glas oder glatten Holz heraufklettern, was bis jetzt nur eine einzige versucht hat, die sehr bald vertilgt wurde.

In meinem früheren Vogelhause hatte ich es mit Katzen versucht und wenn auch Angora-Katzen sich leicht an Vögel gewöhnen, so sind sie doch auch meist schlechte Mausfänger. Wirklich gute Katzen habe ich schon dadurch sterben sehen, daß sie Mäuse im Uebermaß fingen und fraßen. Jetzt habe ich einen kleinen schottischen Terrier-Hund, der ursprünglich als Rattenfänger angeschafft, die Mäuse mit besonderer Liebhaberei fängt. Er und die Vögel vertragen sich vollkommen und er würde mir bald die Spur einer Maus merken lassen.

Das Holzwerk der Flugkäfige ist gefirnißtes Naturholz und das Drahtwerk innen wie außen verzinnter Eisendraht, schwarz angestrichen.

Meine Voliere stimmt in vielen, jedoch nicht allen Einzelheiten mit der Anlage des neuen Vogelhauses im Antwerpner Garten überein. Natürlich ist jenes prachtvolle Vogelhaus in viel bedeutenderen Größenverhältnissen angelegt und mancherlei Einzelheiten habe ich dem Plan zu verdanken, den mir seiner Zeit Herr Direktor Bekemans freundlicher Weise zur Verfügung stellte.

(Die uns freundlichst mitgetheilten Photographien bieten eine schöne Ansicht dieser herrlichen und großartigen Anlage des Herrn Wiener. Da gerade in dieser Zeit manche ähnliche Anlage in Deutschland im Entstehen ist, so ließen wir diese Beschreibung so schnell als möglich abdrucken, damit sie vielleicht hier und da noch zum Muster dienen könne. Hoffentlich ist es uns späterhin noch vergönnt eine Abbildung nachträglich zu bringen. D. R.).

Eine Brut des Quäker-Sittichs.

(P.—Conurus—monachus).

Mittheilung des Herrn Emil Linden in Radolfzell.

In dem, manchen Vergnügungsreisenden gewiß gut bekannten Gasthof zum Adler in Konstanz hat ein Paar Quäkerpapageien 5 Junge großgezogen. Der Besitzer hatte aus einem Privatbesitz dieses Paar, sowie zwei kleine Alexander- und einen Karolinen-Sittich und ein Männchen Nymphen-Papagei übernommen und dieselben in seinem von Gebäuden umgebenen Hof in eine an denselben stoßende halbdunkle Kammer gesetzt, aus welchem ein kleiner Raum aus Drahtgitter in den Hof hinausgeht. Während des letzten Winters wurden die Fenster die kälteste Zeit hindurch geschlossen, aber immer blieb ein kleiner Flügel offen und die Bewohner dieser sehr einfachen Räumlichkeit waren auch fast beständig, selbst des Nachts so gut wie im Freien, allerdings bestens geschützt vor Wind und Unwetter.

Es war in dem hintern halbdunkeln Raum ein Nistkasten angebracht, aus einem alten Kästchen, 20 Cm. hoch und breit, 30 Cm. lang, an jeder schmalen Seite mit einer Einflugöffnung, also durchgehend, und zu Anfang des Frühjahrs begann das Paar Quäckerpapageien gewöhnliche Besenreiser, die sich in dem hinteren Raum befanden, einzutragen; die eine der Oeffnungen und zwar die gegen das Fenster gekehrte, wurde von innen mit diesen Reisern dicht zugebaut, und obwol die Höhe des Nistkastens schon klein genug war, wurde das Nest doch ganz in der Weise geformt, wie es nach Angabe der Naturforscher im Freileben dieser Art der Fall sein soll. (Meine zwei Pärchen haben ebenfalls 4 und 5 Eier gelegt, jedoch im Nistkasten von 30 Cm. Höhe und Tiefe auf Sägespäne, also ohne zum Nestbau etwas einzutragen). Ueber die wirkliche Brutzeit konnte mir nichts mitgetheilt werden; es sind eben eines Tages die 5 Jungen ausgeflogen, auch zur großen Freude der oben erwähnten drei anderen Arten, die sich sehr zärtlich gegen die Jungen benommen. Die Färbung der Jungen war von der ihrer Alten im frühen Jugendkleide sehr wenig verschieden, und als ich die Gesellschaft sah, waren die Jungen 6 Wochen aus dem Kasten und kaum von den Alten zu unterscheiden, nur an dem etwas röthlichen Schnabel. Mit der Futterung seiner Papageien ist Herr Mayer, so heißt der Gastwirth, nicht wählerisch; es wird Alles gereicht; von Körnern: Mais, Hanf, Glanz, Hirse, Hafer; ferner zum Frühstück Kaffe mit Milch und Brot, trockenes Brot, Salat und sonstiges Gemüse und von Beeren und Früchten was die Jahreszeit mitbringt, Erdbeeren, Kirschen, Pflaumen, Birnen, Aepfel, gelbe Rüben, selbst Abfälle von den Tellern der Gasthofsgäste, und mit diesem mannigfaltigen Futter wurden die Jungen wohl und gesund großgezogen. Es wird dadurch die Erfahrung Derjenigen, welche immer dem recht abwech-

selnden Futter das Wort sprechen, bestätigt und wie mancher Aengstliche, der seine Papageien nur mit Spitzsamen, Mais und Wasser füttert und alles andere sorgsam vermeidet, wird vielleicht belehrt sein, daß man meistens gar nicht so vorsichtig zu sein braucht.

Aus den deutschen Vogelstuben.

Unter sechs Paar kleinen Finken lebt in einem Raume schon seit zwei Jahren ein Paradieswitwen-Männchen oder Widahfink ziemlich verträglich und bescheiden. Was nun aber seinen Gesang anbetrifft, so habe ich schon längst bemerkt, daß er sein eigenes Lied ganz aufgegeben hat und dafür jedem andern Vogel nachspottet, besonders dem Tigerfink und dem grauen Sängerfink (Grauedelfink oder Graugirlitz). Sobald Letzterer dies hört, — und er muß es nur zu oft hören — stürmt er wüthend auf ihn ein und sucht ihn zum Schweigen zu bringen.

Die kleine, liebliche Melodie des Tigerfinken singt der Widahfink ganz richtig nach, worüber dieser indeß nicht in Zorn geräth. Pehlow,
Lehrer in Mocker bei Thorn.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ueber meine Volière werde ich mir erlauben, nächstens einen Bericht zu erstatten. Für heute will ich nur erwähnen, daß ich nicht nur Wellen-, Nymphen- und Rothrumpf-Sittiche bis jetzt im Freien, und zwar ganz ungeschützt, gelassen, sondern dasselbe auch mit Alexanderpapageien und Reisvögeln versucht habe, und, wie es scheint und wie ich hoffe, ohne allen Nachtheil für dieselben. Wir haben hier mehrere Nächte — 12 ° R. gehabt, und bin ich überzeugt, daß die Vögel auch noch tiefere Kältegrade gut aushalten können, wenn sie (wie bei mir) fortwährend im Freien gehalten werden und gegen Wind und Nässe geschützt sind.

Otto Wigand in Zeitz.

. . . Alle Liebhaber der fremdländischen Vögel haben wol schon oft gewünscht, in den verschiedenen Sittichen, die sich zur parweisen Haltung in Käfigen eignen, stillere Zimmergenossen zu finden; nach mehrjähriger Erfahrung habe ich nun vornehmlich den Rothrumpf oder Singsittich (P. haematonotus) schätzen gelernt. Prächtig im Gefieder, gegen alle Insassen des Käfigs oder der Voliere verträglich, sehr zutraulich, in größerem Raume die nur zu große, nicht selten an Stumpfsinnigkeit grenzende Ruhe der Plattschweifsittiche ablegend, leicht züchtbar — meine Singsittiche haben während zweier Sommer hintereinander ihre Bruten glücklich aufgebracht — empfiehlt er sich auch durch seinen ganz angenehmen Gesang; denn meine jungen Männchen waren eifrige Schüler eines Stieglitzes, dessen Schlag sie ganz vollkommen ihrem Geplauder beimischten. Pf. W. in F.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Ersuche um gefällige Angabe einer Bezugsquelle für Hühner, gute Eierleger, wenn möglich mit ungefährer Angabe des Preises.

M. Greiert in Berlin.

Antwort: Bestellen Sie von Herrn A. Rumpf in Zürich sich nach Bedarf und Belieben einen oder mehrere Stämme Italienische Landhühner, (im vorigen Jahre der Kopf 3 Frcs.; was sie jetzt kosten, wissen wir nicht), das sind nach unsern Erfahrungen die allerbesten Eierleger. D. R.

Ausstellungen.

* Berlin. Der Direktor des zoologischen Gartens, Herr Dr. Bodinus, hat, als Vorsitzender des Geflügel-Freunde-Vereins „Cypria", bei dem Magistrat den Antrag gestellt, diesem Vereine behufs Ausstellung von Geflügel für die Tage vom 18. bis 26. Februar d. J., die freistehende erste Etage des Gebäudes der alten Münze am Werderschen Markte einzuräumen und zu gestatten, provisorisch einige Gasröhren legen zu lassen. Der Magistrat will dem Antrage stattgeben, da die gewünschten Räume leer stehen und seitens der Polizei-Abtheilung, von welcher in demselben andere Räumlichkeiten benutzt werden, keine Bedenken gegen die beabsichtigte Ausstellung erhoben werden. Er hat die Stadtverordneten-Versammlung ersucht, sich damit einverstanden zu erklären.

Mit Bezug auf die obige Mittheilung in den Zeitungen benachrichtigen wir alle diejenigen Leser, welche sich für die Berliner Ausstellung interessiren, davon, daß an der Bewilligung des Lokals von seiten der Stadtverordneten wol nicht zu zweifeln ist. Mit Hinweis auf die in dieser Nummer befindliche Annonce bitten wir daher die betreffenden Aussteller, ihre gefiederten Sendlinge für die deutsche Reichs-Hauptstadt in Bereitschaft zu halten. Wol dürfen wir die Erwartung aussprechen, daß diese Ausstellung an Großartigkeit alle vorhergehenden übertreffen und der „Cypria" Ehre machen werde.

Soeben theilt uns der Schriftführer, Herr Wagenführ mit, daß die Ausstellung ganz bestimmt an dem genannten Tage stattfinden wird. Indem wir auf die Anzeige verweisen, entnehmen wir dem Programm folgende Bestimmungen.

Die Ausstellung umfaßt Tauben, Hühner, Sing- und Ziervögel. Hiesige Aussteller müssen ihr Geflügel bis zum 18. Febr. Nachmittags, auswärtige Aussteller bis zum 19. Febr. frankirt hier einliefern. Für Tauben und Hühner hat der Verein ganz gleiche, geräumige und zweckmäßige Käfige; für die Sing- und Ziervögel dagegen müssen die Aussteller die Käfige selber beschaffen, oder dieselben werden in den Versandtkäfigen ausgestellt. Der Verein sorgt für die gewissenhafteste Verpflegung und dafür sind für jedes Paar Tauben 2½ Sgr. und für jeden Stamm Hühner 5 Sgr. zu entrichten. Sing- und Ziervögel sind frei. Die Prämiirung findet am 20. Febr. statt. Auswärtige Aussteller wollen ihr Geflügel an das Komité-Mitglied, Herrn H. Wagenführ nach dem Ausstellungs-Lokale, im Gebäude der alten Münze, am Werderschen Markt 8.9, Berlin, W., adressiren.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Stettin.

(Sitzung vom 21. Januar.)

Der Vorsitzende, Herr Ad. Creutz, hatte aus seiner Vogelstube folgende Vögel ausgestellt: 1) einen Porteriko-Pa-

pagei (Ps. leucocephalus). Die Grundfarbe dieses auf der Insel Kuba heimischen Vogels ist dunkelgrasgrün, Stirn und Oberkopf weiß, Kinn, Backen und Kehle purpurroth mit einem schwarzen Fleck auf jeder Seite an den Ohren; Bauch und Unterleib purpurviolett. Der Portoriko-Papagei zählt zu den klügsten Vögeln der Erde, zeichnet sich durch Verstand, leichte Fassungsgabe und vorzügliches Gedächtniß aus, lernt darum leicht sprechen, jedoch nicht pfeifen. Er kommt in der Regel viel gesunder zu uns, als der allbekannte Grau-Papagei oder Jako und kostet auch nur halb so viel wie dieser. Er ist sehr gutmüthig und durchaus nicht scheu. Seine Nahrung in der Gefangenschaft besteht aus türkischem Weizen und Pferdezahnmais, Semmel oder Bisquit. 2) Ein Paar gelbwangige Sittiche oder Perekits (Conurus ieterotis). Dieser aus Neu-Granada stammende Sittich ist von schöner gelbarüner Farbe, mit lebhaft dunkelgelben Backen und Stirn und düsterrothem Unterschwanz. Bisher war er so selten, daß er sich erst in wenigen Museen findet, in jüngster Zeit kommt er jedoch auch auf dem Vogelmarkte vor. Er ist außerordentlich zahm und zutraulich und lernt auch sprechen. 3) Einen grauköpfigen Zwergpapagei (Männchen), Psittacula cana. 4) Einen Sperlingspapagei (Weibchen) Psittacula passerina. 5) Einen Katzenvogel (Turdus felifox). Die Heimath des letzteren erstreckt sich über ganz Nord-Amerika, woselbst er zuweilen im Käfig gehalten wird. Sein Gesang ist nur unbedeutend, vorzugsweise erscheint er interessant durch sein katzenähnliches Miauen und sonstiges Nachahmen von Thierstimmen. Sein Gefieder ist schieferblau, an der Kehle hellgrau, auf dem Schwanze etwas rostroth. In den Vogelhandel gelangt er selten, dagegen ist er regelmäßig in den zoologischen Gärten zu finden. 6) Eine amerikanische Wanderdrossel (Turdus migratorius). In letzterer Zeit kommt dieser herrlich singende Vogel öfter auf den Vogelmarkt und daher läßt sich hoffen, daß er auch bei den Liebhabern sich immer mehr einbürgern wird. Das Gefieder ist an Kopf und Kehle tief schwarz, auf dem Oberkörper dunkelaschgrau, am untern Körper rostroth mit orangengelblichem Schein, Unterleib und Bauch rein weiß. Sämmtliche Vögel waren im besten Gefieder, sehr munter, und riefen die Anerkennung und den Dank der zahlreichen Versammlung für den Aussteller hervor. Redner macht im Laufe seines Vortrages auf die große Verwirrung in der Nomenklatur der Ornithologie, namentlich bei den fremdländischen Vögeln, aufmerksam und führt als Beispiel den von ihm beschriebenen Portoriko-Papagei an, der von Brahm die Kuba-Amazone, von Finsch der rothbäuchige Kurzflügel-Papagei und von Ruß der Portoriko-Papagei (unter welchem Namen er hauptsächlich in den Handel kommt) genannt wird. Noch größer ist die Verschiedenheit in der lateinischen Benennung, und dasselbe Chaos herrscht bei fast allen Vogelarten. Aus diesem Grunde würde es ein großes Verdienst unserer ornithologischen Schriftsteller sein, wenn sie in ihren Werken eine einheitliche Bezeichnung anstrebten, bezügl. alle von anderen Schriftstellern gebrauchten Namen mit anführten, wie es Ruß z. B. in seinem „Handbuch für Vogelliebhaber" gethan. — Konservator Schweizer giebt eine Charakteristik der Waldohreule (Strix sylvestris); zur Veranschaulichung und Erläuterung hatte er ein altes und ein junges präparirtes Exemplar ausgestellt. — Hauptmann Boedicker giebt aus dem in den Jahren 1736 bis 1763 erschienenen Werke von Fritsch, welches seiner prachtvollen Farbenzeichnungen wegen besonders auffiel, eine Schilderung über Bastard-Züchtung, die der in ihr entwickelten eigenthümlichen Anschauungen halber die Heiterkeit der Versammlung erregte. — Ein Antrag des Mitgliedes, Rentier Schmidt-Labes, die Errichtung einer Station für Geflügelzucht betreffend, wird der vorgerückten Tageszeit wegen bis zur nächsten Sitzung vertagt. — Die eingegangene Frage: „Gehören die Würger unter die zu schützenden Vögel?" wird vom Hauptmann Boedicker verneint, da sämmtliche bei uns vorkommenden vier Würgerarten durchaus schädlich sind und unter keinen Umständen Schonung verdienen, sondern zum Schutze der nützlichen kleineren Vögel vertilgt werden müssen. Sie zerren die jungen Vögel aus dem Neste, zerreißen sie, und was sie nicht verschlucken können, wird an Dornen gespießt, um später verzehrt zu werden. Herr Prütz bemerkt, daß in einigen Werken über Vogelschutz die Würger unter den zu schonenden Vögeln, wahrscheinlich ihres Gesanges wegen, aufgeführt sind, auch sei ihm eine Polizeiverordnung bekannt, in der das Fangen und Tödten der Würger bei einer Strafe von 10 Thalern verboten ist. Er macht bei dieser Gelegenheit auf die dringende Nothwendigkeit eines internationalen Vogelschutzgesetzes aufmerksam, das von Sachverständigen einer gründlichen Prüfung unterworfen werden müßte, um solche Widersprüche, wie die angeführten, zu beseitigen. — Aufgenommen werden 16 neue Mitglieder, zur Mitgliedschaft angemeldet 10.

Monatsbericht

der 3. Sektion des Vereins der Vogelfreunde in Württemberg.

Diese Sektion versammelt sich alle Mittwoch Abend, im Lokal des Herrn Jaeger, Rostizstraße 14 in Stuttgart und hat neben der Pflege und Züchtung ausländischer Vögel, auch den Vogelschutz zu einer ihrer Hauptaufgaben gemacht. Schon vor Eintritt des Winters wurde durch mehrere Mitglieder, wie von dem Kassirer Herrn Palm und andern, die Fütterung der Vögel im Freien, auf das Wärmste befürwortet und zu dem Behufe eine Kollekte und ein Aufruf in den Zeitungen veranstaltet, welche eine recht namhafte Summe für Futterverkäufe ergaben. Es wurde ferner ein Futtermeister in der Person des Herrn Kastelmeyer erwählt, welcher diesem Amt in aufopfernder Hingebung treulich obliegt. Dasselbe ist um so schwieriger, als die größte Aufgabe darin besteht, den wirklich darbenden Vögeln, wie Amseln, Finken, Ammern, Haubenlerchen und Meisen, das hingestreute Futter von den Spatzen und Krähen nicht allzusehr fortfressen zu lassen, was nur ziemlich weit außerhalb der Stadt und zwar am besten auf den Straßen zur Ausführung gebracht wird. Glücklicher Weise hat der gegenwärtige milde und schneelose Winter, den Vögeln noch wenige Noth bereitet, wodurch das so leichte Wegfangen durch bübische Hände weniger möglich geworden ist.

In den letzten Sitzungen wurde der Beschluß gefaßt, durch zeitgemäße populäre Aufsätze in den gelesensten Blättern, für den Vogelschutz zu wirken und haben Zeitschriften, wie „Der schwarzwälder Bote", „Das Neue Tagblatt" und „Das Wochenblatt für Volksbildung" hier, ihre Spalten bereitwillig geöffnet. Die Abfassung dergleichen Aufsätze wurde dem Berichterstatter übertragen und sind solche über Anlegung von Hecken, Remisen und sonstigen Gebüschen an öden Stellen; ferner ein Aufruf zum Füttern bei Schnee und ein anderer Aufhängen von Nistkästen bereits vom Stapel gelassen worden. Ueber letzteren Punkt beschloß die Sektion, eine große Parthie Nistkästen nach Muster anfertigen zu lassen, um solche an verschiedene Ortsbehörden und landwirthschaftliche Vereine vertheilen zu können.

Ferner wurde beschlossen, an die Behörde der Königl. Anlagen die Bitte zu richten, innerhalb dieser Nistkasten aufhängen zu dürfen, und hat der Stuttgarter Verschönerungsverein gleichfalls freiwillig die Erlaubniß dazu ertheilt, wonach zu hoffen ist, daß vor Beginn des Frühjahrs eine große Anzahl aufgehangen sein wird. In einer der letzten Sitzungen theilte der Berichter-

statter mit, daß durch das Vergiften der Feldmäuse mit Strychnin oder Phosphor ein nur zu großer Schaden im Naturhaushalt und auch im Interesse der Jagd, hervorgerufen wird, welchem entgegen zu treten es ernste Aufgabe der Regierungen sein sollte. Derselbe theilte mit, daß ihm seit einer Reihe von Jahren gestorbene Schleiereulen, Bussarde und Raben in Menge zugebracht worden, an welchen sich eine sekundäre Vergiftung durch den Genuß vergifteter Mäuse, deutlich nachweisen ließ. Ferner machte er aufmerksam, daß überall da, wo Mäusevergiftung stattgefunden, auch eine Menge von Rebhühnern und Hasen todt gefunden wurden, welche natürlich nur durch umhergestreutes vergiftetes Futter getödtet worden sein können, und daß an vielen Orten dergleichen Wild zum Verspeisen feilgeboten wird. Da außerdem von anderen Orten in einer Jagdzeitung berichtet worden, daß durch das Vergiften der Mäuse eine Menge Wiesel und Iltisse gleichfalls den Tod gefunden haben, so darf der Landwirth sich schließlich nicht mehr wundern, daß die Mäuse-Kalamität nach der Tödtung so vieler nützlichen Raubthiere von Jahr zu Jahr in erschreckender Weise wiederkehren muß. Alle derartigen Eingriffe der Menschen in den Naturhaushalt sind einseitig und verschlimmern das Uebel nur noch mehr oder rufen sogar andere hervor, wie z. B. der Berichterstatter schon früher nachgewiesen, daß bei dem Einsammeln der Maikäfer eine ungeheure Menge Vogelnester zerstört und somit viel zur Verminderung der Vogelwelt beigetragen hat. Die verschiedenen Vereine für Vogelschutz mögen hieraus ersehen, welches große Feld ihrer Thätigkeit offen steht, um in diesem Sinne fruchtbringend zu wirken, wobei es im höchsten Grade wünschenswerth wäre, wenn sich dieselben gegenseitig mehr nähern und unterstützen wollten.

Stuttgart, Ende Januar. Martin.

Zweiter Jahresbericht

des unter dem Protektorate Ihrer Königl. Hoheit der Frau Prinzessin Karl von Preußen stehenden

Vereins für Geflügelzucht in Köln.

Anschließend an unsern vorjährigen Bericht können wir über die Fortentwickelung und das Wachsen unseres Vereins nur Erfreuliches berichten, indem derselbe heute 107 Mitglieder, wovon 25 auswärts wohnen, gegen 82 mit 14 Auswärtigen im Vorjahre, zählt. Neuaufgenommen wurden 32 (11 Auswärtige Personen); aus dem Vereine schieden, theils durch Verlegung des Wohnsitzes, 6 Mitglieder; ein Mitglied wurde uns durch den Tod entrissen.

Die erste Ausstellung des Vereins fand in den Tagen vom 9. bis 12. März statt, und hatte 814 Katalog-Nummern aufzuweisen, eine Zahl, die in Köln noch nicht erreicht, überhaupt nur durch 4 Ausstellungen von auswärts im vorigen Jahre überragt wurde; der Bericht über die Ausstellung ist hier schon veröffentlicht worden. Die große Zahl der Anmeldungen zur Ausstellung machte eine sofortige Beschaffung von Hühnerkäfigen nöthig, und dieserhalb mußten zur Beschaffung der nöthigen Geldmittel weitere Antheilscheine ausgegeben werden. Obgleich unser Ausstellungsmaterial beinahe die Summe von 1000 Thlr. beträgt, müssen wir doch für die nächste Ausstellung, auf dessen Vermehrung Bedacht nehmen, indem uns namentlich Käfige für kleine Hühner fehlen. Durch das Ausscheiden des Herrn Hühnermund und das Verziehen des Herrn Mühlemeyer von Köln, wurden Neuwahlen zum Vorstande nöthig; es wurde Herr Wintz zum Rendanten, und Herr Dr. Dumont zum Schriftführer gewählt. Auf Grund des § 5 der Statuten, wurden die Herren Rob. Oettel in Görlitz und H. Landois in Münster zu Ehrenmitgliedern ernannt. Von dem zur Beschaffung der Käfige von den Mitgliedern dargeliehenen Betrage, wurde den getroffenen Vereinbarungen gemäß die Summe von 100 Thlr. ausgeloost und die Antheilscheine, soweit selbe präsentirt, eingelöst. Wir sind bemüht gewesen, mit den Nachbarvereinen, durch Beschickung von deren Ausstellungen und Aufnahme in ihren Verein, uns gegenseitig zu unterstützen. Unsere Statuten, die sich in mancher Beziehung als nicht ausreichend erwiesen, hoffen wir in nächster Zeit zu revidiren, bzgl. der jetzigen Lage des Vereins entsprechend zu verbessern. Es ist den Bemühungen des Vorstandes gelungen, für unsere nächste **Ausstellung,** wozu **die Tage vom 28. Februar bis 2. März,** in Aussicht genommen sind, den Kaisersaal zu miethen.

Zu unserer Finanzlage übergehend, kann dieselbe als eine befriedigende bezeichnet werden.

Die ganze Einnahme beträgt . . .	Thlr.	2007.	28. —
„ „ Ausgabe „ . . .	„	1978	22. 11.
mithin Kassen-Bestand	Thlr.	29.	5. 1.

wozu noch Thlr. 54 an ausstehenden Beiträgen und Eintrittsgeldern kommen; ebenso sind noch 4 unbegebene Antheilscheine vorhanden.

Die Einnahme setzt sich zusammen aus:

a. Kassen-Bestand von 1872 . . .	Thlr.	20.	10. —
b. Beiträge und Eintrittsgelder . .	„	342.	—. —
c. ausgegebene Antheilscheine . . .	„	545.	—. —
d. Einnahme von der Ausstellung einschl. versteigerter Gewinne . .	„	1099.	18. —
e. verkaufte Käfige	„	1.	—. —
	Thlr.	2007.	28. —

Die Ausgabe besteht aus:

a. für Porto und Drucksachen . .	Thlr.	116.	8. 5.
b. Kosten der Ausstellung mit Verloosung	„	1095.	6. 6.
c. Beschaffung von Käfigen Thlr. 722. 6. 6.			
sonstiges Inventar „ 28. 27. 6.			
d. Abonnement auf Zeitschriften . .	„	6.	8. —
e. Rückzahlung von Antheilscheinen .	„	10.	—. —
	Thlr.	1978.	22. 11.

Der Vorstand, dessen Mandat heute erlischt, dankt den Mitgliedern für die Unterstützung in seiner Amtsführung und bittet wiederholt die Mitglieder, die Versammlungen regelmäßiger zu besuchen. (Die Namen der neugewählten Vorstands-Mitglieder sind in Nr. 5 veröffentlicht worden).

Köln, den 13. Januar 1874.

Der Vorstand:

W. H. Pepys. J. F. König. Th. Hesse. Dr. O. Dumont.
Ch. J. Wintz. C. J. Henkeshoven. L. Adler.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Ein gesunder kräftiger **Aßu** wird zu kaufen gesucht. Offerten nebst billigster Preisangabe erbittet [81
August Schuster in Loewenberg i. Schlesien.

Angeboten: Kalifornische Wachteln. 10 Thlr. pro Paar.
Gesucht: weiße und scheckige Pfauen.
Bestellungen und Offerten unter Nr. 17 N. Z. befördert die Expedition d. Bl. [82

Ich habe etwa 6 **Wellensittiche,** einjährige Männchen à 3 Thlr. abzugeben.

J. F. **Engelhardt,**
Inhaber des Hopfen-Kommissions-Geschäfts
83] in Nürnberg.

Die
zweite große allgemeine
Geflügel-Ausstellung
der
CYPRIA,
Verein der Geflügel-Freunde
zu Berlin,
findet in den Tagen vom **20. bis 24. Februar** statt.
Anmeldungen nimmt bis zum **15. Februar**
der Schriftführer Herr **H. Wagenführ,**
Zoologischer Garten, **Berlin,** entgegen.
Programme und Anmelde-Formulare sind durch denselben und Herrn Dr. Karl Ruß zu beziehen.
84] **Der Vorstand.**

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Praktische Anleitung
zur
künstlichen Ausbrütung
der Eier aller Arten Geflügels, und zur Aufzucht der künstlich ausgebrüteten jungen Hühner, Enten, Gänse und Truthühner.
85] Mit 4 Zeichnungen. Nebst einem Anhange über die **rationelle Kaninchenzucht.**
Herausgegeben von **J. H. Krantz.**
Zweite vermehrte und verb. Aufl., gr. 8 ca. 4 Bogen. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung Berlin. W. 86 Wilhelmstraße.

Meine Brochüre,
Kaninchenzucht in Deutschland,
III. vermehrte Auflage ist gegen Einzahlung von 8 Groschen-Marken franco zu beziehen. **C. Schiffmann,**
Kaninchenzucht, Nürnberg.
86] Hallerthorgraben Steinberg.

Gut gelernte **Gimpel,** auch **Dompfaffen** oder Blutfinken genannt, habe in 3 Qualitäten am Lager

I. a	ausgepfeifende Vögel	á 15 — 25	Thlr.
II. a	pfeifende „	á 8 — 12	„
III. a	„ „	à 3 — 6	„

empfiehlt **E. Geupel-White, Leipzig,**
87] Gewölbe, Thiergarten Connewitz.

Für Kanarienzüchter!
Empfiehlt solide gearbeitete Nistkästen, à Dtzd. 1 Thlr. 18 Gr., große Flugbauer, in welchem circa 25—30 Vögel bequem Raum haben, à Stück 2½ Thlr.
88] **C. Lange** in St. Andreasberg am Harz.

Kanarienvögel
mit mehreren Rollen und anderen schönen Stücken à 4—8 Thlr. Emb. für 1—2 Vögel 8 Sgr., versendet unter Garantie des **gesunden Eintreffens** bis auf 3tägige Postentfernung
89] **A. Maschke** in St. Andreasberg, Harz.

Böhmische Fasanen, 1000 Köpfe
darunter jedoch nur höchstens 250 Hähne werden zu kaufen gesucht. Die Herren, welche früher diese Fasanen angeboten, werden ersucht, ihre Adressen an die Redaktion der „Gefiederten Welt" wieder einzusenden. [90

Ich habe noch 10 Stück echte **Harzer Kanarien-Hähne,** schöne Roller á Stück 8, 10, 12 Thlr. abzugeben und garantire für gesunde und fehlerfreie Thiere! — Roller-Weibchen habe noch 20 Stück á 10 Sgr. abzulassen!
Hannover, Januar 1874. **Carl Tolle.** [91

---

1 Stamm **Aylesbury-Enten** und 4 Paar **französische rothe Rebhühner** (Perdrix rouge) werden **zu kaufen gesucht.** Preis-Offerten erbittet das
Dominium Tiefensee bei Bitterfeld
92] (Prov. Sachsen).

Ein Beo-Beo oder Pagodendrossel, (Gracula religiosa), Männchen, Pracht-Exemplar, jung und zahm, auch schon einige Worte sprechen, ist á Thlr. 50 zu verkaufen.
Reflektanten belieben sich sub La. H. Nr. 100. an die Expedition zu wenden. [93

Ein Paar Paradies-Wittwen, 1 Paar Napoleonsvögel, 1 Astrild, 1 Tigerfink, M., 1 Silberfasänchen, M., sind billig zu verkaufen. Auch werden gute, ausländische Sänger dagegen in Tausch genommen. Offerten sub A. Nr. 200 besorgt die Expedition. [94

In der Gefangenschaft gelegte, gut präparirte Eier von exotischen Vögeln kauft: **A. Nehrkorn,**
Amtmann auf Riddagshausen
95] bei Braunschweig.

Mehrere Paare Lapins in verschiedenen reinen Rassen sucht zu kaufen **A. Tancré,** Anclam. [96

Harzer Kanarienvögel.
Feine Rollvögel besten Stammes können noch abgegeben werden. **Boecker,** Controleur in Wetzlar. [97

---

2 Kolkraben, einjährig, ganz zahm, sind á St. 2 Thlr. zu verkaufen.
84] Batzendorf, Altmarkt. **A. Schuster.**

Eine vollkommen zahme **Diadem-Amazone** (Chrysotis diademata) ist für 30 Thlr. zu verkaufen. [98
Berlin. **Dulitz,** Oranienstraße 145.

Kaufgesuch.
Große schwere franz. Kaninchen 10—14 M. alt. Fr. Offerten unter K. 100 an die Expedition dieser Zeitung! [99

Vogelorgeln zum Liederpfeifenlehren für Kanarienvögel, Amseln, Dompfaffen, Graupapageien ꝛc. ꝛc. mit 6 und 8 St.
Vogelbälge, südamerikanische ꝛc. ꝛc. empfiehlt billig und erbittet Aufträge auf Vogelorgeln bald. [100
G. Benda, Coburg.

Abzugeben: Sonnenvögel (Liothrix luteus), alte u. selbstgezüchtete,
Grauköpfige Zwergpapageien desgleichen,
1 Paar rosenbrüstige Lerchenstaare (St. militaris),
1 Paar goldgelbe Trupiale (St. xanthopterus),
1 Männchen Jamaika-Trupial,
1 Männchen Baltimore-Trupial,
1 Männchen Blauvogel oder Hüttensänger,
Kaptäubchen, Sperbertäubchen, weißbäuchige Täubchen,
Bronceflügeltauben,
2 Paar Nymphen,
Diamantvögel,
Zebrafinken,
sämmtlich in den schönsten Exemplaren und zu billigen Preisen.
Auskunft giebt die Redaktion. [101

Einige Pärchen schöne und lebenskräftige **Papageichen** (Coryllis) sind abzugeben d. d. R. [102

Gesucht
1 gewöhnte, sehr gut schlagende Nachtigal. (2 Jahr alt.)
103] **J. Scurla,** Norden-Ostfriesland.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstraße 2, durch die Post oder durch Vermittlung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Bernau.

Ausland

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 19. Februar 1874. Nr. 8.

Inhalt:

Der weiße Storch, sein Nutzen und sein Schaden (Schluß). —
Aus den deutschen Vogelstuben: Züchtungsversuche. —
Ein eigenthümlicher Vogelhandel in Moskau. —
Ringeltauben und Reiher in Ostfriesland. —
Zur Fütterung: Kreuzschnabel, Schönsittich, Seidenschwanz. —
Geflügelzucht im Großen; Den sog. Pips betreffend. —
Aus den Vereinen: Fauna in Düsseldorf; Cypria in Berlin. — Ornithologischer Verein in Stettin.
Bericht des Verwaltungsraths der zoologischen Gesellschaft in Hamburg. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. — Anzeigen.

Der weiße Storch, sein Nutzen und sein Schaden.

Von E. Michelsen, Direktor der landwirthschaftlichen Lehranstalt in Hildesheim.

(Schluß).

Nahezu vor einem Jahrzehnt hat der Herausgeber dieser Zeitschrift bereits seine Beobachtungen über den weißen Storch veröffentlicht und in einer Schilderung einem weiten Leserkreise vorgetragen. Als gerade hierher-gehörend, entlehnen wir dieselbe dem unten genannten Buche*), und fügen sie zum Schluß an die von dem Herrn Direktor Michelsen hervorgerufenen Erörterungen über den Nutzen und Schaden dieses Vogels.

Eine kleine Waldwiese war geraume Zeit hindurch der Ort, nach welchem ich fast täglich hinauspilgerte, um hier Beobachtungen der mich umgebenden, zahlreichen und mannigfaltigen Thierwelt nachzugehen. Rings um mich her regte sich das muntere Leben unserer gefiederten Lieblinge. Da gab es Grasmücken und Laubvögel in mehreren Arten, Rothkehlchen und andere liebliche Sylvien, auf den kleinen Kiefern am Rande der Wiese Hänflinge, in den Erlen Zeisige, unten am Flüßchen Bachstelzen und Strandläufer, sodann Schnepfen, Kibitze und viele andere.

Ein reiches Gebiet bot sich meinen Beobachtungen dar. Hier im Gebüsch war das Nest einer Garten-Grasmücke, unweit davon das eines Spötterlings und weiterhin das eines Rebhuhns. Ich kannte sie und noch viele andere, und freute mich ihrer in der Weise, wie ich von Jugend auf im Umgange mit dem einheimischen Naturleben meine beglückendsten Genüsse gefunden habe.

Auf der Wiese stellte sich seit einigen Tagen auch ein Storch ein; es war ein großer stattlicher alter Vogel, der hier auf der grünen Fläche wahrlich prächtig erschien, wie er gleichsam so stolz und selbstbewußt daherschritt. Unwillkürlich fielen mir die Worte eines naturhistorischen Schriftstellers ein:

„Auch wir haben heilige Vögel. Man frage nur den Landmann, unter dessen Strohdache die Ungläubigkeit unserer Zeit noch nicht ihren Kampf begann, mit Gefühl und Glauben, mit dem dichterisch Schönen und Erhabenen — was ihm der Storch ist, welcher das Nest auf seiner Hütte First erbaute. Ich weiß, daß er antwortet, ihm sei der Storch ein lieber,

*) „In der freien Natur" von Dr. Karl Ruß; Verleger Max Böttcher in Berlin.

lieber Freund, der bei ihm einzog, ein Gesegneter des Herrn, ein liebwerther Schützling und ein hochgeachteter Schutzherr."

Freilich, wer noch nicht durch und durch Materialist geworden, wie jener Naturhistoriker seitdem, der gedenkt beim Anblicke des ersten Storches im Frühlinge wol unwillkürlich der Eindrücke seiner Kindheit, in deren lichtem Vordergrunde dieser Vogel ja eine Hauptrolle spielt; — der begrüßt ihn noch heute wie vor Jahren als einen der ersten Boten, welche dem Jünglinge das Kommen der Zeit gekündet, die alle Liebe und Wonne bringt, ebenso wie dem armen Kranken den Beginn der warmen, Genesung verheißenden Tage. Darum hatte auch ich ihn lieb und freute mich seiner, wie jeder gute Deutsche es thut.

Der Storch hatte wenig auf mich geachtet, sich jedoch immer nach der entgegengesetzten Seite der Wiese gewendet. Eines Tages, als ich soeben auf dem Waldpfade den Rückweg antreten wollte, machte das lärmende Auffliegen der Rebhühner mich aufmerksam. Im ersten Augenblick glaubte ich, daß ein Mensch dort nahe, da ich aber Niemand sah, mußte ich annehmen, daß ein Raubthier sie störe. Denn gerade in der Brut — ich wußte, daß die Küchel in diesen Tagen ausschlüpfen mußten — würden sie doch nicht ohne Anlaß davon geflogen sein. Auch hörte ich gleich darauf das klägliche Schreien der Hühner. So schnell es mir möglich, eilte ich der Stelle zu, konnte aber im Herannahen weiter nichts bemerken, als daß der Storch schnell seitwärts davon flog. Als ich das Rebhühnernest erreichte, fand ich ein jammervolles Bild. Die Eier waren sämmtlich zerbrochen, die Jungen größtentheils verschwunden, doch mußte der Räuber durch mein Kommen gestört worden sein, denn zwei Küchlein lagen zerquetscht auf dem Boden.

Mit betrübtem Herzen ging ich von dannen, denn nicht jenem Vogelpaar allein, sondern auch mir war ein Paradies zerstört worden. Dabei verdroß es mich nicht wenig, daß ich den Uebelthäter durchaus nicht entdecken konnte. Um mich wenigstens durch einen lieben Anblick wieder zu erfreuen, ging ich zu dem Neste einer Grasmücke im Weidenbusch heran — doch wer beschreibt meine Bestürzung! Auch dies kleine Heiligthum war ausgeplündert, vernichtet. Die Schalen der Eier lagen im Grase und nach einigen zerstreuten Federn zu schließen, war das brütende Weibchen ebenfalls zum Opfer gefallen. Und nun weiter; das Nest eines Fitissängers im Rasen, zwei Hänflingsnester auf kleinen Kiefernbüschen, ein Sumpfschnepfennest im Grase, sie alle waren der Eier und Jungen beraubt. Mir wurde recht weh ums Herz und selten habe ich anderer Wesen Leid und Schmerz so lebhaft mit empfunden. Nachdem ich mich noch sorgfältig rings umgesehen und vergeblich nach dem Uebelthäter geforscht, mußte ich den Rückweg antreten. Im Vorübergehen fand ich dann noch, daß von allen Nestern hier im weiten Umkreise nur das eines Finkenpärchens, etwa vier Fuß hoch über der Erde auf einem kleinen Buchenstamm der Vernichtung entgangen war.

Am nächsten Morgen ganz früh war ich wieder zur Stelle. Wie verändert erschien mir aber jetzt diese kleine Welt. Nur der Schlag des Finken ließ sich hören, dann und wann lockte ein Meischen und im dichten Gebüsch flötete eine Schwarzdrossel, sonst dünkte mir die ganze Umgebung wie ausgestorben.

Nicht lange aber, da wurde das Leben wieder mannichfaltiger; ein Junghäschen hüpfte nach dem dichten Klee heran, ein Kibitzpaar führte seine halbflüggen Jungen daher und rings in den Büschen lebte und webte wieder lustiges Vogelleben. Dann kam auch der alte Storch wieder herbei. Doch war es wunderlich, daß heute die beiden alten Kibitze wüthend über ihn herfielen, während sie ihn doch bis dahin friedlich in Ruhe gelassen. Dies schien mir jedoch erklärlich, da sie heute ihre Jungen hier ganz nahe hatten und für dieselben wol selbst von harmlosen größeren Thieren Gefahr befürchteten. Der Storch wußte sich lange Zeit hindurch der Zudringlichen nicht zu erwehren, bis er ein wenig ins Gebüsch hineinging und die Kibitze zurückflogen.

Ueber einen Durchhau hinweg, konnte ich den Storch gut sehen. Er stand ziemlich lange ganz ruhig, dann lief er plötzlich einige Schritte vorwärts, bis zu dem Finkennest und stieß dasselbe vermittelst des Schnabels auf die Erde herab. Während er dann den Inhalt auffammelte und verschluckte, umflatterten ihn die Vögel mit jammerndem Geschrei. Einige Augenblicke später würgte er auf dem Klee den kleinen Hasen und bald darauf folgten demselben auch einige von den jungen Kibitzen, die er trotz ihres leidlich guten Flatterns erhaschte. Jedenfalls hatte er auf dieselben bereits Jagd gemacht und deshalb waren die Alten ihm heute schon mit solchem Lärm entgegengekommen.

Jetzt hatte ich den argen Mörder aller meiner Lieblinge entdeckt. Was aber nun thun? Meine Büchse stand wohlgeladen mir zur Seite und der Räuber wäre dem sichern Tode verfallen gewesen — allein, was würden die Nachbarn und guten Freunde dazu sagen! Lange war ich unschlüssig, endlich, als wieder eine Vogelbrut vernichtet wurde — drückte ich ab und der alte Strauchdieb lag, sich noch einmal überschlagend, im Grase. —

Indem ich nun erkläre, daß es auch mir leid sein würde, wenn man die Störche überall völlig ausrotten wollte, möchte ich doch die Leser dazu angeregt haben, derartige, unschwer zu machende Beobachtungen über das Treiben des Storches selber anzustellen. Für einen Mittelweg zwischen Duldung und Ausrottung theile ich noch das Folgende mit. Alte Störche rauben und morden, besonders in der Zeit, wenn sie selbst und alle übrigen Thiere Junge haben, im Gras und Strauch umher und tödten alle Thiere, derer sie habhaft werden können. Erschießt man nun den männlichen Storch, so erzieht die Störchin auch ohne seine Hilfe die Jungen; sie findet dann aber keine Zeit dazu, im weiten Kreise Jagd auf höhere Thiere zu machen, sondern begnügt sich vielmehr mit Kriechthieren und Gewürm. Natürlich darf der Storch jedoch nur von einem Schützen getödtet werden, der

die beiden Vögel genau kennt, denn, wird die Störchin erschossen, so fliegt der Storch davon, kehrt nicht wieder und die Jungen müssen elend verhungern. Noch besser ist es daher, wenn ein aufmerksamer Beobachter im Herbst, vor der Abreise jedesmal den männlichen Storch erschießt. Das Weibchen sucht sich dann ein anderes Männchen und sie rauben im ersten Sommer beiweitem nicht so arg, wenigstens nicht im so weiten Umkreise umher.

Möge man, zum allgemeinen Besten, meine Vorschläge prüfen und dann handeln. Karl Vogt und andere Naturforscher zählen indessen den Storch zu den durchaus schädlichen Thieren, deren Verfolgung unbedingt geboten ist. Dr. K. R.

Aus den deutschen Vogelstuben.

Von einem Paar Bandfinken (A. fasciata) legte das Weibchen im Sommer in Zeiträumen von 2—3 Tagen hintereinander 14 Eier, die aber nicht bebrütet wurden. Später erfolgte keine Brut mehr. Ein Paar Goldbrüstchen (A. subflava) legten 5 Eier von denen 3 auskamen; eins von den Jungen starb nach einigen Tagen, die beiden anderen, ein Männchen und ein Weibchen, wurden flügge. Dasselbe Weibchen legte später wieder 7 Eier, die aber nicht bebrütet wurden. Nachdem die Eier, auf denen die Vögel des Nachts schliefen, von denen sie aber am Tage fern blieben, mehrere Tage gelegen hatten, nahm ich drei davon und legte sie einem gerade brütenden Amarantvogel-Pärchen, die nur 2 Eier hatten, unter. Nach 14 Tagen kamen einen Tag nach dem andern die jungen Goldbrüstchen aus, doch starben sie stets an demselben Tage, wahrscheinlich weil sie die Amaranten nicht fütterten. Ein Paar Amarantvögel (A. minima) nisteten ununterbrochen den ganzen Sommer hindurch 4—5 Mal hintereinander, bis ich ihnen die Gelegenheit entzog. Die Zahl der Eier betrug einmal 2, zweimal 4, einmal 3. Die Eier wurden meistentheils glücklich erbrütet, immer aber fand ich nach einigen Tagen die sehr kräftigen Jungen theils todt im Nest, theils auf der Erde. Ich gab scharf Acht und überraschte beim Eintreten in das Gartenhaus, in welchem ich die Vögel im Sommer freifliegend halte, das Männchen eines Tages eifrig damit beschäftigt, einem der Jungen den Kopf einzuhacken. Vor einigen Tagen war eine Brut von vier Jungen ausgekommen und davon war es eines, welches der rothe Wütherich soeben tödtete. Ein zweites fand ich bei näherem Nachsuchen anscheinend noch unversehrt auf der Erde. Ich legte es in's Nest zurück und sperrte den liebenswürdigen Familienvater ab. Das Weibchen nahm sich nun allein der Jungen an, warf aber später das eine, bereits vom Vater herausgeworfene, zum zweiten Male aus der Kinderstube, es war gegen die Geschwister auffallend in der Entwickelung zurückgeblieben und diesmal todt. Die beiden anderen Nestlinge wurden bald groß und stark und flügge. Nachdem die Jungen 14 Tage alt waren, ließ ich das Männchen wieder zu und siehe da, es schien sich gebessert zu haben und ätzte die Jungen eifrig mit. Von dem Grauedelfinken (Fr. musica) besitze ich zwei Köpfe, die ich als Paar empfing, aber für zwei Weibchen halte, da keiner von beiden singt. Der eine Vogel baute sich nun im Herbst in ein offenes Korbnestchen ein Nest aus Watte und Fasern, legte zwei Eier und bebrütete dieselben eifrig wenigstens drei Wochen. Ich untersuchte dann die Eier, fand, daß sie nichts taugten und nahm sie dem Vogel weg, der sonst wahrscheinlich noch heute darauf säße.

Ich habe mir die Freiheit, von meinen Vögeln zu erzählen, nur deshalb genommen, weil ich die Meinung vollkommen theile, daß eine wechselseitige Berührung möglichst vieler Vogelliebhaber, wie eine solche die „Gefiederte Welt" anstrebt, der Vogelliebhaberei und -Züchterei von großem Vortheil sein muß. M. Bischkopff, Verlagsbuchhändler in Wiesbaden.

(Wenn solche Mittheilungen recht fleißig und besonders in der Weise, wie Herr Böcker dies auf dem Gebiete der Kanarienvogelzucht thut, möglichst vielseitig besprochen werden, so dürfen die Freunde und Züchter der lieblichen Welt der fremdländischen Vögel sicherlich hoffen, daß auch ihre Bestrebungen bald zu größeren und vor Allem zu sicheren Ergebnissen gelangen. D. R.).

Ein eigenthümlicher Vogelhandel in Moskau.

In der Voraussetzung, daß es doch möglicher Weise den einen oder andern Leser der „Gef. Welt" interessiren kann, über eine in Moskau übliche, gewiß höchst originelle Art des Vogelhandels etwas zu erfahren, will ich dieselbe in Folgendem hier beschreiben.

Wenn man nämlich in Moskau bei den Verkäufern einheimischer Singvögel einen ganz besonders schönen Sänger, etwa eine Nachtigal, einen Sprosser, eine Lerche oder einen Kanarienvogel oder dergleichen verlangt und sich für keinen der in der Bude befindlichen Vögel entscheiden kann, so kommt es nicht selten vor, daß der betreffende Händler Einen höflichst ersucht, ihm in dieses oder jenes Tracteur, bez. Theehaus zu folgen, um einen von ihm dort ausgehängten Vogel der gewünschten Art zu verhören, der ohne Zweifel gefallen würde. Folgt man nun einer solchen Aufforderung, so findet man in der Regel in dem angegebenen Theehause was man gesucht, muß aber dann einen ganz enormen Preis zahlen, weil es sich in solchen Fällen gewöhnlich herausstellt, daß auch schon andere Liebhaber den Vogel zu kaufen wünschen, und man die Letzteren demnach zu überbieten hat.

Dieses Verfahren der Moskauer Händler, besonders schöne und außer der gewöhnlichen Zeit singende Vögel in Theehäusern auszuhängen, ist dort ein seit uralten Zeiten gebräuchliches und erweist sich als höchst einträglich, sowol für die Händler, die ihre Vögel dadurch unter den Liebhabern schnell bekannt

machen und in kürzester Zeit für fabelhafte Preise an den Mann bringen, als auch für die Besitzer der Tracteure, denen bei ihnen ausgehängte, schön schlagende Vögel eine bedeutende Kundschaft verschaffen. Ich füge hier noch hinzu, daß in Rußland der einfachere Mann fast ausnahmslos gerne einem Vogel zuhört, ja, sich sogar schon für den Stieglitz begeistern kann und es daher kein Wunder ist, wenn die Besitzer von Theehäusern nicht selten alle ihre Zimmer mit Singvögeln vollhängen lassen, ohne befürchten zu müssen, daß der Gesang der Letzteren den Gästen des Lokals lästig werden könnte.

J. Schulze, z. Z. in Riga.

Ringeltauben und Reiher in Ostfriesland.

Das Vorkommen der Ringeltaube in Deutschland in mehr oder minder gezähmtem Zustande, dürfte keineswegs eine vereinzelte Erscheinung sein. Hier bei uns in Ostfriesland, ist dies nichts Auffallendes und eine längst bekannte Thatsache. Bekanntlich ist Ostfriesland Flachland, entbehrt des Waldschmucks und der Vorhölzer theilweise ganz, und nur in Städten, Dörfern und alleinstehenden Plätzen, d. h. Bauerhöfen, finden sich die nothwendigsten Bedingungen, unter denen es der Ringeltaube möglich wird, ihr Brutgeschäft zu verrichten. Dieselbe ist hier zahreich eingebürgert, nistet in Aepfelbäumen, Birnbäumen, überhaupt da, wo sich nur eine passende Gelegenheit zeigt. Sie benutzt mit Vorliebe Dächer und Fensterbänke zu Ruheplätzen und hat nicht mehr Furcht vor den Menschen, als ein Feldflüchter.

Aehnlich verhält es sich mit dem Fischreiher. Etwa $1\frac{1}{2}$ Stunde von Emden befindet sich in dem Garten des Herrn Oekonom Hinrichs in Dykhusen eine Reiherkolonie, die es der Mühe werth erscheinen läßt, im Monat Mai dorthin einen Ausflug zu unternehmen. Die langbeinigen Gesellen nisten zu zwei, drei und vier Paaren auf einem der verkrüppelten Eichen- oder Erlenstämme und scheinen weiter keine Furcht zu kennen, als daß sie dem Fremden ihren Unwillen in dem nicht zu mißdeutenden Zischen zu verstehen geben. Die Horste befinden sich 20—30 Fuß hoch; Herr Hinrichs hat das Vergnügen von seinem Fenster aus die Häupter seiner Lieben genau übersehen und seine Freude daran haben zu können. Obgleich ihm das Vergnügen ziemlich theuer kommt, da jeder Baum, der von einer Reiherfamilie bewohnt wird, dem sichern Ersterben verfallen ist.

Pfannenschmid in Emden.

Zur Fütterung.

Kreuzschnabel. (Loxia curvirostra) **Schönsittich** (Euphema pulchella) **und Seidenschwanz** (Bombycilla garrula).

Vor etwa zwei Jahren erhielt ich einen Kreuzschnabel, der in hiesiger Stadt gefangen worden Offenbar war derselbe der Gefangenschaft entflohen; da der Vogel aber ziemlich scheu war, schien die Gefangenschaft nur kurze Zeit erst gedauert zu haben. Einige Zeit vor Einlieferung dieses Kreuzschnabels hatte ich einen solchen durch den Tod verloren und da dieser nur Rübsamen, Glanz und aus der Hand ab und zu einige Hanfkörner erhalten hatte, versuchte ich es nunmehr mit der Fütterung von Fichtensamen und gab nur nebenbei etwas Rübsamen und Glanz. Der Vogel lebte bei diesem Futter nur ungefähr 2 Jahr lang im Käfig und da der letztere nicht sehr geräumig war, so bin ich der Ansicht, daß bei Gewährung eines großen Käfigs, bei Fütterung von Fichtensamen und gleichzeitiger Darreichung von Fichtenzweigen und Zapfen sowie von viel Grünzeug diese Vögel noch besser sich halten werden. Der ersterwähnte Kreuzschnabel fiel ohne vorheriges Kranksein todt von der Stange, der zweite war einige Tage vor seinem Tode weniger munter wie sonst und schien kurz vor dem Tode an Athemnoth zu leiden. Das Gefieder blieb aber bis zuletzt glatt und der Tod selbst trat schnell und plötzlich ein.

Unter ähnlichen Erscheinungen starb mir kürzlich ein junges Weibchen Schönsittich. Neben Glanz und Hirse, Morrübe und Grünzeug hatte dasselbe auch gespelzten Hafer und etwas Mohnsamen erhalten. Diese Fütterung scheint zu nahrhaft gewesen zu sein oder aber es hat der gestorbene Vogel von der einen oder anderen Körner-Art, die er vielleicht früher nicht erhalten hatte und die ihm besonders zusagte, zu viel gefressen.

Andere Folgen hatte der Genuß zu nahrhaften Futters bei zwei Seidenschwänzen. Ich gab diesen Thieren das gewöhnliche Drosselfutter — zerkleinertes rohes Rindfleisch mit Semmelgries und geriebener Morrübe und die Vögel hielten sich Anfangs bei diesem Futter vortrefflich. Mit der Zeit bemerkte ich aber, daß die Federn in der Nähe des Ohres zusammenklebten und demnächst kahle Stellen in der Ohrgegend entstanden. Ich ließ nun das Fleisch aus dem Futter ganz, fort und gab ein Gemisch von Semmelgries mit geriebener Morrübe, nebenbei im Spätsommer und Herbst Hollunder und Ebereschenbeeren. Nach der Mauser verschwand bei dem einen die kahle Stelle ganz, während bei dem Andern die Ohrgegend schlecht gefiedert blieb und bald wieder ganz nackt war. Auch bei dem ersten Vogel bemerke ich jetzt, daß die Ohrfedern wieder ein wenig aneinander kleben, während der Vogel sonst tadellos im Gefieder ist. Ich hoffe, daß wenigstens bei diesem zweiten Vogel das Uebel — das in einer Art Ohrenfluß zu bestehen scheint, — mit der Zeit wieder verschwinden wird.

Neuerdings ist vorgeschlagen worden, dem Futter für Kerbthierfresser Maikäfer- oder Drohnen-Schrot beizumischen. Ich war noch nicht in der Lage, eine Probe damit machen zu können. Lebende Maikäfer fressen viele Vögel sehr gern: Glanzdrossel und Jamaika-Trupial, Rother Kardinal und Blauheher lieben z. B. diese Speise ganz besonders, während frisch getödtete Drohnen, die ich kürzlich erhielt, nur den Beifall des rothen Kardinals fanden. Ich zerschnitt die verschmähten

Drohnen, nun in ganz kleine Stücke und mischte sie dem aus Ameisenpuppen, etwas Weißwurm und Eierbrot bestehenden Futter bei. In dieser Form wurden sie mitgenossen, doch bemerkte ich, daß eine aus drei Köpfen bestehende Gesellschaft von Hüttensängern (Sialia sialis) in ihrem sonst vollständig geleerten Freßnapf doch einige Drohnen-Bruchstücke zurückgelassen hatten.

Sollten mit Verwendung von Maikäfer- und Drohnenschrot bei Fütterung der Weichfresser praktische Versuche bereits gemacht sein, so wäre deren Veröffentlichung in diesem Blatte sehr wünschenswerth.

Merseburg, im Januar 1874.

v. Schlechtendal.

Hühnerzucht im Großen.

Es ist seltsam, in welcher sonderbaren Weise zuweilen eine Idee von zahlreichen Menschen, unabhängig von einander, zu gleicher Zeit gefaßt und verfolgt wird. Man könnte dann sagen, daß dieselbe förmlich epidemisch sich verbreitet, und am zutreffendsten ist wol die Annahme, daß eine solche Angelegenheit dann eben zeitgemäß sei. Dies ist z. B. gegenwärtig mit der Hühnerzucht der Fall. Alle Welt scheint zu der Einsicht gelangt zu sein, daß die richtig betriebene Hühnerzucht, aber im großartigsten Maßstabe, nicht allein sehr zweckmäßig und wünschenswerth, sondern geradezu als eindringendes Bedürfniß der Volkswohlfahrt erachtet werden muß.

So beabsichtigte man — namentlich während der regsamsten Gründungsperiode — großartige Hühnerzucht-Anstalten in Berlin, an mehreren Orten Schlesiens, in der Rheinprovinz, in Baiern u. s. w. ins Leben zu rufen, ohne daß bis jetzt freilich eine derselben wirklich zu Stande gekommen. Die dann eingetretenen weniger günstigen Zeitverhältnisse tragen erklärlicher Weise die Schuld daran, daß dies noch nicht geschehen ist. Keinenfalls läßt sich annehmen, daß damit auch die ganze Idee für immer oder auch nur für längere Zeit als abgethan anzusehen sei. Im Gegentheil ist dieselbe augenscheinlich mit vollster Lebenskraft — weil Berechtigung, oder vielmehr Nothwendigkeit — aufgetreten und über kurz oder lang wird daher ihre Verwirklichung an einem Orte nach dem andern ohne Zweifel zu Stande kommen.

Als eine der ernstesten Aufgaben unserer Zeitschrift erachten wir es daher, die Angelegenheit der Gründung von Hühnerzucht-Anstalten im Großen fördern zu helfen, soweit wir dies nur vermögen, einerseits durch Veröffentlichung darauf bezüglicher Mittheilungen und andererseits durch Auskunft und Rathschläge. In diesem Sinne eröffnen wir heute eine hierauf bezügliche Rubrik, in welcher wir zunächst mit einem Auszug aus der zweiten Auflage der „Anleitung zur künstlichen Brut und Aufzucht des Geflügels" von J. H. Krantz, der uns von dem Herrn Verfasser zur Veröffentlichung vorgelegt worden, beginnen:

Mit dem Steigen der Fleischpreise des Großviehes sind auch die Preise für das Geflügel verhältnißmäßig in die Höhe gegangen, so daß eine Hühnerzucht im Großen, rationell und mit Sachkenntniß betrieben, ein lohnender Erwerbszweig sein kann; besonders aber, wenn eigene Aufzucht stattfindet und alle Eier dazu verwendet werden. Um dieses nun durchführen zu können, muß künstliches Ausbrüten stattfinden; nebenbei müssen aber alle Hühner, die brüten wollen, auch dazu gelassen werden, und hierzu gehört die Einrichtung der im Kapitel über das natürliche Brüten beschriebenen Bruträume.

Bei solcher Zucht ist es vor Allem nöthig, daß der Besitzer oder Leiter des Geschäfts die sach- und naturgemäße Behandlung der Hühner versteht.

Jeder Hahn mit 10 bis 12 Hennen muß bei einer großen Hühnerzucht seinen eigenen eingezäunten Hof haben, der nicht unter 4 Quadrat-Ruthen (12 Fuß breit und 48 F. lang) groß sein darf, damit die Thiere sich frei bewegen können und es ihnen gar nicht vorkommen darf, als ob sie gefangen gehalten werden. An dem einen Ende muß der Stall stehen, und wenn nun entgegengesetzt und von jeder Seite noch ein eben solcher Hof hieran stößt, so ist für vier Höfe (zu 50 Hühnern) ein Hühnerhaus bei entsprechender Einrichtung ausreichend.

In einem solchen Hofe muß Gras wachsen; es müssen Johannisbeersträucher, hochstaudiger Grünkohl u. s. w. darin gepflanzt werden; denn wo Vegetation ist, halten sich auch Würmer und Insekten auf. Steht Pferde- oder Kuhmist zur Verfügung, so kann wöchentlich eine Karre voll davon hineingegeben werden, welches ich der Madenerzeugung durch Fleisch vorziehe. Ist der Grund und Boden Eigenthum des Züchters, so können in jedem Hofe zwei Maulbeerbäume gepflanzt werden, da Maulbeeren ein gesundes und gefressenes Futter für Hühner sind. In so eingerichteten Höfen finden die Hühner im Sommer schon einen bedeutenden Theil ihrer Nahrung. Das Futter, das man noch zu geben hat, muß täglich dreimal und so reichlich ausgestreut werden, daß sie völlig satt werden. Außer Körnern sind Kartoffeln, Kohl, alle Arten Rüben und die nicht angebrüteten Eier das beste Futter.

Ich glaube, diese kurzen Andeutungen werden genügen und dazu beitragen, daß Jemand, der Hühnerzucht im Großen betreiben will, die richtigen Einrichtungen und Maßnahmen treffen könne.

J. H. Krantz in Berlin.

Den sog. Pips betreffend.

Der pfeifende ziemlich ängstliche Ton, welchen zuweilen ein Huhn ausstößt, ist ein Beweis, daß die Luftröhre afficirt ist, und das Athmen schwer fällt. Ich glaube sehr gern, daß das in Nr. 5 d. Bl. empfohlene Mittel der Wärme ganz zweckentsprechend und das Uebel behebend sei, allein ich verfahre in ähnlichen Fällen etwas anders, indem ich den Patienten 8 bis 10 Streukügelchen Spongia ein-

gebe, dasselbe Mittel, welches die Homöopathen gegen die häutige Bräune der Kinder anwenden. Hiervon habe ich jederzeit den besten Erfolg gehabt, und zwar hört das Pfeifen in der Regel bereits in $^1/_2$ Stunde auf. Meines Erachtes dürfte dieses Mittel auch bei kleineren Vögeln mit gleichem Erfolg anzuwenden sein.

R. O.

Aus den Vereinen.

* In Düsseldorf hat sich unter dem Namen **Fauna** ein Verein gebildet, dessen Zweck es ist, das Interesse für die Thierwelt zu wecken und zu fördern, und der sich auch namentlich als specielle Aufgabe die praktische Durchführung des Thierschutzes stellte. Dieser Verein hielt im Januar d. J. seine erste Haupt-Generalsammlung ab, welche von einigen Sechszig Mitgliedern besucht wurde und in welcher sich ein äußerst lebendiges Interesse an dem Verein durch die lebhafteste Debatte kund gab. Beschlossen wurde, in diesem Jahre noch eine Geflügel-Ausstellung zu veranstalten, und dann wurde zur Wahl des Vorstandes geschritten. In denselben wurden gewählt die Herren:

Advokat Anwalt Lützeler
Professor W. Camphausen,
Ludwig Beckmann,
Dr. Scheenfeld,
Theodor Jäger,
Hermann Garnich,
H. Seebohm,
Julius Wolters und
Oskar Günther.

Hierauf fand ein allgemeines Mahl statt, während dessen eine reichhaltige Sammlung ausländischer Vögel verloost wurde und welches die heiterste Laune belebte.

---

* In der letzten Sitzung des Vereins **„Cypria"** fand zunächst die Berathung über die bevorstehende Geflügel-Ausstellung statt und das sogleich gewählte Komité, bestehend in den Herren: Wagenführ, Barnewitz, Petzold, Meyer und Möser wurde damit betraut, die erforderlichen Anordnungen vorzunehmen. — Der zweite Gegenstand der Tagesordnung war die alljährlich nach den Statuten im Kreise der Vereinsmitglieder stattfindende Verloosung, welche diesmal in 1 Stamm Kochinchina-, 1 Stamm Gold-Brabanter, und 1 Stamm Crêve coeur-Hühnern bestand. Im Weiteren wurde dann über das Archiv berathen, welches wir in der „Bücher- und Schriftenschau" dieser Nr. besprochen haben. Sodann stellte der Verein, nach Berathung und Erwägung, endgültig seinen Namen dahin fest, daß er sich fortan „Cypria", Verein der Geflügel-Freunde in Berlin nennen wird. In den Gründen für und wider diese Bezeichnung wurde ausgeführt, daß unter Geflügel die gesammte Vogelwelt begriffen und daher selbstverständlich auch die Stubenvögel, Sing- und Schmuckvögel als darin mit einbegriffen erachtet werden müßten. Verein der Geflügel-Freunde bedeute nicht, daß in demselben nur die Hühner, Tauben u. dgl., sondern auch alles kleine Sing- und Schmuckgeflügel zur vollen Geltung kommen.

Ornithologischer Verein in Stettin.

Die zum Sonntag, den 15. Februar anberaumte

Vogel- und Geflügel-Ausstellung

muß des gegenwärtigen ungünstigen Wetters wegen bis zum Eintritt milderer Witterung verschoben werden.

Die **Stiftungsfestfeier** findet jedoch unverändert am

17. Februar cr. Abends 7 Uhr

im großen Saale des Schützenhauses statt.

Stettin, 10. Februar 1874.

Der Vorstand.

Eilfter Bericht

des Verwaltungsraths der Zoologischen Gesellschaft in Hamburg.

(Vorgetragen von dem Vorsitzenden, Herrn Dr. Ed. Schwartze).

Zehn Jahre sind verflossen, seitdem der Zoologische Garten am 17. Mai 1863 eröffnet wurde. Wenn die Erinnerung an diese Eröffnung uns zugleich das Bild des Mannes vor die Seele führt, der uns damals mit Begeisterung für die neue Schöpfung, an der er einen so wesentlichen Antheil hatte, in vollster Lebensfrische begrüßte, und der uns wenige Wochen nachher am 5. Juli 1863 ebenso unerwartet wie schmerzlich entrissen wurde, so dürfen wir, seiner in Liebe gedenkend, uns Allen das Zeugniß geben, daß wir sein Andenken dadurch zu ehren versucht haben, daß wir bestrebt gewesen sind, das große Werk in seinem Geiste zu fördern und der Vollendung näher zu führen.

Vieles und Großes ist seitdem geschehen.

Der Thierbestand des Gartens ist von Jahr zu Jahr gewachsen, und braucht heute den Vergleich mit keinem andern Garten zu scheuen. Derselbe ist nicht allein ausgezeichnet durch den Reichthum der Arten, sondern auch durch die Schönheit der einzelnen Exemplare. Die Giraffen und Antilopen unseres Garten sind wol nirgends übertroffen.

Das schnelle Wachsen unseres Thierbestandes, wesentlich gefördert durch die Lage unserer Stadt, und deren überseeische Verbindungen, sowie durch die Liberalität, mit welcher zahlreiche Mitbürger und Freunde des Gartens denselben ausgestattet haben, machten fortwährende Ansprüche an neue Thierhäuser geltend.

Während bei Eröffnung des Gartens nur die nothwendigsten Thierhäuser hergestellt waren, sind nach und nach eine namhafte Anzahl kleinerer und größerer Bauten entstanden, die, unter Benutzung aller bis dahin gesammelten Erfahrungen, an Zweckmäßigkeit der Einrichtung und Solidität der Ausführung nichts zu wünschen übrig lassen. — Als die bedeutendsten wollen wir hier nur hervorheben: das Aquarium, welches die Wunder der unterseeischen Welt dem Auge erschließt, das Affenhaus und das Antilopenhaus mit der Giraffenzelle.

Daneben ist der landschaftlichen Schönheit des Gartens, sowie den geselligen Ansprüchen des Publikums durch Erbauung der Eulenburg, durch den Bau der Restauration und die Herstellung des Konzertplatzes Rechnung getragen. Außerdem ist die Direktorial-Wohnung gebaut worden.

Wenn nichtsdestoweniger unserm Garten noch wichtige Thierhäuser mangeln, auf welche weiter unten zurückzukommen sein wird, so dürfen dagegen die Garten-Anlagen, auf welche im Laufe der Jahre, namentlich auch durch Anpflanzung großer Bäume die größte Sorgfalt verwendet worden ist, als vollendet bezeichnet werden. Die landschaftliche Schönheit unseres Gartens ist so allgemein anerkannt, daß wol kein anderer Garten demselben den Rang streitig macht.

Die finanziellen Ergebnisse der ersten zehn Jahr sind, mit Ausnahme der Kriegsjahre, durchaus befriedigend gewesen. Die Einnahmen haben nicht nur ausgereicht die Ausgaben zu decken, sondern uns in den Stand gesetzt, aus denselben bedeutende Verwendungen für den Garten zu machen, sowol durch Ankauf seltener Thiere (Giraffen, Rinocerosse, Ameisenbären u. s. w.), als auch durch bauliche und sonstige Anlagen. Diese bisherigen finanziellen Resultate, während eines Zeitraumes von 40 Jahren, verbürgen zugleich das Bestehen des Gartens für die Zukunft, nur wird jederzeit auf einen angemessenen Reservefonds Bedacht zu nehmen sein. Abgesehen davon, daß wir immer mehr oder weniger vom Wetter abhängig bleiben, haben uns die Kriegsjahre 1870/71, die Nothwendigkeit eines ausreichenden Reservefonds klar vor Augen geführt. Glücklicher Weise befanden wir uns zu jener Zeit im Besitze eines zu dem Ausbau des großen Gebäudes aus der Restaurations-Pacht angesammelten Fonds, der theilweise zu den allgemeinen Bedürfnissen des Gartens verwendet werden konnte. Nachdem der Zweck dieses besonderen Fonds durch den vorläufigen Abschluß des großen Gebäudes wegfällig geworden ist, wird die Restaurations-Pacht auch fortan von den laufenden Einnahmen getrennt, und als Fonds für besondere Fälle, insbesondere auch für Thierhäuser, zu reserviren sein.

Dieser kurze Rückblick auf den hinter uns liegenden zehnjährigen Zeitraum seit dem Bestehen unseres Gartens mag hier genügen.

Wenn wir uns nach diesen einleitenden Bemerkungen zu dem Ergebnisse des verflossenen Jahres wenden, so darf dasselbe als ein ganz besonders günstiges bezeichnet werden.

Die Betriebs-Einnahmen im Jahre 1872 betrugen: Vco. Mrc. 146,054. 13 Sch., die Betriebs-Ausgaben in 1872 betrugen: Vco. Mrc. 102,107 9 Sch.

Die Ursachen der Vergrößerung der Betriebs-Ausgaben gegen die vorhergehenden Jahre liegen theils in der Verbesserung der Gehalte für die Thierwärter und Erhöhung der Löhne für die Arbeiter, theils in der Vertheuerung aller Materialien, Die Verbesserung der Gehalte und Löhne für die Thierwärter und Arbeiter war Angesichts der immer zunehmenden Theuerung aller Lebensbedürfnisse mit Billigkeit nicht länger zu beanstanden, und hat nach sorgfältiger Untersuchung über das Maas derselben um 16⅔ Procent stattgefunden.

(Schluß folgt).

Bücher- und Schriftenschau.

„Archiv der Cypria". Zwanglose Blätter des unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Prinzessin Karl von Preußen stehenden Vereins „Cypria" in Berlin. Gesammelt, redigirt und nur für Mitglieder des Vereins gedruckt, von W. Möser.

Auf Anregung des Herrn Geheimrath Schneider faßte der Verein „Cypria" in der Sitzung vom 19. Januar d. J. den folgenden Beschluß. Werthvolle größere Arbeiten über alle Zweige der Geflügelzucht und Liebhaberei sollen, jedoch nur für die Mitglieder, auf Kosten des Vereines besonders gedruckt, gesammelt und unentgeltlich vertheilt werden. Jedes neu eintretende Mitglied erhält die vorräthigen Nummern gratis. Keine der Archiv-Nummern darf verkauft, durch den Buchhandel vertrieben oder irgendwie anders als durch Beitritt zum Vereine erworben werden. Die gedruckten Aufsätze erscheinen in zwanglosen Lieferungen, je nach dem zu Gebote stehenden Material und den dafür bereiten Mitteln. Das Archiv ist bestimmt, mit der Zeit eine vollständige Sammlung aller werthvollen Schriften für die Zwecke des Vereins zu werden.

Das erste nur probeweise den Vereinsmitgliedern vorgelegte Heft enthält „Geschichte der Taubenzucht" von C. C. Weber, und da das Unternehmen nun erst durch die Herren Geheimrath Schneider und Verlagsbuchhändler Möser ins Leben geführt werden soll, so müssen wir uns mit diesem Hinweise begnügen, wünschend, daß dies Archiv dem Verein „Cypria", sowie der Sache recht nutzbringend werden möge.

R.

Briefwechsel.

Herrn A. F. Wiener in London: Der zuerst uns gesandte Lori war Trichoglossus ornatus Linné, von Finsch Blauohriger Keilschwanzlori genannt, von Celebes, ein Männchen. Der zweite in zwei ebenfalls männlichen Exemplaren war der gewöhnliche prachtvolle Ps. — Domicella — ruber Gmelin, von Finsch Blauschulteriger Breitschwanzlori geheißen. Die Todesursache läßt sich sehr schwer angeben, da diese Vögel voll und wohlgenährt, auch gut gefiedert erschienen und keinerlei Krankheitsmerkmale zu entdecken waren. Merkwürdig ist es übrigens, daß viele, wenn nicht die meisten zarteren Papageien an Gehirnaffection zu Grunde zu gehen scheinen. Sehr häufig findet man das Gehirn mit Blut gefüllt. Nicht selten ist freilich auch Unterleibsentzündung, infolge von unpassender Nahrung, die Todesursache. Schade um die herrlichen Vögel! — Herrn L. in N.: Ihre Notiz über die Steinadler haben wir dankend erhalten. Weiteres willkommen. — Herrn G. H. M. in N.: Warum sollen wir Ihren Namen unter Ihren harmlosen Mittheilungen fortlassen? Lieber wollen wir auf dieselben gerne verzichten. — Herrn Dr. Baruch in Paderborn: Wenn Sie davon überzeugt sein können, daß Ihr Jako ein junger Vogel ist, so dürfen Sie noch keineswegs zweifeln, daß er sprechen lernen werde. Vierzehn Wochen sind für den ersten Unterricht erst eine kurze Frist. Behandeln Sie ihn mit Geduld und Ausdauer nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber", so werden Sie ohne Frage zum guten Ziele gelangen. — Herrn Lehrer S. in N.: Einen besseren Weg zur Erfüllung Ihres Wunsches wissen wir Ihnen leider nicht anzugeben; doch hoffen wir, daß Ihr Gesuch guten Erfolg haben möge! Im Verlage von B. F. Voigt in Weimar sind derartige Bücher erschienen und wir rathen, daß Sie von jener Handlung sich Auskunft nebst Preisangabe erbitten.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Gesellschaft der Vogelfreunde in Zürich.

Fünfte allgemeine Vogelausstellung

vom 5. bis 10. März 1874, im alten Schützenhause.

Besitzer von ausstellungswürdigen Sing- und Ziervögeln, sowie von schönem Hofgeflügel werden freundlichst zu recht lebhafter Betheiligung eingeladen.

Außer den **Ehrendiplomen** hat die Gesellschaft folgende **Geld-Prämien** ausgesetzt:

Für das edelste Paar Kanarienvögel Fr. 50. —
Für das zweit beste Paar = Fr. 30. —

Programme und nähere Auskunft ertheilt gerne (franco gegen franco) der Präsident der Gesellschaft Herr **Fechter-Weber** in **Fluntern** bei Zürich.

Zu kaufen sucht:
Ein Paar fehlerfreie, zuchtfähige Brüsseler Kanarienvögel. Angeb. nimmt die Exped. d. Bl. entgegen. [108

Zu kaufen gesucht: 1 Paar Blaukehlchen, 1 Paar Rothkehlchen, 1 Paar Mönchsgrasmücken, die verschiedenen Arten von Kreuzschnäbeln und Gimpeln, wenn möglich auch in Paaren. Zu verkaufen oder vertauschen; 6 selbstgezüchtete, sehr schöne 1jährige Wellensittich-Männchen à Thlr. 3, zusammen etwas billiger; 1 Tigerfink-Männchen á Thlr. 2.
Näheres durch die Exp. d. Bl. [105

Vogelorgeln zum Liederpfeifenlehren für Kanarienvögel, Amseln, Dompfaffen, Graupapageien ꝛc. ꝛc. mit 6 und 8 St.
Vogelbälge, südamerikanische ꝛc. ꝛc. empfiehlt billig und erbittet Aufträge auf Vogelorgeln bald. [100
G. Benda, Coburg.

Für Kanarienzüchter!

Empfiehlt solide gearbeitete Nistkästen, à Dtzd. 1 Thlr. 18 Gr., große Flugbauer, in welchem circa 25—30 Vögel bequem Raum haben, à Stück 2½ Thlr.
88] **C. Lange** in St. Andreasberg am Harz.

Abzugeben: ein Pärchen Goldbrüstchen, Heckpärchen.
= = Amaranten =
= = Schmetterlingsfink =
= = Astrilds.
Auskunft giebt die Red. [106

C. Hagenbeck's

Handelsmenagerie

HAMBURG

hält **exotische Vögel,** von den größten bis zu den kleinsten, stets in mehreren Tausenden von Exemplaren zu den civilsten Preisen vorräthig.

Näheres besagen die jeder Zeit von Reflectanten gratis zu beziehenden Kataloge.

[112

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Praktische Anleitung
zur
künstlichen Ausbrütung
der Eier aller Arten Geflügels,
und zur
Aufzucht der künstlich ausgebrüteten jungen Hühner, Enten, Gänse und Truthühner.

Mit 4 Zeichnungen. Nebst einem Anhange über die

rationelle Kaninchenzucht.

Herausgegeben von **J. H. Krantz.**

Zweite vermehrte und verb. Aufl., gr, 8 ca. 4 Bogen.

Preis 10 Sgr.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung Berlin.

W. 86 Wilhelmstraße. [111

Abzugeben ein rother Kardinal (singt schon) von **Georg Hilsz** in Ortenburg (Oberhessen). [113

Ein Paar Pariser Kanarienvögel à Thlr. 8 zu haben bei
114] **Ad. Spindler** in Hilden.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:
Die
„Gefiederte Welt",
herausgegeben
von **Dr. Karl Ruß.**
Jahrgang I. & II. (1872|73).
115] Preis à Thlr. 2 — broch.

Ein Paar
Frettchen,
am liebsten braune, zur Jagd tauglich, werden zu kaufen gesucht. Offerten sub F. H. besorgt d. Exped. [116

Mehrere Paare Lapins in verschiedenen reinen Rassen sucht zu kaufen **A. Tancré,** Anclam. [117

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstraße 2, durch die Post oder durch Vermittlung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gassmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Hermsdorf.

Ausland.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 26. Februar 1874. Nr. 9.

Inhalt:

Die ornithologische Neuigkeit. —
Ueber das Nisten der Zwergpagageien. —
Schadet es dem Gesange der Harzer Kanarienvögel, wenn dieselben zur Zucht gebraucht werden? —
Anfragen und Auskunft: Kanarienhecke; beste Hühnerrace; Rachenfäule der Hühner. —
Ausstellungen: Cypria in Berlin.
Aus den Vereinen: München; Stettin. —
Bücher- und Schriftenschau: Forstzoologie; Unter den Patageniern. —
Briefwechsel. — Anzeigen. —

Die ornithologische Neuigkeit.

* Ueber den Vogel Dodo, der angeblich von den Samoa-Inseln lebendig nach Honolulu gebracht worden ist, stellt sich nun heraus, daß jene Angabe auf einer Verwechslung beruht.

Höchst wahrscheinlich ist mit jenem Vogel die Samoataube (Didunculus strigirostris) gemeint, von welcher sich ein lebendes Exemplar im Zoologischen Garten zu Hamburg befindet.

Dieser Vogel geht gleichfalls seinem Aussterben entgegen, ist aber durchaus kein Dodo, welcher wie bekannt nur auf den Maskarenen im Indischen Ocean gelebt hat. — Schade darum, daß sich die erste Nachricht nicht bewahrheitete. Eine sehr schöne wahrheitsgetreue Abbildung des Dodo ist in dem Berliner Zoologischen Museum vorhanden. H. W.

Ueber das Nisten der Zwergpapageien.

(Vom Herausgeber).

Als ich zuerst in der Gefangenschaft den Sperlingspapagei (P.—Psittacula—passerinus) züchtete, bemerkte ich, so überaus interessant diese Brutentwickelung auch im Ganzen ist, doch nichts vorzugsweise Absonderliches. Ebenso schritten die Unzertrennlichen oder Inseparables (P. pullarius) bei mir und andern Züchtern öfter zur (leider niemals erfolgreichen) Brut und zwar wie Jene in der Weise aller Papageien, welche in der Regel keine Nester erbauen, sondern ihre Eier einfach auf einer Grundlage von Sägespähnen erbrüten.

Es ist wol allbekannt, daß Seidel, der Futtermeister des Berliner Aquarium zuerst die interessante Beobachtung gemacht, daß der Rosenpapagei (P. roseicollis) dagegen ein Nest erbaut. Und zwar erscheint nicht allein der Nestbau an und für sich, sondern auch besonders die Art und Weise interessant, in welcher diese Vögel das Nistmaterial eintragen. Dies sind nämlich Holzspähne, welche sie mit dem Schnabel fein zerschlissen haben und dann, den Kopf rückwärts biegend, zwischen die Federn des Hinterrückens stecken, um sie so in den Nistkasten zu bringen. Dieser Vorgang ist, durch eine Mittheilung des damaligen Direktors vom Aquarium in der „Gartenlaube" allbekannt geworden.

Hochinteressant dürfte es nun aber erscheinen, daß auch die vierte Art der in den Handel gelangenden Zwergpapageien, das Grauköpfchen (P. canus) ebenfalls und in gleicher Weise zum Neste einträgt. Bevor ich meine Beobachtungen hierüber mittheile, schicke ich jedoch diejenigen meiner hochgeschätzten Freunde, des Herrn Emil Linden in Radolfzell

und des Herrn Graf Yorck von Wartenburg auf Schleibitz, sowie des Herrn Grimm, Besitzer einer Instrumentenfabrik in Stettin, über beide Arten voraus. Der Rosenpapagei ist bis jetzt ja leider so selten, daß er trotz seines leichten Nistens erst im Berliner Aquarium, bei Herrn Linden und in meiner Vogelstube gezüchtet worden. Eine ausführliche Schilderung seiner Brut ist bis jetzt noch nirgends, selbst in den neuesten Handbüchern noch nicht zu finden und daher werden unsere Schilderungen für viele Leser hoffentlich willkommen erscheinen. Herr Linden schreibt:

Endlich kann ich Ihnen die gute Nachricht geben, daß mein Paar Rosenpapageien glücklich eine Brut Junge großgezogen, die wirkliche Anzahl kann ich Ihnen noch nicht sagen, bis heute sind zwei ausgeflogen und wie es mir scheint, noch drei im Nistkasten.

Wie Sie wissen, hatte ich diese Papageien kurz vorher erhalten, als Sie im vorigen Jahre mich besuchten und dieselben befanden sich noch in einem besondern Käfig, aus dem wir sie an dem Morgen Ihrer Abreise in den größern Raum zu den Webervögeln einfliegen ließen. Dies that aber nicht lange gut, da kein anderer Vogel weder auf der gleichen Stange noch gleichzeitig an den Freßgeschirren gelitten wurde. Ich brachte das ungemein lebhaft stürmische Pärchen daher in eine ebenfalls größere Räumlichkeit zu drei Paar Plattschweifsittichen, blasköpfigen Rosella's (P. palliceps), Ringsittichen (P. semitorquatus) und Bauers Edelsittichen (P. zonarius), aber selbst mit diesen großen Vögeln lebten sie in fortwährendem Unfrieden. Wollte Einer der Plattschweife nicht von dem oberen Stangen weichen, wurde demselben ganz tüchtig in die Füße gebissen und oft genug ist Blut geflossen.

Nun richtete ich den Rosenpapageien eine besondere Abtheilung ein, in welcher sie bis zum heutigen Tage geblieben sind. Ich hatte nicht sogleich einen Nistkasten eingesetzt, bis ich und zwar schon vor bald einem Jahre auf einem zusammengescharrten Häufchen Hülsen von Kanariensamen ein Ei gelegt fand, nun einen Schleusinger Nistkasten mit einem 10 Centimtr. hohen Lager von Sägespähnen anbrachte und das Ei auch da hinein legte. Schon nach einigen Tagen sah ich das Weibchen nicht mehr und es war lange Zeit nur des Morgens, wenn frisches Futter gebracht wurde, sichtbar. Am Weihnachtstage vorigen Jahres sah ich einmal nach und fand ein Gelege von 6 Eiern, rein weiß und ganz in der Größe der Eier von Wellenpapageien; das Weibchen war so eifrig und hatte dadurch so weit alle Scheu abgelegt, daß es so zu sagen auf der Hand sitzen blieb, bis ich den Schieber wieder zugemacht und den Kasten umgedreht hatte. Es gingen Monate vorüber, ohne daß sich etwas regte und wenn nicht das Weibchen manchesmal zum Vorschein gekommen, so hätte ich muthmaßen können, daß es nicht mehr lebe; auch das Männchen war zeitweilig ebenfalls im Kasten, was gewiß nicht der Fall gewesen, wenn das Andere todt darin war.

Im März v. J. sah ich endlich wieder nach und fand eine große Zahl Eier, was mich vermuthen ließ, daß die erstgelegten nicht befruchtet und also nicht ausgebrütet werden konnten. Doch hatte ich immer wieder neue Hoffnung. — Indessen hatte ich dann erst aus einem andern Züchtungserfolge der Rosenpapageien gelesen, daß Niststoff in den Kasten getragen wurde, und brachte ihnen verschiedenes Material, was aber immer unberührt blieb. Im Mai öffnete ich den Schieber wieder und glaubte wirklich daß sich etwas bewege, schloß schnell wieder zu; das Weibchen war und blieb fast beständig im Kasten und wenn man zu nahe kam huschte das Männchen ebenfalls schnell hinein. Im Juli blieben Beide während zweier Tage außerhalb des Kastens und ich beobachtete am zweiten Morgen eine Begattung, was mich die gehoffte Brut zweifelhaft erachten ließ. Daher nahm ich den Kasten ganz heraus und richtig war weder etwas Lebendes noch ein einziges Ei zu sehen; ich konnte also nichts Anderes denken, als die Jungen seien vielleicht zu Grunde gegangen und die andern vorher gesehenen vielen Eier verzehrt worden. — Ich schüttete also den ganzen Inhalt des Kastens aus, um wenigstens mögliche Ueberbleibsel der Jungen zu finden, aber wie sehr erstaunte ich, als mitten in den Sägespähnen eine ganze Masse Eier waren, wovon mir ein Theil noch ziemlich frisch erschien, nämlich durchsichtig; die Andern öffnete ich und fand einen Theil ganz ausgetrocknet, aber zehn derselben waren nicht nur angebrütet, sondern enthielten schon ziemlich weit ausgebildete Körperchen. — Dagegen war keine Spur einer Schale, oder eines Ueberbleibsels von Jungen zu sehen. Ich gab den Vögeln einen gleichen Kasten wieder, drückte die Sägespähne aber recht fest hinein und eine so hohe Lage, daß sie fast bis zur Oeffnung ging, und legte 12 als gut befundene oder dafür angesehene Eier hinein und noch am gleichen Abend war das Weibchen drinnen und blieb wie vorher so lange Zeit, auch fast immer verschwunden.

Im September nun sah ich doch und zwar dieses Mal gründlich nach und sah jetzt deutlich ein Häufchen Junge, noch winzige Geschöpfchen, mit ganz unförmlichen Köpfen. Ich hatte nun die Gewißheit, daß Junge vorhanden waren, wollte aber so lange keine Mittheilung machen, bis ich auch wirklich ausgeflogene Junge gesehen, denn dieses ist doch eine Hauptsache und nur ein wirklicher Züchtungserfolg. Jetzt endlich also ist dies, wie schon erwähnt, wirklich der Fall.

Ich hoffe, daß die noch im Kasten befindlichen wahrscheinlich drei, also zusammen fünf Junge gut aufkommen, wie es jetzt den Anschein hat.

(Fortsetzung folgt.)

Schadet es dem Gesange der Harzer Kanarienvögel, wenn dieselben zur Zucht gebraucht werden?

(Von Kontroleur Böcker in Wetzlar).

Diese Frage wurde kürzlich von einem Liebhaber von Harzer Kanarien an mich gestellt; da dieselbe von allgemeinem Interesse ist, so will ich es versuchen, sie hier zu beantworten:

Ich habe häufig die Ansicht aussprechen hören, daß es besser sei, einen vorzüglichen Sänger nicht in die Hecke zu setzen, sondern nur als Vorschläger zu benutzen, da in der Hecke der ursprünglich zarte Gesang verloren gehe, sich in einen lauten, mitunter harten Schlag verwandle und der Hahn überhaupt in der Hecke zuviel Abhaltung habe, seinen Gesang zu üben. Das Wahre an der Sache wird die folgende Darstellung ergeben.

Ich hatte vielfach die Gelegenheit, die besten Sänger, welche es überhaupt geben kann, theils in meiner eignen Hecke, theils in der Flughecke meines Nachbars und endlich in der Käfighecke meines Freundes und Kollegen, im Gesange zu beobachten. Der Letztere setzt seit einigen Jahren zu einem Hahn zwei, im letzten Jahre nur ein Weibchen; er besitzt seit dem vorigen Jahre zwei Pärchen und seit vorigem Frühjahre zwei ganz vorzügliche Hohlroller. Obwol diese Vögel nun vom Frühjahr bis zum Spätsommer in der Hecke gewesen sind, so haben sie doch stets fleißig und so schön und zart gesungen, wie vor Beginn der Hecke; nur wenn die Jungen ausgeschlüpft waren, trat auf etwa acht Tage eine Pause im Gesange ein; ganz eingestellt wurde er aber auch dann nicht. Der eine der beiden Vögel singt in diesem Augenblicke wieder ebenso schön wie früher, der andere scheint in der Mauser gestört worden zu sein; er singt zur Zeit noch nicht.

Vor zwei und vor drei Jahren besaß derselbe Züchter einen andern, ebenfalls vorzüglichen Harzer Vogel. Dieser hatte wieder in einer Käfighecke zwei Weibchen und deren Junge zu füttern; er sang wenig, auch während die Weibchen brüteten, aber immer so schön wie außer der Hecke und war namentlich auch nach der Mauser noch derselbe gute Sänger. Nur während der Ausbildung der Jungen ging er etwas zurück, indem er in einer ganz besonders tiefen und schönen Tour die dünnere Stimme eines jungen Vogels nachahmte. Ganz genau dieselbe Erfahrung habe ich vor 12 Jahren mit einem vorzüglichen Sänger, den ich bei einem Weibchen in einer Käfighecke gehabt hatte, machen müssen. Nicht die Hecke, die ihm von Vortheil gewesen war, da ihm das nahrhafte Futter die Mauser um ein Merkliches gegen das Vorjahr erleichtert hatte, — sondern die Ausbildung der jungen Vögel nach der Rauhzeit brachte ihn in einer Tour etwas zurück. Auch bei einem zweiten, auf kurze Zeit in die fliegende Hecke gebrachten ganz vorzüglichen Sänger hatte ich mehrere Jahre nachher dasselbe Unglück. Die jungen Vögel, die andern Stammes waren, brachten denselben unmittelbar nach der Mauser derart in Verwirrung, daß er von seiner frühern Melodie ganz abzugehen drohte. Ich brachte ihn nun in ein besonders Zimmer und hier erholte er sich in 14 Tagen vollständig. Als ich ihn demnächst wieder zu den Jungen brachte, würden verschiedene seiner Rollen kürzer und noch um Weihnachten verdarben ihn die jungen Vögel in seiner schönsten Gluckertour.

Wieder ein anderer vorzüglicher Kollervogel sang, ungeachtet der durchgemachten Hecke, nach der Mauser entschieden besser, als früher, so lange er allein hing. Der Vogel war wieder vollständig auf dem Gesange, als ich ein Dutzend junger Vögel desselben Stammes zu ihm brachte, um sie auszubilden. Nun aber verlor er selbst bei der gebräuchlichen Eifütterung eine wunderschöne, dem Nachtigalenschlage entlehnte Koller, die nur ihm, aber keinem der Jungen eigen war. Später, nach etwa 14 Tagen waren ihm blos zwei Vögel zur Ausbildung geblieben und er brachte dann auch die erwähnte Kollertour wieder.

Mein Nachbar, dessen ich oben erwähnte, setzte vor einigen Jahren einen ganz vorzüglichen, durchaus fehlerfreien Hohlroller in eine kleine Flughecke zu vier oder fünf Weibchen. Die ersten Jungen seiner Hecke rührten von einem früher eingesetzten, demnächst aber entfernten Kollervogel her. Obgleich der Hohlroller viele Arbeit in der Hecke hatte, so hielt er sich doch sehr gut im Gesange bis gegen das Ende der Heckzeit. Nun aber fiel es unglücklicher Weise einem Weibchen ein, etwas von seiner eignen Gesangsfertigkeit erschallen zu lassen und obwol es nicht schön war, was der Hohlroller da plötzlich zu hören bekam, so eignete er sich doch die Paar Strophen an. Er hatte nun seinen Gesang zwar um einige Touren bereichert, die von seinem weichen Organ vorgetragen, auch nicht sehr mißtönig erklangen; aber der Vogel war doch gleich nur die Hälfte dessen werth, was er früher gekostet hatte.

Solche singenden Weibchen — und unmittelbar nach beendigter Brut singen sie alle — können in der That dem Gesange der Zuchthähne sehr gefährlich werden; sie verderben zunächst die jungen und durch diese auch die alten Hähne, wenn man sie nicht bei Zeiten herausfängt.

Der eben erwähnte Hohlroller wurde dann in demselben Herbst bei bloßer Samenfütterung insofern noch verdorben, als seine Rollen immer kürzer und kürzer und seine schönsten Touren immer seltener wurden; er erholte sich aber in meinem Besitz bei Eifütterung und im besondern Zimmer wieder sehr gut; nur hat er die dem Gesange des Weibchens entlehnten Töne bis heute beibehalten, ist auch in den folgenden Jahren im Besitze eines Dritten immer etwas zurückgegangen, obgleich er meines Wissens nur noch ein Jahr zur Zucht verwendet worden.

Andere Zuchthähne meines oben erwähnten Nachbars gingen, so lange sie im ersten Jahre in der Hecke waren, im Gesange nicht zurück; nach der Mauser aber erreichten verschiedene Touren und grade die schönsten, nicht die frühere Tonfülle und auch keiner der jungen Vögel leistete darin etwas Bedeutendes. Ich habe dieses sowie den Umstand, daß die alten Zuchthähne auch noch einige Rollen verloren, der mangelnden Eifütterung zugeschrieben. Bloßer Sommerrübsen während und unmittelbar nach der Mauser scheint mir nicht zu genügen; ich glaube diese Erfahrung in frühern Jahren an meinen eigenen Vögeln gemacht zu haben.

(Schluß folgt.)

Anfragen und Auskunft.

Anfrage: Ich habe eine Vogelstube, hauptsächlich zur Kanarien-Hecke eingerichtet; es befinden sich darin außer Harzer Kanarienvögeln so ziemlich alle hiesigen Finken-Arten paarweise vertreten, wie Buchfinken, Flachsfinken, Zeisige, Blutfinken, Stieglitze, Tannenfinken. Ich möchte gerne wissen, ob dieselben alle während der Heckzeit der Kanarien, in der Vogelstube bleiben können, und ob Letztere nicht durch diese Finken in der Brutzeit gestört werden?

Ad. Spindler in Hilden.

Antwort: Lesen Sie gefälligst in meinen Büchern „Der Kanarienvogel“ (15 Sgr.) und „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (1⅓ Thlr.) nach. Dort finden Sie alle solche Verhältnisse erörtert. Dr. R.

Anfrage: Bitte demnächst freundlichst eine Anfrage aufnehmen zu wollen, diejenige Hühnerasse betreffend, welche für Norddeutschland, insbesondere Ostpreußen und zwar für große Güter die beste sei? Seit dem Bestehen des Blattes bin ich Leser, bisher ist aber von allen Hühnerassen noch keine bezeichnet worden, welche obigen Anforderungen, also leichter Züchtung und gutem Ertrag am meisten entspricht. Ein Urtheil darüber würde für mich von großem Interesse sein, zumal, wenn zugleich Bezugsquellen angegeben würden.

Claeßens in Loyden.

Anfrage: Welches sind die Entstehungsursachen der bei den Hühnern vorkommenden Rachenfäule, ist diese Krankheit ansteckend, und giebt es außer Höllenstein noch andere Mittel zur Hebung derselben? L. Baus in Eltville.

Ausstellungen.

Die zweite allgemeine Geflügel-Ausstellung der „Cypria“,

Verein der Geflügel-Freunde in Berlin, vom 20. bis 24. Februar, im Gebäude der alten Münze, am Werderschen Markt.

I.

Dem Freunde der Sache gewährt die Ausstellung des Vereins „Cypria“ einen Ueberblick, welcher vorzugsweise bezeichnend erscheint Das Ausstellungsverzeichniß umfaßt 585 Nummern und zwar 360 Paar Tauben, 130 Stämme Hühner und 95 Nummern Sing- und Schmuckvögel in etwa 250 Köpfen. Bei diesen Zahlen ist aber zu bemerken, daß die Ausstellung, selbst wenn die Anzahl der vorhandenen Pärchen, Stämme und Köpfe hinter der einer anderen Stadt zurückbleiben sollte, dies doch in Hinsicht des Werthes der ausgestellten Thiere geradezu unmöglich ist. Denn eine Taubensammlung, wie sie von der Frau Prinzeß Karl von Preußen, den Herren Direktor Dr. Bodinus, Moeser, Pausch, Koppe, Petzold, Kratzenberg, Keller, Goeltzer, Michael, Goldstein, also, den Mitgliedern der „Cypria“ hier zusammengebracht worden, kann wol schwerlich irgend ein anderer Verein den Beschauern vorführen. Aehnliches dürfen wir von den Hühnern aussprechen, denn auch hier zeigt sich eine großartige und selten schöne Sammlung. Schließlich müssen wir, selbst wenn wir die persönliche Bescheidenheit auch noch so weit treiben wollten, doch aussprechen, daß eine Sammlung von Schmuck- und Singvögeln, wie sie das Berliner Aquarium, Dr. Karl Ruß' Vogelstube und die Vogelhandlung von W. Mieth gemeinschaftlich geliefert haben, weder in Deutschland, noch in anderen Ländern übertroffen werden kann.

Um diese Behauptung nicht zu kühn oder wol gar anmaßend erscheinen zu lassen, müssen wir jetzt den Beweis antreten und beginnen denselben mit der Schilderung der Tauben.

Die Frau Prinzessin Karl von Preußen läßt ihre herrliche und bereits weltbekannte Taubensammlung durch 18 Pärchen vertreten sein. Die ersten vier Paar, französische Herzkröpfer in verschiedenen Farben, sind so vortrefflich, daß ich eigentlich begierig bin, zu hören, welchem Pärchen davon unsere Preisrichter den Vorzug geben werden. Daneben 1 Paar blaue Ballonkröpfer, ferner 4 Paar der wunderniedlichen ägyptischen Mövchen sind sämmtlich ebenfalls tadellos, und von den nicht minder schönen chinesischen Mövchen ist das gelbe Pärchen entschieden das beste. Von den übrigen sind noch besonders die bucharischen Trommeltauben zu erwähnen, jene seltenen und überaus kostbaren Tauben, welche von Rußland aus hergebracht und durch den Verein „Cypria“ den deutschen Liebhabern zugänglich gemacht worden.

Herr Direktor Dr. Bodinus hat aus dem Zoologischen Garten nur 5 Pärchen gesandt, aber diese kleine Sammlung ist nicht allein von sehr hohem Werth, sondern sie bietet auch ein ganz absonderliches Interesse. Ein Paar Mekka-Tauben, ebenfalls 2 Paar Bucharei-Tauben, 1 Paar köstliche weiße Cyprische Tauben und 1 Paar gelbe englische Kropftauben gewähren für den Kenner, wie für den Liebhaber zugleich einen ganz eigenen Reiz. Die schneeweißen Cyprier sind überdies gleichsam als das Symbol des Vereins anzusehen.

Die reichhaltige Sammlung des Herrn W. Moeser, Buchdruckereibesitzer, bringt den Kenner ebenfalls in nicht geringe Verlegenheit, denn diese herrlichen englischen Karrier in 8 Pärchen, diese ebenso kolossalen als prachtvollen Römertauben, diese Bagdetten, Florentiner, Sticken u. a. wetteifern an Schönheit und Werth. Wem soll man von ihnen den höchsten Preis zu erkennen, den schwarzen Römern oder den Römertauben gris piqué, den rosafarbenen oder den weißen, schwarzen, chokoladenfarbigen Karriers, den blaugescheckten oder den andern Bagdetten!

Die Pfauentauben des Herrn Otto Pausch, Silberwaaren-Fabrikant, sind unter den deutschen Liebhabern und selbst unter den Belgischen, was doch gewiß viel sagen will, geradezu hochberühmt. Die Sammlung steht einzig in dieser Art da und ist so werthvoll, daß man kaum 1 Paar besonders hervorheben darf; doch seien die Besucher auf die weißen Riesen-Pfauentauben (No. 44.) vorzugsweise aufmerksam gemacht. Wie großartig diese Sammlung von Pfauentauben aber eigentlich ist, geht daraus hervor, daß Herr Pausch außer den hier ausgestellten 18 Pärchen zu gleicher Zeit nahezu ebenso viele zur Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht in Köln sendet.

Wiederum eine prachtvolle Sammlung, nur von zwei Rassen, chinesischen Mövchen und ebenfalls Pfautauben, von den ersteren 10 Paar in tadellosen Exemplaren und von den letztern 6 sehr schöne Pärchen hat Herr Rentier Hermann Koppe ausgestellt. Zehn verschiedene Farben der seltenen schönsten Chinesen hat noch keine Ausstellung aufzuweisen gehabt.

Die Sammlung des Herrn Klempnermeister Petzoldt, eines Veteranen des Vereins, dürfen wir nicht unerwähnt lassen. Sie besteht aus 18 Pärchen verschiedener Tauben, unter denen viele ebenfalls sehr lobenswerth sind. Die hübsche Sammlung des Herrn Baumeister W. Kratzenberg hat 1 Paar ganz besonders schöne schwarze Karrier aufzuweisen. Herr Geh. Justizrath Keller hat nur zwei Paar ausgestellt, rheinische Ringschläger und kappige weiße Mövchen mit schwarzen Schwänzen, welche letzteren ganz vorzugsweise prächtig sind. Aus der reicheren Sammlung des Herrn O. Goeltzer aus Charlottenburg müssen wir 2 Paar hellblaubunte Tümmler, 1 Paar Pariser Mövchen und 1 Paar tollige rothe Mövchen mit weißen Schwänzen hervorheben.

Wiederum eine herrliche Sammlung von 6 Paar Tauben, welche durchaus tadellos sind, hat Herr H. Michael, Restaurateur, ausgestellt. Die rothen, gelben, blauen und schwarzen französischen Herzkröpfer suchen ihresgleichen und ebenso schön sind die chokoladenfarbigen Karrier und schwarzen ägyptischen Mövchen. Gleiches müssen wir von der Sammlung des Herrn Siegfried Goldstein sagen, denn die weißen Lockentauben, gelben, rothen und schwarzen Perrückentauben sind herrlich; doch als die schönsten von allen erscheint uns das Pärchen mit blauem Täuber und gelber Taube. Loben wollen wir auch die Perrückentauben des Herrn Nitzhaupt aus Spandau und die Almonds des Herrn R. Bartholomäus, ferner die Berliner altstämmigen Tümmler des Herrn A. Bohnefeld und die gleichen Tümmler des Herrn Th. Leddihn, unter deren letzteren 1 Paar rothbunte ganz besonders hervorzuheben ist. Diese altstämmigen Tümmler bilden bekanntlich eine besondere Specialität hier in Berlin.

(Fortsetzung folgt).

Aus den Vereinen.

Verein für Geflügelzucht in München.

Bericht. Während in Norddeutschland Geflügelzüchter-Vereine seit Jahren eine reiche Thätigkeit entfalteten, begründet sich in München der erste Geflügelzüchter-Verein unter dem Namen **„Verein der Münchener Geflügel- und Vogelfreunde"** am 4. April 1871, neben dem Nürnberger ornithologischen Vereine Jahre lang wol der einzige in Süddeutschland.

Seine Stifter waren die Herren Delcroix, Grünberg sen., Kanreuther, Mendler, J. Müller, Neuner, Rudolph, Scheurer, Schink, J. Steinmetz jun. und F. Stöhr. J. Steinmetz wurde der 1. Vorstand des Vereins.

Schon im Oktober 1871 trat der junge Verein bei dem bayer. Centrallandwirthschaftsfeste im Glaspalaste mit einer Ausstellung von 9 Stämmen Hühnern und 65 Paar Tauben in die Oeffentlichkeit. Er wurde durch Verleihung des Ehrendiploms ausgezeichnet. Im Winter 1871|72 wurde, im Benehmen mit dem Thierschutzvereine, der dem jungen Vereine freundlichst entgegenkam, zum Zwecke des Vogelschutzes Vorsorge für Fütterung der Vögel auf offenen Gartenplätzen getroffen. Für Beschaffung billigen Futters bildete sich unter den Mitgliedern eine Gesellschaft auf Aktien.

Die Oktobersestausstellung im Glaspalaste d. J. 1872 konnte der Verein schon mit 36 Stämmen Hühnern, 175 Paar Tauben und 111 Nummern in- und ausländischer Vögel beschicken. Es wurden eine silberne, eine broncene Medaille und 35 Ehrendiplome den Ausstellern zuerkannt; zur Verloosung wurde für 188 fl. 30 kr. Geflügel angekauft. Als auswärtige Preisrichter waren Kleemann aus Stuttgart und Emilius aus Nürnberg zugezogen. Der landwirthschaftliche Central-Verein hatte sich auch bei dieser Ausstellung, wie später vielfach, als ein stets uneigennütziger und großmüthiger Freund und Gönner unseres Vereines bewährt.

Das Interesse an dem Vereine wuchs; die Betheiligung wurde lebhafter. Der Verein wirkte nach innen und außen in förderlicher Weise. Die Erfolge der bisherigen Lokal- und Landesausstellungen im Glaspalaste ermuthigten zu dem selbstständigen Unternehmen einer ersten **allgemeinen deutschen Geflügel-Ausstellung,** der ersten in Süddeutschland.

Der neugewählte Vereins-Ausschuß, Dr. Franken I. Vorstand, Delcroix II. Vorstand, v. Uechtritz Kontroleur, v. Leveling I. Sekretär, M. Müller II. Sekretär, Friedrich Kassier, Seybold und Rudolph als Beisitzer, bereitwilligst unterstützt aus der Mitte des Vereins, nahmen die Sache kräftig in die Hand. Sobald die königl. Hoftheater-Intendanz in liberalster Weise die Räume des kgl. Odeon, den kleinen Saal mit Nebenräumen, für die Ausstellung zugestanden hatte, wurde dieselbe, verbunden mit einem Glückshafen, für den 22. bis 26. März 1873 ausgeschrieben. Preisregeln wurden festgesetzt. Als Preisrichter waren außer den Einheimischen Müller, Friedrich, Stöhr, Neuner, v. Uechtritz, Seybold, Hendschel und Delcroix, die Auswärtigen Dietz in Frankfurt a. M., Kleemann in Stuttgart und Emilius in Nürnberg zugezogen; den letzteren wurde neben freiem Quartier freie Her- und Rückfahrt garantirt.

Die Ausstellung im kgl. Odeon wurde am 22. März mit 98 Stämmen Hühnern, mehreren Fasanen, Enten, Gänsen, Tunis-Mövchen, Perlhühnern, Truthühnern und Pfauen, mit 320 Paaren Tauben und 110 Nummern Vögeln, in Paaren, Kollektionen und Volièren, eröffnet. Hiervon wurden während der Ausstellung verkauft 68 Stämme Hühner, 200 Paar Tauben, 280 Paare Vögel und fast sämmtliche Fasanen, Truthühner, Enten u. dgl.

Die Ausstellung zeigte sich in jeder Beziehung auf der Höhe der Zeit. Die Theilnahme und der Andrang des Publikums war unerwartet lebhaft. Bei Ankäufen wurden oft die kostbarsten Gegenstände bevorzugt. Die Aussteller konnten, ohne übertriebene oder geradezu ungerechte Ansprüche, mit dem Ergebniß zufrieden sein. Auch der Verein fand seine Rechnung. Trotz einer Ausgabe von nahezu 6000 fl. blieb ihm ein nicht unbedeutender Ueberschuß.

Vom Preisgericht waren zuerkannt: für Hühner 27 erste, 22 zweite und 3 dritte Preise; für Tauben 24 erste, 25 zweite und 4 dritte Preise; für Vögel 4 erste Preise. Die ersten Preise bestanden in 1 silbernen, die zweiten in einer bronzenen Medaille; die dritten Preise in Diplomen. Die Medaillen, in der kgl. Münze geprägt, waren von dem Künstler P. Herwegen gezeichnet und von dem Graveur Oehring gestochen; vorzüglich in Entwurf und Ausführung. Das Diplom, eine Lithographie, Großfolio in zwei Farbtönen von P. Herwegen, stellt die Geflügel- und Vogelwelt in ihren Beziehungen zum Hause dar und ist ein Kunstblatt, würdig des berühmten Meisters, aus dessen Händen es hervorgegangen ist.

(Schluß folgt).

Ornithologischer Verein in Stettin.

Sitzung vom 4. Februar.

Herr Eisenbahnbaumeister G. Keßler hielt einen mit Beifall aufgenommenen Vortrag über Sumpf- und Wasservögel, derer er eine große Anzahl von Arten während eines mehrjährigen Aufenthaltes auf Hiddensoe genau zu beobachten Gelegenheit hatte. Redner giebt ein anziehendes Bild von dem Leben dieser interessanten Vögel in den verschiedenen Jahreszeiten und macht Mittheilung auch über ihr Leben in der Gefangenschaft, da die Mehrzahl der in den früheren Jahren im Berliner Aquarium vorhandenen Wasservögel durch ihn gefangen, gezähmt und an die genannte Anstalt gesandt sind. Zur Veranschaulichung einiger der weniger bekannten Schwimmvögel hatte er das im Auftrage der Oesterreichischen Regierung herausgegebene, mit vielen prachtvollen Farbendruckbildern ausgestattete Werk von Dr Ant. Fritsch „Die Vögel Europas" ausgelegt. — Herr Reimer bringt ein Schreiben des Herrn Dr. Jütte, den Vogelfang in der Schweiz und in Italien betreffend, zur Kenntniß der Versammlung, in welchem der Verfasser dem Verein Rathschläge und Material zur Begründung einer höheren Orts einzureichenden Vorstellung behufs Erlasses eines allgemeinen Vogelschutz-Gesetzes zugehen läßt. Die Versammlung nimmt hiervon dankend Notiz. *) — Dr. Oeltze bemerkt bei dieser Gelegenheit und im Verlaufe einer Debatte über den Vogelfang in Deutschland, daß die zu Tausenden in den Handel gelangenden sogenannten Leipziger Lerchen keine Lerchen, sondern Schwalben sind, auch nicht in Leipzig, sondern bei Halle in großer Anzahl in Netzen gefangen werden. **) Herr Hauptmann Boedicker erstattet Bericht über die Thätigkeit der Vogelschutz-Sektion II. (Berliner Thor bis Bellevue). Am 2. Februar wurden die ersten Nistkästen auf dem Terrain des alten Militärkirchhofes und dem Glacis in einer Anzahl von 350 Stück aufgehängt, und wird damit noch täglich in den übrigen 6 Sektionen fortgefahren, bis die Anzahl Nistkästchen (2000 Stück) verbraucht ist. Sie sind nach Angabe der kundigsten Vogelwirthe, unter Zuhilfenahme aller neueren Verbesserungen angefertigt, und steht zu hoffen, daß sie von Vögeln aller Arten angenommen werden, umsomehr da noch für ein Haupterforderniß gesorgt wird, welches bisher fast immer und überall übersehen ist. Es sind dies die vom Verein eingerichteten Futterplätze, die vor Allem den Vogel bestimmen, sich häuslich niederzulassen. Redner giebt eine ausführliche Beschreibung derselben, und schildert in anziehender Weise das lustige Leben der gefiederten Welt kurz nach dem Ausstreuen der Sämereien. Schon jetzt ist es gelungen, einige Vögel zu fesseln, die uns sonst im Herbste zu verlassen pflegen, darunter Dompfaffe und Braunelle. Mit dazu beigetragen hat wol jedenfalls auch der bisherige milde Winter. Post-Inspektor Wernich theilt mit, daß er in seiner Sektion mehrfach Knaben angetroffen, die sich mit der Zerstörung der ausgehängten Brutkasten beschäftigten, und richtet an die anwesenden Lehrer die Bitte, durch Ermahnung und Belehrung dem Unwesen zu steuern. Hauptlehrer Schneider und Lehrer Röhl werden die Sache bei den Kollegen, bezüglich im Lehrer-Verein zur Sprache bringen. — Aus Demmin ist ein Schreiben an den Vorstand gelangt, worin mitgetheilt wird, daß sich daselbst unter dem Vorsitz des Direktor Dr. Schramm ein Ornithologischer Verein gebildet hat, und worin um Aufnahme in den hiesigen Verein ersucht wird. Die Versammlung beschließt einstimmig, den jungen Schwester-Verein als Mitglied ein für allemal aufzunehmen und nach Kräften zu unterstützen. — Zum Schlusse gelangt das gedruckte Ausstellungs-Programm zur Vertheilung. (Die Ausstellung ist inzwischen des ungünstigen Wetters wegen aufgeschoben.) — Aufgenommen werden 34 neue Mitglieder.

*) Dasselbe hier aufzunehmen sind wir gern bereit.

**) Wenn die Verwechselung der Schwalben und Lerchen kein Märchen sein sollte, so wären uns weitere Mittheilungen sehr erwünscht.

Bücher- und Schriftenschau.

Forstzoologie II.; **Vögel,** von Dr. B. Altum, Professor der Zoologie an der Königl. Forstakademie zu Neustadt-Eberswalde.
Berlin, 1873. Verlag von Julius Springer.

Der Verfasser hat uns in diesem umfassenden Werke von 632 Seiten, wiederum einen Beweis seiner ausgedehnten fleißigen Forschungen gegeben, welche sich denen des ersten Bandes über Säugethiere, in ähnlicher Weise anschließen. Wie auch in jenem ersten Theil, giebt uns der Verfasser einen Gesammtüberblick über die ganze Klasse, beginnt hier mit den Papageien und hört mit den Tauchern auf, wobei alle fremdländischen Vögel natürlich nur kurz erwähnt werden. Es geht diesem speciellen Theil eine Einleitung von 36 Seiten voran, welche von dem anatomischen Bau, dem Leben und den Lebenserscheinungen der Vögel sprechen und vieles Neue und Schätzenswerthe erhalten.

Dem Kukuk, als dem zunächst abgehandelten Vogel von allgemeinstem Interesse, sind allein 14 Seiten gewidmet, durch welche seine große Nützlichkeit im Naturleben auf das Schlagendste dargethan wird. Von hohem Interesse ist die Behandlung der Spechte, welche 41 Seiten einnimmt und ist dieselbe von vielen bezüglichen Holzschnitten begleitet. Der Verfasser stellt sich bei dieser Darstellung aber leider zu sehr auf den einseitigen Standpunkt des strengsten Materialismus und bezüchtigt diese Sippe theilweis eines argen Holzfrevels, dem möglicherweise einzelne Individuen, durch lokale und temporale Verhältnisse gezwungen, zeitweise verfallen sind. Wer aber die große Nützlichkeit der Spechte von anderer Seite her kennt, den muß eine derartige Schuldigsprechung schmerzlich berühren, weil sie ganz dazu angethan ist, großer Willkühr die Schranken zu öffnen und einen unerquicklichen Meinungsstreit hervorzurufen. Sind unsere heutigen Wälder schon so entsetzlich arm, daß das Verzehren einiger tausend Tannenzapfen und das muthwillige Hämmern einiger Buntspechte, ihnen wirklichen Schaden zuführen sollte, dann ist unsere ganze gegenwärtige Forstkultur im höchsten Grade zu bemitleiden, und für den lauten Schrei eines munteren Spechtes, möge dann immerhin die erschreckende Stille einsamer Waldesruhe treten.

(Schluß folgt).

Unter den Patagoniern. „Wanderungen auf unbetretenem Boden von der Magalhaes-Straße bis zum Rio Negro" von George Chaworth Musters, Kapitän in der britischen Marine. Autorisirte Ausgabe für Deutschland. Aus dem Englischen von J. E. A. Martin (Jena H. Costenoble). Unter den hier bereits empfohlenen Reisebüchern in dem genannten Verlage ist das vorliegende neueste für alle Freunde derartiger Lektüre wiederum vorzugsweise interessant. Wir können hier natürlich nur ganz kurz empfehlend darauf hinweisen, indem wir versprechen, daß wir demnächst eine interessante Schilderung daraus, die Vogelwelt jener Gegenden betreffend, unsern Lesern bieten werden. Vorläufig sei nur noch hinzugefügt, daß das Buch mit 9 Illustrationen in Ton- und Schwarzdruck versehen und im Uebrigen in der von dieser Verlagshandlung bekannten vortrefflichen Weise ausgestattet ist.

Briefwechsel.

Herrn Lehrer **S.** in **N.**: Ihre weiteren Aufträge werden uns stets willkommen sein. — Herrn **E. S.** in Palmyra: Ihren ersten Beitrag finden Sie bereits in Nr. 2. aufgenommen. Auch alle übrigen uns freundlichst angebotenen Aufsätze sind willkommen. Wir würden den Ihren letzten Zeilen beigelegten sofort abdrucken, doch fehlt demselben leider der Schluß. In Betreff des Portos machen Sie sich nur keine Sorge; im Gegentheil wünschen wir Ihre Briefe ganz unfrankirt zu erhalten. — An die Direktion des Allgemeinen deutschen Ehevermittelungs-Instituts zu Berlin: Da bis jetzt in der Vogelwelt das Bedürfniß, welches Sie so wohlwollend zu befriedigen streben, sich noch nicht fühlbar gemacht hat, so müssen wir alle weiteren Zusendungen Ihrer Prospekte u. dgl. dankend ablehnen. — Herrn Ad. Spindler in Hilden: Wir müssen Sie ebenso wie die übrigen ungeduldigen Herren Inserenten und ebenso die Herren Mitarbeiter darauf aufmerksam machen, daß es uns doch leider geradezu unmöglich ist, eine Annonce, ja selbst den dringendsten Artikel noch in die laufende Nr. zu bringen, wenn die letztere bereits im Druck sich befindet. Alle Annoncen, die bis zum Donnerstag Abend eingehen, können noch aufgenommen werden, während es bei den später ankommenden unsicher ist, da die Nr. fast regelmäßig schon am Sonnabend gedruckt wird. — Herrn C. Schiffmann in Nürnberg: Ihre Beiträge und Bedingungen müssen wir ablehnen. —

Der Schluß des Berichts über den Zool. Garten von Hamburg kann erst in der nächsten Nr. folgen. —

Durch die Thätigkeit des Herausgebers bei der Ausstellung der „Cypria" ist diese Nr. um einige Tage verzögert; wir bitten um Entschuldigung.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

2 Nachtigalen, Schwarzköpfe, Rothkehlchen, vorzügliche Sänger, Harzer Kanarienweibchen à 10 Sgr., junge französische Lapins à Paar 2 Thlr., desgleichen größere à Paar von 4 bis 8 Thlr. empfiehlt [118
Rudolph Schmidt, Erfurt, Marktstraße.

Vogelorgeln zum Liederpfeifenlehren für Kanarienvögel, Amseln, Dompfaffen, Graupapageien ꝛc. ꝛc. mit 6 und 8 St. **Vogelbälge,** südamerikanische ꝛc. ꝛc. empfiehlt billig und erbittet Aufträge auf Vogelorgeln bald. [119
G. Benda, Coburg.

Korbnester mit Stäben,
für Kanarienvögel und Prachtfinken passend, hat à St. 2½ Sgr., so auch Staarkasten ꝛc. zu verkaufen
120] **R. Hieronymi** in **Braunschweig.**

Eine große Anzahl gebrauchter **Nistkasten für Wellenpapageien** hat à St. 12½ Sgr. abzugeben **R. Hieronymi** in **Braunschweig.** — Dieselben sind den neuen bedeutend vorzuziehen, da sie lieber und eher von den Papageien bezogen werden als Letztere. — [121

Ich habe 60 Stück ausgestopfte inländische Vögel, gruppirt in acht verglasten Kästen, zum Preise von 70 Thlr. sammt Packung abzugeben. Reflektanten stehen Verzeichnisse zur Verfügung. **Anton Klinger**
122] in Prag. Zum blauen Stern.

C. Hagenbeck's

Handelsmenagerie

HAMBURG

hält **exotische Vögel,** von den größten bis zu den kleinsten, stets in mehreren Tausenden von Exemplaren zu den civilsten Preisen vorräthig.

Näheres besagen die jeder Zeit von Reflektanten gratis zu beziehenden Kataloge.

Jetziger Vorrath.

Hell- und dunkelrothe Araras, Nasen-, Rosa-, Inka- und kleine gelbhaubige Kakadus, Amazonen-, Surinam-, Neuholländer-, Brillen- und schwarze (Vaza-) Papageien; rothbäckige Portoriko-Papageien, Königsloris, blaue Gebirgsloris, Rosellas, 3 verschiedene Arten Pennantis, Barrabands- und Bauers Sittiche, rothstirnige Neuseelands Sittiche, Nymphen- und auch Singsittiche oder Blutrümpfe; von den beliebten Halbmond-Sittichen sind auch noch einige Paare vorräthig, sowie auch noch einige Conurus jendaya; Wellensittiche, Inseparables, grauköpfige Inseparables (Psittacula cana), Sperlingspapageien, graue gehaubte und ungehaubte Kardinäle, Safranfinken, Hartlaubs- oder Mozambique-Zeisige, Graupfäffchen, Zebrafinken, Kastanienbrüstige Schilffinken, Australische Fasänchen, Muskatfinken, Reisvögel, Tigerfinken, St. Helena-Fasänchen, Astrilds, Orangebäckchen, Amarantvögel, Atlasvögel, Paradieswitwen, Dominikanerwitwen, Trauerwitwen; große Goldweber (Ploceus textor), Fuchsweber, Orangevögel, Napoleonsvögel, Madagaskar-Weber, Blutschnabel- und Rothkopfweber, sowie noch einige indische Gelbkopfweber, (Ploceus bengalensis), kleine Maskenweber, Rothflügel- und Kuhstaare, Rothbruststaare von Chili, und Jamaika-Trupiale.

Sonntag, den 18. Februar a. c.

traf die Sendung Thiere und Vögel aus Indien ein,

bestehend in:

175 von den so beliebten jungen Alexander-Perequiten, welche von allen Perequiten-Arten bekanntlich am besten sprechen und pfeifen lernen und dabei so sehr zahm werden, zu dem **fabelhaft billigen Preise von Thlr. 3 das Stück;**

85 Sonnenvögel oder Peking-Nachtigalen, sowol des Prachtgefieders als auch des schönen Gesanges wegen so sehr beliebt; sie brüten bekanntlich auch in den Vogelstuben. Diese schönen Vögel bin ich im Stande zu dem billigen Preise **von Thlr. 9 das Stück oder Thlr. 16 das Paar** abzugeben.

Büll-Büll in 2 verschiedenen Arten, Indische Staare in 6 verschiedenen, darunter einigen hier nie zuvor gesehenen Arten,

50 Paar von den niedlichen indischen Perlhalsband-Täubchen à Paar nur Thlr. 4; Nikobartauben à Paar Thlr. 75.

170 Paar japanesische gelb- und auch graugescheckte Mövchen.

45 Paar von den kleinen indischen Kampfwachteln à Paar Thlr. 5.

84 Paar dreifarbige Nonnen (Amadina malacca).

5 Paar indische Inseparables (Coryllis galgulus).

Außerdem noch eine große Sammlung von größeren Vögeln, unter welchen:

14 Rhinoceros-Vögel: 5 Buceros Rhinoceros, 2 Buceros javanensis, 6 Buceros pica, 1 neue Art.

Ferner eine Anzahl indischer Glanz-Kukuke, 4 indische Wander-Elstern, 2 chinesische Blau-Elstern, 2 Glanz-Jabiru, 8 heilige oder Antigone-Kraniche (Grus antigone), verschiedene Wasservögel, als: Glanz-Gänse, (Sarcidiornis regia), Indische Grau-Gänse (Anser ferox), Indische Wild-Gänse (Anser indicus).

Außerdem befinden sich bei dieser Sendung noch 4 Vögel, welche ich bis jetzt noch nicht bestimmen konnte. — An Säugethieren kamen folgende an:

5 schöne indische Elephanten, 1 indisches Rhinoceros, 4 Königstiger, 1 schwarzer Panther, 1 Tibeth-Bär, 6 Paar Lori (Nycticebus tardigradus), sowie verschiedene Affen.

Außer diesen indischen Thieren und Vögeln brachte ich noch 24 Kasten verschiedener Thierarten aus Afrika, Australien und Südamerika, unter denen als besonders bemerkenswerth:

1 leb. Felsenschwalm (Pupicola crocea), 2 leb. Touracos (Corythaix persa), 2 seltene Tukane (Ramphastus carinatus). [123

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Praktische Anleitung
zur
künstlichen Ausbrütung
der Eier aller Arten Geflügels,
und zur
Aufzucht der künstlich ausgebrüteten jungen Hühner, Enten, Gänse und Truthühner.

Mit 4 Zeichnungen. Nebst einem Anhange über die

rationelle Kaninchenzucht.

Herausgegeben von **J. H. Krantz.**

Zweite vermehrte und verb. Aufl., gr, 8 ca. 4 Bogen.

Preis 10 Sgr.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung Berlin.
W. 86 Wilhelmstraße. [124

Kanarienvögel.

Um von der Zweckmäßigkeit der Verpackung beim Versand meiner Vögel einen eklatanten Beweis zu geben, theile ich folgendes Faktum mit. Durch unvollständige Angabe des Wohnortes des Bestellers gelangte im vorigen Monat ein Vogel nach Spiegelberg in Ostpreußen, statt nach S. bei Neustadt. Nachdem er fast **6 Tage** unterwegs gewesen, erhielt ich ihn hier wieder, und zwar sang er nach 5 Minuten.

125] **R. Maschke** in St. Andreasberg.

Meine Kollektion Vögel ist jetzt schon etwas reichhaltig und empfehle in gesunden, schön befiederten Exemplaren, zu billigen Preisen: Tangaras, roth, blau, braun; weiße und bunte, japanesische Mövchen, weiße Reisfinken, im Schwanz mit einigen grauen Federn, Astrilden, Helenafasänchen, Schönbürzel grau, Orangebäckchen, Amaranten, Tigerfinken, Schmetterlingsfinken, Zebrafinken, Schilffinken, Diamantfinken aus China, dito aus Australien, aber sehr schlecht in Federn, Elstervögel, kleine und zweifarbige, Muskatvögel, Nonne weißköpfig, dito mit schwarzer Kehle, Reisfinken, großer Textorweber, Orangevogel, Madagaskarweber, Edelfinken nur einige Paare, Papstfinken, Indigofinken, Kardinal roth, grau, Dominikaner, grün, Kernbeißer rosenbrüstig, Rothflügel-Staar, Spottdrossel, Steindrossel, Blaudrossel, Trupial, grüner Ammer, Flötenvogel, Wellenpapageien 1874er sehr billig in Massen erhalten, Nymphenpapageien auch in Massen sehr billig, Rosellas, bunte und mehlfarbige, Pennantsittich, Königssittich, große und kleine Alexanderpapageien, gelbwangige Edelpapageien, graue zahme Papageien, etwas hoch im Preis aber gute akklimatisirte Vögel, Amazonen, Gelbkopf, Gelbnackenpapageien, Blaukrone, Surinam, Portoriko roth und weißstirnig, die meisten dieser gemeinen großen Papageien sprechen. Kakadus, große gelbhaubige und rothhaubige, Inka und Nasenkakadu, Blaue Gebirgs Lori, Kuh-, Glanz-Staare, Glanz Merle.

Von überseeischen Tauben: Malakka-Täubchen, Wandertauben, Java-Lachtauben, Bronce-Tauben am Lager.

Leipzig, Connewitz, **E. Geupel-White am Barfußberg (Thiergarten).** [126

Nistfähige Wellensittiche à Paar 6 Thlr., **Singsittiche** Paar 8 Thlr. sind abzugeben. Auskunft d. d. Red. [127

Vorzüglich schöne gutgetrocknete steirische Ameiseneier empfiehlt **Franz Aumeyer,** [128
Linz a. D., Landsbergerstraße 55.

---

1 Pärchen nistfähige importirte **Wellensittiche** sind für 7 Thaler, mit großem neuen Bauer für 10 Thaler zu verkaufen **A. Keil,** Gotha, Fleischgasse 16. [129

---

8 Stück gute Kanarienhähne, 2 Stück Distelfinkbastarde à 4 bis 5 Thlr. sind abzugeben. [130
Frl. **J. Pieper,** Witten a. d. Ruhr.

Ich suche zu Kauf einige Paare englische und französische Kröpfer, holländische Ballon-Kröpfer, Indianer, engl. Karrier und Mönnchen. **P. Engel,** Wismar, Meklenburg-Schwerin. [131

Einen vortrefflichen Beo (Gracula religiosa) bietet an für 15 Thaler **Cajetan Agolini** in Triest. [132

Zwei Grauedelfinkenmännchen
suche zu kaufen unter Garantie. [133
Paul Wunder in Liegnitz.

Zwei Silberfasanen-Hennen wünscht zu kaufen
134] Dr. K. Th. Liebe in Gera.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:
Die
„Gefiederte Welt",
herausgegeben
von Dr. **Karl Ruß.**
Jahrgang I. & II. (1872|73).
135] Preis à Thlr. 2 — broch.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstraße 2, durch die Post oder durch Vermittlung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Pernau.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 5. März 1874. Nr. 10.

Inhalt:

Ueber das Nisten der Zwergpapageien. (Fortsetzung). —
Schadet es dem Gesange der Harzer Kanarienvögel, wenn dieselben zur Zucht gebraucht werden? (Schluß). —
Anfragen und Auskunft: Mauser des rothen Kardinals. —
Ausstellungen: Cypria in Berlin. (Fortsetzung). —
Aus den Vereinen: München (Schluß); Usingen. —
Bücher- und Schriftenschau: Forstzoologie; (Schluß). —
Ehrenbezeigungen. —
Briefwechsel. — Anzeigen. —

Ueber das Nisten der Zwergpapageien.

(Vom Herausgeber).

(Fortsetzung).

Das Jugendkleid ist wirklich allerliebst. Bauch und Rücken haben noch vollständig die Flaum-Federn, ganz schön grau, das wirkliche Mäusegrau; die Flügel und die Schwanzfedern schön grün, letztere mit einigen blauen Federchen, das Köpfchen, oder vielmehr der Kopf, da derselbe durch den schwach befiederten dünnen Hals, groß erscheint, schon ganz der Färbung der Alten ähnlich, nur viel zarter rosa, der Oberschnabel ganz schwarz, was sich aber wol abfärben wird. Es sei hier noch erwähnt, daß schon im Frühjahr meine jungen Wellenpapageien größtentheils von Unrath zusammengeballte Fußzehen hatten, was sehr schwer abzulösen war, besonders wo auch die Schwanzbefiederung angegriffen war, und sind mir öfters einige Junge gestorben. Ich hatte die Ursache bald herausgefunden, nachdem ich die Nistkästen sämmtlich untersuchte, welche nach dem Schleusinger Modell viel zu tief im Verhältniß zur Weite sind, und habe ich alle im Gebrauch gehabten, die sehr viel Unrath enthielten verbrannt und wieder mit solchen nach meiner frühern eigenen Idee ersetzt, nämlich sämmtlich würfelförmig, 12 bis 30 Centimeter im Quadrat groß, mit einem im Verhältniß zum Kasten stehenden rechts oder links befindlichen Flugloch und einer seitlich davor angemachten Sitzstange. Das Innere ließ ich durch schief angebrachte Brettchen muldenförmig machen, besonders deßhalb, weil wie es von den Wellenpapageien oft geschieht, alle Sägespähne sauber herausgeworfen und die Eier auf den Boden des Kästchens gelegt werden, die dann eher nahe beisammen bleiben. An der Vorderseite ist zugleich zur oberen Hälfte das Thürchen zum Nachsehen, jedoch mit einem guten Schluß, damit es nicht durch Herumnagen der Papageien zu leicht aufgeht. — Da die Fabrik in Schleusingen für Anfertigung von Nistkasten eingerichtet ist, kann sie jedenfalls nach jeder Zeichnung, Beschreibung oder Modell allen Wünschen genügen*).

Ich hatte mich beim Beginn meiner Vogelzuchtversuche da und dorthin um Belehrung in Betreff der Nistkasten gewandt, aber keine befriedigende erhalten; daher ist man jedenfalls am besten sein eigener Lehrmeister, da es doch nur gilt, die Natur soviel als irgend möglich nachzuahmen.

Uebrigens hängen alle Erfolge oder vielmehr die Anzahl von Mißerfolgen viel zu sehr von Individualitäten der Exemplare und gewöhnlich von mancherlei

*) Dies ist bereits geschehen, indem Herr Frühauf nach den Angaben der Herren Linden, Fiedler u. A. seine Nistkasten verbessert hat und sich auch zu jeder weiteren Aenderung gern bereit erklärt. D. R.

Zufälligkeiten ab; einen Beweis dafür giebt doch gewiß die Brut der Quäker, in Konstanz, welche 5 Junge in einem alten dunklen Stall, in einem Nistkasten, so ungünstig als nur möglich eingerichtet, mit durchgehenden Oeffnungen, glücklich erzogen haben, während bei mir aufgehängte hohle Aeste, die ebenfalls durchgehend waren, nämlich auf beiden Seiten offen, niemals auch nur benutzt oder angesehen wurden und es zwei Jahre des Wartens bedurfte, bis meine ursprünglich gehabten Wellensittiche Anstalt zum Brüten machten.

Meine Quäkersittiche, großen Alexandersittiche, Blasköpfe, Patagonier (P.—Conurus—patagonus) hatten wiederholt Eier, zum großen Theil mit schon entwickelten Jungen, aber wo es fehlt, daß der Erfolg kein besserer war, darüber kann ich keinen Aufschluß geben; es bleibt nur die Hoffnung darauf, daß es mit Geduld doch noch gelingen wird, auch von ihnen Allen Erfolge zu erringen.

Zur Zeit sitzt ein Weibchen Grauköpfchen (P. canus) ganz eifrig auf Eiern, ebenso treiben sich die roth- und gelbstirnigen Neuseeländer Sittiche (P. Novae Zeelandiae und P. auriceps) immer lebhaft herum, besehen sich alle Kasten wie immer, bis hoffentlich einer ausgewählt wird; vom etwaigen Erfolg werde ich dann Nachricht geben.*)

Emil Linden in Radolfzell
am Bodensee.

(Fortsetzung folgt).

Schadet es dem Gesange der Harzer Kanarienvögel, wenn dieselben zur Zucht gebraucht werden?

(Von Kontroleur Böcker in Wetzlar).

(Schluß).

Im vorigen Frühjahre, Anfangs April setzte ich zehn, dann im Laufe der nächsten 14 Tage noch zwei Zuchthähne in die Hecke. Es waren sämmtlich Vögel eines und desselben vorzüglichen Hohlrollerstammes mit langen, weichen und zarten Rollen, im Ganzen übereinstimmend, im Einzelnen aber vielfach abweichend im Vortrage; namentlich hatte Ein Sänger eine ganz besonders schön klingende Flöte, die den übrigen Hähnen nicht eigen war. Diese Flöte ist, wie ich gleich bemerken will, nach der Mauser verloren gegangen; es hat sie weder ein alter noch ein junger Vogel gebracht.

In den ersten Tagen nach dem Einwerfen schlugen die Hähne sämmtlich noch so zart, wie im verdeckten Käfig, obgleich sie volles Tageslicht hatten und gleich einen Wettkampf im Singen begannen, wie man ihn nicht immer Gelegenheit hat zu hören. So saßen gleich im ersten Augenblick, nachdem dieselben aus dem Käfig entfernt waren, auf dem Boden der Heckstube auf einem Raum von einem Quadratfuß vier Hähne und wetteiferten im Gesange miteinander, als wenn Jeder den Andern hätte zu Tode singen wollen. Im Verlaufe der nächsten Wochen wurde nun der Gesang allerdings etwas lauter, aber niemals hart und rauh und stets behielt er das ursprüngliche Gepräge. Am lautesten war der Gesang in den Mittagsstunden, ganz besonders schön aber früh Morgens und in den spätern Nachmittagsstunden. Diese Kapelle hat mir in der That mehr Vergnügen gemacht, als der Gesang einer mittelmäßigen Nachtigal, die sich hier in der Nähe angesiedelt hatte. Ich muß hierbei bemerken, daß das Zimmer bis zum Eintritt der bessern Jahreszeit mäßig geheizt war, das eine mit einem Gitter versehene Fenster aber, sobald die ersten kühlen Mainächte vorüber waren, nicht mehr geschlossen wurde, und in der Hecke neben dem Eifutter nur Sommerrübsen gereicht ist.

Sobald die Jungen dem Ei entschlüpft waren, hörte man den zugehörigen Hahn wenig singen; das dauerte etwa acht Tage.

Nachdem die Mauser vorüber war, begannen noch in der fliegenden Hecke die meisten der alten Vögel wieder zu singen. Das Organ war durchaus zart und weich und verschiedene Vögel sangen besser, als vor der Hecke. Immer noch konnte man das ursprüngliche Gepräge des Gesanges genau und vollständig erkennen; es hatte also keiner der damals schön singenden Vögel etwas eingebüßt, ausgenommen der eine schon erwähnte Vogel, der seine Flöte nicht wieder brachte. Dieser Vogel fing übrigens auch später an zu singen, als jene Vögel, Anfangs Oktober, in Einzelbauer — Harzer Bauerchen — gesetzt wurden. Um diese Zeit bekam jeder Vogel seinen bestimmten Platz. Während er vorher beim freien Umherfliegen bald diesen, bald jenen Nachbar singen und so nicht stets genau ein und dieselbe Melodie hörte, hatte jeder alte damals singende Vogel nothwendig seine eigene Gesangsweise festhalten müssen; jetzt aber hörte er beständig einen und denselben Vogel neben sich singen, und so mochte es kommen, daß nach vier Wochen fünf alte Vögel, die neben einander standen, so lange Strophen ihres Gesanges ausgetauscht hatten, daß der ursprüngliche eigenartige Vortrag fast verschwand und sämmtliche fünf Vögel im Wesentlichen dieselbe Melodie sangen. Von den übrigen sieben alten Vögeln wurden zwei heiser, aber sicher nicht in Folge der Hecke; bei dem einen dieser Vögel liegt die Schuld an seinem übermäßig vielen Singen und an seinen langen Touren. Die übrigen fünf alten Vögel waren einzeln unter die jungen gruppirt und so bildete sich denn an diesen Stellen der Gesang des betreffenden alten Vogels in seinem ursprünglichen Gepräge mehr aus. Hierbei war es nun bemerkenswerth, daß bald der eine, bald der andere junge Vogel der bessere Sänger war, indem Vögel, die Anfangs sehr viel versprachen, später zurückgingen und von andern, früher zurückgebliebenen Sängern übertroffen wurden, bis auch diese wieder nachließen und von andern Jungen überholt wurden.

Da die Gesellschaft ziemlich zahlreich war und die Stimmen immer kräftiger wurden, so hatte ich schließlich einige Mühe, den Gesang der alten und jungen Vögel in der ursprünglichen Weichheit zu erhalten. Als die Entziehung des vollen Tageslichts nicht mehr auszureichen drohte, habe ich mit gutem Erfolge das Eifutter weggelassen.

*) Dank im Voraus! D. R.

Einzelne alte Vögel waren zuletzt nicht ganz so lang mehr in ihren Strophen, als früher; andere hatten von den verschiedenen jungen Vögeln eine andere Zusammensetzung des Liedes angenommen; verschiedene junge Vögel hatten aber die alten im Gesange erreicht, wenn nicht übertroffen und so ist denn der Gesang des ganzen Stammes im Wesentlichen derselbe geblieben, trotz der durchgemachten Hecke.

Auch in Andreasberg muß man keine Gefahr für den Gesang der Vögel darin sehen, daß man dieselben zur Hecke benutzt. Ausnahmsweise werden wol junge Vögel nur während der ersten Brut in der Hecke verwandt; ob aber viel damit erreicht wird, möchte ich bezweifeln.

Vögel verschiedenen Stammes soll man allerdings nicht in ein und dasselbe Zimmer bringen und namentlich nicht zusammen hecken lassen. Wenn man Vögel verschiedenen Stammes hält, und auch dann, wenn man neben einem vorzüglichen Sänger noch geringere Vögel desselben Stammes besitzt, ist es meines Erachtens besser, den bessern Vogel entweder allein zur Hecke, oder ihn auch nur als Vorschläger zu benutzen. Soll Letzteres geschehen, so ist es dringend anzuempfehlen, die jungen Vögel baldmöglichst zu dem Vorschläger zu bringen, sobald nämlich diese allein zu fressen beginnen. Auch dann noch dürfen die Jungen nur von Harzer Vögeln herrühren und der Hahn darf auch kein ganz mittelmäßiger Sänger sein; denn sonst lernen sie nichts, verderben aber fast regelmäßig den Vorschläger. Die Zahl der jungen Vögel soll auch nicht zu groß sein; auf einen Vorschläger rechne man nicht mehr als 6 bis 8 junge Vögel.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Ich bitte mir mittheilen zu wollen, um welche Zeit die Mauser des rothen Kardinals (Cardinalis virginianus) stattfindet. Seit März v. J. habe ich einen solchen, der bis heute sein altes Kleid trägt. C. B. Madsen in Tondern.

Antwort: Die nordamerikanischen Vögel mausern, nisten und singen mit den unsrigen zu gleicher Zeit. In der Gefangenschaft kommt es nicht selten vor, daß ein Vogel, namentlich bei nicht durchaus naturgemäßer Pflege, eine Mauser ganz überschlägt. Meistens wird ihm dieselbe dann im nächsten Jahre tödtlich. Um dies zu vermeiden, behandeln Sie den Kardinal nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber".

Ausstellungen.

Die zweite allgemeine Geflügel-Ausstellung der „Cypria",

Verein der Geflügel-Freunde in Berlin, vom 20. bis 24. Februar, im Gebäude der alten Münze, am Werderschen Markt.

I.

(Fortsetzung).

Wol giebt es noch gar viel des Herrlichen und Prächtigen unter diesem Taubenvölkchen, allein wir müssen zu Ende eilen, um auch Raum für die beiden anderen Abtheilungen übrig zu behalten. Von hervorragendem Werth sind noch die Karrier des Herrn Lehrer W. S. Lenzen in Köln, die Römertauben, sowie die ganze nur in vier Pärchen bestehende Sammlung des Herrn R. Ortlepp in Magdeburg, die pommerschen Kropftauben, namentlich das rothe Paar des Herrn H. Bernhardt in Stettin, und nicht unerwähnt lassen wollen wir die pommerschen Kropftauben des Herrn W. Hevernick in Stralsund, unter denen das schwarze Paar besonders schön ist, ferner die schwarzen Hühnerschecken des Herrn R. Gessner in Zeitz und die chinesischen Mövchen, besonders die blauen des Herrn Geflügelhändler M. Hromada in Dresden.

Um Niemand zu nahe zu treten, wollen wir die übrigen Aussteller wenigstens noch erwähnen: Herr J. Werner mit Türken; Herr H. Mehlmann, Vogelhändler, mit einer gemischten Sammlung; desgleichen Herr Haaß, Herr August Butmann; dagegen nur pommersche Kröpfer hat Herr A. Gerber; Indianer und Tümmler Herr Z. Abel; isabellbunte Tümmler Herr O. Beyer; Kragentauben Herr Eduard Lehmann; egyptische Mövchen Herr E. Tümmel in Freiberg; englische Kröpfer Herr K. Puls in Freiberg; Indianer und Brieftauben Herr R. Mühler in Gehlis.

Nürnberger Bagdetten von hohem Werth haben ausgestellt die Herrn F. Emilius in Nürnberg und G. Endres ebendort. Gemischte Sammlungen sind wiederum vorhanden von den Herren H. A. Richter in Hannover, A. Kantzow in Prenzlau, Karl Klaus in Dresden, C. H. Musgiller in Zeitz, W. Külchen in Barmen, C. F. Horn in Freiberg, E. Thiele in Großenhayn, L. Lange ebendort, A. Neubert in Döbeln, H. Müller in Kraschwitz, Mathias Biron in Mainz, C. Hagermann in Hannover, L. Klöppel in Apolda, T. Wahlhammer in München, Schröder in Mertendorf und Frau Hermine Giebner in Zeulenroda.

Wir bedauern aufrichtig, daß wir aus diesen zahlreichen Reihen nicht noch recht viele schöne Tauben hervorheben können. Die Liebhaber seien sodann auf die Trinkgefäße von Zink für Tauben und auf die Taubennester, welche Herr Klempnermeister Petzelt ausgestellt hat, noch ganz besonders aufmerksam gemacht.

Dr. K. R.

(Soeben geht uns ein Bericht von Herrn Köhne zu und wir nehmen denselben mit Freuden auf, selbst auf die Gefahr hin, daß manche Leser durch einige Wiederholungen gelangweilt werden. Herr Köhne ist als Autorität bekannt und wir freuen uns daher, seine Urtheile den unsrigen gegenüberstellen zu können).

Die schwierigste Aufgabe bei dem Inslebenrufen einer Geflügel-Ausstellung in Berlin ist für die Herren Kommissions-Mitglieder in jedem Jahre die Ermittlung und Beschaffung eines passenden Ausstellungslokals. Der Verein Cypria ist stets bereit, dafür eine ganz bedeutende Miethssumme auszuwerfen, damit alle Zweige der Geflügelzucht in angemessener und vortheilhafter Weise dem Besucher zur Schau gestellt werden können. Leider ist Berlin aber an passenden Räumlichkeiten so arm, daß als Ausstellungsraum stets nur ein im Bau begriffenes oder leer stehendes Geschäftslokal zu erlangen ist. In diesem Jahre hatte der Magistrat die alte Münze in bereitwilliger Weise auf die Bitte des Vereins zur Verfügung gestellt. Wenn nun auch diese seit Jahren unbenutzten Werkstätten zur anständigen Ausstattung bedeutende Mühen, Zeit- und Geldaufwand verursachten, so hat die Kommission diese Schwierigkeiten doch glänzend gelöst. Die Ausstellungsräume machten einen ganz hübschen und gefälligen Eindruck und nur wäre ihm doppelte Größe zu wünschen gewesen.

Die hohe Protektorin des Vereins, Frau Prinzeß Karl hatte, wie seit Jahren bekannt, durch Ihren Haushofmeister Herrn Meyer 18 Paar ganz ausgesucht vorzügliche Exemplare Tauben zur Ausstellung gesandt. Gegen eine solche Sammlung, ebensowol gegen diejenige des Zoologischen Gartens ist es für

jeden Vereinsmann schwer, wenn nicht unmöglich anzukämpfen, da die bedeutenden Mittel mit außergewöhnlichen Kenntnissen bei der Auswahl und den besten Bezugsverbindungen zusammentreffen. Die vier Paare französische Herzkröpfer waren aus vielleicht 50 solcher Paare von fachkundiger Hand ausgewählt und ich brauche für die vorzüglichste Schönheit derselben wol nichts weiter anzuführen. Egyptische und chinesische Mövchen waren in Gestalt und Farbe prächtig. Man hat übrigens bereits angefangen, eine Kreuzung dieser beiden Mövchenarten anzubahnen, die auch schon recht schöne Ergebnisse gezeigt hat. Das chinesische Mövchen, mit seiner wunderbaren Rosette und dgl. Halzkragen hat einen langen Kopf und Schnabel; durch eine Kreuzung mit dem Egyptischen wird die ganze Gestalt kleiner, der Kopf runder und der Schnabel kürzer. Es ist nun die Aufgabe der Züchtung, dahin zu streben, daß die charakteristischen Merkmale des chinesischen Mövchens, besonders die Kravatte in schönster Entwickelung erhalten bleiben, und so habe ich auch bereits gesehen, daß schon nach zweiter Kreuzung die Schönheit dieser Kravatte vollständig hervortritt. Solche gekreuzte chinesische Mövchen machen einen vorzüglichen Eindruck und dürften zweifellos als Veredlung gelten. Herr Haushofmeister Meyer wird diese Kreuzung gewiß bald selbst versuchen, da er ja schon bei der bucharischen Trommeltaube recht gute Erfolge in ähnlicher Weise erzielt hat. Diese bucharische Taube ist sehr weichlich, schwerfällig und durch die lang herabhängende Tolle am Sehen gehindert. In Folge dessen hat die Taube wenig Temperament und fliegt auch nicht. Herr Meyer hat eine Kreuzung mit der hiesigen Trommeltaube vorgenommen und davon schon recht hübsche Junge gezogen. Nach einigen Jahren dürften bucharische Trommeltauben hervorgehen, die der echten in der Tollenbildung nicht nachstehen, dafür aber lebendiger und flugfähiger sind.

Der Zoologische Garten von Berlin hatte 4 Paar vorzügliche Tauben ausgestellt, darunter ein so schönes Paar gelbe englische Kropftauben mit langen Latschen, (welche einige Liebhaber zwar nicht so groß sehen wollen), an welcher wol auch der verwöhnteste Liebhaber seine Freude empfinden muß. Ein zweites Paar in gleicher Größe ist mir noch nicht vorgekommen. Die ausgestellten sehr theuren Tauben aus Mekka sind bis jetzt auch wol nur auf der Berliner-Ausstellung zu sehen gewesen.

Herr Verlagsbuchhändler Möser jun., der in unermüdlicher Weise sich zur Ausstellung die vorzüglichsten und seltenen Exemplare zu beschaffen suchte, hat eine Sammlung von 24 Paar Tauben ausgestellt. Darunter befinden sich 4 Paar Römertauben in verschiedener Farbe und in bedeutender Größe. Die ferner ausgestellten 8 Paar englischen Karrier in allen vorkommenden Farben sind vorzüglich schön und in so passender Zusammenstellung noch garnicht da gewesen. Das schwarze Paar Nr. 31 zog die Aufmerksamkeit aller Kenner auf sich, wurde aber dennoch von einem chokoladenfarbigen Paar des Herrn Michael übertroffen. Dann folgten im Werth 1 Paar des Herrn Lenzen in Köln.

Die Beschreibung der Pausch'schen Pfauentaubensammlung könnte ich wol unterlassen, da dieselbe in jedem Hause, wo Tauben gehalten werden, hinlänglich bekannt ist. Es giebt nur einen Pfauen-König und dies ist Herr Silberfabrikant Pausch. Eine Sammlung in allen Farbenstellungen von solcher vorzüglichen Schönheit hat noch keine Ausstellung aufzuweisen gehabt. Die Möglichkeit zur Vorführung solcher ausgesuchten Exemplare in allen Farben ist auch nur gegeben, bei dem Prinzip, einzig und allein Pfautauben zu halten und dabei stets mit allen Pfautaubenzüchtern in Verbindung zu bleiben. Unter den ausgestellten Exemplaren fesselte die Aufmerksamkeit aller Besucher ein weißes Paar Nr. 44. Eine Pfautaube in solcher Vorzüglichkeit hat gewiß noch keine Ausstellung gezeigt. Die Taube war von großer Gestalt, hatte einige vierzig Federn im Schwanz und trug dieselben so tadellos, daß auch der anspruchsvollste Kenner überrascht wurde.

Hierauf folgte eine kleinere schöne Sammlung Pfautauben des Herrn Koppe, die durch ihre Nachbarschaft einen gefährlichen Stand hatten. Derselbe Herr hatte 8 Paar chinesische Mövchen in verschiedenen Farben ausgestellt, denen man es wol ansieht, daß ihre Beschaffung dem Besitzer große Kosten verursacht hat. Der alte Taubenveteran Petzold hat eine größere Sammlung verschiedener Tauben ausgestellt, unter welchen ein Paar weiße Tümmler mit echten Augen, schön runden Köpfen und sehr kurzem Schnabel besonders hervorzuheben ist. Eine kleine, aber sehr werthvolle und in jeder Hinsicht fehlerlose Sammlung hatte der Herr Michael ausgestellt. Die 4 Paar französischen Kröpfer waren den von der Prinzeß Karl ausgestellten ganz ebenbürtig, ein Paar chokoladenfarbige Karrier Nr. 121, das schönste Paar dieser Taubenrasse der Ausstellung. Perrückentauben waren von Herrn Goldstein hier und Ritzhaupt in Spandau in verschiedenen Farben und recht guten Exemplaren ausgestellt. Die schönen altstämmigen Berliner Tümmler, die durch Inzucht so weit gekommen sind, daß dieselben wol bald von den Ausstellungen gänzlich verschwinden werden, waren in hübschen Exemplaren von Herrn Bohnefeld hier und Leddihn in Spandau vertreten. Eine neue Blutauffrischung wäre ihnen sehr zu gönnen. Claus in Dresden und Hromada in Dresden hatten noch gute Paare chinesische Mövchen gesandt, an einzelnen Paaren derselben war eine Kreuzung mit egyptischen Mövchen schon zu erkennen. Hühnerschecken in einzelnen gut gezüchteten Paaren sandte Herr Robert Gessen in Zeitz, Wahlhammer in München und Emilius in Nürnberg, doch scheint mir der Letztere bei der Preisangabe wol die Null zu viel geschrieben zu haben. Die Paare desselben stehen im Katalog mit 80 Thlr., 100 Thlr. und 60 Thlr., und ein solches kleines Versehen läßt sich gewiß entschuldigen.

Es hat den Anschein, als wollte sich der Werth und die Zahl der nach Berlin zur Ausstellung gesandten Tauben verringern; der Katalog zeigte dies-

mal leider eine Verminderung von etwa 150 Paaren. Um so erfreulicher ist die Aufschwung, den die Hühnerliebhaberei nimmt. Die Ausstellung war stärker beschickt als im vergangenen Jahre und zog das Hauptinteresse auf sich. (Fortsetzung folgt).

Aus den Vereinen.

Verein für Geflügelzucht in München.

(Schluß).

Der Verein, infolge der Ausstellung auch an Mitgliederzahl neu erstarkt, begann nun seine vollständige Organisation. Die Kaninchenzüchter wurden als Pfleger einer neuen und einträglichen Zucht von Hausthieren in den Verein aufgenommen. Derselbe nannte sich fortan **„Verein für Geflügelzucht in München."** Der Verein theilte sich in vier Unter-Abtheilungen für Hühner-, Tauben-, Vogel-, und Kaninchen-Zucht und die vollständig umgearbeiteten Statuten suchten die Abtheilungs-Kommissionen möglichst selbstthätig und für die ihnen zugewiesene Aufgabe selbstständig zu machen.

Die Vereinsbibliothek wurde durch Anschaffung der besten Werke von Brahn, Nuß, Oettel, Prütz, Weber, Hofstätter, Neumeister u. A. gegründet; die hervorragendsten Blätter auf dem Gebiete der Geflügel-Zucht finden sich im Vereine. Das Magazin des Vereins wurde durch Nachschaffen von Hühner- und Taubenkäfigen, von Kaninchenställen u. s. w. für Ausstellungszwecke vermehrt; das übrige Inventar erfuhr nach allen Seiten eine wesentliche Vervollständigung.

Die am 23. April 1873 neugewählte Vorstandschaft bildeten: Ph. Pfister, I. Vorsitzender, K. Delcroix, II. Vorsitzender, Jos. Engelhardt, Schriftführer, J. Friedrich, Kassier, v Uechtritz, Materialverwalter, J. Seybold, Beisitzer, M. Müller, Vorstand der I. Section, J. Steinmetz, Vorstand der II. Section, K. Hendschel, Vorstand der III. Section und Jos. Bscherer, Vorstand der IV. Section.

Weitvorgeschrittene Vorbereitungen der Vorstandschaft zu einer größeren Landes-Geflügel-Ausstellung bei dem Central-Landwirthschafts-Feste im Oktober 1873 wurden durch das Auftreten der Cholera-Epidemie in München fruchtlos gemacht. Dafür beginnen schon jetzt die Vorarbeiten für die zweite allgemeine deutsche Geflügel-Ausstellung vom 19. bis 22. März 1874. Zur Verbreitung guter Hühnerrassen auf dem Lande wurden während des vorigen Sommers über 14 Dutzend La Flèche, Crève-Coeurs und Spanier-Eier, theilweise von Hannover und Görlitz bezogen und unentgeltlich auf das Land gesendet. Die Erfolge waren aber so ungünstig, daß die Versuche nur auf wesentlich veränderten Grundlagen wiederholt werden dürften.

Gesellschaftlich, wie auch für die Vereinszwecke anregend, zeigten sich die in diesem Jahre während der Sommermonate zum ersten Male unternommenen gemeinschaftlichen Ausflüge zur Besichtigung größerer Geflügelhöfe in München und Umgebung. Hier ist von den besuchten Orten vor Allem die großartige kgl. Fasanerie in Moosach zu nennen. Unter den Geflügelhöfen sind hervorzuheben der des Herrn Kaufmann C. Thierry in Nymphenburg, des Hrn. Bäckermeisters J. Friedrich Amalienstraße 15 und des Hrn. Viktualien-Händlers Rudolph, Bogenstraße 5; sodann die kleineren Geflügelhöfe der Herren Delcroix, Deschl, Deschler und Klein. Glänzend vertreten zeigte sich die Kaninchenzüchterei in der Anstalt des Herrn Grafen von Gatterburg in Pasing, des Hrn. A. Rosipal in Schwabing, des Hrn. Schröll an der Schellingstraße und des Hrn. Witt in Giesing, endlich bei Hrn. L. Röder in der Schillerstraße.

Zu korrespondirenden Mitgliedern wurden, in Anbetracht ihrer Verdienste um die Geflügel- oder Kaninchenzucht ernannt: Die Herren Robert Oettel in Görlitz, F. Dietz in Frankfurt a. M., Dr. Karl Nuß in Berlin, Hochstätter in Tübingen und Baron Washington in Prels, Steiermark.

Die Gesellschaftsabende füllten Mittheilungen über die Vereinsthätigkeit; gegenseitiger Austausch von Erfahrungen, einzelne Vorträge, sowie Versteigerung und Verloosung von Geflügel, Tauben, Vögeln und Kaninchen aus. Die Jahresversammlung, bei der die Vorstandschaft neu gewählt, Jahresrechnung gestellt und Jahresbericht erstattet wurde, ist dadurch, daß in einem der schönsten Räume Münchens, Kil's Kolosseum, Mitglieder schönste Exemplare ihrer Thiere zur Ansicht ausstellten, daß importirte Hühnerstämme, Tauben, Vögel und Kaninchen unter die Mitglieder verloost wurden und daß eine Auswahl feinster Kaninchenspeisen sich auf der Speisekarte befanden, zugleich ein geselliger Vereinigungspunkt für den Verein und für Freunde der Geflügelzucht geworden.

München, im Januar 1874.

Ph. Pfister.

Die Konstituirung der Vorstandschaft und der Abtheilungs-Kommissionen ergab durch die Wahl am 26. Januar Folgendes:

Ph. Pfister, k. Assessor, I. Vorsitzender.
E. Delcroix, Univers.-Stallmeister, II. Vorsitzender.
C. v. Leveling, k. Landrichter, Schriftführer.
J. Friedrich, Bäckermeister, Kassirer.
J. Bscherer, Photograph, Materialverwalter.
J. Seybold, Baumeister, Beisitzer.

Ersatzmänner:

Dr. Vogel von Vogelstein, Privatier.
Uechtritz v., k. Offizial.
Deschl, Schlossermeister.

I. Section für Hühner.

M. Müller, Buchbindermeister, Vorstand.
M. Hahn, Buchhalter, Sekretär.
H. Klein, Lebkuchenfabrikant, Beisitzer.

II. Section für Tauben.

J. Deschler, Buchdruckereibesitzer, Vorstand.
Friedr. Müller, Gutsbesitzer, Sekretär.
S. Renner, Schuhmachermeister, Beisitzer.

III. Section für Vögel.

J. Engelhardt, Musiklehrer, Vorstand.
M. Kammerer, Lehrer, Sekretär.
K. Finkh, Sekretär, Beisitzer.

IV. Section für Kaninchen.

Ludw. Röder, Lakierer, Vorstand.
J. Grießl, Kaufmann, Sekretär.
G. Ferchl, Kaufmann, Beisitzer.

In Usingen, Reg.-Bez. Wiesbaden, hat sich im Anfang d. J. im Anschluß an den Wiesbadener Verein für Geflügelzucht, dessen den kleineren Verhältnissen angepaßte Statuten auch im allgemeinen angenommen sind, ein Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht gebildet. Derselbe hat es sich zur Aufgabe gemacht, die einheimischen, der Landwirthschaft unentbehrlichen, nützlichen Vögel durch Anbringung von Nistkästen u. dgl. nach Kräften zu schützen und andererseits zur Zucht auf allen Gebieten der Geflügelliebhaberei für gute Rassethiere zu sorgen, namentlich auch die Zucht der Lapins zu verbreiten. Der Verein bat sich sogleich mit 29 Mitgliedern, unter denen mehrere der bestbekannten Züchter und Besitzer von feinen Harzer Kanarien-Vögeln und belgischen Brieftauben sich befinden, gegründet. — In den Vorstand wurden gewählt die Herren:

E. Reinhard, Vorsitzender;
Weyandt, Sekretär;
C. Schneider, Rendant;
L. Wagner,
A. Truckenbrodt jun., } Stellvertreter.
Heny,

Bücher- und Schriftenschau.

Forstzoologie II.; Vögel, von Dr. B. Altum, Professor der Zoologie an der Königl. Forstakademie zu Neustadt-Eberswalde.
Berlin, 1873. Verlag von Julius Springer.

(Schluß).

Nach den Drosseln und deren Verwandten, werden die meisten andern Vögel mit gerechtem Verdienst behandelt und deren große wirthschaftliche Thätigkeit, in das gebührende Licht gestellt. Von größtem Interesse ist,

was über dieselben von Seite 291 bis 302 gesagt wird; zu bedauern ist dabei aber, daß der Verfasser auch hier wieder zu sehr der Richtung der gegenwärtigen Materialisten Rechnung trägt und die Verdienste des verstorbenen Gloger in vieler Beziehung anzweifelt. Wenn Gloger auch durch allzugroßen Eifer einseitig vorging und manchen Vogel über Verdienst begünstigt wissen wollte, so haben doch alle seine vielen Gegner mit ihren Widerlegungen die Ungezieferschäden noch nicht beseitigt, vielmehr sind dieselben gegenwärtig auf einer Höhe angelangt, wie sie frühere Zeiten nicht gesehen haben. Der Wahlspruch Glogers, daß die durch menschliches Dazuthun hervorgerufenen Uebelstände im Naturhaushalt auch nur allein durch die Natur selbst wieder ausgeglichen werden können, birgt eine unumstößliche Thatsache und je mehr wir zu ihrer Erreichung behülflich sind, desto eher werden wir den Erfolg davon sehen.

Welchen praktischen Nutzen haben wol bis jetzt alle die unbestritten wissenschaftlich so wichtigen Forschungen über die Forstinsekten gehabt, mit welchen alle angehenden Forstkandidaten sich vertraut zu machen haben? — Man glaubt alles genau zu kennen, wenn aber eine Kalamität auftritt, so muß ebenso als wenn man garnichts davon wüßte, die Axt, das Feuer, der Schutzgraben und die menschliche Hand überhaupt, dem Uebel entgegen treten und abwehren und was hierdurch wieder für Unheil angerichtet werden kann, das haben wir in der jüngst zu Grabe getragenen Maikäferfrage gesehen, wo viele Tausende von Gulden und Thalern nutzlos verschwendet worden sind. — Auch hier in Württemberg kam man endlich auf den allein wichtigen Standpunkt zurück, daß dieses Uebel durch menschliches Dazuthun nur noch größeren Schaden bringt und die Hülfe der Natur selbst überlassen werden muß. — In dieser Beziehung redet der Herr Verfasser auch dem Star ganz entschieden das Wort, indem dieser ein sehr eifriger Maikäfervertilger ist. Aber derselbe findet leider auch die Weintrauben sehr wohlschmeckend, weßhalb Weingegenden den Star nicht dulden wollen, was nur als Beweis angeführt werden soll, daß überall gültige Schutzgesetze nie aufgestellt werden können und umgekehrt. — Der Eichelheher und die Elster, werden ihrer großen Schädlichkeit als Nesterplünderer, in verdienter Weise bezüchtigt, während die Saatkrähe leider nicht zur vollen Geltung gelangt. Ueber den wirthschaftlichen Werth der Eulen, mit alleiniger Ausnahme des Uhus, spricht sich der Verfasser in der entschiedensten Weise aus und hat zu dem Ende mehrere tausend Gewölle auf das Sorgfältigste untersucht, wobei er gefunden, daß Mäuse die Hauptnahrung derselben und Spitzmäuse eine Lieblingsnahrung der Schleiereulen mancher Gegend bilden, mit welch' letzterem Befunde, ein gleichfalls sehr tüchtiger Ornithologe, der Pfarrer Jäkel in Bayern, nicht übereinstimmt, was auch für Württemberg gültig ist. Die besondere Liebhaberei der Waldkäuze für große forstschädliche Schmetterlingsraupen, scheint der Verfasser nicht beobachtet zu haben, wie solche dem Referenten mehrfach bekannt ist. Mit vollem Recht sagt der Verfasser auf Seite 359: „Schonung der Eulen in jeder Hinsicht ist deßhalb für den Forstmann strenge Pflicht. Wo sich ein Eulenpaar ansiedelt, oder wo eine oder andere „Eulenbaum" im Reviere steht, da nehme er alle mögliche Rücksicht auf diese seine treuen Verbündeten." — Ganz in der Ordnung werden sämmtliche Weihen, der Hühnerhabicht und der Sperber, als gemeinschädliche Räuber bezeichnet und die Gabelschwänze wegen ihrer Lüsternheit auf junge Hühner bezüchtigt. In auffallender Kürze werden aber die der Landwirthschaft so wichtigen Bussarde behandelt, welche der Jäger immer noch in ungerechter Weise verfolgen darf, wodurch das Uebel des Mäusefraßes natürlich immer noch größere Dimensionen annehmen muß. Mit Ausnahme des Thurmfalken, der als entschieden nützlich zu bezeichnen ist, können wir auch die anderen Raubvögel übergehen, doch wird der aufmerksame Leser auch in der Beschreibung dieser vieles Neue und Interessante finden. Auch der bisher so vielgeliebte und symbolisch gewordene Storch, wird von dem Verfasser mit vollstem Recht als höchst schädlich bezeichnet und es ist hoch an der Zeit, diesen so gemeinschädlichen Vogel, welcher jedes junge Häschen, jedes erdständige Vogelnest und viele tausend fleißige Bienen, als schmackhafte Beute hinunterschlingt, zum Nutzen der Niederjagd wie der Bienenzucht, auf ein bescheidenes Maaß einzuschränken. Aber gegen alte Vorurtheile, wie die Storchfrage eins ist, und für den Schutz der Bussarde, Eulen, Saatkrähen, Stare, Drosseln, Kukuke und anderer Vögel, kann nur eine über alle Partheien erhabene Gesetzgebung, welche den volkswirthschaftlichen Nutzen, nach dem Haushaltungsprinzip der Natur zu regeln versteht, endgültig einwirken. Von großem Werth sind bei vielen Vögeln zur genauen Artunterscheidung, die Handschwungfedern in getreuer Abbildung wiedergegeben, wie z. B. bei Nachtigal und Sprosser (Lusciola luscinia und philomela), durch welche Charaktere es Jedem möglich wird, diese sonst schwer zu unterscheidenden Nachtigalen, sofort richtig zu erkennen.

Wir können dieses mit so vielem Fleiß geschriebene und alle deutschen Vögel umfassende Buch, somit allen Fachmännern, Jagdliebhabern und Naturfreunden bestens empfehlen und wir haben uns recht gefreut, daß der Verfasser auch hier in der wissenschaftlichen Nomenklatur der jetzt leider so beliebten babylonischen Namenverwirrung fern geblieben ist, wodurch es auch dem Laien möglich wird, die einfachen „lateinischen" Namen leicht im Gedächtniß behalten zu können.

Martin.

Raummangels wegen konnte der

Eilfter Bericht

des Verwaltungsraths der Zoologischen Gesellschaft in Hamburg.

in dieser Nr. nicht mehr aufgenommen werden.

Ehrenbezeigungen.

Der Thierschutz-Verein
für das Großherzogthum Hessen

ernennt hiermit Herrn Dr. Karl Ruß zu Berlin, in freudiger und dankbarer Anerkennung der ausgezeichneten Verdienste desselben um Förderung der Schonung und Milde gegen die Thierwelt, zu seinem Ehrenmitgliede. — Darmstadt, 20. Februar 1874.

Der Vorsitzende des Ausschusses, Freiherr van der Capellen.
Der Sekretär, Köhler.

Zum Dank für die mir in einem geschmackvoll ausgestatteten Diplom überreichte Ernennung kann ich nur die Versicherung wiederholen, daß ich auch auf diesem Gebiete der Humanitäts-Bestrebungen als Volksschriftsteller immerfort und rastlos weiter arbeiten werde. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn C. Schneider in Usingen: Alle Berichte aus Ihrem Verein nehmen wir mit Vergnügen auf.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Praktische Anleitung
zur
künstlichen Ausbrütung
der Eier aller Arten Geflügels,
und zur
Aufzucht der künstlich ausgebrüteten jungen Hühner, Enten, Gänse und Truthühner.

Mit 4 Zeichnungen. Nebst einem Anhange über die

rationelle Kaninchenzucht.

Herausgegeben von **J. H. Krantz.**

Zweite vermehrte und verb. Aufl., gr. 8 ca. 4 Bogen.

Preis 10 Sgr.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung Berlin.
W. 86 Wilhelmstraße. [136

Kanarienvögel.

Um von der Zweckmäßigkeit der Verpackung beim Versand meiner Vögel einen eklatanten Beweis zu geben, theile ich folgendes Faktum mit. Durch unvollständige Angabe des Wohnortes des Bestellers gelangte im vorigen Monat ein Vogel nach Spiegelberg in Ostpreußen, statt nach S. bei Neustadt. Nachdem er fast **6 Tage** unterwegs gewesen, erhielt ich ihn hier wieder, und zwar sang er nach 5 Minuten.

Auch eine Partie Weibchen à 20 Gr. sind abzugeben.

[137 **R. Maschke** in St. Andreasberg.

Die Großhandlung
exot. Vögel, Thiere und Naturalien
Leipzig, Markt 3 II.

empfiehlt alle Arten exot. Vögel, Naturalien, Sämereien und diverse Artikel für Vogelzüchter. Preislisten gratis. [138

Die nachfolgend verzeichneten Vögel, sämmtlich im besten Zustande, sind zu den billigsten Preisen abzugeben und zwar: 1 P. Goldgelbe Trupiale (Icterus xanthius) 20 Thlr.; 1 P. Rosenbrüstige Lerchenstare (St. militaris) 22 Thlr.; 1 P. Strohgelbe Prachtsittiche (P. melanurus) 25 Thlr.; 1 P. sehr schöne Bourkssittiche 25 Thlr.; 1 altes Nistpaar grüne Kardinäle 16 Thlr.; 1 P. Rothbäuchige Sittiche (P. cruentatus) 30 Thlr.; 3 P. Sonnenvögel (Liothrix luteus) a P. 20 Thlr.; ein prachtvolles Männchen Jamaika-Trupial 10 Thlr.; 1 M. Baltimore-Trupial 5 Thlr.; 1 M. Blauvogel 4 Thlr.; 1 M. Rother Kardinal, prachtvoll, 5 Thlr.; 1 P. Flammenfinken 8 Thlr.; Diamantvögel a P. 78 Thlr.; Wellensittiche a P. 6—8 Thlr. D. Red. [139

Ein Stamm großer, gesunder Hamburger Silberlackhühner (1,3) ist zu 10 Thlr. abzugeben bei **G. Göller**, Alfdorf bei Lorch Würtemb. [140

C. Hagenbeck's

Handelsmenagerie

HAMBURG

hält exotische Vögel, von den größten bis zu den kleinsten, stets in mehreren Tausenden von Exemplaren zu den civilsten Preisen vorräthig.

Näheres besagen die jeder Zeit von Reflektanten gratis zu beziehenden Kataloge.

Alle Vögel, welche gegenwärtig und im Augenblick nicht vorräthig sind, werden auf feste Bestellung wenn irgend möglich in höchstens acht Tagen verschafft.

Stets werden zu kaufen gesucht: weiße und gescheckte Pfauen, auch Rehe, und immer sind vorräthig: Kleine Ponies, bis ca. 3 Fuß hoch, für à Thlr. 150.

[141

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Die

„Gefiederte Welt",

herausgegeben

von Dr. Karl Ruß.

Jahrgang I. & II. (1872/73).

142] Preis à Thlr. 2 — brech.

Gut getrocknete Ameiseneier à Pfd. 20 Sgr. empfiehlt

143] **August Dietz** in Burg bei Magdeburg.

Zwei ausgezeichnet singende Grasmücken sind à 3 Thaler zu verkaufen. **H. E. Weiglein,** Zellingen

144] (Bayern).

Zu verkaufen:

15 Paar ächte Nürnberger Bagdetten von seltener Schönheit, a Paar fl. 8, bei **Wilh. Schmidsrauter,**

145] Handelsgärtner in Stuttgart.

Gegen einen jungen zahmen Graupapagei einzutauschen oder zu verkaufen sind: 3 Paar selbstgezüchtete sehr schöne Zebrafinken zusammen 9 Thaler, mehrere Pärchen Silberschnäbel und kleine Elsterchen a Paar 2 Thaler. Auskunft die Redaktion. [146

8 Stück gute Kanarienhähne, 2 Stück Distelfinkbastarde à 4 bis 5 Thlr. sind abzugeben. [147

Frl. **J. Vieyer,** Witten a. d. Ruhr.

Vorzüglich schöne gutgetrocknete steirische Ameiseneier empfiehlt **Franz Aumeyer,** [148

Linz a. D., Landsbergerstraße 55.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstraße 2, durch die Post oder durch Vermittlung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Bernau.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 12. März 1874. Nr. 11.

Inhalt:

Bemerkungen über einige selten in den Handel kommende Vögel der Gattungen Heuschreckenstar und Gilbvogel. —
Ueber das Nisten der Zwergpagageien. (Fortsetzung). —
Erläuterung für den Gebrauch der Harzer Nistkasten.
Ausstellungen: „Cypria" (Fortsetzung). —
Aus den Vereinen: Stiftungsfest des Ornithologischen Vereins in Stettin. —
Eilfter Bericht des Verwaltungsraths der Zoologischen Gesellschaft in Hamburg (Fortsetzung). —
Anzeigen. —

Bemerkungen über einige selten in den Handel kommende Vögel der Gattungen Heuschreckenstar (Acridotheres) und Gilbvogel (Icterus).

Im Sommer 1873 fand ich bei C. Gudera in Leipzig mehrere Exemplare des gehäubten Heuschreckenstars (Acridotheres cristatellus) aus China. Das Gefieder dieses Vogels ist schwärzlich, an der Unterseite in lichteres Grau übergehend; der Schwanz ist weiß gesäumt und auch die Flügel haben einen weißen Fleck, der indeß wenig sichtbar ist, wenn der Vogel die Flügel zusammenlegt. Durch eine kleine schwarze Federhaube oberhalb des rothen Schnabels durch das gelbe Auge und die gelbrothen Füße erhält dieser Star ein eigenthümliches gefälliges Aussehen. Das von mir erworbene Exemplar war sehr scheu und ängstlich, ist aber jetzt doch soweit zahm geworden, daß es bei regem Appetit den Mehlwurm aus der Hand nimmt. Mehlwürmer sind aber auch seine Lieblingsspeise, während kleine Wiesen-Heuschrecken, auch Gras- oder Heuhüpfer genannt, verachtet wurden. Während meine Glanzdrossel 20 Stück dieser Grasflügler hintereinander verzehrte, fraß der „Heuschrecken"-Star kaum ein oder das andere Stück. Mehr Beifall fanden Hollunder- und zerschnittene Ebereschenbeeren, die ich dem Drosselfutter zusetzte. Die Lockstimme ist ein klägliches Pfeifen und erinnert an das Quitschen ungeschmierter Maschinen. Der Gesang setzt sich aus allerhand seltsamen, meist schnarrenden Tönen zusammen und wird unter tiefen Verbeugungen vorgetragen.

Als ich einige Zeit nach Ankauf meines Stars wieder einmal bei Gudera die Vogelbestände musterte, fand ich ein sehr schönes zahmes Exemplar einer nahe verwandten ebenfalls gehäubten, aber merklich größeren Art, im Handel Chinastar, (Acridotheres cristatelloïdes) genannt. Das Gefieder ist glänzend schwarz, der weiße Fleck auf dem Flügel größer, der Schnabel bleichgelb, das Auge braungelb, der Fuß hornbraun. Ich erwarb auch diesen Vogel und brachte ihn zunächst mit dem vorhin erwähnten in einen Käfig. Beide Vögel nehmen keine Notiz von einander, außer, wenn es sich um das Fressen handelt. Der Große war als durchaus zahm und menschenfreundlich im Vortheil: noch, während ich den Freßnapf in der Hand hielt, begann er seine erste Auslese. Hatte ich den Napf aber hingestellt und war einen Schritt zurückgetreten, so stürzte der Kleine sich auf seinen schmausenden Verwandten und vertrieb ihn durch das Ungestüm seines Angriffs stets nach kurzem Kampf. Später setzte ich immer zwei, ganz gleich ausgestattete Freßnäpfe gleichzeitig in den Käfig und dann fraß ein jeder ruhig aus seinem Napf. Obschon beide Vögel

in ihrem, an unsern Star erinnernden Wesen sich sehr gleichen, so ist doch der Gesang des größeren Heuschreckenstars weit reichhaltiger und ansprechender, als der jenes kleineren. Dagegen habe ich bisher nicht beobachtet, daß der größere seine Gesang-Vorträge mit Verbeugungen begleitet. Wahrscheinlich ahmen beide Arten andere Vogelstimmen nach. Vom größeren glaube ich den Ruf des chinesischen Sonnenvogels (Liothrix luteus) gehört zu haben, während der kleinere die Glanzdrosseln bei ihrem Schreien (nicht bei dem leidlich klingenden Schwatzen) tapfer begleitete. Im Punkte der Mehlwürmer und Heuschrecken haben beide Vögel denselben Geschmack, sehr artig sieht es aber aus, wenn der größere die in den Käfig gehaltene, geschlossene Hand eifrig nach Mehlwürmern absucht. Mit seinem Schnabel versucht er, die Finger von einander zu sprengen und hält die Hand dabei nicht selten noch mit dem Fuße fest. Selbstverständlich wird von mir stets dafür gesorgt, daß das Suchen nicht vergeblich bleibt.

Einen ebenfalls zahmen und dabei sehr hübschen und seltenen Vogel habe ich kürzlich wieder von Herrn Gudera erhalten: es ist dies der Goldgelbe Trupial oder Gilbvogel (Icterus xanthius seu cayanensis Gray). Von den Gilbvogel-Arten sind bisher hauptsächlich der Oriol oder Baltimore-Vogel (I. baltimore), der schöne Jamaika-Trupial (I. jamaicensis), daneben seltener noch der Braune Baltimore-Vogel (I. spurius) in den Handel gebracht worden. Der Goldgelbe Trupial ist ein hübsch gefärbter Vogel, Vorderkopf und Kopfseiten, sowie der Unterrücken und die ganze Unterseite sind gelb, Nacken, Rücken, Flügel und Schwanz, Schnabel und Füße schwarz. Eine, wie tsdiack, tsdiack klingende Lockstimme und ein kurzer zirpender Gesang, der mich an die Strumpfwirker-Strophe im Gesange des Zeisigs erinnert, ist bisher Alles, was ich von diesem, in seinen Bewegungen anmuthigen und in seinem Betragen höchst liebenswürdigen Vogel gehört habe. Der Jamaika-Trupial — den ich vorhin erwähnte — hat in Herrn Emil Linden in Radolfzell bereits einen Lobredner gefunden.*)

Auch ich bin ein besonderer Liebhaber dieses Vogels und pflichte dem Lobe des Herrn Linden unbedingt bei. Als einzige Untugend des Jamaika-Trupials sieht dieser das an, daß er beim Fressen Vieles nebenaus wirft und verdirbt. Ich besitze nur ein Exemplar des schönen Vogels, habe aber an diesem die gerügte Untugend nicht bemerkt, finde überhaupt nichts an demselben auszusetzen. Vom kleinen braunen Trupial (I. spurius) besitze ich zur Zeit nur ein einzelnes Weibchen, das zu besonderen Bemerkungen keine Veranlassung giebt.

v. Schlechtendal, Regierungsrath
in Merseburg.

*) „Gefiederte Welt" Jahrgang I. S. 145.

Ueber das Nisten der Zwergpapageien.

(Vom Herausgeber).

(Fortsetzung).

Hieran schließen wir zunächst die Mittheilung des Herrn Graf Yorck von Wartenburg über den grauköpfigen Zwergpapagei:

Im Folgenden kann ich einige Mittheilungen über eine Brut der Grauköpfchen machen, die leider aber schließlich gestört wurde, so daß die Alten die 3 Stück Eier verlassen und seitdem den Brütkasten noch nicht wieder bezogen haben. Das Weibchen sitzt zuweilen vor dem Flugloch und hackt wüthend hinein. Ich schrieb Ihnen von mehreren Vogelbruten, in denen die Jungen bis zum Ausfliegen waren und immer plötzlich spurlos verschwanden. Endlich fand ich ein ganzes Nest voll junger Tigerfinken gefressen, so daß nur die Köpfe, Knochen 2c. sich vorfanden, und da ergab es sich denn, daß sich Mäuse in die Vogelstube eingeschlichen hatten. Ich fand auch das Loch und bin die ungebetenen Gäste nur durch Vermauern desselben los geworden. Wahrscheinlich haben die Mäuse auch die Brut der Grauköpfe gestört. Ich theilte Ihnen damals mit, daß sich das Pärchen eifrig schnäbelte und fütterte, bald darauf nahm das Weibchen einen länglichen Brütkasten, der horizontal angebracht war an und flog nun, beständig schreiend und wie wüthend sich geberdend einige Tage ein und aus. Dann räumte sie alle Sägespähne eifrigst aus und flog wie gesagt viel ab und zu; ich konnte aber niemals bemerken, daß sie Etwas zu Nest getragen hätte, sondern bemerkte nur, daß sie sich viel in einer Stroh- und Schilfgruppe zu thun machte. Das Männchen verhielt sich vollständig unbetheiligt und ich habe es nie ins Nest schlüpfen sehen. Nun begannen sie häufiger zu paaren und bald blieb das Weibchen im Kasten und war nicht mehr zu sehen. Da ich es garnicht mehr bemerkte, und das Männchen sich garnicht ums Nest zu bekümmern schien, sah ich nach einigen Tagen vorsichtig in den Kasten, der leicht oben zu öffnen ist, aus Besorgniß, das Weibchen möchte am Legen zu Grunde gegangen sein. Da saß es brütend auf einem Ei, ließ sich das Hineinsehen ruhig gefallen und drückte sich blos etwas in die Ecke. Aber zu meinem Erstaunen sah ich ein flaches vollständiges Nest, aufgehäuft aus einer großen Menge etwa ½ bis 1 Zoll langer Strohstückchen, und in diesem Haufen eine Vertiefung eingedrückt. Ich habe in Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber" gelesen, daß die kleinen Papageien mit rosenrothem Gesicht auch ein solches Nest zusammentragen und die Halme zwischen die Flügel- und Schwanzfedern stecken, um sie einzutragen. Ich habe nun nie gesehen, wie die Grauköpfe diese Halme eingetragen haben, und bei genauer Beobachtung weiß ich nur soviel, daß es im Schnabel nicht geschehen ist. Bald übernahm nun das Männchen die Fütterung des Weibchens, flog einigemal des Tags vors Flugloch des Kastens, rief das Weibchen heraus und fütterte es. In den drei verlassenen Eiern fand ich vollkommen entwickelte Junge, welche in wenigen Tagen ausgeschlüpft sein würden.

*) Meine obigen Mittheilungen über die Grauköpfchen kann ich jetzt in Folgendem ergänzen. Sie haben bald wieder eine neue Brut gemacht und jetzt sind richtig sechs Junge ausgeflogen, prächtige Thierchen und gerade drei Pärchen. Das Gelege bestand in 6 Eiern, aus welchen sämmtlich Junge ausgekrochen und auch groß geworden sind. Obwol die Alten die Kleinen noch füttern, so haben sie doch bereits ein neues Nest eingetragen und zwar eine Masse klein genagter Plätchen von dünnen Eichenblättern. Trotz des eifrigsten Aufpassens konnte ich sie niemals zum Neste eintragen sehen und doch ist ein Schleusinger Brutkasten reichlich zu einem Drittheil mit solchem Nistmaterial angefüllt. Die Alten paaren übrigens schon wieder sehr oft und eifrig und das Weibchen kriecht wieder häufig ins Nest, und jagt selbst die eigenen Jungen wüthend davon fort; ich denke also sie legt entweder jetzt schon wieder oder doch sehr bald. Graf Yorck von Wartenburg.

(Fortsetzung folgt).

Erläuterung für den Gebrauch der Harzer Nistkasten.

In Folge meiner Anzeige in der „Gefiederten Welt" laufen so viele Anfragen und dabei manche kuriose bei mir ein, so daß es mir fast unmöglich wird, alle brieflich zu beantworten. Deßhalb bitte ich das Folgende zu beachten. Zum Nisten der Kanarienvögel werden in Andreasberg nur solche Nistkästchen verwandt wie ich dieselben anfertige. Sie sind dafür bestimmt, in die Vogelstube gehängt zu werden. Sollte man aber einen entsprechend großen Käfig als Heckraum verwenden wollen, so werden die Nistkästchen auswendig angehängt, wo alsdann das kleine Schlupfloch zugemacht und das Sprungholz entfernt wird. Als Nistmaterial nimmt man hier nur trockenes Moos, welches schon im Herbst geholt wird, damit es recht austrocknet. Damit füllt man das Kästchen bis an den Draht und überläßt das Bauen nun den Vögeln selbst. Die Erfahrung hat gelehrt daß der Kanarienvogel nicht gern in ein fertig gemachtes Nest geht, es müßte denn ein recht faules Weibchen sein, welches aber auch nichts zum Hecken taugt, weßhalb man selbiges aus der Hecke entfernen muß, um nicht andere gute Weibchen zu stören. Sieht man nun, daß die Vögel „Kessel rudern", d. h. eine Mulde im Moos formen, so wirft man feine, weich gezupfte Leinewand (Scharpie) in die Hecke, nicht etwa in die Nistkästchen; der Vogel trägt sich dann diese selbst zum Nest ein und baut damit dasselbe fertig. Auch habe ich in diesem letzten Fall beobachtet, daß die Vögel am liebsten die weiße Farbe mögen; dunkele Farben haben Sie stets liegengelassen oder vielmehr unnütz verschleppt. Sind in einem Nest junge Vögel ausgeflogen, so nimmt man das Kästchen fort und hängt an dessen Stelle ein reines und verfährt damit ganz genau ebenso, weßhalb man auch immer einige Nistkästchen vorräthig haben muß. Sollte man das Reinigen der Nistkästchen mit heißem oder kaltem Wasser ausführen, so müssen dieselben, bevor sie wieder in Gebrauch kommen, recht trocken gemacht werden. Diese Anleitung hoffe ich, wird dazu ausreichen, um Jemand, welcher noch gar keine Kenntniß von der Kanarienzüchterei hat, alles Nöthige beachten zu lassen.

Schließlich bemerke ich noch, daß es mir unmöglich ist, vorläufig weitere Bestellungen auf die großen Flugbauer anzunehmen, da ich für längere Zeit hinaus mit Aufträgen überhäuft bin. Nistkästen dagegen für den obigen Gebrauch bin ich nach wie vor zu liefern bereit. C. Lange, Tischlermeister in St. Andreasberg am Harz.

*) (In einem späteren Briefe).

Ausstellungen.

Die zweite allgemeine Geflügel-Ausstellung der „Cypria",

Verein der Geflügel-Freunde in Berlin, vom 20. bis 24. Februar, im Gebäude der alten Münze, am Werderschen Markt.

II.

(Fortsetzung).

In der Abtheilung, in welcher die Hühner ausgestellt waren, fand man stets ein dicht gedrängtes Publikum, welches sein Interesse hierdurch am besten zu erkennen gab. Es waren aber auch so viele vorzügliche Stämme vorhanden, daß Kenner und Besucher eine große Freude empfinden mußten. Der Zoologische Garten, der mit seinem prachtvollen Hühnervolke im Stande wäre, jede Ausstellung förmlich zu erdrücken, hatte 10 Stämme ausgestellt, unter denen die schwarzen Crève-coeur-, Gold- und Silberbrabanter Hühner als die vorzüglichsten Rassen-Vertreter zu bezeichnen sind. Ebenso schön war je ein Stamm Malaien, Yokohama und schwarzer Breda. Der Malaien-Hahn ist ein vorzüglicher Gatte, der den beiden Hühnern sorgsam unter seinen Flügeln Schutz gewährte und dafür viel Lob von der besuchenden Damenwelt erntete. Die zwei Stämme Kochinchina und Brahma-Putra waren jedoch nicht die Vorzüglichen der Ausstellung. Der Brahma-Putra-Hahn war von Gestalt tadellos, doch wäre ein Erbsenkamm wol erwünschter gewesen. Der hochstehende Kamm des Kochinchina wird bei dem Brahma doch nur selten als richtig anerkannt. Das eine Huhn hatte einen sehr bunten Rücken und daher kann ich es nicht als vorzüglich gelten lassen.

Von den, von dem Herrn Möser ausgestellten 8 Stämmen zog ein Stamm großer seidenartiggefiederter Hühner, unter dem Namen: „Emu-Hühner aus dem Kaukasus" im Katalog verzeichnet, die größte Aufmerksamkeit auf sich. Die Beschauer umstanden in großer Anzahl staunend diese noch nicht gesehene, seltene und interessante Hühnerart. Sehr vorzüglich waren ferner 1 Stamm weißer Paduaner mit außergewöhnlich großen Hollen, und 1 Stamm blauer Bredas. Bei den ausgestellten Viktoria-Hühnern zeichnete den Hahn eine ganz auffallend große und schöne Holle aus, doch hätte ich demselben kürzere oder gar keine Lappen gewünscht.

Der als eifriger Züchter rühmlichst bekannte Herr Rentier Kunze in Charlottenburg hatte eine ganz vorzügliche Sammlung von 14 Stämmen ausgestellt, von denen viele bereits von eigener Zucht waren. Die große Gewissenhaftigkeit in der sorgsamsten Pflege und Aufzucht der jungen Küken, mit pünktlicher und sachgemäßer Fütterung läßt auch nur so glänzende Ergebnisse erlangen. Seine ausgestellten blauen Crèvecoeur, Dorking, Houdan, La flèche, Viktoria-Brabanter und Kampfbantam waren von vollendeter Schönheit und können als die vorzüglichsten Zuchtstämme gelten.

Ganz besonders muß ich jedoch 1 Stamm gelbe Kochinchina und 2 Spanier Hühner erwähnen. Die reine gelbe Farbe, Gestalt und Größe der Kochinchinesen waren mustergültig und wurden daher auch von keinem andern Stamm übertroffen, obgleich der Herr Marten in Linden bei Hannover ungewöhnlich schöne und große Thiere, aus England importirt, zur Konkurrenz stellte. Es ist Herrn Kunze auch der I. Staatspreis neidlos verliehen worden.

Bei den von Herrn E. Geupel-White ausgestellten Stämme war besonders ein Stamm Dorking erwähnenswerth. Dahingegen hatte Herr Lenzen in Köln einen sehr vorzüglichen kleinen Stamm Zwergkämpfer und Herr Hromada in Dresden einen schönen Stamm Kochinchinesen gesandt. Die Kochinchina-Hühner waren etwas hell, der Hahn dunkel und nicht lang genug, sonst aber erwähnenswerthe, schöne Exemplare.

Unter den Geflügelhändlern, die den Ruf genießen, reelle und schöne Stämme den Liebhabern zuzuführen steht Herr Marten in Linden bei Hannover in erster Reihe. Derselbe hatte dreißig ganz vorzügliche Hühnerstämme ausgestellt und hierdurch zur Verschönerung der Ausstellung bedeutend beigetragen. Die meisten seiner Hühner waren von England importirt und zeichneten sich fast sämmtlich durch große Schönheit aus. Seine gelben und weißen Kochinchina, sowie mehrere Stämme helle Brahmaputra waren sämmtlich tadellos, von außergewöhnlicher Größe und erlangten ungetheilten Beifall. Trotz seiner hohen Preise, die ja aber durch die Vorzüglichkeit seiner Hühner gerechtfertigt waren, hat er gute Geschäfte gemacht und wol Alles verkauft. Viele seiner Stämme gehörten zu den schönsten der Ausstellung und wird bei der Vertheilung des zweiten und ersten Staatspreises die Wahl zwischen Herrn Marten und den übrigen Ausstellern den Preisrichtern gewiß schwer geworden sein.

Hermann Köhne.

(Schluß folgt.)

Aus den Vereinen.

Stiftungsfest des Ornithologischen Vereins in Stettin.

Am 17. Februar feierte dieser Verein ein herrliches Fest, indem er zurückblickte auf den Tag, da vor einem Jahre von nur wenigen Händen der Grundstein zu seinem Bestehen gelegt wurde. Siebenzehn Freunde der gefiederten Welt scharten sich damals, zu einer Zeit, da Alles nur der Heiterkeit und dem Scherze ergeben zu sein pflegt, zusammen, um einem ernsten und edlen Zwecke nachzugehen und auf dem Rütli der Wissenschaft schwuren sie einen heiligen Eid, in allen Kämpfen, welche mit dem Gedeihen eines neuen Unternehmens verbunden zu sein pflegen, treu zusammenzustehen und dem Vereine, welchen sie gründeten, mit aller denkbaren ornithologischen Hingabe zu Ansehen und Blüte zu verhelfen. Wie treu sie diesen Schwur gehalten haben und wie sehr es ihren Kräften gelungen ist, dieses Gelübde zu erfüllen, bewies das gestrige erste im großen Saale des Schützenhauses begangene Stiftungsfest, welches eine Schaar von etwa 300 Personen versammelte. Eine so ansehnliche Versammlung, welcher die Vereinsdamen einen besonderen Schmuck verliehen, zeigte allein, daß der ornithologische Verein kein Kind mehr ist; die Festtheilnehmer erfuhren aber auch, daß Männer, welche ein Jahr lang in der Stille einem regen wissenschaftlichen und humanistischen Streben ergeben waren, ebenso gut dem Humor zu seinem Rechte zu verhelfen im Stande sind, wenn es Zeit dazu ist. Es versteht sich von selbst, daß, was die festliche Anordnung betrifft, sich alles nur auf ornithologischem Fuße befand; selbst Vater Orlin, welchem die Aufgabe zugefallen war, das Fest musikalisch zu weihen, hatte bedachtsam den gefiederten Sängern ihre Lieder abgelauscht und pfiff in den Tonarten aller sangreichen Kehlen. Andererseits hatte der Maler Herr Plischkowsky sein ganzes dekoratives Talent aufgewendet, um den Saal ornithologisch zu schmücken und er stellte die geflügelte Welt nicht nur ausgestopft in anmuthigen Gruppen zusammen, sondern er malte sie auch mit bekannter kunstvoller Hand auf die Leinewand. Was ihm selbst in dieser Richtung nicht mehr erreichbar war, vollendeten Andere, indem sie die Vogelwelt auf die Bühne versetzten und nicht in ihrer eigenen Sprache, sondern in der des Menschen reden ließen: auf der Bühne lebte der Fasching, der dramatische Mummenschanz. Den Reigen der ornithologischen Festreden eröffnete an der fröhlich bewegten Tafel Herr Prütz mit einem Toast auf den Kaiser, den er den „ersten Ornithologen der Gegenwart" nannte und welches Verdienst er mit dem Hinweis auf die mächtig entfalteten Schwingen des Reichsadlers begründete. Der Vorsitzende Herr Creutz nahm darauf das Wort, um sich eingehender über den Nutzen und die Zwecke des Vereins zu verbreiten und eine Uebersicht der bisherigen Thätigkeit der Gesellschaft zu entwerfen, welche zur Zeit 233 wirkliche Mitglieder zählt. Er schloß mit dem Wunsche, daß der ornithologische Verein anderen hiesigen Vereinen sich würdig an die Seite stellen möge und brachte demselben ein Hoch aus, um endlich in derselben freundlichen Weise des jungen ornithologischen Schwestervereins zu Demmin zu gedenken, von welchem ein Beglückwünschungs-Telegramm eingelaufen war. In anerkennender Weise gedachte Herr Kaufmann Reimer der Presse, welcher er das Verdienst zuschrieb, die Kunde von der Thätigkeit des Vereins in andere Kreise und Länder, ja selbst bis nach Australien getragen zu haben, und schloß mit einem Hoch auf die als Ehrengäste anwesenden Mitglieder der Presse, worauf Herr Redakteur Dunker humoristisch dankte, indem er auf die durch die Bezeichnung der Journalisten als „Federvieh" und durch die von denselben mitunter gepflegte „Entenzucht" gegebene Verwandtschaft mit dem ornithologischen Verein hinwies, das der Presse ertheilte Lob aber zum größeren Theile bescheiden den Journalisten im Verstande als den Verfassern der Zeitungsberichte zuwenden zu müssen glaubte. Herr Reimer, der sich selbst den „Reimer" des Vereins nannte, bewies durch den Vortrag seiner humor- und witzreichen ornithologischen Knittelverse, wie berechtigt sein Anspruch auf jene Bezeichnung war, und that zugleich ein wohlthätiges Werk, indem er die Kinder seiner heiteren Muse gedruckt an der Festtafel zum Besten der „Kückenmühle" verkaufen ließ und dadurch dieser Anstalt eine Gabe von 50 Thlr. 4 Sgr. zuwendete. Herr Eisenbahnbaumeister Keßler gedachte mit einem Hoch der Damen, welche er ebensowol der praktischen Ornithologie als auch der theoretischen ergeben bezeichnete. Herr Creutz nahm schließlich nochmals das Wort, um den Herren Reimer und Lischke als den verdienstvollen Veranstaltern des Festes den Dank auszusprechen und namentlich auch der Dichterin der an der Festtafel gesungenen, sinn- und humorvoll dem Zweck der Feier angepaßten Vereinslieder, Fräulein Minna Ohloff, freundlichst zu gedenken, deren dichterische Verdienste um die Ornithologie außerdem von der Versammlung durch ein Hoch gefeiert wurden. Mannichfach waren auch die Gaben, durch

welche erfindungsreicher Humor das Fest zu beleben und zu würzen verstand. Herr R. Grimm reichte eine ornithologische Spende, indem er ein Potpourri zarter Naturlieder mit virtuoser Hand den Saiten der Zither entlockte, während durch anziehende Nebelbilder das Fest auch seinen optischen Theil erhielt. Ihre behaglichsten humoristischen Triumphe feierte die Ornithologie, wie schon angedeutet, durch die Dramatisirung der Thierfabel und durch manche heitere Allegorie auf der Bühne. Ernsterer Natur und sich mehr an das Gemüth wendend war das Scheffer'sche Duett „Der goldene Hochzeitsmorgen", aber fröhlicher schon pfiff der „Dompfaff aus Sibirien" das klassische Lied „An Alexis send' ich Dich". Ein recht anmuthendes Genrebild war ferner der drollige Dialog zweier „sich zur Mitgliedschaft meldenden Bauern" (gedichtet von Frl. Ohloff), während der „Pechvogel" tragikomisch das ganze Register aller derjenigen Leiden aufrollte, welchen diese unglücklichste aller Thiergattungen nun einmal rettungslos verfallen zu sein scheint, ohne daß die Ornithologie helfend und bessernd einzugreifen vermag. Weniger nahm das Mitgefühl der Anwesenden der „Storch" in Anspruch, indem er, allen Erfahrungen der Wissenschaft entgegen, sein „Storchlied" nicht klapperte, sondern sang, und für das heitere Behagen, welches er den überraschten Ornithologen bereitete, sich nur die Summe von 18 Thlr. und einigen zwanzig Groschen zum Besten des Vogelschutzes auszahlen ließ, wogegen jedem Zahler ein Exemplar des gedruckten „Storchliedes" zur Verfügung stand. Den Damen, welche diese wie noch manche andere humorvolle Gabe gleich den Männern mit empfänglichem ornithologischem Herzen aufgenommen hatten, wurde schließlich noch durch die Vertheilung von Zucker-Eiern mit bezüglichen Sinnsprüchen eine besondere Aufmerksamkeit zu Theil. Erst zu später Stunde trennten sich die auf's Angenehmste angeregten Festgenossen, nachdem Vater Orlin zuvor noch die Aufgabe geworden war, zu einem kleinen wissenschaftlichen Tänzchen aufzuspielen. Die Ornithologen haben jetzt gezeigt, daß sie nicht umsonst in innigem Verhältniß mit der Vogelwelt gestanden haben. Sie haben ihr die Heiterkeit und den Humor, den keuschen Sinn für wahre Freuden und die reine Sprache des Herzens abgelauscht. Nachdem gestern die Ergebnisse ihrer Thierstudien in einer glänzenden Probe an's Licht getreten sind, dürfen wir für die Zukunft das Beste hoffen.

Eilfter Bericht

des Verwaltungsraths der Zoologischen Gesellschaft in Hamburg.

(Fortsetzung aus Nr. 8).

Das Gewinn- und Verlust-Konto schließt mit einem unvertheilbaren Saldo von Bco. Mrc. 685. 10 Sch., welcher auf neue Rechnung vorgetragen worden ist. Der Reservefonds für das große Gebäude betrug letzt. December 1872 Bco. Mrc. 23,297. 5 Schil. Die Zahl der Aktionäre ist unverändert geblieben, Familien-Aktien 1187, Personen-Aktien 235, zusammen 1422 Aktien. Außer den Zöglingen mildthätiger Anstalten und Anderen, denen der Zutritt unentgeltlich gewährt wurde, besuchten den Garten: im Jahre 1872 305,856 Erwachsene, 47,964 Kinder, zusammen 353,820 Entree zahlende Personen, mithin 101,920 mehr als im Vorjahre. Das Aquarium besuchten: 77,261 Personen. Der besuchteste Tag war der 18. August mit 20,940 Personen, im Gegensatz zu dem 13. November mit nur 4 Personen. Der Durchschnittsbesuch beträgt demnach pr. Tag 967 Personen. Besonders erfreulich ist die Zunahme der Zahl der Abonnenten, welche 2691 gegen 2190 in 1871, mithin 501 mehr als im Vorjahre beträgt. Die Abrechnung ist von den Herrn Revisoren C. Godeffroy senr. und F. Laeisz geprüft, und mit den Büchern übereinstimmend befunden worden.

Nachdem wir die Angelegenheit des großen Gebäudes zu dem, für jetzt allein möglichen und jedenfalls besten Abschluß gebracht haben, ist unsere Aufgabe, beim Beginn des zweiten Jahrzehnts die Herstellung der drei, dem Garten noch fehlenden Thierhäuser, und zwar: in erster Linie eines allen Anforderungen entsprechenden Raubthierhauses, sodann eines desgleichen Dickhäuterhauses, sowie endlich einer, den Verhältnissen unseres Gartens entsprechenden Vogel-Voliere. Erst dann, wenn wir diese drei Thierhäuser besitzen, können die Baulichkeiten in unserm Garten im Wesentlichen als abgeschlossen erachtet werden. Ob wir diese Aufgabe in den nächsten zehn Jahren lösen werden, wird wesentlich von der Unterstützung abhängen, welche wir im Publikum finden, denn aus den Mitteln des Gartens allein, werden sich diese Bauten innerhalb zehn Jahren schwerlich ausführen lassen. So möge denn der Hoffnung und dem Wunsche Ausdruck gegeben werden, daß sich Freunde unseres Gartens zusammenfinden, um uns mit den Mitteln zu Hülfe zu kommen, derer wir bedürfen, um zunächst und vor allen Dingen den größeren Raubthieren in erweiterten Räumlichkeiten die zu ihrem Gedeihen nothwendige, freiere Bewegung zu verschaffen, und dadurch zugleich unserm Garten ein neues und erhöhetes Interesse zu gewähren!

Was bisher in dieser Beziehung hat geschehen können mußte sich nach den gegebenen Verhältnissen auf den Anbau eines großen Käfiges an die Gallerie des jetzigen Raubthierhauses beschränken, allein schon diese vereinzelte Ausführung genügt, um es anschaulich zu machen, wie mangelhaft unser jetziges Raubthierhaus ist, welchem übrigens rechtfertigend zur Seite steht, daß es von Anfang an, nur als ein Provisorium betrachtet worden ist. Es ist damals ausgeführt, was nach den dazu vorhandenen Mitteln möglich war, und der Zukunft das Weitere überlassen worden.

Abgesehen von dem besprochenen Ausbau des großen Gebäudes und den damit in Verbindung stehenden Garten-Anlagen, sind wesentliche Veränderungen im Garten im vorigen Jahre nicht vorgekommen. Als weniger erheblich, aber doch bemerkenswerth, mag noch angeführt werden, die Herrichtung einer Räumlichkeit nebst Bassin für das Zweihörnige Nashorn (Rhinoceros bicornis) und Herstellung eines Ausläufers für den indischen Elephanten.

Außerdem ist in Berücksichtigung des großen Reichthums an schönen und zum Theil seltenen Bäumen und Gesträuchen, welche unser Garten besitzt, darauf Bedacht genommen, dieselben in angemessener Zahl mit in die Augen fallenden Namens-Schildern zu bezeichnen, um dadurch neben den zoologischen Zwecken unseres Gartens, auch die Verbreitung botanischer Kenntnisse zu fördern.

Der Thierbestand des Gartens war nach Maßgabe des vorjährigen Berichtes am Schlusse des Jahres 1871 folgender:

303 Säugethiere in 145 Arten und im Werthe von Ct. Mrc. 119,295. 9 Schil.

1116 Vögel in 275 Arten und im Werthe von Ct. Mrc. 21,371. — Schil.

1419 Thiere in 420 Arten und im Werthe von Ct. Mrc. 140,666. 9 Schil.

Angekauft wurden im Jahre 1872, 60 Säugethiere und 1089 Vögel. Die werthvollsten unter diesen Thieren sind eine weibliche Elen-Antilope, ein Faulthier, ein Paar Felsenkängurus, ein weibliches Rothkänguru, ein Paar Säbel-Antilopen, ein Elk, drei Bärenpaviane, drei Schopfpaviane, ein nacktschwänziges Gürtelthier, ein männliches Burchells-Zebra, eine männliche Gnib-Antilope, zwei Riesenreiher, ein Königsfasan, zwei australische Grauhäher, drei australische Halsbandrallen, indische Wachteln, Bartmeisen, und dreißig Arten Papageien. Neu für den Garten waren das Faulthier, die Schopfpaviane, das nacktschwänzige Gürtelthier, die Grauhäher, Halsbandrallen, Wachteln, Bartmeisen und die australischen Papageien. Durch Geburten im Garten erhielt derselbe im Jahre 1872 einen Zuwachs von 44 Säugethieren und 164 Vögeln, deren Werth zu Ct. Mrc. 3602. 4 Schil. anzunehmen ist. Wie in früheren Jahren sind unter den, im Garten geborenen Säugethieren vorzugsweise die Wiederkäuer vertreten. Zum ersten Mal im Garten wurden gezüchtet: Yak, Bieberratten, Gürtelthiere, geschopftes Aguti. Auf die weniger günstigen Ergebnisse bei den Katzenthieren übt die enge Gefangenschaft einen unverkennbaren Einfluß. Die Tigerin hat zwar wieder geworfen, doch sind die Jungen todt geboren. Unter den, im Garten erbrüteten Vögeln bilden, wie bisher, Schwimmvögel und Fasanen die größte Zahl.

An Geschenken sind uns im Jahre 1872 zugegangen 55 Säugethiere und 61 Vögel im Werthe von Ct. Mrc. 3349. 8 Schil., darunter sind die werthvollsten drei Schweinshirsche, ein Trompetervogel, ein Wickelbär, zwei Helmhockos, ein Hoko-

huhn, ein Kasuar, ein schwarzköpfiger und ein Lori von den blauen Bergen, eine Yaguarundi-Katze, ein schwarzhalsiger Schwan. Verkauft wurden im Jahre 1872, 51 Säugethiere und 463 Vögel, zusammen für Bco. Mrc. 9721. 14 Schil. Die Verluste beliefen sich im verflossenen Jahre auf einen Werth von Ct. Mrc. 20,269. 5 Schil.

(Schluß folgt).

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien:

Thesaurus Ornithologiae.

Repertorium der gesammten ornithologischen Literatur und Nomenclatur sämmtlicher Gattungen und Arten der Vögel nebst Synonymen und geographischer Verbreitung.

Von

Dr. C. G. Giebel,

Professor an der Universität in Halle.

Dritter Halbband.

8. Geh. 2⅓ Thlr. Schreibpapier 3⅓ Thlr.

Das mit grosser Anerkennung aufgenommene Werk erscheint in vier Halbbänden, zusammen etwa 100—120 Bogen umfassend. Der erste und zweite Halbband haben den gleichen Preis. [149

Verlag von Bernhard Friedrich Voigt in Weimar.

Der

Hühner- oder Geflügelhof,

sowohl zum Nutzen als zur Zierde,

enthaltend eine praktische Anleitung, die Zucht der Hühner, Gänse, Enten, Truthühner, Tauben u. s. w. zu betreiben, sowie diejenige in- und ausländischer Ziervögel, namentlich der Schwäne, Pfauen, Fasanen, Perlhühner ꝛc.

Nebst naturgeschichtlichen und auf Erfahrung beruhenden Notizen über Eigenschaften und Gewohnheiten dieser Vögel, den Bau von Geflügelhäusern und nützlichen Anleitungen aller Art.

Von **Robert Oettel,**

Stifter und Präsident des Hühnerologischen Vereins zu Görlitz.

Fünfte gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 8 Tafeln, enthaltend 43 Abbildungen.

150] **1874. gr. 4. Geh. 1 Thlr. 15 Sgr.**

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Für Kanarienzüchter!

empfiehlt solide gearbeitete Nistkästen, à Dtzd. 1 Thlr. 18 Gr. Flugbauer sind aber vorläufig nicht zu haben.

151] **C. Lange,** St. Andreasberg (Harz).

Vogelorgeln, mit bestem Erfolge bei den verschiedenartigsten Vögeln angewendet, empfiehlt billig G. Benda, Coburg. [152

Ich empfehle folgende am Lager habende Vögel: Astrilds, Helenafasänchen, Schönbürzel, Orangebäckchen, Amaranthen, Tigerfinken, Schmetterlingsfinken, Zebrafinken, Schilffinken, Elstervögel, kleine und zweifarbige Muskatvögel, Nonnen weißköpfige und mit schwarzer Kehle, Reisfinken, große Textorweber, Orangeweber, Madagaskarweber, Papstfinken, Indigofinken, Kardinäle rothe, graue, grüne, Dominikaner, Kernbeißer rosenbrüstige, Spottdrosseln, weiße Reisfinken, weiße Bengalisten, grüne Ammer, Trupiale, blaue und rothe Tanagras, 1 Paar Septicolors, Hüttensänger, Flötenvögel, Wellenpapageien, Nymphenpapageien, Schönsittiche, Rosellas, bunte und mehlige, Pennantsittiche, Alexandersittiche mittlere und größte, Gelbwangen-Sittiche, graue Papageien, Jakos, Amazonen, Gelbkopf doppelter, Surinam-, Portorike-Papageien, Kakadu großer gelbgehaubter, kleiner gelbgeschmückter, roth gehaubter, Kaekadu rosenrother, Nasenkakadu, blaue Gebirgs-Lori, Glanz-Merlen, Malaga-, Ruf- und Bronze-Täubchen.

E. Geupel-White,

Leipzig am Barfußberg,

153] Thiergarten Connewitz.

Umzugshalber sind zu den billigsten Preisen abzugeben folgende Vögel: Gelbstirnige Girlitze (Fr. butyracea), gelbbäuchige Girlitze (Fr. flaviventris), Kapkanarienvögel (Fr. canicollis), Maskenfinken (Fr. alario), gelbbürzelige Graugirlitze (Fr. atrogularis); auch einzelne Männchen zur Bastardhecke mit Kanarienweibchen; ferner Flammenfinken, Mantelkardinäle, goldgelbe Trupiale, rosenbrüstige Lerchenstare, 1 Heckpaar grüne Kardinäle, 1 Weibchen Spottdrossel, 1 Männchen Jamaika-Trupial, 1 Männchen Baltimore-Trupial, schwarzköpfige Nonnen, weißköpfige Nonnen und desgleichen mit schwarzer Kehle, Madagaskarweber, Zebrafinken, Diamantvögel, Wellensittiche, Singsittiche u. dgl. aus Dr. Ruß' Vogelstube. [154

Zu verkaufen:

1. Eine 1 Jahr alte Lapinshäsin von Hasengröße, weißbunt, trächtig — 3 Thlr. 5 Gr.,
2. 1 Paar Lapins (englische Schecken), zuchtfähig, 8 Monat alt — 4 Thlr. 15 Gr.,
3. 2 Harzer Kanarienvögel, hochgelb und grün mit schönen Touren à 3 Thlr.,
4. 1 dito (Kronenvogel) schwefelgelb — 4 Thlr.
5. 4 Paar weiße sehr schöne Tauben mit gelben Flügeln, à Paar 2 Thlr.
6. 2 Paar fahle Französische Kropftauben, à Paar 2 Thlr.,
7. Bruteier: Kreuzung von Prinz Albert und Landhuhn (legen 20 Tage hintereinander) à 2½ Gr.,
8. dito von Silberbrabantern (Vollhaube) à 5 Gr.,
9. dito von Spaniern (schön weißes Gesicht, ganz rein) à 5 Gr.,
10. dito von Italienern à 5 Gr. [155

Der Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht

in **Astingen** Reg. Bez. Wiesbaden.

1 Pärchen Schopfwachteln und
2 Fasanenhennen

sucht zu kaufen und erbitte Offerten. Apotheker **Grub**

156] in Salzwedel.

Abzugeben oder zu vertauschen gegen ausländische Säugethiere:

1 Monax (Arctomys monax),
1 Wickelbär (Cercoleptes caudivolvulus), stubenzahm.
1 Roller (Paradoxurus leucomystax),
1 weißer Hamster.

Alle Thiere sind ganz zahm und fehlerfrei.

Joh. von Fischer,

157] Gotha, Dammweg № 9.

Programm

der

II. Allgemeinen Deutschen Geflügel-Ausstellung und der damit verbundenen Münchener Lokal-Kaninchen-Ausstellung, vom 19. bis 22. März 1874 im Königl. Odeon zu München.

§ 1.

Zur Ausstellung werden alle Arten Geflügel, insbesondere auch Fasanen, Perlhühner, Truthühner, Pfauen, Gänse, Enten und Schwäne, und Zier- und Singvögel, mit Ausnahme jener Vögel, deren Einfangen und Verkauf gesetzlich verboten ist, zugelassen.

Modelle von Hühner- und Kaninchenställen, Taubenschlägen, Brutmaschinen, Brutkäfigen, Nistkästchen u. dgl. können ausgestellt werden.

§ 2.

Alle Anmeldungen, wozu von Münchnern nur Mitglieder des Vereines für Geflügel-Zucht in München zugelassen werden, sind **längstens bis 6. März** bei dem Vereinssekretär Hrn. C. v. Leveling, Kanalstraße 55, unter Benützung der anliegenden Anmeldeblätter frankirt einzusenden.

§ 3.

Die Ausstellungsgegenstände müssen in leichten Behältern **bis Dienstag, den 17. März Mittags** unter der Adresse: „An den Verein für Geflügelzucht in München im Königl. Odeon" eintreffen.

Die Aufgabs-Adresse ist mit genauer Angabe des Namens des Absenders und der Stückzahl der gesendeten Gegenstände an der Außenseite des Behälters solide zu befestigen. Außerdem muß im Innern jedes Frachtstücks die vollständige Adresse des Absenders, auf Pappe oder Holz, beigelegt werden.

Für zweckmäßige Behälter, gute Wartung und Pflege der Thiere während der Ausstellung sorgt der Verein; für Unfälle irgend einer Art haftet derselbe aber in keiner Weise.

Käfige für Zier- und Singvögel sind vom Aussteller selbst zu liefern; für Collektionen von Zier- und Singvögeln werden die Behälter vom Vereine beschafft.

Alle während der Ausstellung gelegten Eier werden vernichtet.

§ 4.

Nur rechtzeitig angemeldete und eingetroffene Gegenstände werden zur Ausstellung zugelassen; kranke oder nicht ausstellungswürdige Thiere werden zurückgewiesen. Nicht zugelassene Gegenstände werden auf Kosten des Einsenders unfrankirt zurückgeschickt.

Unrichtige Anmeldungen in Bezug auf Geschlecht, sowie Fälschungen u. dgl. werden bei der Ausstellung durch Anschlag an den Behältern unter Veröffentlichung des Namens des Einsenders gerügt.

§ 5.

Jeder Aussteller hat sich allen Anordnungen und Entscheidungen des Ausstellungskomités mit Ausschluß jeder Beschwerde zu fügen.

§ 6.

Alle Gegenstände, deren Preis bei der Anmeldung angegeben ist, gelten als verkäuflich.

Abgeschlossene Käufe ohne sofortige Anmeldung beim Ausstellungssekretariate werden als ungiltig betrachtet.

Von allen verkauften Gegenständen wird vom Verkaufspreise eine Provision von 10% erhoben.

Die Behälter von verkauften Thieren und Gegenständen werden nicht zurückgesendet.

§ 7.

Die Prämiirung findet nach festgesetzten Preisregeln durch hiezu berufene auswärtige und Münchner Sachverständige statt. Kommen bei der Beurtheilung Gegenstände eines Preisrichters in Frage, so urtheilt an seiner Statt der aufgestellte Ersatzmann.

Berufung gegen Urtheile des Preisgerichtes wird nicht zugelassen.

Das Ergebniß der Prämiirung wird in dem Centralorgane sämmtlicher deutschen Geflügelzüchtervereine, den Dresdener „Blättern für Geflügelzucht", veröffentlicht.

§ 8.

Für höchste Auszeichnung auf dem Gebiete der Hühner-, Tauben- oder Vogel-Zucht ist eine goldene Medaille mit Diplom ausgesetzt; reichhaltige Collektionen, Sortimente, kommen hiebei zunächst in Betracht.

Jeder erste Preis für Hühner, Tauben, Vögel und Kaninchen, für Modelle und Geräthe, erhält eine silberne Medaille; zweite Preise bekommen ein Diplom.

Für mehrere, von einem und demselben Aussteller errungene erste oder zweite Preise wird nur Ein Diplom ausgefertigt, auf dem jedoch alle zuerkannten Preise einzeln eingezeichnet werden.

Für hervorragende Leistungen auf dem Gebiete der Hühner- und Kaninchenzucht in Bayern ist von einer unter dem Protektorate Sr. Majestät des Königs von Bayern stehenden Corporation eine goldene Medaille mit Ehrendiplom als Landespreis in Aussicht gestellt.

§ 9.

Mit der Ausstellung ist eine Verloosung, Glückshafen, nach obrigkeitlich genehmigtem Plane verbunden; es werden hiezu nur ausgestellte Gegenstände angekauft.

§ 10.

Ausgestellte, verkaufte und gewonnene Gegenstände dürfen vor dem 23. März aus der Ausstellung nicht entfernt werden.

Die bis 1. April nicht erhobenen Gewinnste werden Eigenthum des Vereins.

§ 11.

Die Zulassung zu der mit der Allgemeinen Deutschen Geflügelausstellung verbundenen Münchner **Lokal-Kaninchen-Ausstellung** ist nur auf Vereinsmitglieder und besonders eingeladene Züchter beschränkt; im Uebrigen bestehen hiefür alle Bestimmungen des gegenwärtigen Programms.

§ 12.

Die Ausstellungslokale sind vom 19. bis 22. März täglich von Morgens 9 Uhr bis Abends 5 Uhr dem öffentlichen Besuche geöffnet.

Eintrittspreis: An den beiden Sonn- nnd Feiertagen für die Person 12 kr., an den beiden Werktagen 18 kr.; Kinder die Hälfte.

Kataloge sind an der Kasse zu haben. [158

München im Februar 1874.

Die Vorstandschaft des Vereins für Geflügelzucht in München.

Ph. Pfister, Präsident.

C. v. Leveling, Sekretär.

C. Hagenbeck's
Handelsmenagerie
Hamburg

hält exotische Vögel, von den größten bis zu den kleinsten, stets in mehreren Tausenden von Exemplaren zu den civilsten Preisen vorräthig.

Näheres besagen die jeder Zeit von Reflektanten gratis zu beziehenden Kataloge.

Alle Vögel, welche gegenwärtig und im Augenblick nicht vorräthig sind, werden auf feste Bestellung wenn irgend möglich in höchstens acht Tagen verschafft.

Stets werden zu kaufen gesucht:

weiße und gescheckte Pfauen, auch Rehe,

und immer sind vorräthig:

kleine Ponies, bis ca. 3 Fuß hoch, für à Thlr. 150.

[159

Gut getrocknete Ameiseneier à Pfd. 20 Sgr. empfiehlt
160] **August Dietz** in Burg bei Magdeburg.

Ein Uhu wird zu kaufen gesucht. Offerten schleunigst an die Redaktion unter T. R. 100. [161

Einen sehr zahmen Würger (Lanius collurio) zweijährig, ausgezeichneter Sänger, hat um 4 Thlr. abzugeben
162] **A. Beyschlag**, Schweinfurt.

Es sind 5 Stück brutfähige Wellensittiche (Männchen) zu verkaufen. Auch werden andere Vögel in Tausch genommen. **Albert Schmidt**, Saalfeld (Thüringen). [163

Eine Spottdrossel, zweijährig, ganz vorzüglicher, Sänger und Nachahmer, mehrere schlagende Sprosser und Steinröthel, worunter ein ausgezeichneter Wildling, verkauft [164
Rektor **Graeßner** in Dortmund.

Zu verkaufen:

15 Paar ächte Nürnberger Bagadetten von seltener Schönheit, a Paar fl. 8, bei **Wilh. Schmidsrauter,**
165] Handelsgärtner in Stuttgart.

Vorzüglich schöne gutgetrocknete steirische Ameiseneier empfiehlt **Franz Kumeyer,** [166
Linz a. D., Landsbergerstraße 55.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstraße 2, durch die Post oder durch Vermittlung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Hernau.

Ausland.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 19. März 1874. Nr. 12.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Polizeiverordnung für Baden. —
Ueber das Nisten der Zwergpagageien. (Fortsetzung). —
Zur Fütterung: Insektenschrot. —
Neue und seltenere Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts. —
Ausstellungen: München; Berlin (Schluß). —
Benachrichtigung. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —

Zum Vogelschutz.

Bekanntmachung.

Das Fangen, Tödten und Feilbieten der Krammetsvögel betreffend.

Wir sehen uns veranlaßt, auf nachstehenden § 2 der Verordnung vom 1. Oktober 1864 mit dem Anfügen aufmerksam zu machen, daß nach Erlaß des Großh. Handelsministeriums vom 15. d. M. die Krammetsvögel zu den Vogelarten gehören, deren Einfangen, Tödten und Feilbieten verboten ist.

Zuwiderhandlungen werden an Geld bis zu 20 Thalern oder mit Haft bis zu 14 Tagen geahndet.

§ 2.

Das Einfangen, Tödten und Feilbieten der einheimischen Singvögel, mit Einschluß der Meisen, Lerchen, Drosseln, Amseln und Stare, der Schwalben, Krähen, Spechte und sonstigen kleineren Feld- und Waldvögel, welche nicht zum Jagdwild gerechnet werden, desgleichen das Zerstören ihrer Nester, das Ausnehmen ihrer Eier und das Feilbieten letzterer; endlich das Aufstellen von Vorrichtungen jeder Art zum Einfangen dieser Vögel, als der Netze, Vogelheerde, Leimruthen, Meisenschläge, Schlingen und dergleichen ist verboten.

Karlsruhe, den 26. Januar 1874.

Großh. Bezirksamt.
Bensinger.

Ueber das Nisten der Zwergpapageien.

(Vom Herausgeber).

(Fortsetzung).

Eine weitere Beobachtung danken wir Herrn Dr. Franken, (früher in München) in Badenbaden. Dieser Herr schreibt:

Von einem Nestbau in der Weise der Rosenpapageien habe ich nichts bemerkt, nur fand sich häufig zerbissener Salat im Nistkasten, ob mit Absicht hineingeschleppt oder nicht, vermag ich nicht zu entscheiden. Ich erhielt, nach langem Warten, endlich im Februar d. J. 1872 ein Pärchen Grauköpfe, die mir indeß keinen sonderlich liebenswerthen Eindruck machten, da dieselben unbeschreiblich wild und scheu sich geberdeten, und namentlich dadurch sich sehr unangenehm machten, daß sie, bei der leisesten Annäherung an ihren Bauer ein fürchterliches Geschrei erhoben. Nichtsdestoweniger bemerkte ich in Bälde (3. März) eine Begattung und gab dem Paare in Folge dessen einen Brutkasten, in welchen das Weibchen sich alsbald begab und vom 10. März an ununterbrochen seine Zeit zubrachte. Am 17. war das erste Ei im Kasten, am 21. waren es 3 Stück. Nun begab sich das Männchen auch

hinein. Am 23. lag ein Ei mit zu dünner Schale im Käfige. Ebenso hatten die am 25. und 27. gelegten Eier zu dünne Schalen und wurden daher zerdrückt. Als ich nun am 29. nachsah, ob wieder ein solches gelegt sei, war Alles vernichtet und ich räumte in Folge dessen den Kasten aus. Ich dachte, es sei genug des grausamen Spieles; da ich aber das Paar nicht getrennt hatte, nahm die öftere Begattung ihren Fortgang und war ich genöthigt, den Kasten wieder zu geben, worin auch den anderen Tag, 31. März ein gutes Ei sich vorfand und am 7. April 4 Eier waren. Ob auch noch ein Zwölftes gelegt wurde weiß ich nicht, da ich nicht mehr stören mochte. Erst am 13. Mai sah ich wieder nach, und fanden sich im Kasten nur 3 Eier, wovon eins durchlöchert, die beiden anderen unbefruchtet. Wenige Tage später begann die Begattung wieder und waren nach ungefähr drei Wochen 3 Eier im Kasten. Ich ging damals auf vier Wochen fort und hoffte Junge bei meiner Rückkehr zu finden; statt dessen waren nur 2 Eier, beide mit kleinen Löchern und vertrocknet vorhanden. Wie viele es wirklich gewesen, läßt sich aus dem Chaos des Kastens nicht schließen. Die Durchlöcherung der Eier brachte mich darauf, daß ein weniger tiefer Kasten vielleicht besser sei und ich änderte denselben also in dieser Beziehung ab. Die Vögel begaben sich alsbald in den neuen Kasten, begatteten sich öfters und als ich am 15. September nachschaute, fand sich keine Spur eines Eies, wol aber Reste von Schalen, vertrocknetes Eigelb u. s. w. Da die Vögel sich so wild benahmen, so hängte ich den Käfig so, daß sie meine Annäherung nicht gewahrten und paßte ich ihnen auf, bis beide am Freßtrog sich befanden. So sah ich am 5. Oktober wieder zwei Eier, die Anfang November wiederum spurlos fort waren. Ebenso am 23. November drei Eier, die am 8. Dezember ebenfalls verschwunden waren. Daher trennte ich das Paar, was natürlich fürchterliches Geschrei besonders von Seite des Mannes hervorrief. Nach Weihnachten gab ich beide wieder zusammen, ohne aber einen Nistkasten dazu zu hängen. Da aber alsbald wieder eine öftere Begattung stattfand, ich auch bemerkte, daß das Weibchen legen wollte, gab ich ihnen den Kasten wieder, berührte ihn aber nie, sondern verlegte mich nur auf die genaueste Beobachtung der Vögel selbst, wobei ich fand, daß die Begattung bis zum 13. Januar täglich stattfand und das Weibchen 5 oder 6 Eier gelegt haben mußte. Am 15. Februar erschien denn das Weibchen öfter wieder und that sich überhaupt ein gewisses Leben kund, woraus ich schloß, daß Junge vorhanden seien. Am 19. aber war es still und als ich am 20. das Weibchen nicht zu Gesichte bekam, holte ich den Kasten herunter und fand von Eiern oder Jungen keine Spur, wol aber das Weibchen todt, zerrissen, zur Hälfte gefressen. Waren nun wirklich Junge dagewesen und hatte der Rabenvater in der unsinnigen Wuth Alles zu zerstören, das Weibchen auch getödtet, oder war es von selber gestorben? Ich glaube das Erstere, denn das Männchen war ein roher Patron. Sobald das Weibchen erschien, um zu fressen, bekam es zum Willkomm einen Hieb mit dem Schnabel, hatte es gefressen und begab es sich wieder gegen den Kasten zu, so flog er hinterdrein und gab zum Geleite wieder einige Hiebe mit in den Kasten. Es mag dies ein Zeichen von Eifersucht sein, wie ja auch Aehnliches bei den rothköpfigen Inseparables zu bemerken ist, die so zahm geworden sind, daß sie mir Wegerich aus der Hand nehmen, alsbald den Schwanz ausbreiten, wenn ich komme, und sich strecken, wobei das Männchen wüthend den Kopf schüttelt, dem Weibchen an den Kopf fährt, es schüttelt und dann ruhig sich mit mir beschäftigt, offenbar beruhigt, daß er seine Ehehälfte verhindert hat, mit mir in Berührung zu kommen.

Soviel über dieses Pärchen Grauköpfe. Mein zweites Paar ist bedeutend ruhiger gewesen, hat aber ebenfalls keine Jungen erbrütet, wol aber waren Junge abgestorben in den Eiern. Meist hatten die Eier kleine Löchelchen. Wäre es vielleicht zweckmäßig, den Mann während der Brut abzusondern? Vielleicht haben Sie die Güte, mir einige Andeutungen über die Brut zu machen. Dr. Franken.

(Schluß folgt).

Zur Fütterung.

Insektenschrot.

Schon seit vielen Jahren füttere ich meine Vögel mit Insektenschrot, und bis jetzt habe ich nur die besten Wirkungen gesehen. In einem großen Bauer befinden sich drei Rohrdrosseln, zwei Teichrohrsänger, drei Plattmönche 2c. und diese alle sind kerngesund und singen jetzt, Anfang März, sämmtlich schon fleißig, ohne daß sie Ameisenpuppen und Mehlwürmer anders als in höchst sparsamen und kleinen Gaben erhalten — etwa alle drei Tage einmal. Quark mit Insektenschrot gemischt ist ein gesundes Nahrungsmittel, welches sie nicht in Uebermaß genießen, da es für sie durchaus kein Leckerbissen ist, und welches doch nahrhaft, leicht verdaulich und für die Gewöllbildung geeignet ist. Am verderblichsten ist für die meisten Stubenvögel der Umstand, daß sie zu nahrhaftes Futter erhalten. Die meisten Vogelwirthe glauben geborgen zu sein, wenn sie sehen, daß es den Vögeln recht schmeckt, und setzen zu starke Portionen des zu schmackhaften und nahrhaften Futters vor. Die Folge davon ist anfänglich Fettleibigkeit und dann Auszehrung, Augengeschwür, Schlag, chronische Entzündungszustände der verschiedenen Unterleibsorgane 2c. Ich will meine Behandlungsweise durchaus nicht als die maßgebende hinstellen, erlaube mir aber auf die freundliche Aufforderung des Herrn Regierungsrath v. Schlechtendal in No. 8 d. Bl. hin sie mitzutheilen. Bei mir erhalten die feinen Weichfresser möglichst abwechselndes Futter, bestehend aus Gemengen, in welchen einmal um das andere Beerenstoffe und Eiweißstoffe vorherrschen, und zwar zweimal täglich. Jene bestehen in gequellten Hollunderbeeren, Feigen, Rosinen, Heidelbeeren, gekochten getrockneten Aepfeln und Zwetschen, geriebenen Möhren, — diese aber in saurem Quark, süßem Quark, gekochtem geriebenem

Fleisch, gekochtem Fisch (zumal Schellfisch und Dorsch), Fleischüberbleibseln von der Mittagstafel, (wenn diese nicht zu stark gewürzt sind), geriebenem Eierbrot, geriebenem Ei. Um das Futter, wenn es nöthig ist, etwas trockner zu machen, wird feine Weizenkleie zugesetzt. Stets aber, wenn der Vorrath irgendwie nur reichen will, findet ein Beisatz von Insektenschrot statt, welches den Vögeln keineswegs gut schmeckt und daher wie schon bemerkt, die Thiere hindert, zu Viel zu fressen, dabei Gelegenheit zu der so nothwendigen Gewöllbildung giebt. Nur das Pulver getrockneter Orthoptern (Heuschrecken, Grillen ꝛc.) scheint den Vögeln etwas mehr zu behagen.

Zum Trocknen werden bei mir in größeren Massen eingetragen: Maikäfer, Brachkäfer (Rhizotrogus solstitialis), Junikäfer (Phylloperda horticola), Fichtenbohrer (Hylobius abietis, von Jägern zu beziehen), Drohnen, Hummeln, Mistfliegen (Eristalis tenax), alle Arten Heuschrecken und Heupferdchen (Acridium), Feldgrillen, Heimchen, Schaben ꝛc. Diese werden so rasch als möglich getrocknet unter Beobachtung aller Vorsicht, daß sie nicht braten oder „anbrennen"; dann werden sie heiß gepulvert und noch warm in heißgehaltene, ganz trockene Glasflaschen gefüllt, nachdem einige Körnchen Salz zugesetzt worden. Die Flaschen werden versiegelt aufgehoben. — Bei Drohnen muß man vorsichtig sein, da vielfach die Thiere in den Drohnenfallen mit Tabaksdampf getödtet werden und solche schädlich sein müssen. Auch die Tödtung durch heißes Wasser ist unbequem wegen der Nässe und der bei dem Honiggehalt ohnehin schwierigeren Trocknung. Ich lasse die Thiere in der Falle durch tüchtiges Schütteln tödten.

Es ist bei alledem nicht leicht, Insekten in genügender Menge für das Trocknen zu beschaffen, — wenigstens wenn die Zahl der hungrigen Schnäbel so groß ist, wie bei mir und bei so manchem meiner Freunde. Es ist mir deshalb oft die Frage aufgestiegen, ob es denn nicht möglich wäre, aus dem Orient, wo ohnehin Heuschrecken (Acridium migratorium) in großen Massen getrocknet werden, für den eignen Bedarf der Beduinen und Bondern, gut getrocknete Heuschrecken zu beziehen. Die „Gefiederte Welt" hat eine große Verbreitung; vielleicht könnte ein Leser, der im Orient hinreichend Bescheid weiß, hierüber Auskunft geben.

Prof. Dr. K. Th. Liebe.

Neue und seltenere Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts.

Fledermauspapageien habe ich jene kleinen wunderniedlichen Vögel benannt, welche Dr. Finsch in seinem herrlichen Werke als Papageichen (Coryllis) bezeichnet. Diesen volksthümlichen Namen gab ich ihnen, weil sie bekanntlich die wunderliche Eigenthümlichkeit haben, zur Nacht sich fledermausartig an den Füßen, mit den Köpfen nach unten anzuhängen. Diese zarten indischen Papageichen kommen außerordentlich selten lebend herüber und meines Wissens sind bis jetzt auch nur erst vier Arten eingeführt worden. Die bekannteste Art und zugleich auch eine der schönsten ist das blauscheitelige Papageichen (C. galgulus), welches auch unter der jedoch wenig zutreffenden Bezeichnung Blaukrönchen bekannt ist. Dies Papageichen ist grasgrün, auf dem Scheitel mit dunkel ultramarinblauen Fleck, auf der Mitte des Oberrückens mit einer hochorangefarbenen Zeichnung, mit brennend scharlachrothem Bürzel und Oberschwanz und mit einem großen runden, dunkel scharlachrothem Schilde an Kehle und Oberbrust. Für den Vogelliebhaber, welcher diese wunderniedlichen Papageien noch niemals gesehen hat, gewähren dieselben ohne Frage einen überraschenden Anblick. Die Papageichen sind die kleinsten aller in den Handel gelangenden Arten dieser großen Vogelfamilie und zugleich dürften sie auch zu den interessantesten gezählt werden. Den Vogelliebhabern gegenüber ist ihnen bisher ganz entschiedenes Unrecht geschehen und zwar lediglich dadurch, daß man mit einer Sendung von ihnen im Berliner Aquarium, unter der ersten Direktion, großes Pech hatte. Dies ist jedoch im Wesentlichen genau dasselbe Vorkommniß, wie es auch mit den Sperlingspapageien und Unzertrennlichen geschehen war. Wer das Unglück hat, daß er eine Sendung solcher Vögel im krankhaften Zustande erhält, dem sterben sie dann allerdings „wie die Fliegen"; ein anderer erfahrener Vogelwirth wird aber die Sperlingspapageien, welche gesund und lebenskräftig in seinen Besitz gelangen, wahrlich nicht für so äußerst hinfällig halten dürfen und von dem als noch hinfälliger verschrieenen Inseparable ist es bekannt, daß ein Pärchen im Besitz verständiger Pfleger oder Pflegerinnen ein Jahrzehnt und darüber am Leben bleibt. So sollte man also niemals nach einer einzigen Erfahrung ein unfehlbares Urtheil aussprechen.

Von den Papageichen in den vier mir durch Anschauung bekannten Arten sind im Laufe der Zeit zahlreiche Exemplare durch meine Hände gegangen. Mehrere davon erhielt Herr Buchhändler Fiedler in Agram von mir, und einen Beweis dafür, daß dieselben sich gut gehalten haben, fand ich darin, daß Herr Fiedler diese Vögel nach längerer Zeit (ich glaube bei der durch Umzug oder dergleichen veranlaßten Auflösung seiner Vogelstube) an Herrn Gudera in Leipzig abgegeben hatte. In wessen Besitz die Vögelchen sodann übergegangen, habe ich nicht erfahren. Ich erhielt die Papageichen in fünf verschiedenen Sendungen, von Fräulein Hagenbeck in Hamburg, den Herren Hieronymi in Braunschweig, Chs. Jamrach in London u. Abraham in London, und die meisten davon kamen glücklich bei mir an. Von einer Sendung gingen, trotz sehr ungünstiger Witterung, nur zwei zu Grunde, während die beiden andern glücklich bis zu wir und dann sogar von Berlin aus über Wien bis Agram gelangten. Aus einer Sendung in drei Exemplaren von Herrn Jamrach war keins am Leben geblieben, während dagegen in den nächsten Tagen sieben Köpfe ebenfalls von Herrn Jamrach durchaus gesund und lebenskräftig ankamen. Immer wieder bewahrheitet sich in allen solchen Fällen die Thatsache, daß die

fremdländischen Vögel in unsern Volieren und Vogelstuben nur dann so zahlreich sterben und uns mit den empfindlichsten Verlusten bedrohen, wenn sie eben bereits krankhaft in unsern Besitz gelangen, wie dies in letzterer Zeit leider mit den Graupapageien und im Allgemeinen nur zu häufig mit den Plattschweifsittichen der Fall ist.

Die gegenwärtig in meinem Besitz befindlichen Fledermauspapageien sind in so vortrefflichem Zustande, daß ich es wagen konnte, sie auf die Ausstellung der „Cypria" zu bringen, wo sie mit Recht allgemeines Aufsehen erregt haben. Auch Herr Dr. Bodinus hat eine Anzahl Papageichen von Fräulein Hagenbeck erhalten und ich hoffe, daß wir, ebensowol der zoologische Garten von Berlin, als auch meine Vogelstube, dieser Vögelchen uns lange Zeit erfreuen und interessante Erfahrungen über sie sammeln werden. Ein einzelnes Exemplar besitze ich seit Dreiviertel Jahren und ich glaube kaum, daß dasselbe, sowie auch die andern als unbedingt hinfällig bezeichnet werden dürfen. Sie fressen gesottenen Reis, in Wasser erweichtes und gut ausgedrücktes Eierbrot nebst ein wenig Feige und Kanariensamen. Wer diese Vögelchen halten will, beachte aber wol, daß sie ziemlich bedeutend schmutzen, daß man sie daher in einem recht geräumigen Käfige mit Metallschublade und äußerst sauber halten muß. Dr. K. R.

Ausstellungen.

Zu der viertägigen, am St. Josephstage, den 19. März, beginnenden zweiten allgemeinen deutschen **Geflügelausstellung im königl. Odeon** sind die Anmeldungen aus allen Theilen Deutschlands so zahlreich erfolgt, daß die Anzahl der auszustellenden Thiere schon am Schlusse des Anmeldungstermines die der vorjährigen um das doppelte überstieg. Es mußten wegen Raummangels die Anmeldungen sehr bedeutender auswärtiger Züchter und Händler leider als verspätet zurückgewiesen werden. Uebrigens werden, abgesehen von der Anzahl, auch ganz neue und so interessante Gegenstände zur Ausstellung kommen, daß dieselbe unter den diesjährigen Expositionen in Deutschland eine hervorragende Stelle behaupten wird.

Der Vorstand
des Vereins für Geflügelzucht in München.
Pfister, Präsident.

Die zweite allgemeine Geflügel-Ausstellung der „Cypria",

Verein der Geflügel-Freunde in Berlin,
vom 20. bis 24. Februar, im Gebäude der alten Münze, am Werderschen Markt.

(Schluß).

III.

Im Gegensatz zu der Hühnerzucht steht die dritte und letzte Seite der Geflügelliebhaberei, die Beschäftigung mit den Sing- und Schmuckvögeln auf dem am wenigsten praktischen Boden. Sie bietet allerdings Genüsse für das Herz und Auge, in den wonnigen Liedern der Sänger und in der Farbenpracht und Anmuth unserer gefiederten Lieblinge; von irgend einem handgreiflichen Nutzen der Stubenvogel-Liebhaberei wußte man bis dahin aber nichts zu sagen. Erst in der allerneuesten Zeit kommt auch hier der letztere in Betracht, in der Züchtung von Kanarienvögeln und zahlreichen Arten fremdländischer Schmuckvögel. Und hierdurch ist diese Liebhaberei zu einer so großartigen Ausdehnung gelangt, daß für dieselbe eine eigene Zeitschrift, eben unsere „Die gefiederte Welt" gegründet werden durfte.

Die Ausstellung der „Cypria" zeigt im Gegensatz zum vorigen Jahre gerade in dieser Hinsicht bedeutsame Leistungen der Aussteller. Billigerweise lassen wir das Berliner Aquarium den übrigen vorangehen. Herr Dr. Hermes hat der Ausstellung in einer Anzahl vorzugsweise interessanter Vögel einen ebenso seltenen als kostbaren Schmuck verliehen. Der Flaggen-Drongo oder Bienenkönig aus Indien erfüllt mit seinem harmonischen Flötenruf bis weithin zum Gekrähe der Hähne die Räume, und der eine Flötenvogel stimmt mit der Melodie des Sängers auf der Fahnenwacht ein, während der andere einen kuriosen Hahnenschrei erschallen läßt. Hochinteressant sind sodann der Hollenpapagei aus Südamerika, die chinesische Spottdrossel, der schöne Blaurabe, drei Arten der wunderlichen Bülbüls, die Waldrothdrosseln, Glanzelstern und Glanzstare, der Bienenfresser, die rothen Tangaren und die hübsche Kitta aus Südasien. Vom Gesichtspunkte der praktischen Liebhaberei, also der Vogelzucht aus verdienen dann zwei selbstgezüchtete Rosenpapageien und zwei desgleichen Büffelweber vorzugsweise Beachtung. Die Vögel befinden sich in schönen Käfigen, die Anordnung ist geschmackvoll und die ganze Sammlung macht dem Berliner Aquarium Ehre.

Auch die Vogelhandlung des Herrn W. Mieth in Berlin verdiente Beachtung. Ein Paar prachtvolle Gebirgs-Lori, drei Paar verschiedene australische Prachtsittiche, ein schwarzer Papagei, eine amerikanische Spottdrossel und eine ausnahmsweise stattliche Blaudrossel, rothe Kardinäle, mehrere Käfige mit verschiedenen kleinen fremdländischen Vögeln, Prachtfinken und dergleichen, sowie ein Käfig mit Wellensittichen laden die Käufer zur Auswahl ein, und wir bemerkten, daß die Liebhaber für die Bereicherung ihrer Vogelstuben und Sammlungen fleißig einkauften, denn Herr Mieth ist dafür bekannt, daß er nur schöne und kerngesunde Vögel abgiebt.

Für jeden Aussteller bringt eine solche Gelegenheit viele Uebelstände und nicht selten empfindliche Verluste mit sich, am undankbarsten aber ist sie ganz entschieden für die Aussteller von Kanarienvögeln. Ihnen gegenüber sind die Preisrichter in arger Verlegenheit. Denn inmitten des Lärms der übrigen Vögel und des Geflügels überhaupt einerseits und der vielen Beschauer andererseits ist das Abhören geradezu eine Unmöglichkeit, und selbst die vorzüglichsten Rollervögel oder gerade diese können garnicht zur Geltung kommen. Ziemlich zahlreiche Sammlungen von Kanarienvögeln, welche in den Preisen von 6 bis 20 Thlrn. wechseln, haben die Herren Karl Tolle aus Hannover, W. Döltz, Goldschmidt und Tischlermeister F. A. Ochs hier, und die bekannte und bewährte Handlung echter Harzer Kanarienvögel von F. Panzer ausgestellt. Die letztere und Herr C. Materne haben auch eine Anzahl sehr zweckmäßig eingerichteter und größtentheils zugleich mit Kanarien bevölkerter Heckkäfige und Einzelkäfige für Sänger geliefert. Nicht unerwähnt dürfen wir den Musterkäfig für Kanarien-Rollervögel aus der Holzwaarenfabrik von Frühauf in Schlensingen lassen, welche bekanntlich auch die allgemein eingeführten Nistkästen für Wellensittiche, sowie für fremdländische und einheimische Vögel überhaupt liefert.

Ein großer Vogelfreund, Herr E. Dulitz, hat einen stattlichen und sehr zahmen, gelbhäubigen Kakadu und eine seltene Diadem-Amazone ausgestellt. — Hiermit müßten wir eigentlich diesen Bericht schließen; doch sei es vergönnt, die ausgestellten Vögel aus Dr. Ruß' Vogelstube wenigstens aufzuzählen. Rosenpapageien oder Zwergpapageien mit pfirsichrothem Gesicht sind jene herrlichen größeren Inseparables, welche zu den seltensten und interessantesten aller fremdländischen Stubenvögel gehören. Hier ist ein Paar alter und ein Paar von denselben gezüchteter nebeneinander. Fast noch schöner, mindestens aber lieblicher sind die grauköpfigen Zwergpapageien oder Grauköpfchen, welche in zwei Alten und drei Jungen sich hier befinden. Die hier ferner vorhandenen Paradiessittiche, Bourkssittiche, strohgelben und gelbstirnigen Sittiche gehören zu den seltensten und schönsten der australischen Pracht-Papageien. Sehr selten sind die rothbäuchigen Sittiche und sehr schön und liebenswürdig die Pflaumenkopfsittiche, von denen das Männchen ebenfalls hier gezüchtet und soeben in der Verfärbung begriffen ist. Ein Paar prachtvolle Loris von den blauen Bergen, welche zu den buntesten aller dieser Schmuckvögel gehören, und im Gegensatz zu ihnen die winzig kleinen Fledermauspapageien oder Papageichen, ferner schneeweiße Reisvögel, reinweiße, gelbbunte und graubunte, größtentheils selbstgezüchtete, japanesische Mövchen, mehrere sehr seltene Prachtfinken, unter denen besonders ein Pärchen einzig in der Ge-

fangenschaft befindlicher Aurorafinken, sodann goldgelbe Trupiale und rosenbrüstige Lerchenstare verdienen wol hervorgehoben zu werden.

Eine Vogelart, welche bis vor wenigen Jahren selbst den meisten Ornithologen noch nicht in lebenden Exemplaren bekannt war und im Berliner zoologischen Museum damals nur in einem Stück vorhanden, ist hier in fünf tadellosen Pärchen mit drei hier gezüchteten Jungen ausgestellt. Es sind die chinesischen Sonnenvögel, die so schön und zugleich interessant sind, daß man ihre Verallgemeinerung im Vogelhandel zu immer billigeren Preisen (von 40 bis auf 20 Thaler) mit größter Freude begrüßen darf.

Eine weitere Schilderung dieser Sammlung ist wol überflüssig. Es sei nur der Hinweis gestattet, daß darunter drei Arten hier gezüchteter Papageien und fünf Arten selbstgezüchteter Prachtfinken, nebst desgleichen Sonnenvögeln sich befinden. Erfahrene Liebhaber, sowie sachverständige Ornithologen konnten an den Schnäbeln der Rosenpapageien, den noch nicht völlig ausgefärbten Köpfen der Granköpfchen und des Pflaumenkopfsittichs u. s. w. alle diese jungen Vögel sogleich erkennen. —

Wir schließen mit dem Wunsche, daß die Geflügel-Liebhaberei in Berlin durch diese Ausstellung einen recht wirksamen Anstoß zur weiteren Ausbreitung gewinnen möge und daß sie besonders nach allen ihren praktischen Seiten hin immer mehr zur Geltung komme. Einen Beweis dafür, daß dies auch in Hinsicht der Vogelliebhaberei sehr wol der Fall sein kann, wollen wir in der Anführung der Thatsache geben, daß mehrere der beliebtesten Stubenvögel-Arten, besonders die Wellensittiche und Zebrafinken bereits jetzt zeitweise in ungleich größerer Anzahl in den deutschen Vogelstuben gezüchtet, als aus ihrer Heimath importirt werden. Keineswegs darf man aber glauben, daß dadurch diese Stubenvögel allmälig zu sehr entwerthet werden könnten, so daß ihre Zucht sich nicht mehr verlohne. Im Gegentheil, jemehr Kanarienvögel in Deutschland gezüchtet werden, desto höher sind ihre Preise gestiegen — und ein Gleiches wird immerhin mit den beliebtesten der fremdländischen Stubenvögel der Fall sein. In rechter Weise und mit Verständniß begonnen, kann auch die Zucht dieser Vögel, ganz ebenso wie die des Kanarienvogels, minder bemittelten Familien einen beachtenswerthen Zuschuß zum Erwerbe gewähren.

Die höchst geschmackvolle Dekoration des Lokals hatten Herr Dekorateur Lell und Handelsgärtner Curio in Charlottenburg ausgeführt und den größten Dank für die ganze Ausführung und die trefflichen Einrichtungen der ganzen Ausstellung verdienen die Komité-Mitglieder, Herr Wagenführ, Sekretär des Zoologischen Gartens, und Herr Buchdruckereibesitzer Möser hier. Dr. K. R.

Die Preisertheilung des Vereins „Cypria".

In Anbetracht der wichtigen Aufgaben, welche der Verein sich gestellt und der hohen Achtung welche er sich bereits errungen, hatte das Königl. Landwirthschaftliche Ministerium drei silberne und fünf bronzene Medaillen zur Prämiirung bewilligt. Bei der vor der Preisverleihung stattgefundenen Berathung der Preisrichter wurde der einstimmige Beschluß gefaßt, daß zwei silberne Staatsmedaillen für die hervorragendsten Leistungen auf dem Gebiete der Hühnerliebhaberei und Zucht und eine solche auf dem der Taubenliebhaberei verliehen werden sollten. Da aber der Züchtung fremdländischer Stubenvögel nicht allein ein wissenschaftlicher, sondern doch auch ebenfalls ein gewisser volkswirthschaftlicher Werth zugesprochen werden muß, so wurde eine Staatsprämie auch für diese dritte Abtheilung der Ausstellung bestimmt. Dieser höchste Preis in der Abtheilung der Vögel wurde der Vogelstube von Dr. Ruß für Züchtungserfolge zuerkannt, während das Berliner Aquarium mit dem zweiten Preise hier, der silbernen Medaille des Vereins für seine Gesammtleistung ausgezeichnet wurde. Wir heben dies hervor, indem wir ganz besonderes Gewicht darauf legen, daß auch die Vogelzucht und zwar auf den Antrag des Herrn Direktor Dr. Bodinus in diesem Sinne als vollberechtigt und eines ersten Preises werth anerkannt worden.

In Betreff der übrigen Prämiirungen sind mancherlei Klagen laut geworden, auf die wir aber näher einzugehen uns hier nicht berufen fühlen. Einerseits läßt es sich selbstverständlich nicht vermeiden, daß bei jeder Prämiirung Unzufriedenheiten erweckt werden, da es doch geradezu unmöglich ist, alle hervorragenden Leistungen durch Prämien auszuzeichnen; andererseits sind die Ansichten und Meinungen gerade auf diesem Gebiete außerordentlich auseinandergehend, so daß doch eben nur die Majorität der Preisrichter die gültige Entscheidung haben kann; schließlich müssen bei jeder solchen Gelegenheit erst Erfahrungen gemacht werden, um festzustellen, welcher Usus gerade den betreffenden Verhältnissen am entsprechendsten ist. Wir glauben, daß auch bei uns die Art und Weise der Preisertheilung des Vereins für Geflügelzucht in Köln am vertheilhaftesten sein wird, welche darin besteht, daß man die Reihenfolge der höchsten Preise nach der Anzahl der einzelnen Leistungen und bezüglich deren Prämien bemißt. Die Preisertheilung zeigte folgende Ergebnisse:

Tauben.

Preisrichter die Herren Dr. Bodinus, Meyer, Petzolt, Richter, Kratzenberg (als Stellvertreter).

№ 1—18 Silberne Staats-Medaille Frau Prinzeß Karl für Gesammt-Ausstellung.
= 44—61 Bronce- = = Herr Pausch für Gesammt-Ausstellung.
= 62—77 = = = Herr Koppe für Gesammt- =
= 19—22 Große Silb. Vereins- = Herr Dr. Bodinus für Gesammt- =
= 117—121 Große Silb. Vereins- = Herr Michael für Gesammt- =
= 27—43 Kleine = = = Herr Möser für Gesammt- =
= 78—81 = = = = Herr Petzolt für Gesammt- =
= 197—199 = = = = Herr Leddihn für Altstämmige Tauben.
= 332—355 = = = = Herr Bernhardt für Kropftauben.
= 189—191 Große Bronce- = = Herr Bohnefeld für Altstämmige Tauben.
= 214—215 = = = = Herr Hevernick für Pom. Kropftauben.
= 226 = = = = Herr Claus für Chinesische Mövchen.

Hühner.

Preisrichter die Herren Dr. Bodinus, Kunze, Richter, Meyer (als Stellvertreter).

№ 362—371 Silberne Staats-Medaille Herr Dr. Bodinus für Gesammt-Ausstellung.
= 380—393 = = Herr Kuntze = Gesammt- =
= 372—379 Bronce- = Herr Möser = Gesammt- =
= 463—488 = = Herr Martens = Gesammt- =
= 361 Kleine Silberne Vereins- Frau Prinzeß Karl = Berg. Kräher.
= 394 = = Herr Schneider = Italiener.
= 409 = = Herr Geupel-White = Dorking.
= 421 = = Herr Lenzen = Kämpfer.
= 436 = = Herr Hromada = Kochinchina.
= 395—397 Große Bronce Vereins-Medaille Herr Heinecke = La flèche, Berg. Kräher.
= 400—403 = = = Herr Effeldt = Gesammt-Ausstellung.

Sing- und Ziervögel.

Preisrichter die Herren Dr. Bodinus, Dr. Ruß, Wagenführ, Meyer (als Stellvertreter).

№ 492, 499 u. 521 Bronce-Staats-Medaille Herr Dr. Ruß für Züchtungs-Resultate.
= 565—582 Große Silberne Vereins-Medaille Herr Dr. Hermes für Gesammt-Ausstellung.
= 554—564 Kleine = Vereins-Medaille Herr Mieth für Gesammt-Ausstellung.
= 548—551 = = = -Medaille Herr Tolle für Kanarienvögel.
= 542—547 Große Bronce- = -Medaille Herr Pantzer für Kanarienvögel.

Zur Benachrichtigung.

Herr Rudolf Schoebel aus New-York theilt uns mit, daß er von einer Reise nach Südamerika soeben zurückgekehrt ist und binnen Kurzem in Deutschland ankommt. Außer, den vielbegehrten kleinen Kubafinken, bringt er eine beträchtliche Anzahl verschiedener seltener Vögel mit und wir verweisen im Uebrigen auf die in dieser Nummer befindliche Annonce von ihm.

Briefwechsel.

Herrn Premierlieutenant **L. K.** in B.: Ihren Bericht haben wir mit Dank empfangen und auch die übrigen zugesagten Mittheilungen werden uns willkommen sein — Herrn Jeb. Schulze, Regulirungs-Dirigent in Riga: Ihre weiteren Beiträge werden uns sehr willkommen sein. — Herrn Maler Fritz Engel in Woldegk: Sie schreiben uns, daß Herr A. T. Lossow in Berlin sich Vorsteher des „Deutschen Central-Vereins für Geflügel-Import und -Züchtung", ferner Direktor des „Allgemeinen landwirthschaftlichen Instituts" und schließlich auch noch Vorsteher des „Vereins deutscher Taubenfreunde" nennt. Da uns bereits mehrere Fragen in Betreff des Herrn Lossow zugegangen sind, so bemerken wir hiermit, daß es unseres Wissens — und wir sollten doch gewiß Kenntniß davon haben — weder einen deutschen Central-Verein für Geflügel-Import und -Züchtung, noch einen Verein deutscher Taubenfreunde giebt. Mit welchem Recht Herr Lossow sich also den hochklingenden Titel eines Vorstehers solcher Vereine beilegt, vermögen wir nicht zu ergründen. Wenn Sie uns den Sachverhalt Ihres Verkehrs mit Herrn Lossow wahrheitsgetreu angeben wollen, so sind wir natürlich bereit, denselben hier zu veröffentlichen. Sind Sie reell und gut von ihm bedient, so wird dies seinen Titeln Ehre machen, andernfalls haben wir die Pflicht, unsere Leser zu warnen. —

Der Herausgeber der „Gefiederten Welt" Dr. Karl Ruß verzieht am 18. März d. J. und bittet darauf zu achten, daß er dann in Steglitz bei Berlin, Albrechtstraße 115 wohnt. Für freundliche Besuche sei bemerkt, daß Steglitz in 10 Minuten von Berlin aus zu erreichen ist.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

In **R. Hieronymi's Zoologischen Handlung zu Braunschweig** sind u. A. vorräthig: Zebrafinken, Muskat- und Reisvögel, Weberfinken, Wittwen, Elsterchen, Kanarienvögel, Stieglitzbastarde, Dompfaffen, Hänflinge, Zeisige, Stieglitze, Braunellen, Goldammer, Finken, Kreuzschnäbel, rothe Kardinäle, Graue Amazonen und Surinampapageien, Wellen- und Nymphensittiche, Rosellas, Kakadus, Araras, Kolkraben, Wander- und Lachtauben, franz. Kaninchen, Opossum, Affen, Racenhunde, Goldfische, Schildkröten. — Käfige, Nistkasten, neue und alte, Futtersämereien u. dgl. aller Art ꝛc. ꝛc. [167

Lapins (Haasenkaninchen).

Lapins belier (schwerste Rasse) zu verkaufen; 5—8 Wochen alte à 1—1½ Thlr.; zeugungsfähige, 10—12 Monat alte 2—2½ Thlr. bei **Nietschmann,**
Sondershausen. Höche's Ziegelei. [168

Eine große Auswahl in- und ausländische Vögel, Tauben und Hühner. Ausländische Sachen selbst importirt, empfiehlt billig **C. Herslen,** Vogelhändler
169] Hannover.

Verlag von Bernhard Friedrich Voigt in Weimar.

Der

Hühner- oder Geflügelhof,

sowohl zum Nutzen als zur Zierde,

enthaltend eine praktische Anleitung, die Zucht der Hühner, Gänse, Enten, Truthühner, Tauben u. s. w. zu betreiben, sowie diejenige in- und ausländischer Ziervögel, namentlich der Schwäne, Pfauen, Fasanen, Perlhühner ꝛc.

Nebst naturgeschichtlichen und auf Erfahrung beruhenden Notizen über Eigenschaften und Gewohnheiten dieser Vögel, den Bau von Geflügelhäusern und nützlichen Anleitungen aller Art.

Von **Robert Oettel,**
Stifter und Präsident des Hühnerologischen Vereins zu Görlitz.

Fünfte gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage.
Mit 8 Tafeln, enthaltend 43 Abbildungen.
170] **1874. gr. 4. Geh. 1 Thlr. 15 Sgr.**

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Französische Kaninchen.

In Folge einer, mit Herrn E. Gayot getroffenen Uebereinkunft ist mir der Alleinverkauf der, unter seiner persönlichen Leitung und Aufsicht gezüchteten

Leporiden

für Deutschland und die Schweiz übertragen worden. Ich erlaube mir daher, die Liebhaber dieser ebenso schönen als nützlichen Hausthiere ganz besonders auf dieses vortreffliche Produkt französischer Züchtung aufmerksam zu machen und bitte um **zeitige Einsendung** gefälliger Aufträge.

Preis per Stück **6 Monat alter Thiere** Frs. 15 — franco Zürich zuzügl. Frs. 2½ per Sendung für Verpackung ꝛc. Vorstehendes gilt auch für

Lapins de St. Pierre

á Frs. 10 — per Stück, hochgeschätzt wegen ihres feinen saftigen Fleisches. Mit Rücksicht auf die äußerst bescheidene Provision, mit welcher ich mich im Interesse der Verbreitung der Kaninchenzucht bei genannten Preisen begnüge, muß ich mir frankirte Einsendung des Betrages in Begleit der resp. Aufträge höflichst ausbedingen. [171]

A. Rumpf, Außersihl-Zürich.

Meine von Herrn Lehrer Wiegand zu Ansbach (L. Ussingen) bezogene Harzer Kanarienvögel haben nicht allein einen schönen rollenden, sondern auch einen vollen wohltönenden (nicht so schreiend) Gesang, und kann ich deshalb diese Art Vögel, die sich vortrefflich zur Zucht eignen, nur empfehlen. Herr Wiegand hat noch welche. **H. Carl Weiglein,** Zellingen. [172

Empfehlen Lapins belier Widderkanin,
graue und weiße 5—10 Wochen alt à Paar 3—4 Thlr.
Lapins garenne gekreuzt mit beliers,
grau und weiß, 5—11 W. alt à Paar 2—3 „
Cochons de Ind. angora und de mitis,
Angora-Meerschweinchen à Paar 1—2 „

Unsere Zuchtthiere haben wir aus dem Jardin d' Acclimatation von Paris direkt bezogen. Familienzucht ist streng dabei vermieden; für echte Race garantiren.

H. Wienhold & Sohn,
173] Kellermeister in Münster (Westfalen).

C. Hagenbeck's Handelsmenagerie

HAMBURG

hält **exotische Vögel**, von den größten bis zu den kleinsten, stets in mehreren Tausenden von Exemplaren zu den civilsten Preisen vorräthig.

Näheres besagen die jeder Zeit von Reflektanten gratis zu beziehenden Kataloge.

Jetziger Vorrath.

Hell- und dunkelrothe Araras, Nasen-, Rosa- Inka- und kleine gelbhaubige Kakadus, Amazonen-, Surinam-, Neuholländer- und Brillen-Papageien; Königsloris, blaue Gebirgsloris, Rosellas, 3 verschiedene Arten Pennantis, Barrabands- und Bauers-Sittiche, rothstirnige Neuseelands Sittiche, Nymphen- und auch Singsittiche oder Blutrümpfe; auch sind noch einige Conurus jendaya; Wellensittiche, Inseparables, grauköpfige Inseparables (Psittacula cana), rothe und ungehaubte graue Kardinäle, Safranfinken, Graupfäffchen, Zebrafinken, Kastanienbrüstige Schilffinken, Muskatfinken, Tigerfinken, St. Helena-Fasänchen, sehr schöne Bandfinken, Trauerwitwen; große Goldweber (Ploceus textor), Fuchsweber, Orangevögel, Napoleonsvögel, Madagaskar-Weber, Blutschnabel- und Rothkopfweber, sowie noch einige indische Gelbkopfweber (Ploceus bengalensis), kleine Maskenweber, Rothflügel-, Seiden- und Kuhstaare, Rothbruststaare von Chili, und Jamaika-Trupiale.

Sonntag, den 18. Februar a. c.

traf eine große Sendung Thiere und Vögel aus Indien ein,

von denen noch vorhanden sind:

die so beliebten jungen Alexander-Periquiten, welche von allen Perequiten-Arten bekanntlich am besten sprechen und pfeifen lernen und dabei so sehr zahm werden, zu dem **fabelhaft billigen Preise von Thlr. 3 das Stück;**

Sonnenvögel oder Peking-Nachtigalen, sowol des Prachtgefieders als auch des schönen Gesanges wegen so sehr beliebt; sie brüten bekanntlich auch in den Vogelstuben. Diese schönen Vögel bin ich im Stande zu dem billigen Preise **von Thlr. 9 das Stück oder Thlr. 16 das Paar** abzugeben.

Büll-Büll in zwei verschiedenen Arten, Indische Staare in 6 verschiedenen, darunter einige hier nie zuvor gesehene Arten,

die niedlichen indischen Perlhalsband-Täubchen à **Paar nur Thlr. 4, Nikobartauben** à **Paar Thlr. 75.**

japanesische gelb- und auch graugescheckte Mövchen.

45 Paar von den kleinen indischen Kampfwachteln à **Paar Thlr. 5.**

dreifarbige Nonnen (Amadina malacca).

Außerdem noch von größeren Vögeln:

Rhinoceros-Vögel (Buceros Rhinoceros, Buceros javanensis, Buceros pica, und eine neue Art).

Ferner indische Glanz-Kukuke, indische Wander-Elstern, chinesische Blau-Elstern, Glanz-Jabiru, heilige oder Antigone-Kraniche (Grus antigone), verschiedene Wasservögel, als: Glanz-Gänse, (Sarcidiornis regia), Indische Grau-Gänse (Anser ferox), Indische Wild-Gänse (Anser indicus).

Von diesen damals eingeführten indischen Vögeln*) und den außerdem in 24 Kasten eingeführten verschiedenen Thierarten aus Afrika, Australien und Südamerika sind noch manche vorhanden, so 1 lebender Felsenschwalm (Pupicola crocea), 2 seltene Tukane (Ramphastus carinatus) und dergleichen. [174

Billig zu verkaufen: je ein Paar Bandfinken, Tigerfinken, Silberschnäbel und rothe Kardinäle.
175] Dr. **Erckmann** in Alzey.

Eine Silberfasanhenne wünscht sogleich zu kaufen
Dr. Röper, Villa Hullersbusch
176] bei Feldberg in Mecklenburg.

---

*) Die in Nr. 9 erwähnten, mir unbekannten Vögel hat Herr Dr. Ruß als Brillen-Honigfresser (Zosterops madagascariensis) bestimmt; winzig kleine, wunderniedliche und noch niemals lebend in Europa vorhanden gewesene Vögelchen.

Solingen.

Die II. Ausstellung, verbunden mit Verloosung, findet am 19., 20. und 21. April in den Räumen des Tivoli statt.

Die Ausstellung umfaßt:

Hühner, Enten, Tauben, Sing- & Ziervögel, so wie auch **Kaninchen.**

Anmeldungen erbitten wir uns **bis spätestens 10. April.**

Ausführliche Programme, sowie Loose à 5 Sgr. sind bei unserm Schriftführer Herrn **Carl Schmidt** zu haben.

Auch in diesem Jahre werden die zur Vertheilung kommenden Prämien, außer den uns in Aussicht gestellten silbernen und bronzenen Medaillen, wieder in prachtvollen Gegenständen der Industrie, als feinen **Transchir-**, sowie **Patent-Messern** und **Gabeln** in **Hirschhorn, Ebenholz** und **Elfenbein,** sowie eleganten **Leder-Etuis** mit 3 und 4 Scheeren 2c. bestehen. [177

Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht.

Nach meiner Rückkehr von Südamerika, werde ich meinen Wohnsitz vorläufig wieder in **Grünau** bei Berlin nehmen. Ich bringe einen beträchtlichen Transport

wilder Thiere und Vögel

mit, von denen letzteren ich nur die folgenden erwähnen will: Die beliebten Kubafinken in sehr schönen Exemplaren, etwa 15 bis 20 Pärchen; Spottdrosseln (rothe Spottdrosseln, Turdus rufiventris); Prister-Tangaren und rothe Tangaren; einen Mexikaner Gey, einen prachtvoll gefiederten Vogel; Tities eine ganz neue Vogelart, rothe Kardinäle, wovon einige hundert Pärchen; südamerikanische Rebhühner; Krähen-Glanzstaare, ein Paar Grand spords, sehr schön gelb und schwarz gefiedert; Männchen rosenbrüstige Kernbeißer; prachtvolle Blauheher (Cyanocitta cristata). —

178] **Rudolf Schoebel,**
Vogel- und Thierhändler.

Vorzüglich schöne, gutgetrocknete steirische Ameiseneier empfiehlt **Franz Aumeyer,** [179
Linz a. D., Landsbergerstraße 55.

Es sind 5 Stück brutfähige Wellensittiche (Männchen zu verkaufen. Auch werden andere Vögel in Tausch genommen. **Albert Schmidt,** Saalfeld (Thüringen). [180

Ein Uhu wird zu kaufen gesucht. Offerten schleunigst an die Redaktion unter T. R. 100. [181

Sommerrübsamen 6¼ Thlr., Kanariensamen 6¾ Thlr., Hanf 5¼ Thlr., Mohn blau 10⅔ Thlr., Hirse weiße 7¼ Thlr., Hirse Blut- 4½ Thlr., Mais 5¼ Thlr., Lein 6 Thlr., Hafer gespaltener 6½ Thlr. pro Ctr. in guter Waare empfiehlt
182] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

Rothe Kardinäle, Grundrötel, Blauheher, Hüttensänger, rothbrüstige **Kernbeißer,** amerikanische graue **Eichhörnchen** offerirt **C. Reiche Alfeld,**
183] Provinz Hannover.

Anzeige.

Große Anzahl Zeisige à P. 12½ Sgr., das Männchen 10 Sgr. zu verkaufen. Für Handlungen selbige bedeutend billiger. Stieglitze 12½ Sgr. Im April und Mai alle Arten Insektenfresser. Zu kaufen suche ich einen frisch gefangenen, womöglich männlichen Waldkauz. **W. Langner,** Weichensteller in Liegnitz,
184] Uferstraße № 1.

Ich habe abzugeben: 4 Paar Zebrafinken, je 1 Paar Tigerfinken, Orangebäckchen, Napoleonsweber, große Weber, 2 Paar Blutschnabelweber, je 1 Stück Graunedelfink, Amaranth, Silberschnabel, Hartlaubszeisig, Wellensittich-Männchen.

Zu kaufen resp. einzutauschen suche ich: 3 Paar Wellensittiche, 1 Paar Singsittiche und bitte um gefl. Offerten.
185] **Heinrich Beneke** in Löbau (Sachsen).

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstraße 2, durch die Post oder durch Vermittlung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Pernau.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 26. März 1874. Nr. 13.

Ausland.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Durch den Umzug des Herausgebers der „Gefiederten Welt" ist diese Nr. leider um einige Tage verzögert worden; wir bitten die Leser sehr um Entschuldigung.

Inhalt:

Die Graupapageien in Freiheit und Gefangenschaft. —
Die Zucht des Kubafinken. —
Seltene Jagdbeute. —
Mäusejagd. —
Briefliche Mittheilungen: Paradies-Widah. —
Anfragen und Auskunft: Krämpfe; Milben; Wellensittich-Zucht. —
Eilfter Bericht des Verwaltungsraths der Zoologischen Gesellschaft in Hamburg (Schluß.). —
Ausstellungen: Nürnberg. —
Briefwechsel. — Anzeigen. —

Die grauen Papageien in Freiheit und Gefangenschaft.

Von Dr. Anton Reichnow.

Da es den Lesern dieses Blattes willkommen sein dürfte, über das Freileben der als Stubenvögel hochbeliebten Jakos, über welches wir bisher nur sehr geringe Kunde hatten, sowie über die Erlangung und erste Gefangenzeit derselben Einiges zu erfahren, so theile ich in Nachstehendem bezügliche Beobachtungen mit, welche ich auf meiner Reise nach Guinea in den Jahren 1872 und 73 sammeln konnte.

Die Jakos sind die einzigen Vögel, welche von der Westküste Afrikas als regelmäßige Erscheinungen auf dem europäischen Vogelmarkt kommen. Die wenigen anderen Käfigvögel, welche bis jetzt jene an interessanten Formen so reichen Gegenden uns bieten, wie die grauköpfigen Papageien, einige Weber, Finken und Tauben, gelangen nur unregelmäßig in den Besitz der Händler. Von den prächtigen Sycobius-Webern, den zahlreich vertretenen Bartkukuken (Bucco) und Haarvögeln (Criniger), den schlichtgekleideten, aber höchst ausgezeichneten Gesangeskünstlern und Spottvögeln, den Bulbuls (Pycnonotus obscurus), den auffallenden Pisangfressern und Nashornvögeln sehen wir selten oder niemals etwas.

Der Grund für diese Thatsachen liegt in der Theilnahmlosigkeit und Unzugänglichkeit der Eingeborenen jener Gegenden. Die Neger sind zu träge, um sich mit dem Vogelfange zu befassen, dessen Handel ihnen im Allgemeinen nur geringen Verdienst bringt. Sie selbst, vollständig stumpf gegen die sie umgebende Natur, haben keine Freude an gefiederten Hausgenossen und halten garkeine Vögel in Gefangenschaft. Ich sah solche nur wenige Male bei den intelligenteren Bewohnern der Goldküste, den Gã-Negern und Aschanti. Die Vogelwelt hat für den Haushalt der Neger nur eine Bedeutung, freilich die höchste, das wichtigste Moment im Leben jener armseligen Menschen: den Wanst zu füllen. Jeder Vogel, welcher zufällig in die Hände der Schwarzen fällt — die Jagd wird von den meisten Küstenstämmen nur wenig und höchst ungeschickt betrieben — wird mit „Haut und Haaren", ohne vorher die Federn und Eingeweide zu entfernen, in das Feuer gelegt, und wenn er äußerlich vollständig verkohlt ist, mit dem größten Wohlbehagen als Delikatesse verzehrt. Den grauen Papageien würde es ebenso ergehen, wenn nicht die hohen Preise, welche die Europäer für dieselben zahlen, die Neger zu anderer Verwerthung der Gefangenen veranlaßten.

Der größte Theil der kleinen Vögel, welche wir von Westafrika erhalten, kommt vom Senegal zu uns; nur wenige von der Gold- und Benguelaküste; von letzterer die grauköpfigen Papageien (Ps. senegalus). Die Jakos dagegen werden von allen durch Europäer

besuchten Küstenpunkten, besonders von den sogenannten Oelflüssen ausgeführt. —

Trotz der vielfachen Nachstellungen, denen die grauen Papageien ausgesetzt sind, finden sie sich allerorts ungemein häufig, wo ihnen nur zusagende Wohn- und Brutorte durch die Natur geboten werden, vorzugsweise in den Mündungsländern der Flüsse. Hier nisten sie in den Mangraswaldungen des ungeheuren Delta, vorhandene Höhlungen in den Bäumen, Astlöcher benutzend, welche sie mit Hülfe ihres kräftigen Schnabels bezüglich erweitern und zu wohnlichen Niststellen einrichten. Das unzugängliche Schwammland schützt sie vielfach vor der Verfolgung der Eingeborenen, und unter den Thieren haben sie nur einige Feinde, die ihnen gefährlich werden. —

Während der Brutzeit, welche in die Regenmonate, also je nach der Lage der betreffenden Distrikte, nördlich oder südlich vom Aequator, in unsere Sommer- oder Wintermonate fällt, leben die Paare einzeln. Nach derselben schlagen sie sich mit ihren Jungen und mit Artgenossen in Gesellschaften zusammen, welche vereint umherstreifen, gemeinsam die Nahrung suchen, gemeinsame Nachtruhe halten. Sie wählen jetzt zu bestimmten Schlafplätzen die höchsten Bäume eines Reviers. Kleinere und größere Scharen vereinigen sich hier des Abends aus verschiedenen Richtungen zusammenkommend, so daß die Zahl der gemeinschaftlich übernachtenden Vögel oft einige Hunderte erreicht. Solche Schlafplätze werden bald bemerkbar. Weithin schallt durch die Gegend das Gekrächz der ankommenden und aufbäumenden Vögel und verstummt erst mit Eintritt der Dunkelheit. Des Morgens verkündet ein abermaliges Gekrächz und Kreischen den allgemeinen Aufbruch. In einzelnen Trupps ziehen die Papageien jetzt lärmend dem Binnenlande zu, nach den Futterplätzen, den Maisfeldern der Neger, welche auf den Hochebenen des Innern häufiger als in den Niederungen des Küstenstriches sind. Der Mais bildet halbreif, noch weich, das Lieblingsfutter der Papageien; sie richten in den Feldern arge Verwüstungen an. Gegen Sonnenuntergang kehren sie wieder heim zu ihren Schlafplätzen. —

Bei diesen regelmäßigen Streifzügen halten die Jakos immer dieselben Zugstraßen ein, wenn sie auf denselben nicht beunruhigt werden. Wir benutzten diese Wechsel zum Anstand, um die Vögel für unsere Küche zu erlangen, konnten aber denselben Anstand niemals längere Zeit behaupten, da die klugen Vögel sich sehr bald die betreffenden Punkte merkten und im weiten Bogen umflogen. —

Der Flug der grauen Papageien ist erbärmlich. Mit ganz kurzen, schnellen Flügelschlägen streben sie in gerader Richtung ihrem Ziele zu; es sieht fast aus, als ängstigten sie sich und fürchteten, jeden Augenblick herabzufallen. Als wir zum ersten Male fliegende Papageien in der Ferne sahen, hielten wir sie für Enten; ihnen gleichen sie im Fliegen. Ein Schuß bringt sie vollständig außer Fassung. Sie stürzen dann oft hernieder, sich fast überschlagend. Arges Krächzen verräth ihre Angst, welche sie auch beim Erscheinen eines größeren Raubvogels zeigen.

Unter den gefiederten Räubern scheinen sie besonders in dem Guineseadler (Gypohildax angolensis) einen Feind zu haben. Ich sah mehrfach denselben graue Papageien verfolgen, welche sichtbar in entsetzlicher Angst vor demselben flohen, und es ist unzweifelhaft, daß jener Raubvogel, obwol selbst kein gewandter Flugkünstler, diese ungeschickten Flieger einzuholen und zu überwältigen vermag.

Das Fleisch der grauen Papageien, welches häufig unseren nichts weniger als reichen Mittagstisch in Afrika schmückte, ist gekocht zwar wohlschmeckend, aber auch von jungen Vögeln sehr zähe, immerhin jedoch den Fischreihern vorzuziehen, welche wir aus Mangel an Fleischnahrung als vorzügliche Delikatesse betrachteten. Die rothen Steuer- und Schwanzdeckfedern werden von den Eingeborenen allgemein als sympatische Heilmittel benutzt. — Natürlich waren während des Aufenthaltes in Afrika meine Beobachtungen insbesondere darauf gerichtet, die oft behandelte Frage zu beantworten, ob die jungen Graupapageien rothe oder graue Schwanzfedern haben. Obwol ich selbst niemals Gelegenheit hatte, Nestvögel zu untersuchen, glaube ich nach meinen Beobachtungen und Erkundigungen, einer früher ausgesprochenen Vermuthung entgegen, jetzt behaupten zu dürfen, daß die Schwanzfedern der jungen Vögel anfangs dunkelgrau gefärbt sind. Letzteres wurde mir von den Negern, welche die Vögel jung aus dem Neste nehmen, um sie den Europäern zu verkaufen, bestätigt. Ich selbst sah mehrmals jüngere Individuen, bei welchen die Grundtheile der Schwanzfedern dunkelgrau, die Spitzen roth, aber unreiner als bei den Alten, bräunlichroth gefärbt waren, ein Beweis, daß die Verfärbung zum Roth, wie in der Regel bei solchen Farbenveränderungen an den Spitzentheilen beginnend, allmälig vor sich geht. Eine gleiche Verfärbung beobachtete ich auch an den unteren Schwanzdecken von Gefangenen. Der junge Vogel unterscheidet sich vom Alten außerdem durch fahleres, bräunliches Grau des Gefieders — vornehmlich tritt das Braun an der Ohrgegend hervor — und durch die graue, bei Alten hellgelbe Iris.

Nicht selten kommen Varietäten vor, welche einige rothe Armschwingen haben. Dieselben werden Königspapageien genannt und sind sehr gesucht. Nach Europa kommen sie selten, da die an der Küste stationirten europäischen Kaufleute solche Papageien in der Regel erwerben.

Kein einziger der Graupapageien, welche wir erhalten, wird als alter Vogel gefangen; alle werden jung, noch nicht flügge, von den Negern aus dem Neste gehoben. Im Binnenlande sammeln die Häuptlinge oder Vornehmen in den Ortschaften die jungen Vögel auf, welche sie nach und nach erlangen, um dieselben später in größerer Anzahl zugleich nach der Küste zum Verkauf zu transportiren. Inzwischen lassen sie die Thiere mit beschnittenen Flügeln laufen. Man sieht daher in den Dörfern die Papageien allenthalben auf den Strohdächern der Hütten oder auf Bäumen, welche zu diesem Zwecke vor den Häusern errichtet sind, wie bei uns die Haustauben sitzen: ein

Anblick, der den Vogelliebhaber im höchsten Grade entzücken muß.

Gleich nach der Brutzeit kann man die jungen Papageien auch an der Küste — im Binnenlande sind sie im Allgemeinen wohlfeiler — wenn man mit Waaren bezahlt, für einen Thaler unseres Geldes erwerben. Später steigen die Preise, und auf den englischen Postdampfern werden oft schon 5 bis 6 Thaler für einen Papagei gezahlt. Alte und durch längere Gefangenschaft schon gezähmte stehen höher im Preise als Junge, weshalb die Neger an vielen Orten, besonders die spekulativeren, halbkultivirten, in den Missionshäusern erzogenen, die Jakos längere Zeit halten, zähmen und ihnen auch einige Worte ihrer Sprache oder verdorbenes Englisch lehren.

Jedes Schiff, welches die Küste Westafrikas verläßt, führt eine mehr oder minder große Zahl Jakos mit sich, von welchen nur geringe Procente während der verhältnißmäßig kurzen Fahrt zu Grunde gehen, trotz der höchst mangelhaften Pflege, welche den Thieren zu Theil wird. Die auf Segelschiffen übergebrachten gelangen zum größten Theil direct in die Hände der Liebhaber, während die Händler ihren Vorrath von den Postdampfern beziehen; daher die meisten Graupapageien über England in den Handel kommen.

Wenn nur wenige Jakos während der Seereise zu Grunde gehen, so ist die Sterblichkeit der nach Europa gelangten während der ersten Zeit ihres Lebens hier um so bedeutender. Mehrmals sind in dieser Zeitschrift die Todesursachen unserer Vögel behandelt worden, und ich muß nach meinen Erfahrungen vollständig der von Herrn Lintz ausgesprochenen Ansicht beitreten, daß der Todeskeim durch die schlechte Behandlung während der Reise in die Vögel gelegt wird, denn die Jakos sind harte Vögel, welche sich leicht an unser Klima gewöhnen. Sehr richtig sucht Herr Lintz den Grund vorzugsweise in dem mangelhaft gebotenen Trinkwasser. Zwar ist keine Ursache vorhanden bei der kurzen Reise auf den Schiffen mit Wasser zu sparen und deshalb den mitgeführten Vögeln dasselbe zu entziehen; am wenigsten kommt solche Erwägung auf den Dampfern in Betracht; sondern wie ich mich selbst überzeugte, ist allgemein unter den Seeleuten wie unter den Kaufleuten an der Küste die Meinung verbreitet, die Papageien hätten Trinkwasser nicht nöthig. Da nun die Fütterung während der Reise hauptsächlich in trockenem Hartbrot besteht, welches die Vögel auch sehr gern nehmen und merkwürdigerweise dem ihnen zuweilen gebotenen gekochten Reis vorziehen, so dürfte der Mangel an Trinkwasser sicherlich üble Wirkungen auf die Verdauung ausüben. In den meisten Fällen sterben ja die Jakos an gastrischen Erkrankungen bald nach ihrer Ankunft, auch wenn man ihnen die sorgfältigste Pflege in dieser Hinsicht angedeihen läßt.

Das Schiff, auf welchem ich zurückkehrte, brachte einige dreißig Papageien über. Diese wurden mit weißem Hartbrot und gekochtem Reis ungefähr zu gleichen Theilen gefüttert und erhielten auf meine Veranlassung zweimal täglich Trinkwasser. Wir verloren nur einen; alle übrigen kamen, wenn ich nach drei noch in meinem Besitz oder dem von Bekannten befindlichen urtheilen kann, in bester Gesundheit herüber.

Es ist bei der Fütterung frisch angekommener Jakos besonders vor dem Hanf zu warnen. Die Vögel fressen in der Freiheit vorzugsweise mehlige Früchte, Mais, wie erwähnt, und erhalten ebenfalls während der Reise fast ausschließlich Brot. Man sollte den Thieren demnach nicht sogleich viel ölige Sämereien, wie Hanf reichen. Ich gebe den meinigen nur wenig von solchem, aber soviel alte, in Wasser aufgeweichte Semmel, als sie mögen, zuweilen gekochten Reis und in Wasser aufgequellten Mais — frischer, halbreifer Mais ist sicherlich ein vorzügliches Futter zu der Zeit, wo man ihn haben kann — dazu Früchte, während der Winterzeit besonders Feigen. Zu trinken bekommen sie zwei bis drei Mal täglich. Trinkwasser ihnen beständig zu lassen ist nach meinen Beobachtungen nicht zulässig. Da sie dann scheinbar ohne Durst, nur zum Zeitvertreib, sehr häufig trinken und Durchfall bekommen. Bei frisch angekommenen hat man die Verdauung sorgfältig zu überwachen und möglichst viel Früchte zu reichen. Auch kann der erste Winter den Vögeln leicht verderblich werden, weshalb man sie während dieses sorgfältig vor Erkältung zu schützen hat. Uebrigens genügt schon eine Zimmer-Temperatur von 12° R., auch in der ersten Zeit.

Die Zucht des Kubafinken.

(Fringilla — Euethia — canora).

Mittheilung des Herrn Kaufmann Emil Gaebel in Graudenz.

Wer Kubafinken in der Vogelstube züchten will, dem diene von vornherein und in erster Linie zur Richtschnur, daß er nie mehr, als ein Pärchen, frei fliegen lasse. Die Unverträglichkeit und Zanksucht zwischen Hartlaubszeisig und Grauedelfink, die mitunter soweit geht, daß einer auf dem Platze bleibt, ist nicht zu vergleichen mit der Unruhe, Heftigkeit und Kampflust eines zur Zeit der Liebe stark erregten Kubafinkenpärchens. Das Männchen jagt und zaust selbst bedeutend größere Vögel, wie Scharlachweber, Pfaffenvögel und alle anderen mit Wuth aus der Nähe seines Nestes fort. Letzteres ist ein wahrer Kunstbau, wird nach meinen Beobachtungen keineswegs immer in gleicher Weise erbaut, sondern sehr verschieden angelegt, obwol die retortenähnliche Form, eine mehr oder minder wagerechte Flugröhre, die mitunter bis 15 Zoll lang ist und darunter mit einem straußeneigroßen, gefilzten Beutel, die häufigste ist. Eine zweite Form des Nestes ist ein großer gefilzter Beutel ohne Flugröhre, Eingang von oben. Bei diesem Nest sind die Wandungen stets dicker und stärker, als bei der vorherbeschriebenen. Als Nistmaterial werden vorzugsweise lange Baststreifen aus Bastmatten, Kokus- und sogenannte weiße Fiber-Fasern, wie sie die Bürstenfabrikanten an Stelle der Borsten verarbeiten, verwandt. Das Innere ist zwar geglättet, jedoch keineswegs so weich, als man nach der Zartheit dieser reizenden kleinen Thierchen wol annehmen möchte. Nach beendigtem Nestbau brüten

Männchen und Weibchen abwechselnd und schon nach 11 Tagen schlüpfen die Jungen aus, die nach Verlauf von fernern 8 Tagen sich beim Aetzen durch sehr lautes Zirpen, das sehr charakteristisch ist, bemerkbar machen. Kaum noch vollständig befiedert, halb nackt und ohne Schwänzchen fliegen die Kleinen aus und sind so behend, flink und quecksilbern, als die Alten. Letztere führen dieselben noch so lange, bis sie fressen können und schützen sie mit unendlicher Liebe und wahrhaftem Todesmuth gegen die Angriffe anderer Vögel. Doch bald verwandelt sich diese innige Hingebung in das gerade Gegentheil: sobald die Jungen des Fressens kundig und selbstständig geworden sind, dürfen auch sie sich nicht dem Neste der Alten, die bereits mit der zweiten Brut begonnen, nahen und werden, sobald dies geschieht, vom Vater in mörderischer Art überfallen und selbst wirklich getödtet. Ich verlor auf diese Weise 11 solcher kleinen Thierchen und bin erst durch den Schaden klug geworden. Hätte ich die Jungen herausgefangen, würde ich sie wahrscheinlich noch jetzt am Leben haben. Im Uebrigen aber empfehle ich einem jeden Vogelliebhaber diese ganz allerliebsten, reizenden und außerordentlich beweglichen Vögelchen auf das Wärmste, denn es wird Jeder seine Freude daran haben.

Seltene Jagdbeute.

In der „Magdeburger Zeitung" vom 26. November v. J. wurde unter der Rubrik: „Aus der Provinz" von Weißenfels geschrieben, daß in dem Osterholze, zu Prittitz gehörig, am 21. November Nachmittags von dem Gutsbesitzer Voigt ein schöner Steinadler geschossen wurde. Derselbe, eine große Seltenheit der dortigen Gegend, maß mit ausgespannten Schwingen 8 Fuß.

Ein gleiches seltenes Ereigniß habe ich aus hiesiger Gegend zu melden. In der Königl. Forst, zwei Meilen von Neuhaldensleben entfernt, wurde am 11. November 1873 von einem Königl. Förster ebenfalls ein prachtvoller Steinadler geschossen. Das schöne Thier klafterte 7 Fuß 4 Zoll. Der glückliche Schütze wünschte das Prachtexemplar auch ferner zu besitzen und ließ es deshalb hier in Neuhaldensleben ausstopfen, bei welcher Gelegenheit auch ich dasselbe sah. Eine Stelle am Hinterkopfe des Thieres mit abgebrochenen Federn ließ mich nach der Ursache forschen, und ich erfuhr, das krankgeschossene Thier habe sich noch so wüthend zur Wehr gesetzt, daß erst ein Schlag mit dem Gewehrkolben allen ferneren Widerstand brach. Wie selten auch bei uns die Steinadler sind, mag aus der Thatsache hervorgehen, daß seit 9 Jahren in der ganzen hiesigen forstreichen Gegend keiner der edlen Königsvögel auch nur bemerkt wurde. St., Lehrer in N.

Mäusejagd.

In meiner Voliere habe ich kürzlich eine eigenthümliche Mäusejagd veranstaltet. In der einen Ecke ist nämlich ein Bund Stroh aufgehängt, welches mehrfach so unterbunden ist, daß eine Menge Höhlungen entstanden. Diese sind in vorigem Jahre besonders von Zebrafinken und Amaranten als Nistgelegenheiten benutzt, und dienen jetzt im Winter den Singsittichen Nachts als Schlafkammer. Leider aber gewähren sie auch den Mäusen, wenn diese einmal Eingang in die Voliere gefunden haben, ein prächtiges Asyl; sie sind jedoch glücklicherweise auch sehr leicht daraus zu entfernen. Als diesen Winter im Nisten der Wellensittiche eine Pause eingetreten, und deshalb eine Störung nicht von Bedeutung war, schüttelte ich aus dem Stroh die Mäuse zu Dutzenden heraus. Eiligst liefen sie unten an der Wand entlang um in die engen Spalten zu flüchten, welche sie zwischen den Pflastersteinen gegraben hatten. Diese hatte ich jedoch vorher sorgfältig verschlossen, und in der Nähe derselben andere Höhlungen den Mäusen geboten; — ich hatte einfach Stiefeln an die Erde gelegt und die Schäfte derselben dicht an die Wand gedrückt. Da hinein huschten nun die geängstigten Thiere, und überspringen sie ja in der Hast den einen, so suchten sie in dem andern Schutz. Dieser Schutz dauerte für sie freilich nicht lange, denn ruhig schloß ich oben den Schaft mit der Hand und schüttelte dann den Inhalt des Stiefels in einen halb mit Wasser gefüllten Eimer. Noch drei darauf folgende Tage hielt ich eine ähnliche Jagd mit Erfolg ab, — denn einige Mäuse waren doch immer entkommen, — dann aber war keine mehr im Stroh zu finden.

O. Wigand, Photograf in Zeitz.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Mein Paradieswitwenmännchen ist immer noch in voller Pracht. Dies schöne Thier gewährt mir viel Vergnügen. Es ist sehr zahm und flötet und schmettert sehr fleißig. Ich lasse es des langen Schweifes wegen frei in meiner Arbeitsstube herumfliegen. Das Thier hat, außer anderen, die schöne Tugend, die Stube niemals zu verunreinigen. Sein Sitzplatz ist stets ein und derselbe; nämlich ein Zweig, welcher an einem sein Weibchen und andere Vögel enthaltenden Käfig angebracht ist. Es genügt die Untersetzung eines Spucknapfes, um die Stube vor Verunreinigung zu schützen. Die Flugtour im Zimmer ist immer ein und dieselbe; regelmäßig kehrt er auf seinem sich erkorenen Sitzplatz zurück. Das Futter findet er in der Fensterbrüstung, ebenso das Wasser zum Trinken. Sand holt er sich aus den Blumentöpfen. O. Richter in Gräfenhainchen.

Anfragen und Auskunft.

Anfrage: Im Herbst erkrankte eine Lachtaube; sie legte krampfhaft den Kopf auf den Rücken und überschlug sich vielfach. War ein derartiger Anfall vorüber, so erschien das Thier anscheinend gesund, doch wurde ihr nachher das Fressen augenscheinlich schwer. Diese Zufälle wiederholten sich immer häufiger, so daß ich das Thier nicht länger leiden sehen mochte, und es tödten ließ. Vor etwa 8 Tagen trat dieselbe Krankheit an einem Kochinchinahuhn auf, welches sich in demselben Raume befand, weil es brütet. Heute beobachtete ich dieselben Erscheinungen an einem Englischen Kröpfer, der mit den vorigen

gar nicht in unmittelbarer Berührung gekommen. Sollte es gegen diese Krankheit kein Mittel geben? und wie kann man sich vor späterer Verbreitung schützen?

A. Drenckmann in Wernigerode.

Antwort: Krämpfe bei den Vögeln kommen aus verschiedenen Ursachen her, welche ich im „Handbuch für Vogelliebhaber" übersichtlich zusammengestellt und besprochen habe. Hier, in Ihrem Falle muß aber eine bestimmt und gleichermaßen auf all' dies Geflügel einwirkende Ursache vorhanden sein und diese kann, meines Erachtens, sich nur in der Fütterung finden. Untersuchen sie also Ihr Gesäme genau, ob sich darin nicht vielleicht Samen von giftigen Unkräutern befinden. Andernfalls könnten auch vielleicht Blei oder andere Bestandtheile im Trinkwasser, vielleicht aus den Geschirren, Röhren 2c. vorhanden sein.

Frage: In welcher Weise hält man Volieren von Milben frei und befreit man die damit bereits behafteten Vögel?

L. K., P.-L. in B.

Antwort: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" glaube ich den sichersten Weg angegeben zu haben: auf welchen man jeden von Milben befallenen Vogel von dieser Plage befreit: Man fängt den Vogel ein, bepinselt ihm Schultern und alle Theile, wo das Ungeziefer sich befindet, mit verdünntem Glycerin und bläst über dasselbe vermittelst einer Federspule oder der von Herrn Gudera in Leipzig eingeführten Luftdruck-Insektenpulver-Spritze feines und ganz trockenes Insektenpulver. Dann läßt man den Vogel fliegen, und während er sogleich in's Nest eilt, wird auch dort zugleich das Ungeziefer vertilgt. Bei Brutvögeln ist es nothwendig, daß dies Verfahren an dem Weibchen vor dem Legen des ersten Eies ausgeführt und sobald die Jungen fast flügge sind, wiederholt werde. Bei nicht nistenden Vögeln ist meistens nur eine einmalige Ausführung erforderlich.

Anfrage: Da ich mir eine Wellensittichhecke anlegen möchte, und ein zu diesem Zwecke hergerichtetes Zimmer zu sehr verunreinigt würde, so ersuche ich Sie, mir mit gewohnter Gefälligkeit auf nachfolgende Fragen Antwort durch Ihr geschätztes Blatt zu ertheilen:

1. Welche Größe muß das Bauer haben, in welchem die Wellensittiche brüten? (Bitte die Zahlen für Größe, Tiefe und Länge).
2. Welche Vogelhandlung empfehlen Sie mir für den Bezug dieser Vögel?
3. Sind die gebrauchten Nistkästchen vorzuziehen, wie kürzlich in der Anzeige von Herrn Hieronymi in Braunschweig stand?

Ein Vogelzüchter in Potsdam.

Antwort: 1. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I nach; dort ist dies Alles genau angegeben. 2. Mieth, Schmidt, Hagenbeck, Gudera, Hieronymi, Geupel-White und alle Andern, welche sich von Zeit zu Zeit hier im Anzeigentheil melden. 3. Ich halte die gebrauchten Nistkasten, wenn sie auf das sorgfältigste gereinigt sind, ebenso gut als die neuen. — Uebrigens können wir die Fortsetzung der „Stubenvogelzucht als Erwerb" erst im II. Vierteljahr, hoffentlich jedoch in den nächsten Nummern bringen und werden dann, bei dem ersten dieser Artikel, alle Angaben über die Wellensittichzucht zusammenstellen.

Eilfter Bericht

des Verwaltungsraths der Zoologischen Gesellschaft in Hamburg.

(Schluß).

Bei Aufführung der werthvollsten Thiere, die wir verloren haben, wird es nicht ohne Interesse sein, die Zeit dabei zu bemerken, während welcher dieselben im Garten lebend gehalten sind, weil, wenn man die Empfindlichkeit der Thiere und unsere klimatischen Verhältnisse berücksichtigt, und die Sterblichkeitsverhältnisse in anderen zoologischen Gärten in Vergleich zieht, die Lebensdauer der Thiere in unserm Garten keineswegs zu einem ungünstigen Resultate führt, vielmehr für eine gute und sorgfältige Thierpflege spricht. Zu diesen werthvollsten Thieren gehören zwei Chimpanse (einer 11 Monate im Garten), zwei Löwenäffchen (15 Monate), ein Gepard (8½ Jahr), ein Biber (7½ Jahr), ein amerikanischer Tapir (10 Jahr), ein Schabrackentapir (8 Jahr 4 Monate), ein Pfefferfresser (3 Jahr), eine Krontaube (4½ Jahr), eine Rhea (5 Jahr), ein Marabu (9½ Jahr). Die erheblichsten und schwer zu ersetzenden Verluste sind unfraglich die Tapire, welche eine Zierde unseren Thiersammlung bildeten. Der Schabrackentapier war lange Zeit ein Unikum und nur der Zoologische Garten in Amsterdam besaß, kurze Zeit lebend, das zweite Exemplar. Die verstorbenen Thiere sind, soweit dieselben in dem hiesigen naturhistorischen Museum nicht in guten Exemplaren vertreten waren, wie in früheren Jahren diesem zum Geschenk überwiesen. Hier nicht verwendbare, werthvolle Exemplare erhielten im Interesse der Wissenschaft zu mäßigen Preisen die Universitäten Berlin, Göttingen, Heidelberg und Kiel, und haben die Herren Professoren Dr. Pagenstecher in Heidelberg, Dr. Möbius in Kiel und Claus in Göttingen, es sich angelegen sein lassen, über die Sektionsbefunde sowol in öffentlichen Vorträgen, als in wissenschaftlichen Zeitschriften zu berichten.

Es ist hiernach der Erwähnung werth, daß wir vor uns drohenden ferneren Verlusten bewahrt worden sind. Die im Sommer vorigen Jahres in der Nähe Hamburgs aufgetretene Rinderpest wurde bereits als erloschen betrachtet, als sie plötzlich in unmittelbarer Nähe des Zoologischen Gartens bei dem Milcher Remstedt unter dessen Kühen wieder sich einstellte. Nachdem gleich beim Ausbruche der Rinderpest alle Vorsichtsmaßregeln für den Garten getroffen waren, wir uns auch mit dem, in Veranlassung des Auftretens dieser Seuche vom Reichskanzler-Amte nach Hamburg gesandten Herrn Professor Dr. Müller aus Berlin dieserhalb in Verbindung gesetzt hatten, wurden wir durch den vorgedachten Fall genöthigt, sämmtliche Wiederkäuer vom 22. Sptbr. bis zum 4. Oktbr. in ihren Behausungen eingesperrt zu halten. Die rasch getroffenen Vorsichtsmaßregeln, das strengste Fernhalten aller denkbar schädlichen Einflüsse von Außen und die sorgfältigste Beaufsichtigung im Garten, haben jedenfalls wesentlich dazu beigetragen, daß kein Fall einer Erkrankung eingetreten ist.

Der Thierbestand des Aquariums hat auch i. J. 1872 nichts zu wünschen übrig gelassen. Von besonderem Interesse und neu waren die aus dem Aquarium des Krystall-Palastes in London eingeschickten Eledone und die aus dem Aquarium in Havre durch Kapitain Paulsen uns mitgebrachten Octopus-*) Exemplare, sowie die Seefedern, welche wir der Güte des Herrn Direktor Schmidt aus Kopenhagen verdanken.

Ebenso ist auf die Erhaltung und Ergänzung des Thierbestandes im Terrarium auch im verflossenen Jahr alle Sorgfalt verwendet. Als Geschenke sind hier zu erwähnen, 2 Riesenschlangen und eine Peitschenschlange von Herrn Gebhard in Kap Haytien, letztere neu für den Garten, eine Kupferschlange von Herrn Becker in Karakas, ebenfalls neu.

Als Anerkennung ihrer Verdienste um unsern Garten haben im vorigen Jahre die silberne Medaille der Gesellschaft erhalten: die Herren Kapitain Paulsen, wegen seines, seit dem Bestehen des Aquariums demselben unausgesetzt bewiesenen Interesses, sowol durch unentgeltliche Lieferung von Seewasser, als auch von Seethieren; Apotheker Steudemann in Surabaja wegen seiner ebenso uneigennützigen wie verdienstlichen Bemühungen um Bereicherung unseres Thierbestandes; Professor Dr. Müller aus Berlin, wegen seiner, während der Rinderpest dem Garten gewidmeten Fürsorge, und John Booth in Anerkennung eines dem Garten gemachten reichen Geschenkes von 490 Coniferen in 38 Sorten.

Möge das zweite Jahrzehnt unserm Garten die Theilnahme erhalten, die das erste Jahrzehnt demselben gebracht hat, wodurch allein es möglich geworden ist, innerhalb einer verhältnißmäßig kurzen Zeit den Garten zu dem Range zu erheben, den er unter den Zoologischen Gärten heute einnimmt. Dann werden wir am Schlusse des zweiten Jahrzehnts zurückblicken auf die Vollendung dessen, was uns heute noch fehlt, das sind die drei, oft erwähnten Thierbauten. Dazu wollen die Freunde der Sache uns durch thatkräftige Hülfe in den Stand setzen, das ist die Bitte, die wir verbinden mit dem Danke, den wir dem gesammten Publikum für die dem Garten bisher geschenkte Theilnahme immer aufs Neue aussprechen müssen.

*) Beides bekanntlich Weichthiere, zu den Vielfüßen gehörend. D. R.

Ausstellungen.

Die Nürnberger Geflügelausstellung.

Die zur Zeit in Nürnberg stattfindende allgemeine Vogel- und Geflügelausstellung des Nürnberger ornithologischen Vereins hat am 21. Februar begonnen und endigt am 2 März. Dieselbe umfaßt einheimische und ausländische Vögel, Tauben, Hühner und Enten. An weiteren Gegenständen sind Käfige, Volieren, Nistvorrichtungen, Nester und Aquarien ausgestellt.

Das Ausstellungslokal befindet sich im sogenannten Kontumazgarten und besteht aus zwei Abtheilungen, von denen die erstere Tauben, Hühner und Enten, die zweite Abtheilung die Vögel und sonst ausgestellten Sachen enthält.

Was das Lokal betrifft, so kann dasselbe nicht als vollständig entsprechend bezeichnet werden. Der Raum ist im Verhältniß zur Anzahl der ausgestellten Vögel zu klein, so daß sich die Besucher gegenseitig stören. Die den Hühnern längs der Wände und inmitten der ersten Abtheilung angewiesenen Parterreplätze sind zu sehr parterre, so daß man sich bücken muß, um diese Thiere genau besichtigen zu können. Ueber den Hühnern befinden sich die Tauben. Diese erfreuen sich eines günstigeren Platzes, der gestattet, sie von allen Seiten mit Muße zu betrachten. Das Arrangement der zweiten Abtheilung, eines an und für sich hellen und freundlichen Raumes muß dagegen ein ganz vortreffliches genannt werden. Mitten in dieser Räumlichkeit befindet sich ein Gerüst, welches mit Blumen und grünen Sträuchern geschmückt ist, zwischen welchen sich die Käfige mit den größeren, wirklich prachtvollen Exemplaren von Papageien großartig schön ausnehmen.

In malerischer Abwechslung an den Wänden vertheilt, befinden sich die gefiederten Bewohner aus allen Weltgegenden vereint, größtentheils in sehr schönen und praktisch eingerichteten Volieren und Käfigen.

Ein ungeheurer Schwall von Tönen klingt an das Ohr des Besuchers, der diese Räumlichkeit betritt. Man glaubt ein Monstrekonzert zu hören, in welchem, die Minderstimmbegabten sich als eifrige Choristen hören zu lassen, während die besseren Sänger den Chor in wohlzusammenstimmenden Melodien übertönen.

Von den einheimischen Vögeln waren hauptsächlich die Singvögel vertreten; auch ein Kukuk war erschienen, gleichsam träumend, in sich verloren dasitzend, schien er wie von einem verlorenen Pradiese zu träumen.

Von den fremdländischen Vögeln alle die zu nennen, welche sich durch Seltenheit und Werth auszeichnen, würde zu weit führen; es sei hier nur erwähnt, daß sehr schöne Arten Papageien als der graue Papagei (Jako), Buntsittiche oder Rosellas, verschiedene Edel-, Alexander- und Pflaumenkopf-Sittiche, ferner Nymphen, Grassittiche, Blutrumpfsittiche, Wellensittiche, Prachtfinken, Webervögel, Tanagras und andere vorhanden waren.

Außer den namentlich bezeichneten Papageien fielen besonders durch Farbenpracht verschiedene Exemplare von rothen, grauen und grünen Kardinälen, Hüttensängern, Papstfinken, Gürtelgrasfinken und Diamantfinken auf; auch ächte importirte Kanarienvögel hatten sich eingestellt. Außer verschiedenen ausländischen Singvögeln waren hauptsächlich die Harzer Kanarienvögel in einer bedeutenden Anzahl vortrefflicher Sänger vorhanden.

Von den ausgestellten Tauben verdienen besonders unter andern die Kropftauben, Hühnertauben, Pfauentauben, Mövchen, Bagadetten, zumeist in schönen, rein gezeichneten Exemplaren hervorgehoben zu werden. Die kleineren fremdländischen Tauben dagegen fehlten gänzlich.

An Hühnern waren, außer zwei Stämmen Truthühner, wovon einer (Isabellen) sehr schön vorhanden, Prinz Albert-Hühner (Sperber), Kampfbantam, Goldbantam, La flèche, Crève, Paduaner, Hamburger, Goldlack, Venetianer, Malayen; außerdem noch mannichfache Arten indischer, russischer, spanischer und italienischer Hühner, endlich auch ein Stamm Perlhühner und ein Stamm Rebhühner. Garnicht vertreten waren die Zwerghühner. Von Enten waren nur 1 Stamm Stockenten und 2 Stämme schwedische Enten, diese aber in sehr schönen Exemplaren ausgestellt. Weitere Geflügelarten wie Fasanen, Gänse, Schwäne u. dgl. fehlten gänzlich, was als eine Lücke der Ausstellung betrachtet werden dürfte. Was die Ausstellung der Käfige, Nistvorrichtungen und Aquarien betrifft, so kann nur über elegante Ausstattung und praktische Einrichtung auf das Prächtigste gesprochen werden.

Mit großer Sachkenntniß und Gewissenhaftigkeit war bei der Prämiirung von der damit beauftragten Kommission verfahren; überhaupt verdienen die Thätigkeit und die Bemühungen des **„Ornithologischen Vereins von Nürnberg"** alle Anerkennung; wir wünschen demselben deßhalb auch das beste Gedeihen!

Zum Schlusse dürfte noch zu erwähnen sein, daß die Ausstellung trotz der ungünstigen Witterung und der ziemlich großen Entfernung des Ausstellungsgebäudes von der Stadt, sehr besucht war, sowie auch daß den Schluß derselben eine Verloosung ausgestellter Thiere und Gegenstände bildete. L. K.

(Wir bedauern, daß der sehr geehrte Berichterstatter es versäumt hat, wenigstens die Namen derjenigen Aussteller zu erwähnen, welche die Nürnberger Ausstellung mit den hervorragendsten Leistungen verherrlicht haben. Um den Bericht also dahin zu vervollständigen, erklären wir uns zur Aufnahme der Prämiirungsliste gern bereit. D. R.).

Briefwechsel.

Durch den nur zu schwierigen Umzug behindert, konnte der Herausgeber den Schluß des Aufsatz „Ueber das Nisten der Zwergpapageien" nicht mehr für diese Nr. schreiben; derselbe wird in der nächsten Nr. zum Abdruck kommen. Zugleich bitte ich um Nachsicht und Geduld in Betreff zahlreicher unbeantwortet gebliebener Briefe und Anfragen. Dr. R.

Der Herausgeber der „Gefiederten Welt" Dr. Karl Ruß verzieht am 18. März d. J. und bittet darauf zu achten, daß er dann in Steglitz bei Berlin, Albrechtstraße 115 wohnt. Für freundliche Besuche sei bemerkt, daß Steglitz in 10 Minuten von Berlin mit der Potsdamer Bahn aus zu erreichen ist.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Brut-Eier.

Von meinen alten Stämmen Cochins, gelb und rebhuhnfarbig, welche in Dresden und Berlin prämiirt wurden, sowie einen schönen dunklen Brahma gebe ich von jetzt Stück 15 Gr. ab; empfehle auch meinen jetzt großen Vorrath aller Sorten feine Tauben und versichere den geehrten Liebhabern, ganz echte Thiere, da ich durch langjährige Liebhaberei es genau verstehe und mir sehr vortheilhafte Bezugsquellen zur Seite stehen.

Außer meinem großen Vorrath von überseeischen Vögeln empfehle ich in Gärten und Zimmer prachtvolle Vogel-Volieren, von Drath mit eisernen Tischen und von Naturholz ebenfalls mit Naturtischen als etwas sehr Geschmackvolles und kann ich von letzteren Photographien einsenden. Wandkonsole, sowie alle nur möglichen Gegenstände und alle Sorten Nester von Naturholz, ganz besonders meine von Herrn Dr. Ruß empfohlenen für Kanarienvögel. Aquarien mit Tischen und Luftdruckfontainen als ganz besonders schöne Zimmerzierde, Muscheln, Tuffsteine, Goldfische, Vogelfutter, Ameiseneier, Mehlwürmer.

H. Hromada,

186] Zoologische Handlung, Dresden.

C. Hagenbeck's

Handelsmenagerie

HAMBURG

hält exotische Vögel, von den größten bis zu den kleinsten, stets in mehreren Tausenden von Exemplaren zu den civilsten Preisen vorräthig.

Näheres besagen die jeder Zeit von Reflektanten gratis zu beziehenden Kataloge.

Jetziger Vorrath.

Hell- und dunkelrothe Araras, Nasen-, Rosa- Inka- und kleine gelbhaubige Kakadus, Amazonen-, Surinam-, Neuholländer- und Brillen-Papageien; Königsloris, blaue Gebirgsloris, Rosellas, 3 verschiedene Arten Pennantis, Barrabands- und Bauers-Sittiche, rothstirnige Neuseelands Sittiche, Nymphen- und auch Singsittiche oder Blutrümpfe; auch sind noch einige Conurus jendaya; Wellensittiche, Inseparables, grauköpfige Inseparables (Psittacula cana), rothe und ungehaubte graue Kardinäle, Safranfinken, Graupfäffchen, Zebrafinken, Kastanienbrüstige Schilffinken, Muskatfinken, Tigerfinken, St. Helena-Fasänchen, sehr schöne Bandfinken, Trauerwitwen; große Goldweber (Ploceus textor), Fuchsweber, Orangevögel, Napoleonsvögel, Madagaskar-Weber, Blutschnabel- und Rothkopfweber, sowie noch einige indische Gelbkopfweber (Ploceus bengalensis), kleine Maskenweber, Rothflügel-, Seiden- und Ruhstaare, Rothbruststaare von Chili, und Jamaika-Trupiale.

Sonntag, den 18. Februar a. c.

traf eine große Sendung Thiere und Vögel aus Indien ein,

von denen noch vorhanden sind:

die so beliebten jungen Alexander-Periquiten, welche von allen Perequiten-Arten bekanntlich am besten sprechen und pfeifen lernen und dabei so sehr zahm werden, zu dem **fabelhaft billigen Preise von Thlr. 3 das Stück;**

Büll-Büll in zwei verschiedenen Arten, Indische Staare in 6 verschiedenen, darunter einige hier nie zuvor gesehene Arten,

die niedlichen indischen Perlhalsband-Täubchen à **Paar nur Thlr. 4, Nikobartauben** à **Paar Thlr. 75.**

japanesische gelb- und auch graugescheckte Mövchen.

45 Paar von den kleinen indischen Kampfwachteln à **Paar Thlr. 5.**

dreifarbige Nonnen (Amadina malacca).

Außerdem noch von größeren Vögeln:

Rhinoceros-Vögel (Buceros Rhinoceros, Buceros javanensis, Buceros pica, und eine neue Art).

Ferner indische Glanz-Kukuke, indische Wander-Elstern, chinesische Blau-Elstern, Glanz-Jabiru, heilige oder Antigone-Kraniche (Grus antigone), verschiedene Wasservögel, als: Glanz-Gänse, (Sarcidiornis regia), Indische Grau-Gänse (Anser ferox), Indische Wild-Gänse (Anser indicus).

Von diesen damals eingeführten indischen Vögeln*) und den außerdem in 24 Kasten eingeführten verschiedenen Thierarten aus Afrika, Australien und Südamerika sind noch manche vorhanden, so 1 lebender Felsenschwalm (Pupicola crocea), 2 seltene Tukane (Ramphastus carinatus) und dergleichen. [187

---

1 Amsel 2 Thlr., 1 Drossel 2 Thlr., 1 Nachtigal 3 Thlr. schlagend bei
188] **Sebastian Heusert,** Schreinermeister Würzburg.

Ein ganz neues Etagenbauer, 3stöckig, ist zu verkaufen. Näheres in der Expedition. [189

Drei schöne, zahme, böhmische Fasanenhähne und zwei grünfüßige Wasserhühner sind gegen Tausch abzugeben beim

Oberamtmann **Selmar Schneidewind**
190] in **Elingen** bei **Greußen.**

*) Die in Nr. 9 erwähnten, mir unbekannten Vögel hat Herr Dr. Ruß als Brillen-Honigfresser (Zosterops madagascariensis) bestimmt; winzig kleine, wunderniedliche und noch niemals lebend in Europa vorhanden gewesene Vögelchen.

Zu verkaufen: 1 P. Alpendohlen, einige P. Schneefinken; 1 P. Alpenflüevögel. — Zuweilen Steinadler, Stein-, Birk- und Auerhühner sowie sonstige Alpenvögel. — Gefl. frc. Anfragen unter A. Z. # 1 besorgt die Exped. d. Bl. [191

Kanarienvögel,

vorjährige Männchen wie Weibchen aus guten Rollerstämmen, erstere durchschnittlich zu 5½ Thlr., letztere zu 20 Gr., Emb. für 1—2 Vögel 8 Gr. hat noch abzugeben.
192] **A. Maschke** in St. Andreasberg.

Eine Parthie echter, altstämmiger, zitterhälsiger Tauben

rothe, schwarze, gelbe, weiße, Blauspitze, Schwarzspitze, Rothspitze, Schecke, Weißköpfe
preiswerth bei **Th. Thiel,** Bromberg. [193

Ein junger, ganz zahmer Jako, schön befiedert, welcher spricht, pfeift, bellt u. s. w. ist nebst Bauer zu verkaufen. — Näheres durch **Rudolph Sausse,** Elbing. [194

Von allen Sorten inländische Vögel und Tauben sowie selbst importirte ausländische Vögel empfiehlt billig
C. Gersten,
Vogel- und Taubenhandlung
195] Hannover.

Ein sprech. Surinam Papagei, 50 Thlr., ein kleiner weißer **gelbgeh. Kakadu,** etwas sprechend, 20 Thlr., **ein Amazonen Papagei,** jung, zahm 18 Thlr., **ein Paar rothe singende Cardinäle,** 6 Thlr.; ein zahmer schöner **Java-Affe** 18 Thlr., ein ff. **Damen-Windspiel,** klein, 8 Monate alt, 15 Thlr. Verkäufl. Anfragen besorgt die Red. d. Bl. unter Chiffre „Vögel" 100. [196

Zwei Paar Wellensittiche bereits gepaart, ein Hänfling sehr guter Schläger, ein Dompfaffe und eine Feldlerche W., sind zu verkaufen, oder werden auch gegen Harzer-Vögel vertauscht von **Friedr. Kiefer,** Carlstadt a. M. [197

Wegen Mangel an Raum zu verkaufen: 1 Paar Wellensittiche (hat eben flügge Junge) 8 Thlr., 1 nistfähiges dito Weibchen 4 Thlr., 1 Nistpärchen rothe Kardinäle 9 Thlr., 1 Weibchen Hartlaubszeisig 2½ Thlr. **W. Thiemann,**
198] Stolp i. Pommern.

Zu verkaufen:

Mehrere Paare vorjährige, schöne

Wellensittiche

à 4 Thlr. per Stück, einzeln oder paarweise.
(1713). **H. Blom,** Bern (Schweiz). [199

Angeboten mehrere Paare zuchtfähiger Wellensittiche.
Gesucht eventl. in Tausch Zebra- und Bandfinken.
Guben, Markt 38. **Franz.** [200

Eine Silberfasanhenne wünscht sogleich zu kaufen
Dr. Röper, Villa Hullersbusch
201] bei Feldberg in Mecklenburg.

Wir haben jederzeit franz. Lapins je nach Alter und Güte von 1 bis zu 5 Thlr. das Paar abzugeben.
Der
Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht
in Astngen, N.-B. Wiesbaden. [202

Lapins (Haasenkaninchen).

Lapins belier (schwerste Rasse) zu verkaufen; 5—8 Wochen alte a 1—1½ Thlr.; zeugungsfähige, 10—12 Monat alte 2—2½ Thlr. bei **Nietschmann,**
Sondershausen. Höche's Ziegelei. [203

Vogelorgeln,

mit bestem Erfolge bei den verschiedenartigsten Vögeln angewendet,
empfiehlt billig G. Benda, Coburg. [204

Italienische Hühner

importirte 1874er Frühbrut, echte Rasse

bringe ich von Anfang Mai an wieder regelmäßig zur Versendung und lade die verehrl. Liebhaber dieser vorzüglichen Leghühner hiermit auf's Höflichste ein, mir ihre Aufträge so zeitig als möglich einsenden zu wollen. Der Preis per Stück, Hahn oder Henne und in weiß, gelb oder schwarz, ist auch dieses Jahr wieder Frs. 3 — zuzügl. einer Kleinigkeit für Verpackung ꝛc. franko Postbüreau Zürich.

Unter Hinweisung auf einen Artikel in Nr. 20 der „Gefiederten Welt" vom vor. Jahr erlaube ich mir die Bemerkung, daß die von mir expedirten Hühner schon italienischerseits von Kennerhand sortirt, in besondere Körbe verpackt und auf meine Kosten verpflegt werden, was zur Folge hat, daß die Thiere viel munterer bleiben und ohne Gefahr nach 2tägiger Rast die Weiterreise nach den entferntesten Poststellen antreten können, während die zuweilen von anderer Seite zu etwas niedrigerem Preise ausgebotenen Hühner in Folge schlechter Verpackung und höchst mangelhafter Verpflegung größtentheils mit Rachenfäule behaftet zur Versendung kommen.

Als Beweis allseitiger Zufriedenheit mit der Art und Weise meiner Bedienung möge mir hier gestattet sein zu erwähnen, daß von den im Jahre 1873 beförderten ca. 300 Stämmen nicht ein einziger reüsirt worden ist, daß ferner mit ganz wenigen Ausnahmen die Rechnungsbeträge prompt und vollständig eingesandt wurden und daß ein einziger Besteller, Carl Tolle, Zündwaarenfabrikant in Hannover mir noch den Betrag für 4 hübsche auserlesene Stämme schuldet, was ich mir erlaube, hiemit öffentlich bekannt zu machen. [205
(1789). **A. Rumpf,** Außersihl (Zürich).

Verlag von Bernhard Friedrich Voigt in Weimar.

Der

Hühner- oder Geflügelhof,

sowohl zum Nutzen als zur Zierde,

enthaltend eine praktische Anleitung, die Zucht der Hühner, Gänse, Enten, Truthühner, Tauben u. s. w. zu betreiben, sowie diejenige in- und ausländischer Ziervögel, namentlich der Schwäne, Pfauen, Fasanen, Perlhühner ꝛc.

Nebst naturgeschichtlichen und auf Erfahrung beruhenden Notizen über Eigenschaften und Gewohnheiten dieser Vögel, den Bau von Geflügelhäusern und nützlichen Anleitungen aller Art.

Von **Robert Oettel,**
Stifter und Präsident des Hühnerologischen Vereins zu Görlitz.

Fünfte gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage.
Mit 8 Tafeln, enthaltend 43 Abbildungen.
206] **1874. gr. 4. Geh. 1 Thlr. 15 Sgr.**

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstraße 2, durch die Post oder durch Vermittlung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Pernau.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 2. April 1874. Nr. 14.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur Kanarienvogelzucht: Ueber das Zudecken der Harzvögel. —
Mein zahmer Spaz. —
Vogelliebhaberei und Lyrik. —
Zur Fütterung: Kerbthierfang und Verwendung. —
Sonderbarer Tod eines Uhus. —
Vogelkrankheiten: Magenkatarrh der Graupapageien. —
Briefliche Mittheilungen: Paarung von gehaubten Kanarienvögeln. —
Ausstellungen: Erste Vogel- und Geflügelausstellung in Stettin. —
Anderweitige Liebhabereien: Kaninchen-Züchterei. —
Anzeigen. —

Zur Kanarienvogelzucht.

Ueber das „Zudecken", (Verhängen) der Harzvögel.

Von vielen Liebhabern und Züchtern der Harzer Kanarienvögel, welche in der letzten Zeit Vögel von mir bezogen, wurde häufig Auskunft über Fütterung, Art des Käfigs u. dgl. und besonders über das „Zudecken" gewünscht. Vor Kurzem schrieb mir ein großer Freund des feinen Rollvogels unter Anderem: „Mit dem Zudecken habe ich in der letzten Zeit gar traurige Erfahrungen machen müssen und in Folge dessen decke ich nie mehr einen Vogel zu. Bei einem zugedeckten Vogel lüftete ich rasch das Tuch und ein Hin- und Herflattern und plötzlicher Tod war die Folge. Einige Tage darauf hörte ich einen zugedeckten Vogel stark flattern, ich lüftete den Behang und fand das liebe Geschöpf todt am Boden liegen. Ueberhaupt scheint mir der Vortheil, den man durch das Verhängen erzielt, in keinem Verhältniß zu stehen mit der Quälerei, die man an den Thierchen durch Entziehung des Lichtes ausübt, welche doch so recht Kinder des Lichtes sind u. s. w." Schließlich bemerkte er noch: „Sagen Sie mir doch, ob Sie trotzdem auf das Zudecken schwören, als ein Verfahren, welches unerläßlich ist bei der Züchtung der feinen Harzvögel".

Soeben, während ich dies schreibe, erhalte ich einen Brief von einem Züchter mit der Anfrage: „Meine Vögel werde ich noch nicht Zudecken dürfen". — Damit nun mancher Züchter und Liebhaber, welcher gerne Aufschluß über das Zudecken haben möchte, darüber in's Klare komme und ich dann wol auch keine so langen Episteln mehr über diesen Punkt brieflich zu schreiben brauche, (was ich zwar stets mit Freuden gethan habe), so will ich versuchen, das Verfahren des Zudeckens genau zu beleuchten und besonders die Vortheile und Nothwendigkeit desselben hervorheben.

Im Monat September, wenn die Vögel vermausert sind, werden die jungen und alten Männchen aus der Flughecke herausgenommen und 8 Tage hindurch in große Flugkäfige eingesteckt, etwa 6 bis 12 Köpfe beisammen. In 8 Tagen haben sich die Vögel eingewöhnt und die meisten fangen an zu singen. Diese steckt man nun zuerst einzeln in kleine Körbe, bis nach und nach alle allein sind. Man richte es von vornherein gleich so ein, daß kein Vogel den andern sehen kann; denn sehen sie sich, so springen sie unruhig an die Drähte des Korbes und wollen mit dem Singen nicht recht beginnen. Hierzu sind

die Käfige am besten, welche blos an der Vorderfronte Draht haben*).

Ich nehme jetzt an, daß Anfang Oktobers herangerückt sei und die Vögel fangen dann so ziemlich alle an zu singen (sie dichten); nur einzelne Eigensinnige wollen sich noch nicht mit ihrem engen Korbe, der ihnen gewiß wie ein Kerker vorkommt, befreunden und deßhalb schweigen sie noch hartnäckig. Diesen weise man vor der Hand einen etwas größeren, helleren Käfig an und sie werden sich alsbald hören lassen. Jetzt fange man aber ja noch nicht mit dem Zudecken an, denn jetzt üben Junge und Alte ihr Lied ein und dabei müssen sie Licht haben. Man hüte sich, die Vögel so anzuhängen, daß sie durch die Fenster ins Freie schauen können, dies darf durchaus nicht sein; es regt sie auf und sie springen dann wol tüchtig und machen Turnübungen, singen aber entweder wenig, oder zu laut und abgebrochen. Dabei muß die Fütterung eine sehr gute sein. Jeden Tag reiche man jeden Vogel eine Wasserspritze voll Eifutter neben Sommerrübsamen und wöchentlich reiche man ferner zweimal einen halben Theelöffel voll guten Mohnsamen. Bei dieser Fütterung werden die Vögel sicher rasch im Gesange voran schreiten und die Vorschläger und einzelne junge Männchen der ersten Brut werden bis Ende Oktober völlig „durchschlagen". Jetzt beginnt das Zudecken bei diesen Vögeln, aber alle andern bleiben noch offen, so lange sie nicht völlig ihres Liedes Meister sind. Nur einzelne junge Männchen, welche beim Ueben zu heftig und aufgeregt singen, oder eine oder die andere „Zwischentour" zu laut und oft vorbringen, decke man sofort zu, und es ist recht gut, wenn sie dann mehrere Tage ganz stille sind. Dann beginnen sie wieder, aber ruhig und leise und nehmen eine ernstere Richtung ein; sie bekehren sich. Junge und Alte aber, welche beim Ueben einen unangenehmen Ton hören lassen, (einen Fehler) entferne man sofort und schreibe ihnen den Laufpaß auf Nimmerwiedersehen. Es sind Taugenichte, die in der großen Welt und in den Straßen, wo sie oft zu hören sind, immer gemeiner werden. Der feine, gelehrige Vogel bleibt einstweilen im stillen, ruhigen Kämmerlein und macht seinem Herrn große Herzensfreude. Die Vorschläger hängen hier und da unter den Studenten und es ist von besonderem Vortheil, wenn man die „alten Meister" oben hinstellt, da die Tonwellen von oben herab stets mehr nach unten getragen werden, als umgekehrt und so hören und lernen auf diese Weise die Jungen leichter. Ferner hänge man womöglich die Vögel nicht im Zimmer zerstreut umher, sondern an eine Wand enge zusammen und reicht die eine Wand nicht aus, so bringe man die übrigen an die anstoßende Seitenwand. Dann bekommt das ganze Lied gleichsam einen Guß und die wundervollsten Harmonien; Zusammenklänge und Uebergänge sind hörbar. Viele Junge fassen dies auf und so bilden sich die herrlichsten neuen Touren eines Stammes, welcher dadurch an Werth gewinnt.

Jetzt vor Allem, welche Vortheile werden erzielt durch das Verdecken? Die Vögel sind durch dasselbe ruhig und gleichsam gesammelt, sie werden nicht von ihrer Umgebung aufgeregt und zerstreut. Sie hören, und da der Gesichtssinn nicht thätig sein kann, so wirkt dies erstärkend auf das Gehörorgan und die Sangeslust. Der Vogel singt zart und leise, er lockt nicht lange hin und her, ehe er sein Lied beginnt und daher kommt es ja gerade, daß die meisten feinen Stämme nicht „stimmen", ehe sie rollen, flöten, gluckern und kollern wollen. Ein aufgedeckter Vogel wird stets, ehe er singt, „locken" und „stimmen" und dies steht nicht im Handwörterbuch des echten, feinen Kenners. Ferner singt der zugedeckte Vogel nicht zu viel und nicht zu wenig. Unter dem Tuche gewöhnt sich der Vogel gewöhnlich daran, einzelne Touren ganz leise vorzutragen und andere dagegen stärker; einzelne beginnt er in seinem geheimen düsteren Kämmerlein ganz leise und verzagt, doch rasch fühlt er sich und es schwellt die Tour nach und nach bis zum Forte an, und das ist des feinen Kenners Hochgenuß, eine Hohlrolle dieser Art zu vernehmen. Kurz, durch das Zudecken wird das ganze Lied des Vogels ein feineres, ein leiseres und die lieblichsten, herrlichsten Schattierungen ergötzen des Hörers Ohr und Gemüth.

Einen weiteren, sehr wichtigen Vortheil erzielt das Zudecken darin, daß sich der Vogel gewöhnt, nicht so oft in seinem Gesange abzubrechen. Er singt meistens ruhig und ohne Leidenschaft und Aufregung durch, und so wird der Eindruck des Liedes ein vollständiger und guter. Besonders erzielt man aber noch durchs Verdecken, daß die Rollen und Touren recht lange gezogen werden und dies ist unbedingt erforderlich, denn alle kurz abgebrochene Rollen, Gluckern, Kollern, Klingeln und Triller sind im Grunde Fehler. Die Uebergänge der Touren sind beim verdeckten Vogel ruhig, die Touren fließen in einander in logischer, harmonischer Weise, was nie so vollkommen zu erreichen ist, wenn der Vogel offen bleibt. Dies wären so ziemlich wol die Hauptvortheile des Zudeckens.

Unter kleineren Vortheilen will ich nur den erwähnen, daß die bei Tage zugedeckten Vögel Abends bei Licht sehr bald, sowie sie aufgedeckt werden, singen. Bemerken will ich aber noch besonders, daß man doch täglich, so lange die Fütterung andauert, stets alle Vögel aufgedeckt lasse, ebenso decke man sie noch eine halbe Stunde Abends vor der Dämmerung auf, damit sich die lieben Tonkünstler einmal nach Herzenslust ausspringen und bewegen und ihre Augen ans Tageslicht gewöhnt bleiben. Einen kranken, schwächlichen Vogel decke man ja nicht zu. Die Vortheile und die Nothwendigkeit des Zudeckens sind hiernach nicht zu bestreiten, nur muß dasselbe in der angegebenen Weise ausgeführt werden. Ein Weiteres über etwaige Nachtheile will ich mir für ein andermal vorbehalten. Zum Zudecken nehme man blauen oder grünen baumwollenen Stoff, welcher ziemlich dicht ist. Einzelne rasche Vögel verdecke man doppelt. Alle Reizmittel, welche den Vogel zum Singen bringen sollen, unter-

*) Dieselben werden neuerdings von der Holzwaarenfabrik von Frühauf in Schlensingen geliefert. D. R.

lasse man; der Vogel singt denn doch nie so schön, als wenn ihn die Lust von selbst anspornt. Durch vieles öfteres Reizen verdirbt man am Ende die Vögel. Ich habe dies zwar früher auch gethan, aber ich bin davon abgekommen und warte jetzt stets hübsch fein, bis es dem Vogel gefällt, seine schönen Weisen in ruhiger Art vorzutragen. Fr. Wiegand,
Lehrer in Ansbach,
A. Usingen.

Mein zahmer Spaz.

Vor etwa sechs Jahren erhielt ich einen jungen Haussperling (Fringilla domestica) der ungefähr 3 Tage alt gewesen sein mag und zog denselben groß. Vor meinem Arbeitszimmer, das auf einen freien Platz ging, der mit Bäumen besetzt war und das sich im ersten Stock befand, war ein Blumenbrett, auf dem ich mehrere baumartige Pflanzen hielt. Meinen Zögling setzte ich in einen leeren Blumentopf, den ich mit Wolle ausfüllte und hielt denselben in meinem Zimmer so lange bis derselbe so groß war, daß er sein Nest verlassen wollte; dann stellte ich das Nest vor das Fenster auf das Blumenbrett so daß der junge Vogel aus demselben auf die Blumentöpfe springen konnte. Nach und nach wurde derselbe so zahm, daß er jedesmal wenn er gefüttert sein wollte zu mir in das Zimmer auf meinen Schreibtisch kam und sich da sein Futter holte, was er auch fortsetzte als derselbe schon seine Nahrung allein aufsuchte. Als sich das Gefieder vollständig entwickelt hatte, zeigte es sich daß mein Sperling ein Männchen war, der sich durch das reichliche Futter und Pflege besonders schön entwickelt hatte, so daß er leicht von anderen seiner Art unterschieden werden konnte. Eines Tages war mein Sperling fort und ich glaubte sicher, derselbe wäre mit seinen Genossen, deren sich viele auf den Bäumen aufhielten, davon geflogen. Um so größer war mein Erstaunen als nach ein paar Stunden derselbe sich wieder einfand und sein Futter wie gewöhnlich aus meiner Hand forderte.

Von dieser Zeit an ließ ich ihm freien Paß, so daß er sich an mein Zimmer wie eine Taube an ihren Schlag gewöhnte. In meinem Zimmer hing ein offner Käfig mit Futter in welchem er regelmäßig die Nacht verbrachte; morgens wenn das Fenster geöffnet wurde, flog er gleich fort und kehrte erst nach etwa 1 Stunde zurück um sein inzwischen bereites Frühstück einzunehmen; aber niemals bemerkte ich, daß ihm andere Sperlinge bis auf das Blumenbrett folgten obgleich er sich auf den Bäumen und Dächern stets unter seines Gleichen herumzankte.

Oefters traf ich ihn unter einem Trupp anderer Sperlinge auf dem freien Platz, wo er, wenn ich ihm zurief, mit gesträubtem Gefieder zu mir auf die Hand geflogen kam.

Dieses dauerte von April bis zum Oktober, in welcher Zeit das Haus worin ich wohnte, abgerissen wurde und ich ebenfalls den ersten Stock eines Hauses ganz in der Nähe bezog, wo aber an meinem Fenster kein Blumenbrett anzubringen war. Beim Auszug nahm ich meinen Sperling mit, gewöhnte ihn inzwischen durch freies Herumfliegen erst an das Zimmer, dann setzte ich ihn in einen Käfig der geschlossen war vor das Fenster, um sich an die Umgegend zu gewöhnen, was ihm aber nicht gefallen hat, und öffnete endlich nach ungefähr 3 Wochen die Thüre. Er verließ sein Gefängniß und ich wartete von Stunde zu Stunde, aber er kam nicht wieder.

Als es Abend wurde und der Spaz noch nicht zurück war, begab ich mich in meine frühere Wohnung wo inzwischen das Dach, Fenster und Thüren schon entfernt waren, und hier fand ich meinen Flüchtling wieder auf seinem alten Platze schlafend, ich nahm ihn mit, verfuhr wieder wie das erste Mal und nach etwa 3 Wochen gab ich ihm abermals die Freiheit. Er verschwand, kam nicht wieder und da inzwischen das früher bewohnte Haus ganz abgebrochen war und ich denselben da nicht mehr aufsuchen konnte, habe ich ihn auch nicht mehr wiedergefunden; habe aber die feste Ueberzeugung, daß in meiner früheren Wohnung, mich derselbe nicht so leicht verlassen hätte, so groß war die Anhänglichkeit.

F. B. Kilian in Mainz.

Vogelliebhaberei und Lyrik.

Je weiter die Liebhaberei für fremde und inländische Vögel in's Volk dringt und je tiefer die Namen und die Kenntniß der Lebensweise der gefiederten Welt in Fleisch und Blut von Jung und Alt übergehen, um so mehr wird sich natürlich die Volkssprache bereichern und um so größer der Kreis aller jener Beziehungen werden, die der gefühlvolle Mensch seit Urzeiten mit den lieblichen Sängern geknüpft hat. Dies scheint mir für unsere Dichter bedeutungsvoll zu sein; denn sicher wäre es für die zarten lyrischen Ergüsse ein Gewinn, wenn darin neben den wol bereits allzusehr verbrauchten und abgenutzten Lerchen und Nachtigalen nun auch die große Zahl der schönen, bei uns eingebürgerten Ausländer eine Stelle und poetische Verwendung fände. Leider bin ich kein Dichter; ich will aber trotzdem einen Versuch in dieser Richtung wagen, um begabteren Naturen wenigstens eine Andeutung zu geben, wie ich mir eine solche ornithologisch erweiterte Lyrik denke.

Nimm mich wieder an!

Als Du mich liebtest, gab ich Dir
Ein wunderliebes, kleines Thier,
Ein Vögelchen. Es wurde zahm,
Daß es zu Dir geflogen kam. —

Nun sitzt auf Deiner weißen Hand
Der dunkelrothe Amaranth;
Sieht Dich mit hellen Augen an
Und singt, so laut er singen kann!

Dies Finkchen fern aus Afrika,
Das Nest und Busch am Niger sah,
Vergaß schon längst die trop'sche Welt,
Den Palmenwald, das Sorghumfeld.

Ach, ebenso ergeht es mir:
Ein neues Sein fand ich bei Dir!
Das alte längst in Nichts zerrann:
So nimm mich wieder lieb'voll an! —

Ein sonst wol nur selten von der Lyrik herangezogener inländischer Vogel könnte etwa in folgender Weise stimmungsgemäß verwerthet werden:

An meinen Gimpel.

Im letzten Herbst am Felsenquell
Hab' ich Dich eingefangen,
Bin aber selbst nicht minder schnell
In Anna's Netz gegangen.

Du hast von Wolken, Wald und Feld,
Wo frei Du Dich geschwungen:
Ich hab' von meiner Herzenswelt
Mein kleines Lied gesungen!

Ich gab Dir Beeren, süßes Korn,
Ein Haus, um warm zu wohnen:
Schön Annchen mocht' nur mit dem Dorn
Der Rose mich belohnen. —

Heut reiße ich das Netz entzwei,
Getäuscht in Lieb' und Hoffen:
Auch Du, mein Gimpelchen bist frei!
Flieg' fort! Dein Haus ist offen. —

Dr. St. in Straßburg.

Zur Fütterung.

Kerbthierfang und Verwendung.

Wie bei vielen Vogelwirthen vereinigt sich auch bei mir die Vorliebe für Vögel mit einer solchen für Pflanzen. Ich will nicht davon sprechen, wie mir im strengen Winter bei Eis und Schnee eine Anzahl immergrüner, theils blühender Pflanzen im Zimmer dieses behaglicher machen, welch' wohlthuenden Einfluß diese auch auf meine gefiederten Lieblinge in demselben Raume ausüben mögen — ich will praktisch den Augenblick ausnützen und schreite daher mit dem Schmetterlingsnetz zum blühenden Resedabeet unterm Fenster, wo eine Schaar von Weißlingen aller Art, durch den Duft von weither angelockt, ihr Spiel treiben, in Blumen saugen und Eier setzen. Schnell sind einige im Netz, durch Aufschlagen desselben auf den harten Boden betäubt und wandern so zu den Käfigen von Steinröthel, Staar, Plattenmönch ꝛc., die alle gierig ihren Antheil verzehren. Doch nicht allein dies — jene zu Hunderten angesetzten Eier der Schmetterlinge werden in wenigen Tagen zu ganz ansehnlichen Räupchen, die meinen Vögeln zur Zeit das liebste Gericht sind und selbst Mehlwürmern vorgezogen werden. Es erfordert nur einige Uebung, die meist sammetgrünen Raupen, genau von der Farbe der Resedablätter, aufzufinden. Die Mühe ist gering, der Nutzen ein doppelter. Zunächst bewahre ich meine Reseda, Levkojen und andere Blumen vor völliger Vernichtung durch tägliches Ablesen des freßgierigen Ungeziefers, dieses selbst aber giebt einen trefflichen Leckerbissen für meine Vögel. Auch auf allen Kohl-Arten finden sich jetzt reichlich allerhand glatte Raupen, die jeder Vogelwirth, dem ein Gemüse- oder Blumen-Garten zugänglich ist, zum Dank von dessen Eigenthümer und zum Nutzen seiner Vögel einsammeln und theils frisch, den Ueberschuß aber gedorrt verfüttern kann. Ich führe stets eine Rindendose zur Aufnahme von allerhand Kerfen und deren Larven, selbst ganzer Raupennester bei mir, da ich besonders bei der beginnenden Mauser meinen Sängern alles Verwendbare der Art biete. Ein kleiner Versuch dürfte jeden Vogelwirth zu gleicher Thätigkeit ermuntern.

Carl Seifert in Frankenstein.

Sonderbarer Tod eines Uhus.

Ich hielt eine große Ohreule (Uhu), ein Weibchen ihres Geschlechts, zum Jagdvergnügen. Längere Zeit (3 Tage) ohne Nahrung gelassen, warf ich ihr einen Rehkopf sammt Hals vor. Dem Kopfe war das Gehirn entnommen und die scharfen Schädelknochen blosgelegt. Daran nun spaltete sich mein Uhu den Kopf vom Schnabel bis zum Hinterschädel, indem er hungrig wie er war, einen verfehlten Hieb führte, der ihm augenblicklich das Leben kostete. Mir war sehr leid um das zahme Thier, und werde mich hüten, einem zweiten Uhu wieder Fraß mit scharfkantigen Knochen vorzulegen, besonders wenn er hungrig wäre, und gierig denselben annimmt.

Carl Scholz,
Privat. in Poisdorf bei Wien.
N.-Oest.

Vogelkrankheiten.

Magenkatarrh der Graupapageien.

Mein grauer Papagei, den ich nun einige Jahre habe (gekauft aus der Handlung von C. Gudera in Leipzig), erkrankte Anfang November, bekam Durchfall und Erbrechen. Da mir der Vogel sehr viel Freude macht, mir daher lieb und theuer geworden ist, theils wegen seiner Zahmheit, theils wegen seines schönen Pfeifens und verschiedenen Sprechens, so lag mir viel daran, demselben so schnell wie möglich Hilfe zu schaffen. Der herbeigerufene Thierarzt, der schon mehrfach Papageien behandelt hatte, erkannte die Krankheit als Magenkatarrh an, tröstete mich zwar, daß das Uebel zu beseitigen sei, wenn nicht inzwischen noch sich ein anderes, als Darmentzündung, Lungenentzündung (Tuberkulose), Abzehrung oder dgl. hinzutrete. Der Käfig mit dem Vogel wurde in die Nähe des warmen Ofens gebracht und der Thierarzt verordnete Opium in Verbindung mit Gummischleim und zwar Opiumpulver ein halber Gran und Arab. Gummischleim ein halbes Quentchen. Von diesem Gemisch wurde, nachdem es jedesmal vorher umgerührt war, dem Papagei vermittelst eines kleinen Löffels ungefähr 10—15 Tropfen dreimal täglich eingegeben, was allerdings immer Schwierigkeiten machte, da der Vogel jedesmal aus seinem Käfig herausgenommen werden mußte. Eine Person allein war daher nicht im Stande, es dem Vogel einzugeben. Während dieser Zeit fraß der Vogel fünf bis sechs Tage nichts, saß ruhig mit aufgesträubtem Gefieder, die Augen bald öffnend, bald schließend, von Zeit zu Zeit eine Klage (Schmerzenston) von sich gebend,

bewegte sich zwar öfters vom Platze aber nur um zu saufen, da er fortwährend vielen Durst hatte, während er jedoch gestandenes Wasser sowie dann schwachen Kamillenthee, versetzt mit einigen Tropfen Laudanum (Opiumtinktur), immer wieder von sich brach, bis ihm dann auf Anrathen des Thierarztes endlich ein Gemisch von einem Theil lauer Milch mit zwei Theilen Wasser gegeben wurde, welches von dem Vogel nicht allein gern gesoffen wurde, sondern ihm auch besser bekam. Nachdem die Arzenei in dieser Weise mehrere Tage so fortgegeben wurde, trat Besserung des Vogels ein; er wurde nicht allein lebhafter, gab wieder, wenngleich noch Anfangs heisere Töne von sich und nahm auch nach und nach wieder Sämereien, besonders Hanf (sein Lieblingsfutter) zu sich, bis ich ihm nach und nach dann wieder mehr aufgeweichte Semmel gab.

Karl Bartels in Jena.

Briefliche Mittheilungen.

In Nr. 25 der „Gefiederten Welt" v. J. finde in einem Aufsatz des Herrn Dr. von Gloeden, worin er angibt, daß er keine nachtheiligen Folgen bei der Parung von gehaubten Kanarienvögeln unter sich gehabt. So glücklich sind nun nicht Alle, welche dieses versuchen. Ich erinnere mich noch sehr deutlich, wie ich als Knabe vor etwa 15 Jahren zwei goldgelbe schön gehaubte Kanarienvögel Mch. und Wch. in einer Voliere mit anderen Kanarienvögeln hatte. Um goldgelbe Jungen mit Haube zu züchten, nahm ich sie heraus, that sie in einen Käfig in dem sie zwei Mal brüteten, aber alle Jungen waren mehr oder weniger kahlköpfig und in der einen Brut war das Eine gelb und grün gefleckt. Ich gab nun dem Männchen ein anderes Weibchen und umgekehrt aber glattköpfige und erhielt dann hiervon im nächsten Jahre prachtvoll gehaubte Jungen.

Fr. von Ivernois.

Ausstellungen.

Die erste Vogel- und Geflügelausstellung des ornithologischen Vereins zu Stettin

am 7. und 8. März 1874.

P. Wenn man sich im Gedanken in die Zeit zurückversetzen könnte, da noch in jeder deutschen Wohnung der unvermeidliche Krummschnabel hing, im engen Bauer, das ihm kaum Raum gewährte, einmal hin und einmal her zu hüpfen, oder höchstens ein abgerichteter Dompfaff, der mit dumm-gutmüthiger Miene sein eintöniges Liedchen pfiff, das ihm mühselig eingetrichtert worden; wenn man sich an das Rothkehlchen erinnert, dem der Landbewohner, um es vor der Unbill der strengen Winterkälte zu schützen, Aufnahme gewährte; kurz, wenn man sich den Vogelhorizont des Deutschen, des Europäers überhaupt, auf die Arten beschränkt denkt, welche in Wald und Auen mit meist unscheinbarem Gefieder, aber beinahe ausnahmslos mit hübscher Singstimme begabt, das Herz des Naturfreundes zu allen Zeiten erfreuten, dann kann man sich wol vorstellen, daß der Import des ersten ausländischen Vogels, der zu uns kam, des vor mehr denn drei Jahrhunderten bei uns eingeführten Kanarienvogels, beinahe wie ein Ereigniß betrachtet wurde. Heute dagegen wird jeder Nadelstich der ärmsten Nähterin von dem Gesange des „Piepmatz" begleitet; mit dem Raspeln des Hobels, mit dem Schnurren der Drehbank um die Wette trillert, rollt und schlägt in jeder Werkstätte der echte Harzer; das gelbe Gefieder, das unseren Großvätern noch so prächtig vorkam, erscheint uns als etwas Alltägliches, und wir geben von unserem Reichthum an Kanarienvögeln schon alljährlich Hunderttausende an das singvogelarme Nordamerika ab, das sie uns mit einer stattlichen Summe von Dollars bezahlt. Besser im Ansehen steht bei uns noch der geschwätzige Papagei mit seinem komisch gekrümmten Schnabel, der Kakadu mit seiner Federhaube, die er, wie es ihm beliebt, aufrichten oder auch zurücklegen kann. Doch vergegenwärtigen wir uns auch hier, wie das „Papchen" aus den Salons der Fürsten, der Hochadeligen und der milionenschweren Kaufleute herabgestiegen ist in die Zierstuben aller wohlhabenden Stände, ja selbst bis in die Wohnungen der Handwerker und Gewerbetreibenden. Unsere Zeit demokratisirt eben auf allen Gebieten, und was gestern noch sich in aristokratischer Vornehmheit gefühlt hat, ist heute schon Proletarier. Der nivellirenden Tendenz der Neuzeit kommt bei uns in Deutschland gerade noch zu Hülfe, daß die erlassenen Verordnungen, betreffend das Abfangen von Singvögeln und Ausnehmen von Nestern derselben, die Aufmerksamkeit der Vogelfreunde direkt auf die Einführung ausländischer Vogelarten lenkten. Zwei- bis Dreihunderttausend fremdländische Vögel werden heutzutage bereits alljährlich nach Europa eingeführt, und kein geringer Bruchtheil kommt davon auf Deutschland. Fehlt den Boten der tropischen Welt Südamerikas und Afrikas, der Länder des östlichen Asiens auch beinahe in allen Fällen die melodische Stimme, die das Ohr entzückt, so erfreuen sie doch andererseits durch den Farbenglanz ihres Gefieders, durch die Grazie ihrer Bewegung, durch die Munterkeit ihres Benehmens und durch ihre stolze Haltung. Der Triumph aber, den die moderne Naturwissenschaft gerade auf dem Gebiete der Ornithologie feiert, ist, daß wir uns immer mehr von der Zwischenthätigkeit, welche der Londoner oder Hamburger Thierhändler zu einer für ihn meist sehr gewinnbringenden zu gestalten weiß, daß wir uns unabhängig machen von meist zufälliger Wahl, welche der aus fernen Gegenden heimkehrende Seemann unter den Vögeln trifft, die ihm von Eingeborenen zum Ankauf oder zum Tausch für Glasperlen u. dgl. angeboten werden. Wir züchten! Durch die liebe- und mühevolle Erforschung der Eigenheiten in der Lebensweise dieses oder jenes Vogels haben es die Vogelfreunde dahin gebracht, daß sie zu Vogelzüchtern wurden, und heute möchte es wol dem gewiegtesten Vogelkenner oft schwer werden, zu entscheiden, ob dieser Sittich oder jener Prachtfink in den Urwäldern Brasiliens aus dem Ei geschlüpft ist, oder in dem Nistkasten einer stattlich bevölkerten heimischen Vogelstube. Damit die Vogelzucht aber eine recht allgemeine werde und dem Anfänger darin Verluste möglichst erspart bleiben, und zum Austausche der gemachten Erfahrungen wurden an vielen Orten ornithologische Vereine gegründet und ein eifriger Forschungs- und Arbeitstrieb verpflanzt sich von einer solchen Centralstelle unter die Kreise der Vogelfreunde und Vogelliebhaber. Beschränkt sich ein solcher Verein nicht darauf, nur fremdländische Zier- und Schmuckvögel zu hegen, sondern wendet er seine Aufmerksamkeit auch den in nationalökonomischer und landwirthschaftlicher Hinsicht so wichtigen Fragen des Vogelschutzes und der Geflügelzucht zu, so kann man den Mitgliedern ein so herzliches „Glück auf!" wünschen, wie wir es dem hiesigen Verein bereits wiederholt zugerufen haben, ein „Glück auf", in das gewiß Jeder einstimmt, der die heute eröffnete Ausstellung des Vereins, über welche wir berichten wollen, besucht hat.

Unseres Wissens ist diese Ausstellung, die erste derartige, die in Deutschland stattfindet. Die bisher stattgehabten Ausstellungen brachten nämlich ausschließlich nur Geflügel, also Hühner, Tauben, Enten, Gänse u. dgl.*) Die Ausstellung des Stettiner ornithologischen Vereins ist eine wirklich ornithologische Ausstellung, da neben dem zahlreichen Geflügel (ca. 120 Hühner, 230 Tauben, 83 Enten u. A.) über 400 fremdländische Vögel sich unsern Blicken zeigen. Unter diesen Vierhundert

*) Dies ist ein Irrthum des Herrn Berichterstatters, denn nahezu sämmtliche Ausstellungen dieser Art vereinigen gegenwärtig bereits alle Zweige der Geflügel-, also auch die Stubenvogel-Liebhaberei und Zucht. D. R.

befinden sich die seltensten Arten, wie sie sonst nur ausgestopft in Museen, hier und da wol lebend in den zoologischen Gärten zu sehen sind.

Der ganze untere Raum des Schützenhauses ist zu der Ausstellung benutzt; wo wir so häufig Konzertweisen oder Tafellieder, die Stimme des Vorlesers oder Rhapsoden erschallen hörten, da tönt heute ein Klanggewirr, aus dessen undeutlichen Gemisch wir nur schwer die einzelnen Laute des Rollens, Flötens, Schlagens, Girrens, Gluckens, Krähens, Trillerns, Gurrens, Piepens, Zirpens, Pfeifens, Schmetterns, Trällerns, und wie die „singende" Thätigkeit noch weiter onomatopoetisch spezialisirt wird, zu erkennen vermögen. Dichtgedrängt steht Käfig an Käfig, Korb an Korb. Wo anfangen und wo aufhören? Wenden wir uns zuerst den Hühnern zu, wahren Riesen ihres Geschlechts, oder den Lieblingen der Frauen, den Tauben, den Boten der Liebe und Sinnbildern der Unschuld, oder lassen wir uns von der buntschimmernden Farbenpracht der kleinen Vögel dazu verlocken, diesen Fremdlingen zuerst unseren Besuch abzustatten?

Sei's drum! Die Deutsche Natur, die sich nach dem Fremden sehnt, läßt sich ja doch nicht verläugnen.

Gegen 800 befiederte Kehlen girren, gluckſen, krähen, pfeifen, singen, schreien oder rollen dem Besucher mit einer Einmüthigkeit entgegen, welche Jeder erfreulich finden muß, der sie — nicht lange zu hören braucht. Bei diesen Zahlen ist aber zu bemerken, daß die Ausstellung nur in dem Kreise der Vereins-Mitglieder sich bewegt, und daß, wenn sie auch hinsichtlich der ausgestellten Pärchen, Stämme und Köpfe hinter der anderer Städte zurückbleibt, dies doch in Hinsicht des Werthes der ausgestellten Thiere geradezu unmöglich ist, denn Sammlungen, wie sie von den Herren Creutz, Haslinger, Mellin, W. Wolff, Bernhardt, Gatow, Gedtke und Schell hier aufgestellt worden, dürften schwerlich übertroffen werden. Die Vogelsammlung des Herrn Creutz z. B. repräsentirt allein einen Werth von über 1000 Thlr. Es ist ferner ein wirklich rühmliches Zeugniß für mühevollen Fleiß und verständnißvolle Züchtung, wenn wir Hühner-Sammlungen finden, wie die der Herren A. Gatow und Bernhardt, denen sich in einzelnen Arten und Rassen ebenbürtig andere Aussteller anschließen, alle eine Sorgfalt in Pflege und Auswahl bekundend, daß sie einer eingehenden Besichtigung empfohlen werden müssen. Herr A. Creutz hat der Ausstellung in einer Anzahl von 200 Köpfen, vorzugsweise interessanter Vögel einen ebenso seltenen, als kostbaren Schmuck verliehen. Hochinteressant sind die weißen Reisvögel, die Loris von den blauen Bergen, die Portlinkoln-Sittiche, die grauköpfigen Zwergpapageien, ein weißer Zwergkakadu, ein Rosenkakadu, ein Glanzstaar, die Chinesischen Sonnenvögel, die rothen Kardinäle, die Amerikanischen Spottdrosseln, der so seltene Flötenvogel, die Portoriko- und Amazonen-Papageien, verschiedene Arten Perequiten, der Katzenvogel, die Amerikanische Wanderdrossel, die grünen Bengalisten, die Ostindischen Kampfwachteln und die weißen Japanesischen Mövchen; ebenso interessant ist eine große Voliere mit 6 verschiedenen Arten Webervögeln, und die von ihnen gewebten Nester, ferner die selbstgezüchteten Wellensittiche, Nymphen-Papageien, Zebra- und Safranfinken, eine Sammlung Kanarienvögel in den verschiedensten Farben, sowie Blendlinge von Stieglitz und Kanarienvogel. Als den vorzüglichsten Sänger dieser in ihrer Art gewiß einzig dastehenden Vogelsammlung heben wir noch eine prachtvolle Singdrossel hervor, der unter allen ausgestellten Wildlingen gewiß der erste Preis gebührt. — Herr Direktor Haslinger hat Atlasvögel, weiße Reisvögel, Tigerfinken und Diamantvögel und 1 sprechenden Kakadu ausgestellt, Herr Bredow 1 Paar blaue Gebirgsleri, Herr W. Wolff 1 Inka-Kakadu, 1 sprechenden grünen und 1 grauen Papagei, Brandmeister Thomas prachtvolle Kanarienbastarde in schöner Färbung, Lieutenant von Dankbahr 1 Kardinal, 1 Edelsittich, Herr Engeler weiße Japanesische Mövchen und Gürtelgrasfinken, Herr Starke 1 Sammlung selbstgezüchteter Wellensittiche, und Herr Mellin unter vielen Fremdländern eine Sammlung einheimischer Singvögel.

Bei der großen Anzahl der ausgestellten Papageien ist meistens bemerkt, daß sie „sprechen" können; dem Dompfaff oder Gimpel, welcher in mehreren Exemplaren vertreten, ist immer beigefügt, daß er ein oder mehrere Lieder zu pfeifen versteht. Hervorzuheben ist der vollständig zu den „Schwarzen" übergegangene Dompfaff des Herrn Prütz (ein interessanter Fall von Melanismus).

Die schönen Exemplare von Kanarienvögeln, welche dort und da ihren hellen Klang erklingen lassen, und unter ihnen namentlich die prachtvollen Roller aus der Zucht des Herrn Kontroleur Boecker, die durch Herrn Prütz vielfach Eingang in Stettin gefunden, die verschiedenen Bastarde von Stieglitz und Kanarienvogel, unter denen uns die des Herrn Thomas die kräftigsten und schönstgezeichneten zu sein scheinen, würden uns ähnlich der Sammlung einheimischer Singvögel, die Herr Mellin gestellt hat, zu unseren Hausthieren, den Hühnern, Tauben, Enten hinüberführen, wenn nicht das von Herrn Haslinger ausgestellte Wasserhuhn mit seinem komischen Aussehen den leichtesten Uebergang uns darböte.

Heinrich IV. hätte es wahrlich überaus gut mit seinen französischen Bauern gemeint, wenn er unter dem Huhn, das jeder von ihnen Sonntags im Topfe haben sollte, eines von den Arten gemeint, welche die Herren A. Gatow in Grünhof (neben Herrn Struck-Stralsund wol der bedeutendste Geflügelzüchter in unserer Provinz), Bredow, Bernhardt, Dupont, von der Haegen, Matthäi in Demmin u. A. ausgestellt haben. Von solch' einem Brahma, Kochinchina, Dorking, La Flèche oder Spanier nährt sich, wenn nicht eine Bauernfamilie, so doch eine arme Beamtenfamilie, sollte man meinen eine ganze Woche lang, und was die Größe der Eier betrifft — das häufige Legen, worin sich besonders das italienische Landhuhn auszeichnet, welches die Herren Gatow und Bredow in prächtigen Exemplaren zeigten, interessirt mehr den Landwirth — so gäbe, glauben wir, manche Stettiner Hausfrau gerne für die Mandel das Doppelte von den nicht mit Unrecht als hoch verschrieenen jetzigen Marktpreisen.

Zunächst müssen wir jetzt der vortrefflichen Sammlung des Herrn A. Gatow-Grünhof gedenken, worunter namentlich die dunklen Brahmas und Dorkings durch ihre Größe, die Chamois-Paduaner und Silberlack-Hamburger durch die Eleganz und Farbenpracht ihrer Erscheinung sich auszeichnen. Die von demselben ausgestellten beiden Stämme weißer und bunter Italiener Landhühner weisen alle charakteristischen Kennzeichen vorzüglicher Legehühner auf, als welche sie sich seit ihrer in den letzten Jahren erfolgten Einführung in Deutschland einen wohlverdienten Ruf erworben haben.

Mit den Hühnern des Herrn Gatow wetteifert die von Herrn Fabrikant H. Bernhardt-Oberwieck ausgestellte äußerst reichhaltige Hühnersammlung, unter denen die selbstgezüchteten Stämme La flèche, Brahma, Chamois-Paduaner und Italiener mit dem 1. Preis gekrönt wurden.

Der von Herrn Bernhardt ausgestellte Stamm Aylesbury-Enten hat schon bei seiner früheren Vorzeigung in einer Vereins-Sitzung allseitigen Beifall hervorgerufen. Herr Baumeister Bredow in Westend stellte einen vortrefflichen Stamm selbstgezüchteter und deshalb auch prämiirter Spanier aus, auch sind die schwarzen Italiener Landhennen desselben interessant. Herr Fabrikant Dupont hat von den auf der Ausstellung nur sehr wenig vertretenen Zwerghühnern äußerst niedliche Exemplare ausgestellt, auch wurden seine selbstgezüchteten Spanier prämiirt. Als hervorragende Hühner-Stämme sind ferner die großen Cochins des Herrn Direktor von der Haegen-Pommerensdorf und ein Stamm Original-Spanier des Herrn August Matthäi in Demmin zu bezeichnen, von denen letztere noch vor Eröffnung der Ausstellung zum notirten Preise von 25 Thlr. verkauft wurden.

Unbehaglich scheinen sich, fern von ihrem nassen Elemente, die Enten in der Ausstellung zu fühlen. Die Aylesbury des Herrn Bernhardt, die Bisam-Enten des Herrn Freese, und diejenigen des Herrn Getke, die Schwedischen des Herrn Pfalzgraf-Demmin und Creutz-Stettin und die großen weißen Pommerschen des Herrn Dreblow-Greifenhagen werden von Sachverständigen am meisten bewundert.

Die dritte Abtheilung umfaßt die Tauben, vertreten durch etwa 200 Köpfe. Herr Baumeister Bredow-Westend hatte eine Sammlung von Rassetauben ausgestellt, wie sie in solcher Anzahl und Reinheit ihres Gleichen sucht und wie wir sie in der letzten Ausstellung der „Cypria" kaum gesehen haben. Hervorzuheben sind in erster Reihe weiße und getigerte Altstämmer mit Glasaugen und verschwindend kleinen Schnäbeln,

Mohrenköpfe, Indianer und Almondstümmler. Herr Bernhardt hatte eine Sammlung Kropftauben, Aegyptische und Chinesische Mövchen, Herr Grüneburg isabellfarbene und weiße Brünnerkröpfer, Reitlehrer Gädke eine Sammlung von Kropftauben, Herr Gatow Staarenhalstauben, die von allen Feldtauben die nutzbarsten sind, Herr Schell Wiener Gamseln, Herr Prütz Antwerpner Brieftauben aus der Zucht des Herrn Lenzen-Köln, Herr Vetter silberhelle Berliner Blaubunte, Herr Schmidt weiße Indianer mit echten Augen und Herr Lemke blaue Tümmler mit weißen Binden, gelatscht und glattfüßig, gehaubt und glatt, ausgestellt.

— In dem Vorzimmer befindet sich eine reiche Sammlung von Käfigen, Nistkästen, Hühnernestern aus Draht, Versandtkästchen, Sämereien, Präparaten, Brutkästen u. s. w. Die ausgelegten Bücher und Prachtwerke, darunter das in neuer Auflage demnächst erscheinende Werk des Herrn Prütz „Die Arten der Haustaube" (II. bedeutende vermehrte Auflage), mit einem Anhange „Die Krankheiten der Tauben", auch nur oberflächlich durchzufliegen, fehlt es freilich den Besuchern an Zeit. Wenn man Gelegenheit hat, das Leben zu studiren, verschmäht man die Wissenschaft, und mancher Vogelfreund wird halb unwillig zu den Büchern und Bildern zurückkehren, wenn morgen die bunte laute Gesellschaft das Schützenhaus wieder verlassen hat.

Die großartigen Hühner- und Tauben-Ausstellungskäfige des Herrn A. Gatow und des Baumeisters Bredow sind von dem Baubeamten Herrn Gust. Gatow nach Muster der Berliner „Cypria"-Ausstellungskäfige persönlich in allen Theilen angefertigt und sind als das Beste in ihrer Art prämiirt worden.

Die Ausstellung, welche schon im Laufe des Sonnabends zahlreich besucht war, hatte am Sonntage Tausende nach dem Schützenhause geführt. Zeitweilig mußte die Kasse geschlossen werden, damit die Neuankommenden den schon in den Sälen Verweilenden den ohnehin erschwerten Verkehr nicht ganz unmöglich machten. Im Ganzen berechnet man die Zahl der Besucher der Ausstellung auf 6000 Personen.

Daß der Vereinsvorstand von dem ursprünglich gehegten Plane, die Ausstellung nur in dem Kreise der Vereinsmitglieder abzuhalten, zurückgekommen ist, wurde allgemein bei dem Publikum mit Freuden begrüßt, da dadurch nur Interesse in weiteren Kreisen erweckt werden kann. Zahlreiche Käufe wurden gemacht, und manches Tauben und Hühnerpärchen wird fern von seiner Heimath sich den Sorgen für das Gedeihen einer wohlgerathenen Nachkommenschaft zu widmen haben. Zum Schluß müssen wir noch der emsigen Thätigkeit des Ausstellungskomitees, sowie der der Herren Creutz, Böbiker, Reimer und Prütz gedenken, die Tag und Nacht thätig am Platze waren, so daß ein Todesfall sowenig bei den Stubenvögeln wie bei allen übrigen Geflügel nicht zu beklagen ist. Auf die Prämiirungsliste kommen wir demnächst zurück.

(Wenn die Redaktion sich auch dagegen verwahren muß, daß sie sämmtliche Aussprüche und Behauptungen des Herrn Berichterstatters als richtig anerkenne oder zu den ihrigen mache, so nahm sie diesen Bericht doch um so bereitwilliger auf, da wol kaum ein anderer verwandter Verein in ganz Deutschland eine solche erfreuliche Thätigkeit entwickelt und einen so großartigen Aufschwung genommen hat, als der Ornithologische Verein in Stettin, dessen korrespondirendes Mitglied zu sein, der Herausgeber d. Bl. sich zur großen Ehre schätzt).

Anderweitige Liebhabereien.

Die Kaninchen-Züchterei zum Hasenstein in Cannstatt.

Mit Vergnügen können wir darauf hinweisen, daß die bis vor wenigen Jahren in Deutschland so sehr vernachlässigte Kaninchenzucht nun auch bei uns eine größere Ausdehnung gewinnt. Schon im vorigen Jahre war die Nachfrage nach Zuchtthieren bei uns so groß, daß wir unmöglich alle Bestellungen ausführen konnten und dies hat uns dazu bestimmt, unsere Züchterei ganz bedeutend zu vergrößern und unsere Zuchtthiere sind nun so zahlreich, daß wir während der im März beginnenden und Ende Oktobers schließenden Zuchtzeit etwa 18,000 Kaninchen züchten können. Die Zuchtthiere sind in 475 Einzelställen untergebracht, dagegen werden wir die Jungen im Freien in großen Sommerställen aufziehen, was zur Kräftigung und Schönheit derselben ungemein beiträgt.

Wir züchten hauptsächlich die Normandiner Rasse, Kreuzung von Lapin bélier und de Garenne, bekanntlich die empfehlenswertheste Rasse zur Fleischerzeugung. Diese Rasse ist sehr fruchtbar, verträgt unser Klima sehr gut. Wir haben jedoch die Garenner nicht mehr nöthig, da wir bereits die erforderliche Anzahl Normandiner Weibchen besitzen. Zum Belegen benutzen wir nur echte Bélier Rammler und erzielen dadurch eine sehr schöne Nachzucht, alles einfarbig graue oder isabellen Kaninchen.

Da die von Ihnen in Nr. 5 erwähnte Kaninchenzucht-Anstalten doch erst im Entstehen begriffen sind, so glaubten wir, daß es für Ihre Leser auch von Interesse sein würde, von einer solchen Züchterei zu hören, die schon längst im vollsten Betriebe ist.

Mösel und Meyer.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Siebente Geflügel- und Vögel-Ausstellung

in **Frankfurt a./Main**

vom 22. bis 27. April

in der Lederhalle.

Anmeldungen bei Herrn G. Andreas, Rebstock 5. Schluß derselben bis zum 18. April.

Einsendungen unter der Adresse: Ausstellungs-Komité in der Lederhalle, spätestens bis zum 21. April.

Prospekte und Anmeldeformulare werden den bekannten Vereinen in Kürze zugesendet. [207

Der Vorstand.

3 zuchtfähige Weibchen von Wellenpapageien werden zu kaufen gesucht. In Tausch kann gegeben werden ein Paar zahme Rebhühne und gute Harzer Roller. **Gade**, Major zu Einbeck. [207a.

1. 2 weiße und 1. 2 bunte importirte Donkings, jung und schön, sowie 2 Paar importirte zuchtfähige Silberkaninchen zu beziehen durch den Kammer-Assessor Rasch in Hildesheim. [207b.

Ein schöner zahmer Hirsch aus vergangenem Jahre, schon sehr groß und kräftig, billig abzulassen. Offerten in d. Expd. d. Bl. gef. unter G. K. abzugeben. [207c.

Bei meiner Rückkehr von Südamerika, habe ich meinen Wohnsitz vorläufig wieder in **Grünau** bei Berlin genommen.

Ich brachte einen beträchtlichen Transport

wilder Thiere und Vögel

mit, von deren letzteren ich nur die folgenden erwähnen will: Rothe Kardinäle, Sommerroth-Tangaren, Scharlach-Tangaren, Blauheher, Tomegins oder größere Kubafinken, Morgenfinken, Indigovögel-Männchen, ein Paar prachtvolle Trupiale von Kuba, Amerikanische Spottdrosseln, Rothe Spottdrosseln, Purpurhühnchen und Virginische Wachteln.

Villa Schöbel.

208] **Rudolf Schoebel,**
Vogel- und Thierhändler.

Kanarienvögel,

vorjährige Männchen wie Weibchen aus guten Rollerstämmen, erstere durchschnittlich zu 5½ Thlr., letztere zu 20 Gr., Emb. für 1—2 Vögel 8 Gr. hat noch abzugeben.

209] **M. Maschke** in St. Andreasberg.

Zu verkaufen:
Mehrere Paare vorjährige, schöne
Wellensittiche
à 4 Thlr. per Stück, einzeln oder paarweise.

(1713). **H. Blom,** Bern (Schweiz). [210

Ein zahmer, junger, schwarzer Storch, 1 Rothkehlchen M., 1 Singdrossel-Pärchen, mehrere Dompfaffen M. abzugeben, oder gegen Prachtfinken einzutauschen.
Franko Briefe durch d. Exped. dieser Zeitschrift. 32 Wilhelmstr. S. W. [211

Abzugeben: 1 Schilffink M. 2½ Thlr., 2 Zebrafinken à 1¾ Thlr., 1 P. Wellensittiche jung 4½ Thlr., 1 P. rothe Kardinäle 10 Thlr., 1 Grassittich 3 Thlr., sowie Bruteier von Italienern à 2½ Sgr. Auskunft durch die Expedition 32 Wilhelmstr. S. W. [212

Eine große Auswahl in- und ausländische Vögel, Tauben und Hühner. Ausländische Sachen selbst importirt, empfiehlt billig **C. Gerstein,** Vogelhändler
213] Hannover.

Apotheker Neuß in Essen a. Ruhr sucht ein Nachtigalweibchen, sowie ein Plattmönchweibchen. [214

Hanfmühlen
empfiehlt und versendet gegen Nachnahme von Thlr. 1. per Stück **Alb. Aug. Angerer** am Schloßberg in Pforzheim (Baden). [215

Donny Sapin wohnt gegenwärtig **Rue de Courtrai 174** in **Gent** (Belgien). [216

Eine sehr reichhaltige, aus 530 meist europäischen Vögeln bestehende Sammlung ist wegen Mangel an Raum mit den dazu gehörigen 16 Schränken preiswerth zu verkaufen. Dieselben sind sehr gut ausgestopft und conservirt und dürfte man nicht leicht eine solche Sammlung im Privatbesitz finden.

Nähere Auskunft ertheilt **L. Leiter,**
217] Gärtner in Klieken
bei Coswig in Anhalt.

Eine Parthie
echter, altstämmiger, zitterhälsiger
Tauben
rothe, schwarze, gelbe, weiße, Blauspitze, Schwarzspitze, Rothspitze, Schecke, Weißköpfe
preiswerth bei **Th. Thiel,** Bromberg. [218

Zu verkaufen:
Veränderungshalber gebe ich noch folgende Zuchttauben ab:

2 Paar	schwarze Hühnerschecken	3 bis 3½	Thlr.	anstatt	5 u. 6	Thlr.,
2 "	rothe	"	3 " 4	"	"	5 u. 6	"
2 "	blaue	"	2½ " 3	"	"	4	"
2 "	gelbe	"	4 " 4	"	"	5 u. 6	"
1 "	vierfarbige Gimpel		2½	"	"	4	"
4 "	schöne Malteser, in weiß, blau und schwarz		3 " 4	"	"	5 u. 6	"

sämmtliche Tauben haben schöne Zeichnung.

219] **Robert Geßner,**
Zeitz, (Provinz Sachsen).

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Steglitz bei Berlin, Albrechtstraße 115 durch die Post oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Bernau.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 9. April 1874. Nr. 15.

Bitte an die Leser der „Gefiederten Welt" in Oesterreich.

Der Unterzeichnete beabsichtigt eine **Vogel-Fauna** Oesterreichs herauszugeben, wozu ihm bereits ansehnliches Material vorliegt. Damit jedoch diese Arbeit die möglichste Vollständigkeit erlange, ersucht der Unterzeichnete die Besitzer von Sammlungen und Freunde der Vögel ihn bei diesem Unternehmen mit ihren Erfahrungen unterstützen zu wollen. Ganz besonders wäre es ihm erwünscht genaue Daten über das Vorkommen seltener Arten zu erhalten; aber auch über die minder seltenen sind ihm Beobachtungen über Lebensweise, Brütegeschäft u. dgl. sehr willkommen und werden gewissenhafte Verwendung finden.

Victor Ritter v. Tschusi-Schmidhofen
Villa Tännenhof bei **Hallein.**

Inhalt:

Bitte an die Leser in Oesterreich. —
Zur Charakteristik der Langflügel-Papageien. —
Züchtungsversuche mit Fichten-Kreuzschnäbeln. —
Weiteres über die Erkrankungen der Graupapageien. —
Vogelversendungen. —
Künstliche Aufzucht des Geflügels. —
Ausstellungen: Vogelausstellung in Zürich. —
Anderweitige Liebhabereien: Die griechische Schildkröte. — Anzeigen. —

Zur Charakteristik der Langflügel-Papageien.

Von E. v. Schlechtendal.

Zwei Hallenser, die sich längere Zeit in Brasilien aufgehalten hatten, waren im verflossenen Sommer von da nach Halle zurückgekehrt und hatten mehrere Hundert kleiner grasgrüner Schmalschnabel-Sittiche (Brotogerys tirica) gewöhnlich Grasperekiten genannt, mitgebracht. Zwischen diesen kleinen, lärmenden Sittichen, die in einem zum Vogelhause umgewandelten Stalle ein höchst ungemüthliches Obdach gefunden hatten, saßen ernst und still einige große, düstergefärbte kurzschwänzige Papageien, zum Theil schon kränkelnd und einem baldigen Tode unrettbar verfallen. Es waren dies brasilianische Langflügel-Papageien (Pionias Maximiliani), im Handel meines Wissens nicht häufig vorkommende Vögel. Das düstergrüne Gefieder ist an Kopf, Kinn und Kehle düster violettblau überlaufen. Das dunkele Blau einiger Schwanzfedern und das Roth der untern Schwanz-

deckfedern fällt nur wenig in die Augen, dagegen geben die schuppenförmigen, grau gefärbten, und düster violett gesäumten Federn des Hinterkopfes dem Vogel ein seltsames und wenn er mit gesträubtem Gefieder dasitzt, etwas eulenartiges Aussehen. Ich erwarb das einzige Stück, das mir noch ganz gesund zu sein schien, fand aber keinen besondern Gefallen an meinem neuen Pflegling. Ausschließlich an Mais gewöhnt, verschmähte der Vogel jede andere Speise und ließ in den Morgenstunden ab und zu ein ganz abscheuliches gellendes Geschrei hören. Dabei war er in Folge der erlittenen Unbilden sehr mißtrauisch und ängstlich. Ich bot ihn also wieder zum Verkauf aus, fand aber keinen Käufer. Dafür hatte ich bald die Freude, den ängstlichen Gesellen fast plötzlich zahm werden zu sehen. Es war mir gelungen, den scheu Zurückweichenden doch mit der Hand zu berühren und ihm am Halse zu kraueu. Sofort streckte der Papagei den Hals lang aus und ließ sich diese Liebkosung ruhig gefallen, wurde dann aber wieder ängstlich und floh. Trotzdem hatte ich nun gewonnenes Spiel. Der kluge Vogel, der gemerkt hatte, daß ich ihn nicht zu greifen, sondern nur ihn zu liebkosen suchte, änderte sehr bald sein Verhalten und wurde mir gegenüber vertrauend und hingebend. Oeffne ich jetzt seinen Käfig und halte meine Hand hinein, so bohrt er förmlich seinen Kopf in dieselbe. Genug, wir sind inzwischen die besten Freunde geworden und ich meinerseits halte jetzt diesen Papagei für einen verständigen Vogel und schätze an ihm namentlich auch die gute Eigenschaft, daß er den großen horngelben Schnabel, mit dem er seine Sitzstangen in wirksamster Weise zu bearbeiten versteht, nicht zum Beißen mißbraucht. Neben halbweich gekochtem Mais frißt mein Langflügel-Papagei jetzt übrigens auch Hanf sehr gern und hat ebenso an Obst, Ebereschenbeeren, Morrüben 2c. Geschmack gefunden. Ob er das zum Glück nicht häufig ertönende Geschrei auch mit der Zeit sich mehr und mehr abgewöhnen wird, steht dahin. Von einem afrikanischen Gattungsverwandten, dem kleinen Mohrenkopf-Papagei (Pionias senegalus) wird in Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" gesagt, daß er bei großer Furcht ein sehr gellendes pfeifendes Geschrei hören lasse. Ich besitze ein allerliebstes, sehr zahmes Mohrenköpfchen seit einigen Jahren, habe aber nie ein derartiges Geschrei von ihm gehört, möglich also, daß das gellende Geschrei von Pionias Maximiliani noch Folge von Erregung ist und bei stets ruhiger und freundlicher Behandlung noch seltener wird, als es jetzt schon ist. Mohrenkopf-, den vorhin erwähnten kleinen Papagei, hatte ich im Jahre 1871 außerordentlich billig erworben. Das Thierchen sah damals in hohem Grade verwahrlost aus, war aber bereits sehr zahm und liebenswürdig. Mehrfach hatte es den Besitzer gewechselt, war in ganz ungeeigneten Käfigen gehalten worden und trotzdem hatte es ein liebenswürdiges, heiteres Wesen bewahrt. Es war und ist ein durchaus menschenfreundlicher Vogel, der zu Jedem der sich mit ihm beschäftigt, artig und freundlich ist, vertrauensvoll sein Köpfchen hinhält oder leise und sanft mit dem ihm dargebotenen Finger spielt. Bemerkt es, daß es aus dem Käfig gelassen werden soll, so klettert es schleunigst auf den Boden desselben herab und wartet nun vor der Thür stehend, auf das Oeffnen derselben. In einem früheren Käfige besorgte das Mohrenköpfchen das Letztere selbst. Mit der Spitze seines Schnabels hob es die außen angebrachte leicht bewegliche Thürklinke so oft in die Höhe, bis sie beim Herabfallen nicht mehr in dem Haken einschlug. Klemmte ich die Thürklinke mit einem Stückchen Holz fest, so wurde erst dies beseitigt und dann in der beschriebenen Weise geöffnet.

Um das heitere, liebenswürdige Wesen dieses Vogels zu kennzeichnen, sei es mir gestattet noch einige kleine Geschichten von ihm zu erzählen. Um ihm Zerstreuung zu verschaffen und ihn von der Zerstörung seines Käfigs abzuhalten, hatte ich an dem Draht der Käfigdecke einen Bindfaden so befestigt, daß die beiden mit einem Knoten versehenen Enden in den Käfig herunterhingen. Dieses einfache Turngerüst machte dem Mohrenköpfchen viel Vergnügen. Berührte er zufällig den Bindfaden, daß dieser sich bewegte, so stieß es dann absichtlich an denselben und spielte mit ihm wie ein junges Kätzchen. Aehnlich spielte es manchmal auch mit Kirschen, die ich an den Stielen im Käfig aufgehangen hatte. Mit dem halb geöffneten Schnabel versuchte es, dieselben zu erhaschen und freute sich, wenn ihm dies gelang. Die komischen Bewegungen des Kopfes, die das Thierchen dabei machte und die Töne des Vergnügtseins, die es dabei ausstieß, entziehen sich der Beschreibung. Der an der Käfigdecke angebrachte Bindfaden wurde übrigens auch fleißig als Turngeräth benutzt. Am hübschsten sah es aus, wenn das Mohrenköpfchen mit jedem Fuße an einem Ende des Bindfadens sich festhaltend, den Körper herabhängen ließ und flügelschlagend sich schaukelte. Nicht selten ließ es einen Fuß noch los und hing dann, nur mit dem andern Fuße sich festhaltend, frei in der Luft. Die fröhlichen Rufe, die es dabei ausstieß, zeigten welches Vergnügen ihm die Ausübung dieser Turnkünste machte. Als ich vor etwa zwei Jahren eine Glanzdrossel gekauft hatte und das Mohrenköpfchen Anfangs deren Nachbar wurde, ahmte er in komischer Weise und offenbar höchlichst amüsirt über das seltsame Geschwätz seines glänzenden Nachbars, eine besonders charakteristische Stelle des Glanzdrossel-Gesanges nach, wie es sich auch jetzt wieder damit vergnügt, die Lockstimme eines Jamaika-Trupials nachzuahmen, der neuerdings sein Käfig-Nachbar geworden ist. Daß Mohrenkopf-Papageien sprechen lernen, ist mir nicht zweifelhaft. Den meinigen habe ich nie mit Unterricht gequält, er sagt aber wenigstens „Jakob", schnalzt, pfeift und giebt im Uebrigen ein gemüthlich klingendes Kauderwelsch zum Besten. Hat man sich aber mit ihm eine Zeit lang beschäftigt und geht dann wieder fort, so läßt er nicht selten einen zornigen Schrei hören, der nicht grade wohltönend ist. Von einem so hübschen und liebenswürdigen Vogel läßt man sich eine derartige kleine Unart schon gefallen.

Pfarrer Hanfs Züchtungsversuche mit Fichtenkreuzschnäbeln (Loxia curvirostra, L.).

Von Vict. Ritt. v. Tschusi-Schmidhofen.

Da Herr Pfarrer Bl. Hanf vor einiger Zeit so freundlich war, mir nähere Mittheilungen über seine Züchtungsversuche mit Fichtenkreuzschnäbeln zu machen, und ich den verehrten Lesern der „Gefiederten Welt" in einer früheren Notiz versprochen habe, über die erzielten Erfolge Bericht zu erstatten, so entledige ich mich hier dieses Versprechens, indem ich Pfarrer Hanfs eigene Worte folgen lasse:

„Um die Fichtenkreuzschnäbel in Gefangenschaft zur Fortpflanzung zu bringen, war ich besonders für eine gute Ernährung derselben besorgt. Ich gab ihnen Arvennüßchen (die Samenkörner der Pinus cembra), welche ein besonderer Leckerbissen der Kreuzschnäbel sind. Wenn sie diese einmal gekostet haben, so verschmähen sie alles andere gewöhnliche Futter mit Ausnahme der Mehlwürmer, welche jeder Vogel, wenn er sie verkostet hat, sehr liebt. Diese befördern auch den Fortpflanzungstrieb, aber leider auch den Tod der Kreuzschnäbel. So fiel mein Liebling, ein sehr zahmes Männchen, welches noch kurz vorher um diese Lieblingsnahrung für sein brütendes Weibchen bettelte, vom Schlage getroffen vor meinen Augen todt vom Aste.

Die Hauptaufgabe bleibt immer, ihnen einen passenden Brutplatz zu bereiten. Ich wählte dazu ein Fenster, welches außen mit einem Fliegengitter und außer diesem mit Jalousien versehen war. In der obersten, verdunkelten Ecke brachte ich ein dicht verwachsenes Fichtenbäumchen an, welches ich so gut als möglich für den Nestbau herrichtete. Schon Ende Januar 1873 gab ich ein Pärchen meiner aufgezogenen Kreuzschnäbel aus dem warmen Zimmer in dieses der freien Luft ausgesetzte Fenster. Ungeachtet der noch herrschenden Kälte, welche mich nöthigte öfters das Trinkwasser zu erneuern, fing das Weibchen schon am 8. Februar an das Nest zu bauen, wobei ich ihm anfangs etwas behülflich war, indem ich mit dürren Fichtenzweigen den Grund zu seinem Neste legte. Als Baustoffe gab ich ihm die Bestandtheile aller Nester und Baumwolle, welche er zur inneren Ausfütterung benutzte. Das Weibchen arbeitete allein und vollendete sein Nest in 4 Tagen. Am 11. Februar, dem 5. Tage nach Beginn des Nestbaues, legte das Weibchen das erste Ei und blieb gleich auf demselben sitzen, was ich auch in der Freiheit beobachtete und was nothwendig ist, damit die Eier nicht durch die Kälte leiden. Die Eierzahl beträgt gewöhnlich 4, bisweilen nur 3; ausnahmsweise aber auch 5. Die Brutzeit dauert 14 Tage, von dem Tage an gerechnet, an welchem das erste Ei gelegt wurde. Aus diesem Grunde sind die Jungen auch im Neste sehr verschieden in der Größe.

Obschon ich meine Kreuzschnäbel bald zur Fortpflanzung brachte, so gelang es mir doch nur Eier, nicht aber Junge zu erzielen, da noch mancher Unfall, wie der früher erwähnte, meine Lieblinge traf. Auch sind die Weibchen sehr eigensinnig in der Wahl der Männchen, so daß sie manches garnicht annehmen wollen und so heftig verfolgen, daß ich es wegzunehmen gezwungen war. Endlich gab ich ein vor kurzer Zeit eingefangenes rothes Männchen zu dem Weibchen, welches sofort angenommen wurde. Von diesem Paare stammen zwei in der Gefangenschaft gezüchtete Junge. Das Weibchen legte zwar 4 Eier, welche alle befruchtet waren, doch ging ein Junges schon im Ei, das andere nach 10—12 Tagen im Neste zu Grunde, was mich bewog, die zwei noch lebenden, aber schwächlichen Jungen in meine eigene Pflege zu nehmen.

Sowol diese als auch alle aus dem Neste genommenen Jungen habe ich mit einem Gemenge aus hartgesottenen und fein geschnittenen Eiern, etwas geweichter Semmel und wenigen sehr fein geschnittenen Fichtennadeln (in Ermangelung eines anderen Grünzeugs) gefüttert. Von dieser für einen Tag bereiteten Nahrung nahm ich für jede Fütterung eine entsprechende Portion, kaute einige Arvennüßchen, mengte diese gekauten und mit Speichel erweichten Nüßchen unter die für eine einmalige Fütterung bestimmte Portion und füllte mit diesem weichen Brei mittelst eines der Größe des geöffneten Schnabels des Vogels entsprechenden Holzsplitters den Kropf der Nahrung verlangenden Jungen 6—8 mal täglich voll.

Die im Februar 1872 aufgezogenen Kreuzschnäbel fingen schon im April, die vom Jahre 1873 aber erst im Juli zu mausern an. Die Männchen vertauschten das bekannte graue Nestkleid mit einem mehr oder weniger schmutziggelben oder grünlichgelben Kleide.

Von dem im Jahre 1872 aufgezogenen Kreuzschnäbeln war unter 8 Individuen nur ein sogenannter „Rechtsschnabel", bei den 1873 aufgezogenen 7 Stück hingegen nur ein „Linksschnabel". —

Villa Tännenhof b./Hallein.

Weiteres über Erkrankung der Graupapageien.

Von Herrn Hagenbeck erhielt ich einen grauen Papagei (den siebenten) und der Aufsatz von Herrn Linz in Hamburg in Nr. 5 veranlaßt mich zu folgender Mittheilung. Der Vogel kam anscheinend gesund an, röchelte indeß und zeigte sich bei genauer Untersuchung auf dem linken Fuß so kraftlos, daß es ihm unmöglich war, die Zehen dieses Fußes zu gebrauchen. In zwei Tagen, nachdem dieselbe Erscheinung auch am rechten Fuße sich gezeigt, starb der Vogel. Er und seine sechs Vorgänger zeigten auffallenden Durst, fraßen fast Nichts und tranken anhaltend. Herr Hagenbeck schrieb mir, daß ich den Vögeln kein Wasser verabreichen solle, denn dasselbe sei die Ursache ihres Todes. Ich habe seinen Rath befolgt, aber ohne Erfolg. Herr Inspektor Sigel in Hamburg theilte mir Aehnliches mit, als das, was Herr Linz veröffentlicht und dennoch ist es mir nicht gelungen, trotz aller Versuche, einen Jako (grauäugigen) durchzubringen. Zwei Vögel, die mir besonders lieb waren, ich war ihretwegen nach Hamburg gereist und hatte sie unter 50 Stück ausgewählt, sandte ich nach Berlin und ließ sie durch Bekannte zur Thierarzneischule

bringen. Der eine hatte an beiden Seiten eine geschwollene, entzündete Schnabelwurzel, der andere spie zeitweise dicken, zähen Schleim; ich erhielt beide Vögel mit der Bemerkung zurück, sie seien unheilbar; sie starben auch, ungeachtet aller, auch der sorgfältigsten Pflege und Behandlung nach den Regeln über erkrankte Vögel.

Fr. S. II. in Wittstock.

Vogelversendungen.

Kürzlich bezog ich ein Paar Vögel von einem Händler, von denen der eine todtkrank ankam und am zweiten Tage trotz meiner Pflege verendete. Dergleichen ist nun leider etwas sehr Gewöhnliches und welchem Vogelliebhaber ist es noch nicht passirt! Ich selbst habe in dieser Beziehung im Laufe der Zeit sehr schlimme Erfahrungen gemacht, einen Bekannten von mir erging es aber noch übler; regelmäßig verlor er von den erhaltenen Sendungen einige Vögel und einmal die ganze Sendung von fünf Köpfen. Die Herren Händler behaupten in solchen Fällen immer, daß die Vögel ganz gesund abgegangen sind und verstehen sich, wenn der Vogel nicht gerade ganz todt ankommt, selten oder nie zu einem Ersatz. Nehmen wir nun an, daß die Vögel gesund abgegangen sind, so müssen sie sich also unterwegs den Tod geholt haben. Da die Vogelsendungen, wie jede Waare, auf Gefahr des Empfängers gehen, so wäre es demnach nicht unbillig, wenn dieser letztere ganz entschieden verlangte, daß dem Vogel die Gefahr des Erkrankens auf der Reise möglichst fern gehalten, er mithin besser verpackt würde, wie dies meistentheils geschieht. In der ungünstigeren Jahreszeit, bei Kälte und Regenwetter sollte von den Herren Händlern nur ein Versandtkäfig mit Einsatz, wie in der „Gefiederten Welt" beschrieben, angewandt und würden dadurch auch sicherlich viele Reklamationen vermieden werden, die doch keinen Erfolg haben und dem Liebhaber schließlich die ganze Sache verleiden.

Dringend wäre den Herren Händlern Beherzigung dieser Zeilen anzuempfehlen; kommt dann bei derartiger Verpackung ein Vogel krank an, so wird der Empfänger nicht dem Händler die Schuld beimessen, wie dies bei ungenügender Verpackung nur zu gerechtfertigt ist und sollte dennoch eine Beschwerde erfolgen, so wird im ersteren Falle der Händler dieselbe mit viel mehr Recht zurückweisen können.

Wenn der Vogel einmal als Waare behandelt wird, gebührt ihm auch eine mindestens ebenso sorgfältige Verpackung, wie sie anderen Waaren, die durch Nässe u. dgl. leiden können, zu Theil werden muß und auch selbstverständlich vom Absender zu Theil wird.

B. K.

Die künstliche Aufzucht des Geflügels.

Wenn je in Deutschland in früheren Zeiten ein Theil der landwirthschaftlichen Industrie nicht nur ganz vernachlässigt, sondern nur nebenbei, als untergeordnet beachtet wurde, ohne einen ernsten Vortheil zu gewähren oder auch nur zu beanspruchen, so war es die Geflügelzucht, die namentlich in Frankreich schon lange mit Vortheil betrieben wurde, dem allerdings das nahe England als großer Absatzort diente. Dahin wurden nicht nur, wie die statistischen Notizen nachweisen, ungeheure Massen von Eiern, sondern auch von fettem Geflügel als lukrative Handelsartikel befördert, und es hatte sich dadurch eine Einnahmequelle gebildet, die nach vielen Millionen zählte. Erst in den letzten 20 Jahren hatte sich die Aufmerksamkeit auch in Deutschland auf diesen Industriezweig gerichtet und Einzelne versuchten durch rationelle Behandlung des Geflügels das Versäumte nachzuholen, besonders da durch Eisenbahnen und Dampfschiffe Länder und Städte in leichtern Verkehr traten und durch Einführung größerer fremder Hühnerrassen und durch deren Kreuzung mit dem einheimischen Geflügel eine erhöhte Nutzbarkeit und größere Einnahme sich voraussehen ließ.

Das Hauptbestreben der Hühnerzüchter mußte sich besonders auf zwei Hauptpunkte koncentriren: auf eine größere und saftigere Fleischproduktion und womöglich gleichzeitig auf eine zahlreichere Eierproduktion. Beides ließ sich aber bei der gewöhnlichen Aufzucht auf natürlichem Wege nicht vereinigen und wurde stets der eine Vortheil nur auf Kosten des andern erzielt, weil ein Huhn, das selbst brütet, hierbei seine besten Kräfte und Säfte absorbirt und je öfter es brütet, desto zäher und saftloser sein Fleisch wird. Hierbei kann es nun aber auch in den ersten Jahren nicht so viel Eier produziren, als es bei rationeller Behandlung zu liefern im Stande ist. Wenn nun schon ein Huhn in der Mauserzeit im Herbst mit allem Eierlegen aufhört, weil eben in dieser 6—8 Wochen dauernden Periode alle Säfte zur Reproduzirung der Federn herhalten müssen und kein Nahrungssaft zur Entwickelung der Eierkeime übrig bleibt, so nimmt die Brütezeit gleichfalls so sehr die Säfte des Huhnes in Anspruch, daß es auch in dieser Zeit und während der folgenden Wochen, in welchen es die junge Brut leitet, keine Eier legen kann. Man hatte daher auch diesen Nachtheil eingesehen und hielt sich Truthühner, die nicht nur größere Massen von Eiern ausbrüten konnten, sondern auch größere Sorgfalt auf die junge Brut verwendeten, und somit war schon den Hühnern mehr Zeit zum Eierproduziren bewilligt; dieser Vortheil ist für die Hühnerzucht nicht zu unterschätzen, obgleich er dadurch aufgewogen wurde, daß diejenigen Nachtheile, die man von den Hühnern abwendete, sich auf die Truthühner übertrugen; denn das Fleisch dieser wurde durch das Brüten nun um so zäher, als ihre Eierproduktion gehemmt wurde. Man versuchte daher auf künstlichem Wege die Brütung zu bewerkstelligen und es wurden recht sinnreiche Maschinen erfunden, die dem Geflügel sowol die Ausbrütung als auch die Aufzucht der Jungen abnehmen mußten. Bei den meisten dieser Maschinen aber waren wiederum so viele Nachtheile vorherrschend, daß man im Allgemeinen wol das Sinnreiche bewunderte, aber praktisch davon zurücktrat, weil auf der einen Seite die Heizungsweise mit Oel- oder Spirituslampen die Sache sehr vertheuerte, auf der anderen Seite durch stete Kontrole der Wärme und

durch stete Ueberwachung innerhalb 3—4 Wochen, Tag und Nacht über, die Handhabung so erschwerte, daß man billiger und sicherer den eigentlichen Zweck auf natürlichem Wege erreichte. Erst in der neuesten Zeit ist es nach vielfachen Versuchen gelungen, daß man nicht nur als billigeres Heizungsmaterial die Steinkohle und besonders Coaks anwendete, sondern die Maschinen selbst sind so konstruirt, daß man nicht nur ruhig die Nacht über schlafen, sondern selbst halbe Tage die Maschinen sich selbst überlassen kann, weil sie durch angebrachte Vorrichtungen sich selbst reguliren. Die erforderliche Wärme in diesen Maschinen wird durch erhitztes Wasser erzeugt, das wie das Blut in beständiger Cirkulation in den Gummischläuchen erhalten wird und das in der Nähe der Eier einen gewissen Dunst verbreitet, der dem Vertrocknen des Eiweißstoffes im Ei vorbeugt und namentlich bei Enten- und Gänse-Eiern im erhöheten Maße erforderlich ist; außerdem aber wird den Eiern noch Luftzug zugeführt, der die Embryone in den Eiern vor dem Ersticken bewahrt, woran bis jetzt so viele Versuche gescheitert waren. Da durch mikroskopische und andere sorgfältige Untersuchungen sich ergeben hat, daß kein Huhn mehr als 500—600 Eier während seiner ganzen Lebensperiode legen kann, weil eben der Eierstock im Huhne nicht mehr als diese Zahl von Bläschen oder Eierkeime enthält und sich dieselben niemals erneuern, sondern nur nach und nach zur Entwickelung kommen, so muß der Hühnerzüchter durch rationelles Füttern und Abwarten das Geflügel dahin treiben, daß es in seinen ersten Lebensjahren mehr als die größere Hälfte der Eier ablegt, ohne es zum Brüten selbst gelangen zu lassen. Dann kann er noch immer ein nicht zu altes Huhn mit saftreichem Fleische zu Markte senden, das zwar noch gerne Abnehmer findet, für ihn selbst aber bereits ein unnützer Fresser geworden ist.

Die Maschinen vermögen aber nicht nur die geringe Anzahl Eier, die ein einzelnes Huhn auszubrüten vermag, in sich aufzunehmen, sondern sie können je nach ihrer Größe 100—300 Brütehühner gleichzeitig vertreten, d. h. sie können 1500—4000 Eier auf einmal ausbrüten und geben dadurch jenen Hühnern Gelegenheit, ihrem Berufe zum Eierproduciren Folge zu leisten. Man ist ferner bei diesen Brütemaschinen gänzlich davor gesichert, daß die Brüte-Eier beschmutzt oder zerdrückt werden und der Erkältung ausgesetzt sind. Und endlich bleiben die jungen Küchlein ganz von dem Ungeziefer befreit, das sich bei der natürlichen Brut nur zu leicht in den Nestern einnistet und nicht nur die Brüthennen furchtbar peinigt und ermattet, sondern von diesen oft in erschreckender Weise sich der jungen Brut mittheilt.

Wer durch Brüthühner Küchlein aufgezogen hat, wird diese großen Vortheile zu würdigen wissen. Endlich gehen in diesen Brütemaschinen keine Eier gänzlich verloren, da man schon am vierten Tage diejenigen Eier erkennen kann, welche nicht brutfähig waren. Man entfernt dieselben, ersetzt sie durch andere und hebt jene auf, um sie gekocht und fein gehackt als erste Nahrung für die übrige Brut zu verwerthen. Immer aber muß man auf 20—25 Proc. Verlust an Eiern gefaßt sein, da nicht alle Eier brutfähig sind und sich noch immer Embryone finden, die zu schwach gebildet sind und daher absterben. Auch diese sind leicht zu erkennen und durch andere zu ersetzen.

(Schluß folgt).

Ausstellungen.

Vogelausstellung in Zürich.

Motto:
Ihr lieben Wandergäste,
Euch lad' ich gastlich ein,
Bewirthet auf das beste,
Willkommen sollt Ihr sein!
Ed. Frisch.

Als die „Gesellschaft der Vogelfreunde" in Zürich im Frühjahr 1870 die erste Ausstellung von Singvögeln in der Schweiz veranstaltete, waren die Mitglieder derselben wegen der vielfachen Schwierigkeiten, die sie zu überwinden hatten, im Zweifel über das Gelingen ihres Unternehmens. Durch die lebhafte Betheiligung von Ausstellern, sowie den zahlreichen Besuch aus allen Schichten des Publikums wurde die Gesellschaft zu ferneren Ausstellungen ermuntert und sind auch andere Schweizerstädte, namentlich Bern und Basel, diesem Beispiele mit ebenso günstigen Resultaten gefolgt.

Die weiteren Ausstellungen wurden auf ansehnliche Sammlungen von seltenen Hühnern und Tauben, sowie auf fremdländische Sing- und Schmuckvögel ausgedehnt. Die mehrfachen Ausstellungen haben hauptsächlich bewirkt, daß die Zahl der Vogelzüchter in der Schweiz innerhalb weniger Jahre bedeutend angewachsen ist. Dieser Umstand hat die günstige Folge, daß die am letzten Donnerstag in den Sälen des alten Schützenhauses eröffnete fünfte Ausstellung von Nutz- und Ziervögeln, trotz der geringen Betheiligung ausländischer Ornithologen, sowol an Reichhaltigkeit als Mannigfaltigkeit der Raritäten den früheren voransteht. Sehr anerkennenswerth ist die Schlußnahme des neugestalteten Vereins, dahingegen den Besuchern eine möglichst reiche Sammlung der inländischen Singvögel zur Ansicht zu bringen und demgemäß die Ausstellung, so weit sie in dieser Richtung nicht beschickt worden ist, durch zweckmäßige Anschaffung auf eigene Kosten zu ergänzen.

Manchem Freunde der gefiederten Sänger, welche in Feld und Wald durch ihre fröhlichen Weisen sein Gemüth erheitern, ist es nicht vergönnt, die zahlreichen Familien derselben mit ihren Varietäten kennen zu lernen. Insbesondere müssen sich viele Städtebewohner, welche ein größeres Interesse für unsere Singvögel haben, nach ausgestopften Exemplaren in den zoologischen Sammlungen unterrichten.

Wie viel einladender ist es für den Naturfreund, während noch Meister Winter die erstarrte Natur beherrscht, einen von Waldesgrün, hübschem Blumenflor und seltenen Tropen gewächsen geschmückten Saal zu betreten, aus welchem ihm hunderte der geflügelten Insassen in buntem Durcheinander entgegenjubeln:

„Wir lustigen Bürger in grüner Stadt,
Wir singen und lärmen,
Arbeiten und schwärmen,
Vom Morgen zum Abend und werden satt".

Die kleinen Sänger lassen sich durch die vielen Besucher nicht stören, sie scheinen einander zur Heiterkeit anzufeuern und widerlegen hiedurch die vielfach irrthümlich verbreitete Ansicht am besten, daß die gefangenen Vögel traurig und die Gefangenschaft für sie eine Qual sei. Das trauliche Verhältniß zwischen dem Pfleger und seinem Lieblinge, sowie der muntere Gesang des Letztern sind Beweis genug für das Wohlbefinden, denn ein kranker oder trauernder Vogel singt niemals.

Die Dekoration unserer dermaligen Ausstellung ist sehr geschmackvoll ausgeführt. Fleiß und Kunstsinn leuchten aus der gesammten Ausstellung hervor und gebührt dem Leiter

derselben, Herrn Handelsgärtner Müller in Hottingen, alle Anerkennung. Bei unserem kurzen Rundgang in der Ausstellung wollen wir zuerst die Sing- und Schmuckvögel in Augenschein nehmen. Wie bei den bisherigen Ausstellungen sind in dieser Abtheilung unsere kleinen Hausfreunde, die Kanarienvögel, in hunderten von Exemplaren vertreten. Der Verein hat für die zwei schönsten Paare Preise von 50 und 30 Fr. ausgesetzt.

Bewundern wir zunächst unsere einheimischen Sänger, an denen die Ausstellung so reich. Groß ist hier das Geschlecht der Finken, als: Grün-, Buch-, und Distelfinken, Hänflinge, Zeisige, Dompfaffen oder Gimpel, sodann viele Arten von Amseln, Drosseln, Rothkehlchen, Schwarzköpfchen, Lerchen, Meisen, Grasmücken, Kreuzschnäbel, Ammern, Wachteln, Baumpieper, endlich die Königinnen der gefiederten Sänger, die Nachtigalen.

Ehe wir zu den fremdländischen Vögeln übergehen, erwähnen wir noch, daß die Aussteller es dem freundlichen Entgegenkommen des Herrn Dr. Girtanner in St. Gallen zu verdanken haben, den Besuchern eine in Ausstellungen seltene Gesellschaft von Vögeln aus unseren Hochalpen zur Ansicht zu bringen. Es sind dieses 6 Stück Alpendohlen mit ihrem sammtschwarzen metallschimmernden Gefieder und orangegelben Schnäbeln. Sie sind in Freiheit ein lebhaftes Völkchen, welches sich nur auf den höchsten Spitzen unserer Berge, an steilen Felswänden und Klippen aufhält.

An fremdländischen Vögeln, die sich zum größten Theile durch ihr Prachtkleid auszeichnen, ist die Ausstellung durch etwa 50 Arten vertreten, von welchen verschiedene hier noch nie lebend gesehen worden sind. An dieser schönen und kostbaren Abtheilung haben sich hauptsächlich die Herren Locher in Zürich, Charles Bocquet in Paris, Schöttler in Bremerhaven und Gudera in Leipzig betheiligt. Hier finden wir graue, rothe und grüne Kardinäle oder virginische Nachtigalen, Dominikaner, Hüttensänger oder amerikanische Blauvögel, indische Foudi, amerikanische Kuhstare, sodann ein ganzes Heer von sog. Bengalisten: Goldbrüstchen, Astrilden, Schmetterlings- und Tigerfinken, Elsterchen, Silber- und Helenafasänchen, Reisfinken, Schönbürzel, Stahl- und Feuerfinken, Orangebäckchen, Wittwen, Webervögel, weißköpfige Nonnen, Zebrafinken, Muskatvögel, Riesenweber, Indigovögel u. a. Wir beschränken uns auf das Aufzählen dieser schönen Schmuckvögel, da es hier zu weit führen würde, die zahlreichen Familien einläßlich zu beschreiben.

Nicht minder reich vertreten ist das Geschlecht der Sittiche oder Papageien. Wir erwähnen den Rosen-Kakadu, Inseparable, Edelpapagei, Halsbandsittich, Surinampapagei, Portorikopapagei (spricht englisch und spanisch), grauer und Amazonenpapagei. Am meisten hat sich bei uns eingebürgert und akklimatisirt der in zahlreichen Exemplaren ausgestellte niedliche Wellensittich, dessen munteres Treiben Jedermann amüsirt.

Die Freunde der Taubenzucht finden eine große Auswahl (etwa 70 Paare) von hübschen und zum Theil sehr seltenen Arten. Wir erwähnen: Weiße Perrücken (einfache und doppelte) gelbe, rothe und weiße Pfauentauben, rothe, blaue und schwarze Schwalben, gelbe Tümmler, blaue und rothe Weißköpfe, rothe und gelbe Elstern, Eistauben (mit und ohne Binden) Roth-, Schwarz- und Blauflügel, Schwarzschwingen, Prager, Florentiner, Gimpel, Trommler, Kaletten, Brieftauben, englische Kröpfer, Indianer. Im Speziellen machen wir noch auf die durch Bocquet in Paris ausgestellten blauen römischen Tauben und polnischen Chamois aufmerksam, welche hier wahrscheinlich noch nie, jedenfalls in so schönen Exemplaren überhaupt noch nicht gesehen worden sind.

An nutzbringendem Federvieh enthielt die Ausstellung etwa 70 Stämme edler Hühnerrassen. Es mußte die zahlreichen Züchter interessiren, viele Prachtexemplare und sehr seltene Thiere dieses Geschlechts zu finden. Das Pariser Haus Charles Bocquet, das diese Ausstellung durch seine zahlreichen Sendungen wesentlich verschönerte, hat u. A. je einen Stamm der sämmtlichen Hühnerrassen Frankreichs, sowie hübsche Gold- und Silberfasanen und kalifornische Rebhühner ausgestellt. Von den selteneren Hühnerrassen nennen wir: Dunkle Brahma, weiße und schwarze Italiener, weiße Crève coeur (aus der Züchterei des Königs von Bayern stammend), englische Kämpfer, schwarze Kochinchina (2 Paar Bruthennen mit Küchlein), verschiedene Arten Bantams, Dorkings, Holländer, Spanier La Fleche ꝛc. Die Herren Zollinger-Alber in Zürich und Fürsprech Steck in Bern beschickten diese Abtheilung mit schönen bronzefarbigen und braunen Truthühnern. Schließlich erwähnen wir als Narität drei chinesische, resp. indische Wollhühner (auch Seidenhühner genannt) aus Singapore, welche Herr Hauptmann Arbenz in Feuerthalen eingesandt hat. Das Federkleid dieser hübschen Hühner besteht fast ausschließlich aus feinem Flaum, weßhalb sie ein wolliges Ansehen haben. Sie sind sehr friedfertiger Natur und bewahrheiten hiedurch die Angabe, daß sie in den Ländern ihrer Heimat (Indien, China, Japan) die Lieblinge und Schooßkinder der Frauen seien, die sie mehr der Unterhaltung als des Nutzens halber ziehen. Vom praktischen Standpunkt aus können wir jedoch noch beifügen, daß die Wollhühner vorzügliche Leg- und Bruthennen sind, die sich bei uns gut akklimatisirt haben.

Das wären die hauptsächlichsten Gruppen unserer Ausstellung, die indessen seit der Eröffnung durch Zusendungen von Störchen, einheimischen Singvögeln und Fremdländern aus dem In- und Auslande erheblich vermehrt worden sind.

Unsere fünfte Vogelausstellung kann in jeder Hinsicht als gelungene bezeichnet werden. Wir haben zugleich die Beobachtung gemacht, daß in allen Beziehungen eine musterhafte Ordnung herrscht. Für die Aussteller im Speziellen ist es von großem Werth zu wissen, daß die anvertrauten, zum Theil sehr kostbaren Thiere sach- und ordnungsgemäß behandelt werden.

Das Inslebenrufen einer solchen Ausstellung ist mit mannigfachen Hindernissen verbunden. Wenn im Weitern noch in Betracht kommt, daß die „Gesellschaft der Vogelfreunde" auf bescheidene Mittel angewiesen ist, so müssen zur Erlangung des schönen Zweckes von den einzelnen Mitgliedern desto größere Opfer gebracht werden. In dieser Richtung gebührt in erster Linie der Unermüdlichkeit und Uneigennützigkeit des Präsidenten, Herrn Fechter-Weber, alle Anerkennung und erlauben wir uns, ihm Namens der zahlreichen Besucher den wärmsten Dank auszusprechen.

Es mag vielleicht hier und da die Frage aufgeworfen werden, warum die für solche Zwecke vorzüglich geeignete Tonhalle dieses Jahr nicht wieder in Anspruch genommen wurde? Wir erwidern hierauf, daß die vielen Schreihälse letztes Jahr sich in ungebührlichster Weise erlaubt haben, die Konzerte im kleinen Tonhallesaal zu stören. Als sie die hübsche Musik hörten, glaubten sie ihre Mitwirkung nicht versagen zu dürfen und hätten es wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht besser gemacht. Die Tonhalle hat aber selbstverständlich allervorderst ihrem Hauptzweck zu dienen. Sodann sind der Gesellschaft im Verhältniß zu den Einnahmen erheblich größere Ausgaben erwachsen, während Herr Kommandant Dubs die Freundlichkeit hatte, die Säle des alten Schützenhauses für die ganze Dauer der Ausstellung unentgeltlich abzutreten und überhaupt dem Verein zur Ausführung seines Zweckes mit allen ihm zu Gebote gestandenen Mitteln an die Hand zu gehen.

Nachtrag über die Vogelausstellung in Zürich.

Nach einem Besuche dieser Ausstellung in den Sälen des alten Schützenhauses kann ich die obigen Bemerkungen über die vortreffliche Anordnung und die Reichhaltigkeit derselben bestätigen. Noch keine der bisherigen Ausstellungen in der Schweiz hat uns so viele und interessante Vögel aus allen Welttheilen zur Schau gebracht wie die gegenwärtige. Diese hübsche, durch reiche Pflanzendekoration unterstützte Ausstellung übt deßhalb mit Recht eine große Anziehungskraft auf Alt und Jung aus allen Ständen aus. Hierin liegt offenbar die beste Anerkennung für die Bestrebungen der „Gesellschaft der Vogelfreunde", insbesondere ihres unermüdlichen Präsidenten, Herrn Fechter-Weber, auf dem die Hauptaufgabe lastete.

Bei meinem Rundgang machte ich die Bemerkung, daß die Käfige und Behälter für die etwa 70 Paar Tauben und etwa 80 Stämme Hühner bis auf wenige (unverkäufliche) durchweg als „verkauft" bezeichnet sind. Dieser Umstand ist offenbar der beste Beweis sowol für die Vorzüglichkeit der ausgestellten Rassenthiere, als für die Zweckmäßigkeit solcher Ausstellungen im Allgemeinen. Dieses günstige Ergebniß wird die zahlreichen in- und ausländischen Aussteller um so eher zur inskünftigen Beschickung derartiger Ausstellungen veranlassen, als, wie man

mir mittheilte, den starken Nachfragen in dieser Richtung bei Weitem nicht Genüge geleistet werden konnte.

Gegenwärtig findet durch die „Ornithologische Gesellschaft" eine ähnliche Ausstellung in Basel statt und in einigen Wochen soll eine solche in Winterthur eröffnet werden. Da solche Ausstellungen mit mancherlei Schwierigkeiten und wegen der Sendungen aus dem Ausland mit erheblichen Kosten und Risiko verbunden sind, so dürfte es zweckmäßig sein, wenn die ausstellenden Gesellschaften in direkte Beziehungen zu einander treten möchten, um in Zukunft eine zusammenhänge Vereinigung, ähnlich wie bei den schweiz. Kunstausstellungen, zu bewirken. Auf diesem Wege könnte der Genuß solcher Ausstellungen auch kleineren Städten verschafft werden, da sich die Kosten für alle Vereine bedeutend verringern würden. Werden in einzelnen Städten Ankäufe gemacht, so liegt es im Vortheil der Aussteller selbst die Sammlungen wieder zu ergänzen. Ich erlaube mir diese Idee im Interesse der guten Sache den resp. Gesellschaften zur näheren Erörterung zu empfehlen. Wir haben eine Reihe von schweizerischen Vereinen, welche zweifellos weniger zur Geltung kommen als eine derartige Verbindung, die den Zweck hätte das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und allen Kreisen der Gesellschaft zu dienen.

Anderweitige Liebhabereien.

Die Griechische Schildkröte (Testudo graeca).

Schildkröten „für besondere Liebhaber" fanden sich im Anzeigentheil der „Gefiederten Welt" hin und wieder. Allerdings, der Abstand von den Quecksilber-Naturen der Vögel bis hinab zu den Kriechthieren ist groß, allein so ganz stumpfsinnig und theilnahmsunwerth, als es auf den ersten Blick erscheinen mag, sind die Schildkröten denn doch nicht. Seit dem Bestehen der „Gefiederten Welt" ist es dem Thierfreunde leicht gemacht, sich allseitig zurecht zu finden und nach Belieben zu versorgen; ehedem aber war ich schon sehr froh in Paris einen Bekannten zu entdecken, der mir Griechische Schildkröten zu schicken versprach, und ich erhielt denn auch wirklich im Augustmonat für 3 Frs. drei prächtige Exemplare, 2 Männlein und 1 Fräulein. Das überzählige Männchen gab ich gleich weiter ab, wo ihm eine kleine Bleiche mit einem Hollunderstrauch zur Wohnstätte angewiesen wurde. Mein Pärchen aber kam in vornehme Gesellschaft; es wurde nämlich auf einem 4—5 □Ruthen großen Hofraum in Freiheit gesetzt, wo es türkische und Hauben-Enten, verschiedene Hühnerrassen, Silberfasanen, Feldhühner, Wachteln und viele Andere gefunden haben würde, wenn ihm nur beliebt hätte von seiner Umgebung die geringste Notiz zu nehmen.

Daß auf einem so stark bevölkerten Fleckchen Erde kein Grashalm zu finden war, ist fast mehr wie selbstverständlich, trotzdem aber führten seine Bewohner ein durchaus nicht uninteressantes Leben, denn an einer Stelle war eine seichte Vertiefung angebracht in die das tägliche Spühlicht ausgegossen wurde, welches, von der Sonne beschienen, so verlockende Düfte aushauchte, daß sich eine Legion Fliegen einfand, die sich theils an den Wänden niederließ, theils das kleine Bassin in hellen Haufen umschwärmte, und natürlich die schnellfüßige Bevölkerung zu unausgesetzter Jagd reizte und in Athem erhielt.

Das war aber nichts für meine Schildkröten, diese nahm ich deßhalb täglich mit in meine Wohnstube, um sie in einem mit Sand gefüllten Kasten zu füttern; anfänglich wollte es mit dem Fressen schlecht von Statten gehen, nach etwa 14 Tagen aber hatten wir uns miteinander verständigt: ich hielt die Salatblätter in der Hand und die Schildkröten rissen sich maulgroße Stücke heraus und verschluckten sie. Auch Mehlwürmer wurden gerade nicht verschmäht, sollten sie sich aber mal recht etwas zu Gute thun, dann gab's gekochtes Kalbfleisch, namentlich weichen Knorpel, den sie in Stückchen zerschnitten mir zwischen den Fingern wegzogen.

Nachdem das erste Frostwetter eingetreten, nahm ich sie vom Hofe ganz herein und brachte sie zwischen wollene Decken in eine Kiste auf dem Flur; das war aber nicht nach ihrem Geschmack, es wurde so lange gekratzt bis die Decke bei Seite geschoben war und sie sich auf den Sand legen konnten. So blieben sie den Winter über bei einer Kälte bis zu 10 Grad; bei zeitweisen geringfügigen Bewegungen ließen sie die Augen geschlossen; Nahrung wurde natürlich nicht eingenommen. Mit dem Eintritt wärmerer Witterung wurden die Schildkröten auch wieder lebhafter, zeigten aber anfänglich gar nicht den rechten Appetit, den ich erwartet hatte, endlich stellte sich auch dieser ein, und sie trollten lustig und munter zwischen der Hofgesellschaft umher, vonwo ich sie nun des Fütterns wegen zu entfernen nicht mehr nöthig hatte, denn sie kamen sobald sie hungrig waren von selbst auf mich zu gewatschelt, in einem so schnellen Tempo als man ihnen kaum zutrauen sollte, und fraßen aus meiner Hand bis sie gesättigt waren, worauf dann mit einer lächerlichen Hast kehrt gemacht und zu dem Lieblingsplätzchen abgeschoben wurde. Eines schönen Tages, nachdem es schon recht behaglich warm geworden, hörte ich in meiner Stube vom Hofe herauf ein sonderbares Klatschen, etwa als wenn Holzschuhe gegen einander geschlagen werden; an's Fenster getreten überzeugte ich mich, daß diese Töne von den Schildkröten hervorgebracht wurden, indem das Männchen seinen Panzer mit aller Wucht gegen den des Weibchens stieß, und, wie ich bald gewahrte, auf diese sonderbar ländlich sittliche Weise seine Liebe erklärte. Trotz der Dielenhärte des Hofraums scharrte das Weibchen demnächst auch eine flache Vertiefung, in der ich aber nie Eier gefunden habe, was in dem Paschareich des türkischen Enterichs auch wol nicht zu erwarten stand.

Das zweite Männchen, welches ich gleich anfangs abgegeben, hatte den ganzen frostreichen Winter unter dem Hollunderstrauch zwischen Schnee und Blättern zugebracht ohne Schaden zu nehmen, frisch und munter betrat es mit der warmen Sonne wieder sein kleines Königreich, und wurde dann zum Lohn für seinen Sieg in Schnee und Eis — verkauft.

Für den dritten Sommer hatte ich allen Ernstes Vorbereitungen zur Sicherung der Nachzucht von meinen Schildkröten gemacht. Ein ganz frei gelegener Rasenplatz war mit einem nach innen steilen Erdwällchen umgeben, eine kleine Grube zum Ablegen der Eier mit Sand ausgefüllt, ein Gefäß mit Trinkwasser angebracht, kurz Alles so eingerichtet, wie ich

mir einbildete, daß es den Thieren einen paradiesischen Aufenthalt zu schaffen geeignet sei. Kein Zweiglein beschattete den Ort, und die Kinder einer sicilianischen Sonne fühlten sich anscheinend überaus glücklich. Allein es erging meinen Schildkröten wie weiland dem Eisbär im zoologischen Garten zu Köln; dem hatte man auch ein Stüblein mit elegantem Waschbecken so traulich und wohnlich hergerichtet und doch erlag der weiße Herrscher jener Regionen, wo des Menschen Herrschaft Fiasko macht, rheumatischen Leiden. Ich werde gelegentlich bei Besprechung der Affenwelt auf diesen Punkt zurückkommen.

Genug, als die Sonne ihre glühenden Strahlen senkrecht herniedersandte, da trug ich zwei Schildkröten — zum Seelettiren in die Mehlwurmkiste! Sie waren am Sonnenstich gestorben, die Köpfe sogar fast gebraten, denn die Haut schälte sich bei leiser Berührung schon ab. Dr. von Gloeden.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Siebente Geflügel- und Vögel-Ausstellung

in **Frankfurt a./Main**

vom 22. bis 27. April

in der Lederhalle.

Anmeldungen bei Herrn G. Andreas, Rebstock 5. Schluß derselben bis zum 18. April.

Einsendungen unter der Adresse: Ausstellungs-Komité in der Lederhalle, spätestens bis zum 21. April.

Prospekte und Anmeldeformulare werden den bekannten Vereinen in Kürze zugesendet. [220

Der Vorstand.

Münster.

Die IV. Ausstellung des Westf. Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht

findet statt am 14. 15. 16. u. 17. Mai in den Räumen und Garten-Anlagen des Herrn Hölscher auf Mauritz.

Die Ausstellung, verbunden mit Verloosung, umfaßt:

Hühner, Enten, Tauben, Sing- und Ziervögel, so wie auch Kaninchen.

Anmeldungen erbitten wir **spätestens bis zum 1. Mai** bei Herrn Kaufmann **C. Krawinkel**, und sind von demselben Loose à 5 Sgr., so wie auch Programme zu beziehen. [221

Der Vorstand
Prof. Dr. H. Landois.

Zwei Hähne kalifornische Wachteln werden gesucht. Angebote erbittet Oskar Vetter
222] in Ludwigsburg.

Vogelorgeln, mit bestem Erfolge bei den verschiedenartigsten Vögeln angewendet, empfiehlt billig G. Benda, Coburg. [223

Eine Parthie

echter, altstämmiger, zitterhälsiger

Tauben

rothe, schwarze, gelbe, weiße, Blauspitze, Schwarzspitze, Rothspitze, Schecke, Weißköpfe

preiswerth bei **Th. Thiel,** Bremberg. [224

Ein Paar sehr schöne zahme Wildtauben (Palumbus torquatus) werden um 5 Thlr. verkauft von **J. Seybold,** Baumeister in München. [225

Zu kaufen gesucht:

ein türkischer Enterich,
eine Sperber-Kochinhenne reinster Zeichnung und Race.

Zu verkaufen:

drei Harzer Weibchen,
Bruteier: von hellgelben Kochinchinas von ausgezeichnet großem Stamm . . . . à 4 Gr.
" von englischen Zwerghühnern . . " 2 "
" von schwedischen blauen und silbergrauen Enten . . . . . " 4 "
" von Silberbrabantern reiner Race mit Wollhaube . . . . . " 2½ "
244] " von Silberbrabantern mit Helmhaube . " 3 "

Der

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht

in Asingen, N.-B. Wiesbaden. [226

Zu verkaufen:

2 Stück Hennen Silberlackbrabanter mit Helmhaube und schöner Zeichnung, zweijährig à St. 1 Thlr.

Auch sind dieselben im Tausch gegen einen desgl. Hahn und gegen einen gelben Italiener Hahn abzugeben.

227] **Wilh. Hilbert** jun. Ob. Langenbielau.

Zu verkaufen:

Ganz echte spanische Hühner (Portoriko), preisgekrönt, 1 Hahn 2—4 Hühner, vorjährig à St. 7 Thlr. Bruteier von genannter Rasse à St. 2½ Sgr. Ganz echte Kochinchina-Hühner, 9 Monat alt, 1 Hahn, 1 Huhn, gelb 12 Thlr. Holländische Hühner 1 Hahn 2 Hühner 8 Thlr.

228] **Louis Carius,** Inspektor
Dortmund, Unions-Vorstadt.

Franz. Lapins, nur **echt** importirte Racen in Original-Zuchtthieren, als: Beliers, de garenne, argentes, clapiers und domestique, billigst unter Garantie liefert das Export- u. Importgeschäft **C. Schürholz,** Hildburghausen. [229

„Goldfische

„pro 100 Stck. 10 Thlr. loco Triest exclusive Emballage gegen „Vorausendung des Betrages; auch werden Bestellungen auf „Nil- und Ganges-Krokodille, Brillenschlangen ꝛc. ꝛc. entgegen „genommen. **Carl Vaudisch,** Triest. [230

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Steglitz bei Berlin, Albrechtstraße 115 durch die Post oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.

C. F. Pilger's Buchdruckerei in Hermsdorf.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 16. April 1874. Nr. 16.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetz in der Schweiz. —
Ueber das Nisten der Zwergpagageien. (Fortsetzung anstatt Schluß). —
Die Vogelhäuser des Herrn Vetter in Ludwigsburg. —
Wasserfall im Vogelhause. —
Aus Oesterreich. —
Noch einmal über das häufige Sterben der Harzer Kanarienvögel. —
Sind die Bastardkanarienvögel fruchtbar oder nicht? —
Beitrag zur Pflege und Behandlung des Andreasberger Kanarienvogels. —
Erkrankung und neue Kur der Weibchen beim Eierlegen.
Plaudereien vom Hühnerhofe. —
Künstliche Aufzucht des Geflügels (Schluß). —
Zur Putenzucht. —
Briefliche Mittheilungen: Leid und Freude in der Vogelzucht. —
Aus den Vereinen: Verein der Vogelfreunde in Würtemberg. — Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Usingen. —
Anzeigen. —

Zum Vogelschutz.

Hiermit die Mittheilung, daß § 25 der am 19. April unserm Schweizervolke zur Annahme — die ist ganz unzweifelhaft — vorliegenden neuen Bundesverfassung dahin lautet:

> „Der Bund ist befugt" — hoffentlich giebt er auch baldigst die entsprechenden Gesetze — „gesetzliche Bestimmungen über die Ausübung der Fischerei und Jagd, namentlich zur Erhaltung des Hochwildes, sowie zum Schutze der für die Land- und Forstwirthschaft nützlichen Vögel zu treffen."

Wieder ein Schritt weiter auf dem Wege zu einem internationalen Bunde des Vogelschutzes.

E. W. in F.

(Demnächst bringen wir noch eine weitere Uebersicht der verschiedenen Schritte auf diesem Wege zur Bereicherung der Volkswohlfahrt. Dies wäre — wie bereits längst versprochen — schon geschehen, wenn der Herausgeber nicht durch ernstliche Erkrankung seit Wochen in seiner Thätigkeit gehemmt worden.

D. R.).

Ueber das Nisten der Zwergpapageien.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung statt Schluß; vrgl. Nr. 12).

Herr Grimm, Inhaber einer Musik-Instrumenten-Fabrik in Stettin schreibt: Betreffs der verunglückten Brut meiner Grauköpfchen säume ich nicht, Ihren Wunsch zu erfüllen, jedoch gestatten Sie mir wol, wenn es auch nicht gerade nöthig oder wissenswerth erscheinen sollte, etwas weiter auszuholen und Sie zunächst mit dem Brutraum bekannt zu machen, welchen ich den Vögeln angewiesen. Derselbe ist durch ein Gitter von einem nach dem Hofe heraus, gegen Osten belegenen Zimmer mit zwei Fenstern, derart abgetheilt, daß sich beide Fenster in der Volière befinden. Bei einer Höhe von etwa 10 Fuß ist er 11 Fuß lang und 4½ Fuß tief. Die Bevölkerung besteht außer den Grauköpfen noch aus 40 Wellensittichen (davon 30 eigener Zucht) sowie einigen Pärchen Zebrafinken, Diamantfinken, Schmetterlingsfinken, Rothschwänzchen, Amaranten, grauen Edelfinken u. a. Nistgelegenheiten sind gegenwärtig nur für Papageien angebracht gewesen und zwar vieretagige

Niststämme nach Art der im zoologischen Garten von Berlin befindlichen, in genügender Anzahl, und außerdem Schlensinger Kästen.

Nachdem ich seiner Zeit das betreffende Pärchen Grauköpfchen erhalten, geberdeten sie sich wie toll, hatten aber in 14 Tagen ihre Scheu soweit abgelegt, daß sie in meiner Gegenwart bereits zum Futter kamen, in dessen größter Nähe mein Beobachtungspostenist, und nach weiteren 14 Tagen hatten sie sich in dem ihnen gebotenen Nistkasten häuslich eingerichtet, jedoch konnte von einem eigentlichen Nestbau nicht die Rede sein, sondern sie brauchten nur zur Unterlage außer Spähnchen von morschem Weidenholz, das ich stets zum Ueberfluß gebe, trockene Fichtennadeln, etwas Moos und Federn von den Sittichen. Auf diese Unterlage legte das Weibchen 3 Eier, die es jedoch nach 14—16tägiger Bebrütung (ganz genau kann ich die Brutdauer nicht angeben) plötzlich, durch irgend eine Störung veranlaßt, verließ. Beim Nachsehen fand ich in zwei Eiern sich bewegende Junge; das dritte war verdorben.

Mit der mir eigenen Geduld wartete ich ruhig das weitere Verhalten der Vögel ab und siehe da, während sie erst den hochhängenden Nistkasten, dessen Oeffnung der Stube zugekehrt gewesen, benutzt hatten, wählten sie nun die unterste Etage eines Niststammes mit der Oeffnung dem Lichte zugekehrt, frei am Gitter hängend, in Gesichtshöhe und waren so zahm und zutraulich geworden, daß sie, selbst wenn Fremde mit dem Gesicht am Gitter standen, ab und zu am Neste flogen. Auch jetzt wieder und noch weniger als das erste Mal benutzen sie anderes Material als Spähnchen nur zum Zwischenmengen für die Unterlage, jedoch war in dieselbe eine Vertiefung wie Nestmulde gedrückt und zwar recht sauber.

Am 16. Tage nach Anfang meiner Beobachtung des Brütens hörte ich das matte Piepen der beiden Jungen und wartete nun mit größter Schonung ziemlich drei Wochen lang auf das Ausfliegen derselben, bis zu meinem Leidwesen alles vergebens war, da das Weibchen sammt den Jungen gestorben. Uebrigens glaube ich nun auch die Ursache des Todes gefunden zu haben, denn das Weibchen hatte, wie ich jetzt beim Untersuchen fand, ein reifes Ei im Legeschlauch und ist sonach wol, zu zeitig während der Brut vom Männchen gedrängt, an Entkräftung gestorben, nachdem sie vorher die Jungen hat verhungern lassen. (Wundern muß ich mich nur darüber, daß ich nicht das Mindeste merkte, da sich doch wol noch hätte helfen lassen). Das Männchen hat sich beim Futtern nur insofern betheiligt, als es das Weibchen futterte und bekümmerte sich nach dem Unglücksfalle auch nicht um die Nisthöhle, in der die Jungen lagen, sondern nur um die darüber befindliche, in der das Weibchen seinen Tod erwartet hatte, indem es davor sitzend, jämmerlich klagte, bezüglich suchend umherflog.

Schließlich bitte ich, meine weitschweifige Auseinandersetzung dem regen Interesse für meine Lieblinge zu Gute zu halten. C. H. Grimm.

(Schluß folgt).

Die Vogelhäuser des Fabrikanten Herrn Vetter in Ludwigsburg.

Es gewährt mir ein ganz besonderes Vergnügen, über die Leistungen eines Mannes im Bereich der Züchtung ausländischer Vögel, etwas Näheres mittheilen zu können, zumal dieselben mit außerordentlichem Geschick und großer persönlicher Aufopferung geleitet worden, welche alle Beachtung und Nachahmung verdient.

Wie so viele andere Liebhaber auch, fing Herr Vetter vor mehreren Jahren damit an, sich Gold-, Silber- und gewöhnliche Fasanen zu halten und er verstand es musterhaft, durch Erfindung zweckmäßiger Brut- und Züchtungskästen, verbunden mit einer verständnißvollen Pflege und Abwartung, eine bedeutende Anzahl junger Goldfasanen groß zu ziehen. Diese glücklichen Erfolge verleiteten Herrn Vetter zu weiterem Vorgehen und so wurden kalifornische Wachteln und Wellenpapageien bald zugesellt, mit welchen er dann ähnliche Ergebnisse erzielte. Aber auch hierbei blieb dieser rastlose Mann nicht stehen, sondern bald wurden auch Prachtfinken und viele andere angeschafft, für deren Unterbringung er einen Pavillon von Glas und Drahtgitter erbauen ließ, welchen jetzt eine große Anzahl der verschiedensten fremdländischen Vögel im freien Flug bevölkern. Eine Aufzählung aller dieser Vögel wäre ihrer großen Menge wegen fast ermüdend und ich werde mich daher begnügen, interessante Einzelheiten darüber mitzutheilen. Zuvörderst aber wird es von Interesse sein, über dieses hübsche Vogelhaus etwas Näheres zu erfahren. Dasselbe lehnt sich an ein größeres Gartenhaus an und bildet vorn eine Glaskuppel von etwa 25' Höhe. Der innere Raum ist mit einem flachen Becken, vielen Aesten und Zweigen, künstlichen und natürlichen Nestern, Nistkästen und dergleichen ausgestattet. Auf der einen Seite befindet sich ein kleiner vergitterter Raum, wo Futter und Geräthschaften aufbewahrt werden und welcher zugleich als Beobachtungsort dient. Diesem gegenüber befindet sich auf der andern Seite der Ofen in einem gleichfalls vergitterten Raum, dessen Wärme auf 12 bis 15 Grad gehalten zu werden pflegt. In diesem, noch nicht volle zwei Jahre bestehenden Eldorado, hat Herr Vetter schon eine ziemliche Anzahl junger Prachtfinken gezogen. Aber wie Schiller sagt: „Des Lebens ungetrübte Freude wird keinem Sterblichen zu Theil", so erging es auch hier, denn die Wölfe in Schafskleidern oder besser gesagt, in Priesterkleidern, die Kardinäle, Dominikaner und Genossen, haben auch hier Neid, Zwietracht und Herrschsucht, Gewaltthat und Unheil aller Art angestiftet, das Glück ganzer Familien vernichtet, die Nester zerstört u. s. w. Ganz besonders schlimm waren die grünen Kardinäle, welche zuerst entfernt wurden, worauf Mitte Februars die übrigen rothen folgen mußten, indem ihre Unduldsamkeit und Verfolgungslust gegen Andersdenkende das Maß ihrer Sünden voll machte.

Bei einer Kälte von 16 Grad sah Herr V. sich genöthigt, seine 5 übrigen Kardinäle aus der geheizten Voliere heraus und in eine offene zu den Fasanen zu bringen, welcher enorme Temperaturwechsel von etwa

30 Grad diesen Vögeln nicht im Mindesten geschadet hat. Interessant ist die Beobachtung, daß die dabei befindlichen grauen Kardinäle ihre Eigenwärme, bereits zu gegenseitig sehr inniger Zuneigung gesteigert und derselben durch den Bau eines Nestes offenkundigen Ausdruck gegeben haben. Gegenwärtig haben die grauen Kardinäle bereits ihre Jungen glücklich ausgebrütet. Wir haben hier wieder einen Beweis dafür, daß kräftig genährte tropische Vögel, unter günstigen Bewegungsverhältnissen, einen hohen Grad von Kälte aushalten können und sich dabei völlig wohl befinden.

In einem dritten Vogelhaus, welches Herr Vetter in seinem Garten besitzt und welches durch Vergrößerung und Anbau an ein früher vorhandenes Gartenhaus entstanden, befinden sich eine Anzahl von 8 Paar Wellen- mehreren Paar Sing- und Zwergpapageien, Nymphen, und früher waren auch noch einige Buntsittiche hier, welche letzteren aber als Mörder junger Wellensittiche ertappt, sofort entfernt werden mußten. Dieses Vogelhaus ist unheizbar und wird gegen große Kälte nur durch Strohmatten über den Glasfenstern geschützt. Trotzdem brüten die Wellensittiche hier fast ununterbrochen und haben zwei Paar, seit vorigem Oktober schon 19 flügge Jungen geliefert. Die Pflege, welche Herr Vetter seinen Lieblingen angedeihen läßt, ist musterhaft und es gewährt eine große Freude zu sehen, wie einzelne dieser Vögel ihrem Herrn zugethan sind, welcher sie auf das Sorgfältigste selbst versorgt. Besonders gezähmt ist ein geschäcktes Mövchen, das auf den Ruf seines Herrn sofort geflogen kommt, auf die Hand sich setzt und liebkosen läßt, wobei es in behaglichster Weise zwitschert. L. Martin in Stuttgart.

Wasserfall im Vogelhause.

Der Unterzeichnete hat einmal in früheren Jahren irgendwo einen sehr hübschen künstlichen Miniatur-Wasserfall gesehen, der zur Ausschmückung und gehörigen Vollendung eines größeren Vogelhauses gewiß nicht unwesentlich beitragen würde. Leider sind ihm die Darstellung oder Einrichtung eines solchen Wasserfalls ganz aus dem Gedächtniß entschwunden; nur Eines ist mir noch erinnerlich, daß nämlich eine sehr geringe Wassermasse über eine gekrümmte Spange von ziemlich großem aber bestimmten Radius geleitet wird, und über diese vermittelst Adhäsion sich ausbreitet, so das also gleichsam ein ganz dünner leichtgeschwungener Spiegel erzeugt wird. Ich weiß sehr wohl, daß die gegebenen Andeutungen soviel wie Nichts sind, sie tragen aber vielleicht dazu bei, eine solche Einrichtung bei Kunstgärtnern, Dekorateuren oder gar irgend einem Theoretiker in der Physik auszukundschaften; ich weiß nur noch, daß der Anblick dieses vorhin erwähnten Falles (es waren damals 3 solcher Spiegel angebracht) einen äußerst freundlichen Eindruck auf mich machte. Hinzufügen muß ich noch, daß der berührte Fall auf der früheren Flora zu Biberich in einem großen Terrarium, also einem verhältnißmäßig ziemlich beschränkten Raum, aufgestellt war.

Mit Bezug auf Vorgehendes erlaube ich mir nun die ergebenste Bitte zu stellen, falls es gelingen sollte, einen Wasserfall auszukundschaften, die Einrichtung desselben möglichst deutlich, vielleicht durch einige Umrißschnitte veranschaulicht, in der „Gefiederten Welt" erscheinen lassen zu wollen, und dürfte diese Schilderung auch den übrigen Lesern mehr oder minder willkommen sein. Wenigstens wäre es wünschenswerth, eine Adresse dessen bekannt zu geben, von dem eine solche Einrichtung vielleicht bezogen werden könnte.

F. Rupprecht,
Kaiserl. Forstgehilfe in Schnaittach.

(Wir geben dieser Anregung gern Raum, denn es wäre sehr wünschenswerth, daß in allen Vogelstuben eine solche wichtige, weil höchstnützliche Einrichtung eingeführt werde. D. Red.).

Aus Oesterreich.

So verbreitet diese geschätzten Blätter sind, so wenig liest man in denselben über Vogelzucht, Geflügelzuchtvereine, deren Ausstellungen, Verkaufs- oder Kaufsanzeigen aus Oesterreich. Und fragen die geehrten Leser warum? Weil wir mit wenigen Ausnahmen weder Züchter noch Vereine haben, weil sich unsere Hauptstädtler wenig dafür interessiren, weil, ich sage es gerade heraus, die Theilnahmlosigkeit so groß ist, daß nicht einmal ein Thiergarten in Wien lebensfähig geworden, und weil unsere Postdirektion beharrlich sich weigert, Vogelsendungen von uns nach auswärts anzunehmen, wodurch jedem Tausch- und Absatzverkehr ein Riegel vorgeschoben ist. Unter solch' mißlichen Zuständen für den österreichischen Vogelliebhaber und Züchter bleibt natürlich nichts übrig, als sich mit den Züchtern im weiteren Deutschland zu befreunden, von ihnen zu beziehen, und von ihnen Rath und Belehrung anzunehmen, und selten wird es dann fehlschlagen. Nach langjährigen fruchtlosen Versuchen mit der Zucht von Wellenpapageien, wandte ich mich getrost an Züchter im nördlichen Deutschland und bezog von einem derselben ein junges gesundes Pärchen dieser Vögel. Heute habe ich die Freude von diesem Pärchen in zwei Bruten 6 Junge erzogen zu haben und das Weibchen brütet eben wieder auf 5 Eiern. An dieser Stelle kann ich die Behauptung bestätigen, daß es nur auf den Stamm ankommt, wenn auf außerordentliche leichte Weise selbst mit trockenem Futter und Vogelmiere allein, in ungeheizter Stube von diesen Papageien Junge erzogen werden.

Der Anfänger in der Vogelzucht versucht es natürlich mit jenen Vogelarten zuerst, von denen er sich die leichtesten Erfolge verspricht. Außer oben erwähnter Wellensittichzucht, betrieb ich auch eifrig die Zucht der Harzer Kanarien. Leider erwarb ich mir um theures Geld lauter fehlerhafte Schreier. Also wieder frisch auf nach Deutschland. Herr Lehrer Fr. Wiegand in Auspach (A. Usingen in Nassau) sandte mir Rollvögel, die meine Erwartungen übertrafen, die nach 96stündiger Reise sogleich ihre wundervollen tadellosen Rollen sangen, so daß Nichtkenner vor Er-

ſtaunen Ohren und Augen aufſperrten. Jede Anempfehlung iſt da überflüſſig, dieſe Vögel empfehlen ſelbſt ihren Züchter.

Ich glaubte dieſe Zeilen in der „Gefiederten Welt" veröffentlichen zu ſollen, um einerſeits Leidensgefährten und Anfänger in der Vogelzucht zur Ausdauer und Beharrlichkeit auch bei großen Mißerfolgen anzueifern, andererſeits erfahrene und einflußreiche Vogel- und Geflügelzüchter in Oeſterreich zu bitten, nach Kräften zur Hebung der in Oeſterreich ganz vernachläſſigten Geflügelzucht beizutragen, Vereine zu bilden, und dieſe Blätter auch zur Veröffentlichung ihrer Erfolge und Erfahrungen zu benutzen, vor Allem aber dem Uebelſtande entgegenzuarbeiten, daß unſere Poſtämter Vogelſendungen von uns nicht annehmen, ſondern nur vom Auslande hereinführen. Was ein deutſcher General-Poſt-Direktor gewähren kann, muß doch auch einem öſterreichiſchen möglich ſein.

Karl Scholz, Privatier,
in Poisdorf bei Wien.

Noch einmal über das häufige Sterben der jungen Harzer Kanarienvögel.

Von W. Böcker in Wetzlar.

In einem in Nr. 24 vorigen Jahrgangs abgedruckten Artikel werden als Urſachen des häufigen Sterbens der jungen Harzer Kanarienvögel der übertriebene Verſuch der Bewohner des Harzes, von einjährigen Vögeln in übermäßig geheizten Stuben eine möglichſt zahlreiche Nachkommenſchaft zu ziehen, namentlich die überheizte ſchlechte Luft, nebenbei die zu kleinen Harzer Bauerchen und endlich die den Harzer Züchtern eigenthümliche Fütterung, welche es dem ſpätern Beſitzer erſchweren, die Vögel an ein anderes Futter zu gewöhnen, — hingeſtellt. An dieſen Behauptungen iſt unleugbar manches Wahre; deſto größer iſt aber auch die Gefahr, daß jeder Liebhaber oder Züchter, dem in der Folge ein Harzer Vogel an übelverſtandener Pflege und Behandlung zu Grunde geht, mit dem Herrn Verfaſſer zu dem Schluſſe gelangt, daß derartige Vögel ſchwache, verzärtelte Thiere ſind, die den Keim der Ungeſundheit von Jugend auf in ſich tragen, daß er ſich alſo nicht erſt die Mühe nimmt, der wahren Urſache des Eingehens ſeines Vogels nachzuforſchen, ſei es auch nur, um einem ähnlichen Verluſte für die Folge vorzubeugen.

Ich kenne den Harzer Kanarienvogel ſeit 30 Jahren und bin, um mich über die Zucht, Wartung und Pflege an Ort und Stelle möglichſt genau zu informiren, mehrfach im Harze, zuletzt während ſechs Tagen im Auguſt dieſes Jahres in Andreasberg geweſen; es ſei mir daher geſtattet, meine Anſicht über den Fragefall hier ebenfalls mitzutheilen.

Um zu ermitteln, wie weit die oben erwähnten Mißſtände wirklich eine Degeneration des Kanarienvogels in der Harzer Raſſe zur Folge gehabt haben, wird es zweckmäßig ſein, daß, was uns Bolle über den wilden Kanarienvogel mitgetheilt hat, ſoweit es hier von Intereſſe iſt, uns ins Gedächtniß zurückzurufen. Er ſagt in ſeiner vortrefflichen Schilderung des Stammalters unſeres zahmen Kanarienvogels wörtlich Folgendes: „Der wilde Kanarienvogel . . . iſt merklich kleiner und gewöhnlich auch etwas ſchlanker als derjenige, welcher in Europa gezähmt unterhalten wird", und an einer andern Stelle: „Kaum giebt es einen weichlichern Körnerfreſſer. Man verliert die meiſten an Krämpfen, deren zweiter oder dritter Anfall mit dem Tode zu endigen pflegt. Wer dieſe Vögel über See mit ſich nehmen will, wird wohl thun, ſich längere Zeit vor der Abreiſe mit wenigſtens der doppelten Anzahl von denen, die er wünſcht, zu verſorgen . . . Trotz aller Vorſichtsmaßregeln kann man darauf rechnen, während der Seereiſe und unmittelbar nach derſelben die Hälfte der Vögel einzubüßen. Wir haben von elf glücklich heimgebrachten, bereits vermauſerten, vollkommen eingewöhnten und zum Theil ſchon ſchlagenden Kanarienvögeln im Laufe des erſten Winters noch mehrere ganz unerwartet an Krämpfen zu Grunde gehen ſehen. Vor Allem vermeide man, dieſe Vögel in die Hand zu nehmen; viele von ihnen vertragen das durchaus nicht. Später ſcheinen ſie härter zu werden."

Der Kanarienvogel iſt demnach auch im wilden Zuſtande durchaus kein feſter, derber Vogel, wie wir ſolche beiſpielsweiſe an unſern einheimiſchen Körnerfreſſern beſitzen und die Wartung und Pflege der gezähmten Art erfordert daher auch mehr Sorgfalt, wie durchweg darauf verwendet wird, namentlich, wenn es ſich darum handelt, nicht blos den Sänger lange am Leben zu erhalten, ſondern auch ſeine Stimme zu ſchonen, ſeinen vollendet ſchönen Geſang, das Reſultat einer mehrhundertjährigen ſorgfältigen Züchtung vor allmähligem Zurückgehen zu bewahren. In dieſer Hinſicht war es denn auch entſchieden ein Fehler, Vögel, die vorher im geheizten Zimmer und ſogar in der Nähe des Ofens gehangen hatten, in ein Zimmer von nur 6 bis 8 Grad ſteter Wärme zu bringen. Die beiden Kanarienhähne, die in Folge dieſer Ueberſiedelung in wenigen Tagen eingegangen ſind, können an einer erblichen Krankheit nicht zu Grunde gegangen ſein; ſie ſind höchſt wahrſcheinlich an Lungenentzündung geſtorben und einem Kanarienvogel anderer Raſſen wäre es vermuthlich nicht beſſer ergangen. Uebrigens laſſen ſich auch Harzer Kanarienvögel, wenn es allmählich geſchieht, an Kälte, an hochgradige Kälte ſogar, gewöhnen. Ich habe in den langen Jahren meiner Züchtungsverſuche die Weibchen in der Regel in ungeheizten Stuben überwintert, bei einer Kälte, die das Trinkwaſſer bei Tage gefrieren macht, ohne dabei nennenswerthe Verluſte gehabt zu haben. Die männlichen Kanarienvogel Harzer Raſſe in ungeheizten Räumen zu überwintern, iſt durchaus nicht anzurathen; der Geſang würde ſelbſt bei ältern Vögeln unfehlbar zurückgehen und nicht wenige würden ſogar heiſer werden. Es iſt dies eine allen erfahrenen Züchtern der Harzer Raſſe wohlbekannte Thatſache.

(Fortſetzung folgt).

Sind die Bastardkanarienvögel fruchtbar oder nicht?

Ich habe hierüber keine eigenen Erfahrungen machen können und was mir andere Vögelzüchter mittheilen konnten, beschränkt sich darauf, daß ein Frankfurter Herr einmal Junge von solchen Bastarden gezogen habe, unter welchen Umständen, wußte man nicht.

Vielleicht ist der Eine, oder der Andere der geehrten Genossen in der Vogelzucht so freundlich, seine desfallsigen Erfahrungen in diesem Blatte mitzutheilen.

Bei dieser Gelegenheit kann ich mir nicht versagen, ein Kuriosum mitzutheilen, welches sich vor einigen Jahren in dem benachbarten Gießen zugetragen. Ein dortiger Züchter hatte verschiedene Bastarde von männlichen Distelfinken und weiblichen Kanarienvögeln gezogen, darunter ein ganz schwarzes Pärchen. Diese beiden Vögel machten wegen ihrer seltenen Farbe einiges Aufsehen; sie wurden auf der nächsten Geflügel-Ausstellung in Frankfurt prämiirt und dem glücklichen Besitzer wurde das nahmhafte Gebot von 50 Gulden darauf gemacht. Der Letztere zog es indeß vor, die seltenen Vögel zu behalten, sehr zum Nutzen des kauflustigen Liebhabers, wie sich nachher zeigte. In der nächsten Mauser — die Vögel waren damals im zweiten Jahre — trat eine völlige Umfärbung des Gefieders bei ihnen ein; sie bekamen die vorherrschende Farbe ihrer Art.

Der Züchter wußte sich übrigens selbst nicht zu erklären, auf welchen Ursachen die ursprüngliche tiefschwarze Farbe der Vögel beruhen könne; er hat auch meines Wissens später keine dieser schwarzen Gesellen mehr gezogen. W. Böcker in Wetzlar.

Beitrag zur Pflege und Behandlung der Andreasberger Kanarien.

Daß viele Andreasberger Kanarien in den Händen der Liebhaber bei vermeintlich richtiger, weil aufmerksamer Pflege binnen Kurzem im Gesange zurückgehen, ist eine Thatsache, deren Gründe festzustellen das Interesse der Züchter und Händler wie deren Kunden fordert, weil letzteren die Freude an den Vögeln verdorben, ersteren ihr guter Ruf gefährdet wird.

Einfach, leicht und bequem ist es, die Schuld davon dem Lieferanten aufzubürden, aber ist's auch verständig, billig und recht, dies ohne triftige Gründe zu thun? Liegt nicht noch viel näher die Annahme, daß die Verschlechterung des Gesanges Folge ist eines Fehlers oder gar einer ganzen Reihe von Mißgriffen in der Pflege dieser verfeinerten Kunstsänger? Ich will es versuchen, drei Kardinalfehler bei der Behandlung derselben dem geneigten Leser vorzuführen. Es sind das meines Erachtens:

1. Die Fütterung mit schlechtem Rübsen. Der von den Andreasberger Züchtern gefütterte Rübsen ist ohne Frage von besserer Qualität, als durchgehends jener, welcher namentlich in kleinern Ortschaften Seitens der Kaufleute von den Bauern zusammengekauft wird, der dann, reif oder unreif, bitter oder süß, rein oder mit dem giftigen Hederich vermischt, durcheinander in Haufen geschüttet, oft schlecht gelüftet, endlich aus geschlossener Lade der Thönebank für den Handverkauf herauskommt. Und selbst erfahrne Kaufleute beurtheilen denselben beim Einkauf nach seinem äußern Aussehen, anstatt nach seinem Geschmacke; den Schaden davon haben die kleinen Sänger, die mit solcher oft verdorbenen Kost fürlieb nehmen müssen und doch in ihrer Gesangesfreudigkeit nicht nachlassen sollen. Es dürfte sich darum empfehlen, bei Ankunft des gekauften Andreasberger Kanarien eine Prise seines Reisefutters durch den Geschmack zu prüfen und zu vergleichen mit dem Rübsen aus des Kaufmanns Thönebank, den man füttern will; zweckdienlich aber ist es, sich von dem Züchter gleich einige Pfund seines Rübsens mitkommen zu lassen, um sicher zu gehen, daß das Hauptfutter des theuren Lieblings ein gutes und gesundes ist.
2. Die zweckwidrigen Käfige. Der Andreasberger Vogel soll singen, aber nicht tanzen und springen. Wer an dem artigen zierlichen Betragen des Kanarien seine Freude findet, deshalb einen hellen luftigen Käfig nöthig hält, dem leistet ein billiger Landsmann dieselben Dienste; der Sänger aber bedarf vor allem der Ruhe; er muß vor Zerstreuung durch Spiel und Tändelei, vor Aufregung durch Neugierde oder Erschrecken sorgfältig bewahrt bleiben, weshalb für ihn ein geschlossener Käfig mit gedämpftem Lichte, am besten wol ein tiefer Kistenkäfig anzurathen ist. In diesem ist er zugleich vor seinem gefährlichen Feinde, dem Zugwinde, geschützt, gegen welchen er um so empfindlicher sein muß, je sorgfältiger ihn sein erster Pfleger davor bewahrt hat, und je größer der Temperatur-Unterschied in seiner frühern zu seiner jetzigen Behausung ist.
3. Die schlechte Gesellschaft. Mancher Liebhaber hängt den jugendlichen, zarthörigen Sänger zu seinen übrigen Kanarien, oft derben Burschen mit rauher Kehle. Da soll er den Lehrer machen, sie die Schüler. Das geht aber nicht, und so wird der Lehrer zum Schüler. Mit seiner reichen Gesangesanlage und seinem feinen Gehör, womit er, wie Jemand bemerkte, gegen den gemeinen Kanarien dasteht wie eine Opernsängerin zu einer Viehmagd, lernt er leicht und schnell die rohen Gesangesmanieren seiner Kameraden, während diese mit ihrer grobkörnigen Stimme seine bezaubernden Tonperlen vergeblich nachzuzaubern sich bemühen. So verliert er denn in wenig Monaten die eine Tour nach der andern, bis ein paar Rollen als Wurzelstock seines anfänglich reich aufblühenden Gesanges übrig geblieben sind. Er ist entwerthet und bereitet seinem Besitzer Verdruß, weil er ihm keine Freude mehr macht.

Dies sind, so weit meine Erfahrung reicht, die drei Grundmängel bei Pflege und Behandlung der Andreasberger Kanarien; sie bestimmt hervorzuheben und darauf aufmerksam zu machen war der Zweck dieser Zeilen. R. Müller, Vikar in Coerfeld.

Erkrankung der Kanarienvögelweibchen beim Eierlegen.

In Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. Band sagen Sie, Herr Redakteur, daß es ein künstliches Mittel zur Abwehr der Legenoth nicht gebe.

Ich glaube Ihnen jedoch ein ganz sicheres Mittel in dieser Beziehung angeben zu können, dessen Mittheilung in Ihrem Blatte gewiß allen Kanarienzüchtern recht angenehm sein dürfte.

Wenn nämlich ein Weibchen das Ei nicht los werden kann und dadurch, wie jedem Züchter ja bekannt ist, alsbald so hinfällig wird, daß es das Gefieder aufsträubt und sich kaum oder garnicht mehr auf der Sitzstange erhalten kann, dann nehme ich, sobald ich solches bemerke (die Legzeit ist bekanntlich fast regelmäßig an jedem Morgen vor 9 Uhr), das Weibchen in die flache Hand, den Bauch nach oben gekehrt, ergreife dann ein Gefäß, worin frisches, möglichst kaltes Wasser ist und lasse das Wasser etwa in der Höhe von 6—12 Zoll auf den After und demnächst auch auf den ganzen Leib des Vogels fallen, bis derselbe ziemlich durchnäßt ist. Dann setze ich den Vogel behutsam auf sein Nest, welches er schon gebaut hat, oder wickele ihn sonst gut ein, bis er sich erholt hat und wieder munter ist.

Durch dieses Verfahren, so scheint es mir wenigstens, wird das Ei, welches nicht abgehen will, wieder zurückgedrängt und es erfolgt die Legung desselben an diesem Tage nicht mehr, wol aber wird es am anderen Tage in dem Neste liegen. Ich habe auch versucht, dem Vogel, nachdem ich die erwähnte Wasserprocedur mit ihm vorgenommen, noch in seine Legenoth dadurch weiter zu Hülfe zu kommen, daß ich einen in Oel getauchten Stecknadelkopf mehrmals sanft und vorsichtig, um das Ei nicht zu zerbrechen, in den After einschob; doch ist in diesem Falle gewöhnlich anderen Tages das Ei dem Vogel auf dem Sitzstängelchen abgegangen und, falls man es nicht mit einem weichen Gegenstande auffangen konnte, auf dem Boden gefallen und zerbrochen. Diese Oelmanipulation ist demnach garnicht nöthig; das Ei wird durch die erwähnte Wasserkur allein schon abgehen und wird dann in's Nest gelegt.

Man nehme sich aber in Acht, daß man den Vogel, während man ihm das Wasser auf After und Leib fallen läßt, nicht mit dem Kopfe zu weit nach unten hält, weil durch den Druck des Wassers ihm das Blut nach oben gedrängt wird und es ihm zum Schnabel herausfließen und er so leicht sterben könnte; man halte ihn also ganz gerade in der Hand.

Ich sollte meinen, daß dies Verfahren auch bei anderen Vogelgattungen, die an Legenoth leiden, anwendbar wäre; ich habe es indeß nur bei meinen Kanarienvögeln versucht, da ich andere Sorten noch nicht gezüchtet habe. Eduard Volger,

Buchhändler in Landsberg a/W.

Plaudereien vom Hühnerhofe.

In den funfziger Jahren — ich stand damals in Friedewald auf dem Westerwalde — erzählte mir mein Nachbar, ein durchaus zuverlässiger und wahrheitsliebender Landwirth, wie er einmal ganz unerwartet und sehr gegen seinen Willen zu einem ganzen Dutzend junger Hähne gekommen sei. Der Mann wollte eine Glucke setzen; er hatte davon gehört, daß man das künftige Hähnchen im Ei erkennen könne, wenn man das letztere zwischen Daumen und Zeigefinger in einer dunklen Kammer gegen das Licht bringe. Die röthliche Farbe des Dotters, oder die gelbliche, — das eben wußte der gute Mann nicht mehr — zeige das Hühnchen, die andere das Hähnchen an. Auf diese Weise wurden dann die Eier gewissenhaft ausgesucht und dreizehn Stück, darunter nach der Meinung des Nachbars 12 Hühnchen, der Glucke untergelegt. Nach kurzer Zeit gab es auf dem Hofe des Mannes zwölf junge Hähne und ein Hühnchen.

Mein Nachbar vermochte sich nicht mehr zu entsinnen, ob er die Eier mit röthlichem oder gelblichen Dotter gewählt hatte; nach meiner Ansicht können es nur die ersteren gewesen sein. Die röthliche Farbe des Dotters entspricht der kräftigeren Färbung des Gefieders beim Hahn;*) überdies habe ich bei angestellten Versuchen gefunden, daß die Kochinchina-Hühner, von denen nach der Behauptung vieler Züchter nur wenige Hühner, aber desto mehr Hähne fallen, meist Eier mit röthlichem Dotter legen.

Ich weiß wol, daß die Nahrung des Huhns nicht ohne Einfluß ist auf die Farbe des Dotters; ein Huhn, welches sich viel in Baumhöfen und auf Wiesen aufhalten kann, wird in der Regel Eier mit röthlichem Dotter legen. Es findet hier aber auch eine reichliche Nahrung und mit ihm der zugehörige Hahn; eine Nahrung, die den Letztern zur kräftigen Zeugung befähigt und auf dieser beruht das Geschlecht des künftigen Hühnchens.

Auf meinem Hühnerhofe aus damaliger Zeit befand sich ein kräftiger Kochinchina-Hahn, der das Interesse sämmtlicher Hausbewohner erregte. Eines Tages brachte mir mein Dienstmädchen, eine gute, mitleidige Seele, den riesigen Kerl in ihrer Schürze aufs Zimmer und erzählte weinend, daß der arme Hahn in den letzten Zügen liege. Der Patient war allerdings in übler Verfassung; Kamm und Bartlappen hatten eine unangenehme bläuliche Farbe; die matten Füße wollten den schweren Körper nicht mehr tragen und das Athmen war nur noch ein rasches, beängstigendes Pfeiffen. Der Kranke hatte den Pips. Was war aber zu thun? Im ganzen Dorfe befand sich kein Züchter von einiger Bedeutung, der Thierarzt des Orts war ein ehrsamer Schäfer und eine Hülfe von Außen wäre auch möglicher Weise zu spät gekommen. Ich wußte und hatte es erst kürzlich wieder in Moleschotts Lehrbuche über die Nahrungsmittel gelesen, daß die Fette zur Unterhaltung des Athmungsprozesses dienen. Ein Stück frischer Butter konnte nicht schaden und — der Hahn schien derselben Meinung zu sein; er fraß ein Stück nach dem

*) Dies ist nicht richtig. Die mehr oder weniger röthlich-gelbe Färbung des Eidotters entspricht vielmehr dem größern oder geringern Fettgehalt. D. R.

andern, bekam augenblicklich Erleichterung und war am andern Morgen so gesund, wie früher.

W. B. in W.

Die künstliche Aufzucht des Geflügels.

(Schluß).

Die künstlichen Brütemaschinen haben ferner den großen Vortheil, daß sie das ganze Jahr hindurch in Thätigkeit bleiben, also Küchlein und junge Hühner liefern in Jahreszeiten, in welchen es sonst keine giebt, und für die man dann mit Recht höhere Preise erzielen kann.

Da das in beständiger Cirkulation sich befindende Wasser immer wieder zum Heiz-Apparat zurückkehrt und dieses noch immer beim Heraustreten aus der Brütemaschine die Blutwärme enthält, so benutzt man bei den neuesten Maschinen dasselbe noch, um mit ihm für die junge Brut eine Vorrichtung herzustellen, die die liebende und erwärmende Mutter ersetzt und diese Vorrichtung nennt man „die künstliche Mutter." Ist unter dieser den Jungen einmal ihr Platz angewiesen, so verlassen sie dieselbe nur, um zu fressen und zu saufen und kehren von selbst, so bald es ihnen kühl wird, unter ihre wärmende Mutter zurück.

Nach L. u. f. Ztg. f. d. n.-ö. D.
Berl. „Industrie-Blätter".

Vogelkrankheiten.

Puten.

Im verflossenen Jahre war meine Putenzucht ausgezeichnet; ich füttere mit Buchweizen, Hirse und füge dem Gemenge in erster Zeit für die Küken gehacktes hartes Hühnerei mit Wermuth hinzu, außerdem gebe ich auch mitunter Schwarzkümmel, als Kraut, der Verdauung wegen.

Meine Hühnerställe sind zur Zeit noch zu klein, und da die gut gefütterten Puten früh brüteten, ließ ich die Bruthenne nebst Küchlein in einem geheizten Kellerraum. Leider trat dann das so sehr unfreundliche Wetter ein, bei dem ich jeden Sonnenblick benutzte, wenn das Gras abgetrocknet war, die Küchlein in's Freie bringen zu lassen. Dessen ungeachtet habe ich eine Unzahl Küchlein in diesem Jahre verloren, und zwar erblinden die jungen Küchlein, wobei der Kopf sehr verschwollen ist. Dagegen ließ ich mit Erfolg warmen Fliederthee anwenden und die verklebten Augen öffneten sich wieder. Doch als Hauptsache lag auch die Verdauung darnieder. Die Küchlein stehen mit offenem Schnabel und warmer Speichelsaft fließt aus demselben, die Ernährung ist trotz des Futters sehr dürftig. Bei Untersuchung der todten Thiere fand ich, die Augen stark vergrößert, den Kopf blutleer und bleich, Magen und Lebergegend hingegen mit dunkelem fast schwarzen Blut erfüllt.

A. Jacobs in Gnewikow.

Briefliche Mittheilungen.

In Ihrem werthen Schreiben wundern Sie sich darüber, daß ich so lange nichts von mir habe hören lassen; dies ist jedoch ganz natürlich. Sie werden sich erinnern, daß ich anfangs mit furchtbarem Pech in der Vogelzucht zu kämpfen hatte, und daß ich in meiner Noth Sie sehr häufig um Ihren werthen Rath bat. Wie es mir schien, war Ihnen darüber doch endlich der Geduldsfaden gerissen, denn Sie riethen mir kurzweg, daß ich die ganze Vogelzucht aufgeben möchte, und ich glaubte außerdem sehr deutlich zwischen den Zeilen lesen zu müssen, daß ich Sie nicht mehr mit meinem Lamento belästigen möchte. *) Letzteres that ich denn natürlich auch, Ersteres aber nicht. Die fortgesetzten Mißerfolge zwangen mich jedoch, die Vogelstube aufzugeben und die Zucht in einzelnen Käfigen zu versuchen. Die bisherige Vogelstube wurde meine Arbeitsstube — und da lernte ich denn auch bald die Ursache meiner vielen Mißerfolge in der Vogelzucht kennen. Das Zimmer liegt nämlich mit der einen Seite nach Süd, mit der andern nach Ost, ist also einem starken Zugwinde ausgesetzt, und da die Mauern sehr dünn sind, so ist auch die Temperatur darin nur zu sehr veränderlich. In vorigem Winter fiel mir das besonders auf, als wir hier eine Kälte von durchschnittlich 15 ° R. hatten. Bei dieser Temperatur zeigte das Termometer bei einem mittleren Wärmegrade von 15 ° im Zimmer oben unter der Decke etwa 20 ° und in der Nähe des Fußbodens nur 5 bis 6 ° Wärme. Es ist also kein Wunder, daß sich die Thierchen, die früher dicht unter der Decke bei einer Lufttemperatur von 25 ° gebrütet hatten und zum Futternapf in eine Temperatur von 5 ° niedersteigen mußten, stets erkälteten. Mit der Zucht in Käfigen hatte ich ebenfalls kein Glück, weil ich für dieselben keinen anderen Platz hatte, als im Laboratorium und im Arbeitszimmer. Wie es schien, war die Luft, welche häufig mit dem Dunst verschiedener Chemikalien geschwängert war, den jungen Thierchen nicht zuträglich, denn die meisten starben regelmäßig in einem Alter von 8—14 Tagen. Auf junge Kanarienvögel schien dagegen diese Luft nicht nachtheilig einzuwirken, denn diese sowol als auch Bastarde von solchen und Stieglitzen habe ich sehr viele darin gezogen.

In vorigem Sommer versuchte ich nun zum ersten Male die Zucht in einer freien Volière im Garten, und über die erfreulichen Ergebnisse derselben habe ich hier ja bereits mehrfach berichtet **) und werde dies auch fernerhin thun. O. W. in Z.

*) Dies war ein Irrthum, denn ich gebe nicht allein herzlich gern, sondern auch unermüdlich meine Rathschläge, freilich immer nur nach aufrichtigster Ueberzeugung — und eine solche war bei mir damals die Meinung, daß Sie, angesichts Ihres fabelhaften Pechs und der namhaften Verluste, die ganze Vogelzucht aufgeben oder doch aufschieben sollten. Um so besser nun, daß Sie es nicht gethan, sondern schließlich doch zum Ziele, zu beachtenswerthen Erfolgen gelangt sind, zu denen ich von Herzen Glück wünsche! Dr. K. R.

**) Die glückliche Zucht der kleinen Alexandersittiche (P. torquatus) und mehrerer anderen, bitten wir im vorigen Jahrgange nachzulesen. D. Red.

Aus den Vereinen.

Verein der Vogelfreunde in Württemberg.

Die dritte Sektion unseres Vereins hatte in den letzten beiden Monaten ihre ganze Thätigkeit auf die Herstellung und Vertheilung von Nistkästen für Meisen und andere Vögel gerichtet. Weil Württemberg ein Land ist, in welchem die Obstbaumkultur eine hervorragende Rolle des ländlichen Erwerbs bildet, und weil gerade in den letzten zehn Jahren die Obstbäume durch Insektenfraß sehr zu leiden gehabt und der Obstertrag in Folge davon gewaltige Einbuße erlitt, so ersah die Sektion hierin ein weites Feld ihrer Thätigkeit geöffnet.

Bezügliche Aufsätze über diesen Gegenstand im „Schwarzwalder Boten", im „Staatsanzeiger", in der „Bürgerzeitung", dem neuen „Tageblatt" und dem „Wochenblatt für Volksbildung", brachten ihre heilsamen Folgen und liefen innerhalb kurzer Zeit, gegen 60 verschiedene Bestellungen ein. Unter diesen befinden sich 8 landwirthschaftliche Vereine nebst einer vielversprechenden vom Stadtschultheiß in Kirchheim an der Tei, auch haben sich die Landpfarrer, Schullehrer und einige Förster sehr regsam betheiligt. Im Ganzen sind gegen 1500 solcher Kästen, zu 10 Kreuzer das Stück abgegeben worden, welches mühsame Geschäft die Herren Jäger hier und Herr Vetter in Ludwigsburg übernommen und bestens ausgeführt haben. Somit wäre denn der Anfang einer hoffentlich gedeihlichen Hegung, unserer nützlichsten Vögel gemacht, welche in diesem Herbst fortgesetzt werden soll, um den Meisen durch vermehrtes Aufhängen solcher Kästen auch zugleich Schlafstellen für den Winter zu gewähren, was für ihre Existenz und Heimischmachung in den Obstgärten von großem Nutzen ist.

L. Martin.

Der Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Usingen beabsichtigt im dortigen Amte eine große Anzahl von Nistkasten auszuhängen und veranstaltet, um die Mittel hierzu zu gewinnen, mit Genehmigung des Herrn Oberpräsidenten, eine Verloosung von Geflügel. Loose à 2½ Sgr. in größeren Partien für Vereine oder auch einzeln verabfolgt der Rechner der Verloosungs-Kommission, Herr Buchdrucker Wagner, und einer recht regsamen Betheiligung und Verwendung von Freunden der Sache sehen wir mit großem Dank im Voraus entgegen. Auch die Redaktion der „Gefiederten Welt", Herr Dr. Karl Ruß in Steglitz bei Berlin, Albrechtstraße 115, hat sich erboten, Loose gegen freie Einsendung des Betrages abzugeben.

Der Vorstand des Vereins für Vogelschutz und Geflügelzucht in Usingen.

J. A.: Schneider.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Praxis der Naturgeschichte.

In meinem erweiterten Atelier können noch einige Schüler, welche sich als Sammler oder Konservatoren ausbilden wollen, in allen Zweigen der Praeparation und plastischen Darstellung hinlängliche Beschäftigung und Belehrung finden. Bedingungen brieflich. — Stuttgart im April 1874.

L. Martin,
231] Neckar-Straße 66.

Ein Jamaika-Papagei, zahm und einige Worte sprechend, ist für 10 Thaler zu verkaufen. — Offerten befördert die Expedition. [232

Siebente
Geflügel- und Vögel-Ausstellung
in **Frankfurt a./Main**
vom 22. bis 27. April
in der Lederhalle.

Anmeldungen bei Herrn G. Andreas, Rebstock 5. Schluß derselben bis zum 18. April.

Einsendungen unter der Adresse: Ausstellungs-Komité in der Lederhalle, spätestens bis zum 21. April.

Prospekte und Anmeldeformulare werden den bekannten Vereinen in Kürze zugesendet. [233

Der Vorstand.

Abzugeben 1 Stamm **guter Harzer Roller,** 1 M. 3 W. Preis 6 Thlr. **Otto Wigand,** Zeitz. [234

Eine Kalanderlerche ist à 3 Thlr. oder noch lieber gegen Austausch mit Zierfinken sofort abzulassen. **Jesniher,**
235] Zanow, Pommern.

Zu verkaufen: 2 P. nistfähige Nymphen, 1 P. nistfähige Wellensittiche.

Gesucht eine gut singende Spottdrossel.

236] **O. Ohlendorf** in Lingen, Prov. Hannover,

---

200 Stück gut schlagende Andreasberger Kanarienvögel sowie hiesige und ausländische Vögel, Vögel-Gebauer, Nester für Kanarienvögel und ausländische Vögel bei

237] **C. Wenisch,**
Breslau, Hinterhäuser Nr. 10.

Eine gut und fleißig singende Amerik. Spottdrossel, zahm und kerngesund ist zu dem sehr mäßigen aber festen Preis von 12 Thlr. 15 Ngl. inclusive Versandtkäfig abzugeben durch
238] **A. Huhle,** Buchhändler in Dresden.

Nachtigalen, ganz vorzügliche Sänger, Schwarzplättchen, unermüdliche Sänger, dabei ein Explr. der exquisitesten Sorte mit den herrlichsten Variationen, hat zu vergeben [239

Friedr. Kieser, Karlstadt a. M.

Fasanen-Bruteier 1000—2000 Stück
werden bis Mitte Mai zu kaufen gesucht und nimmt Offerten entgegen **C. Schuerholz** in Hildburghausen. [240

Auf brutfähige Silber-Bantam-Hühner-Eier, sowie auf Stämme diesjähriger Zucht dieser Hühner-Rasse nimmt noch einige Bestellungen an. **H. Schultze,** Putbus. [241

Franz. Lapins, nur **echt** importirte Racen in Original-Zuchtthieren, als: Beliers, de garenne, argentes, clapiers und domestique, billigst unter Garantie liefert das Export- u. Importgeschäft **C. Schürholz,** Hildburghausen. [242

Die
„Gefiederte Welt",
herausgegeben
von **Dr. Karl Ruß.**
Jahrgang I. & II. (1872|73).
243] Preis à Thlr. 2 — broch.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Steglitz bei Berlin, Albrechtstraße 115 durch die Post oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Bernau.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 23. April 1874. Nr. 17.

Inhalt:

Die Vogelsprache im Volksmunde. —
Ueber das Nisten der Zwergpagageien (Schluß). —
Vogelkrankheiten: Blasiger Kropf; Krämpfe bei kleinen Vögeln. —
Noch einmal über das häufige Sterben der Harzer Kanarienvögel (Fortsetzung.) —
Aus den Vereinen: Stettin. —
Anzeigen. —

Die Vogelsprache im Volksmunde.

Mitgetheilt von W. Frenzel.

Das muß was recht Gescheidtes sein,
Was sich die Vögel sagen.
E. Taubert.

Nicht will ich im Nachfolgenden reden von der Vogelsprache der Märchen, die jedenfalls Allen, mindestens wol aus Hauff's „Khalif Storch", bekannt ist und dort seiner Zeit auch uns wol ein herzliches Lachen abgenöthigt hat; nicht auch von der Vogelsprache und Vogelweisheit der Fabeln, die zuweilen altklug und unweise ist; ebensowenig auch von der Sprache und dem Schwatzen der Papageien und Stare, sondern von der Vogelsprache, die noch heute in unsern Wiesen und Wäldern, Gärten und Feldern erschallt und die der Volks- und Mutterwitz oder die aufmerksame Beachtung und gefühlvolle Naturbetrachtung sinnig gedeutet hat. Von den vielgerühmten Polyglotten (Spöttern) und oft genannten Sängern der fremden Länder hat schon Mancher gehört und sie vielleicht mehr bewundert, als sie eigentlich verdienen. Die Spottdrossel Nordamerika's, der Sariama und Glockenspieler Brasiliens, der Organist Peru's, der Miro Java's, der Flötenvogel Australiens und alle Sänger der Tropen stehen weit zurück gegen Fink, Sprosser und Nachtigal der sängerreicheren gemäßigten Zone*). Daß in der That die Sprache der Vögel nicht blos von Menschen gedeutet, sondern auch von andern Thieren mehr oder weniger verstanden wird, hat schon mancher Reisende oder Jäger zu seinem nicht geringen Verdruß und Leidwesen erfahren müssen. Ganz abgesehen von den Lock- und Angstrufen der Vögel ist es erwiesen, daß Elster, Heher, Amsel u. a. Fuchs und Reh warnen, daß der Nashorn- und Bienenvogel Afrika's die größeren Thiere auf Gefahren aufmerksam machen, wie Baker, Dr. Livingstone u. A. in ihren Reisewerken auffallende Beispiele darüber mittheilen; ebenso thun es auch die Höhlen-Eulen Amerika's, und auch vom heiligen Ibis geht die Sage, daß er der Wächter des Krokodiles sei. Erwähnt sei auch noch, daß die natürliche Sprache und der Gesang der Vögel, wenigstens bei den talentvolleren, auch einer Vervollkommnung und gewissen Kunstbildung fähig ist, und ich will, abgesehen von der Nachahmung guter Vorsänger, zum Beweise nur an diejenigen Sänger erinnern, die selbst schwierige Choralmelodieen und Arien erlernen und sicher vortragen, wenn sie später auch eine zufällig gehörte Leierkastenstrophe als Zwischenmusik einlegen; ferner an die Schwarzamsel Dumareau de la Malte's, die er in seiner Haft während der ersten französischen Revolution die Marseillaise gelehrt, und der sie später in der Freiheit fast alle Amseln des Departements auf Jahre hindurch nachgesungen haben, oder an die-

*) Dies ist jedoch eine irrige, entschieden widerlegte Meinung. D. R.

jenigen von Sanssouci mit ihrem Dessauer Marsch, oder endlich an den lachlustigen, leider zu früh verstorbenen Flötenvogel des Berliner Aquarium mit seiner patriotischen Fahnenwacht von Lindpaintner.

Ich lasse im Nachfolgenden eine kleine Blumenlese von Nachahmungen und Deutungen des Vogelgesanges, -Schlages und -Rufes folgen, wie ich sie seit vielen Jahren aus verschiedenen Werken, Journalen, einzelnen zerstreuten Aufsätzen und dem Munde des Volkes gesammelt habe*).

Wenn ich zunächst im Hause beginne, so ist es vor Allen der Hahn, der uns mit seinem Kikeriki entgegentritt. Sobald er in früher Morgenstunde Knechte und Mägde aus süßem Schlummer weckt, so verstehen diese: „'s ist noch zu früh!" Wenn er dagegen vorwitzig durch die Thür ins Haus oder gar in die Küche geschaut hat, schwingt er sich eilends auf eine Wand oder auf den Zaun und ruft aus vollem Halse: „Uns'e Mutter kocht drö Röhn!" oder je nach Befund „Moröhn, Koröhn" (weiße Rüben, Morrüben, Kohlrüben oder Wruken). Oder wenn er einmal neugierig den Nachbarhof betreten und Alles in Augenschein genommen hat, dann verkündet er heimkehrend seinen fragenden Hennen: „Luter riek Lüd'!" (Lauter reiche Leute!). Oder wenn er als Wetterprophet den höchsten Pfahl oder die Zinne des Daches besteigt und Umschau hält in die Lande, oder wenn Abends spät ihm noch seine Sehergabe die Zukunft offenbart, dann ruft er siegesgewiß und selbstbewußt: „'s gibt morgen Räng!" (Es gibt morgen Regen!) Wenn er dagegen vertrieben und verjagt wird von verbotenem Gebiet, oder wenn Zank und Aufruhr unter seinem Volke ausgebrochen, oder ein Feind eingedrungen ist, dann ruft er mit Stentorstimme dazwischen: „Zackerlot, schlagt se dot!" — Auch das häusliche Huhn; es ist nur selten immer still und schweigsam; wenn es ein Ei gelegt und das Ereigniß oder das Nest verbergen möchte, ruft es rathlos durch den Hühnerhof: „Ka-ka-kakeleät! Wat, wat, wat is denn da tu duhn?" (Was ist denn da zu thun?)

Von den Hühnern sind meistens die geschäftigen Enten nicht weit; sie schnattern den ganzen Tag: „Pracherwerk! Pracherwerk!" oder berathen als echte Repräsentanten der Klatschzungen in einem unentwirrbaren Rot- oder Kauderwelsch alle Neuigkeiten, die ihnen mit gellendem „Pak! Pak! Rat! Wat!" eine Alte zuträgt. „Saldoat'n koam!" (Soldaten kommen) läßt sie der Volkswitz in der Mistpfütze schnattern, und darauf den aus seinem Mittagsschlaf dadurch aufgeweckten Hofhund fragen: „Wo? Wo?" — „Da! Da!" rufen sie aus vollem Halse, und hastig ruft die buckelmachende Katze dazwischen: „Von Bernau! Von Bernau!", und auch der Hahn gibt hier noch schließlich seinen Senf dazu, indem er rathgebend dazwischen ruft: „Zackerlot, schlagt se dot!"

*) Die an sich zwar sehr schönen Nachahmungen der Vogelstimmen in F. Reuters Werken sind hier als zu fern liegend unberücksichtigt geblieben.

Enten*) aber sind selten allein; es leisten ihnen im Schnattern die Gänse hülfreich Gesellschaft. Da bleibt Nichts undurchgehechelt. Was das Lied sagt von den Klatschzungen: „Sie tragens zur Base und zur Frau Gevattern, bis daß es die Gänsʼ auf dem Markte beschnattern, bis daß es der Entrich beräth auf dem See, der Kuckuk im Walde!" — das gilt auch von ihrer redseligen Gesellschaft. Und beinahe wie Ironie klingt es, wenn vom hohen Dachfirst herab der sich weit über sie erhaben dünkende Storch klappernd seine Brocken dazwischen wirft, fast als wüßte er die Weisheitsregel der Menschen: Klappern gehört zum Handwerk.

Anders benimmt sich dieser saubern Gesellschaft gegenüber die Schwalbe. Sich auch mehr oder weniger zum Hause zählend und sich daher einen näheren Einblick in dasselbe erlaubend, kann sie vor Verwunderung gar nicht darüber hinwegkommen, wie sie nach ihrer Rückkehr im Frühlinge Alles so verändert gefunden hat. Kopfschüttelnd wiederholt sie immer und immer wieder:

„Als ich fortfuhr,
war'n Kist'n und Kast'n voll;
als ich wiederkam,
war Alles leer.
Schipp-schurr!"

(Vergl. auch Rückert's Gedicht: Aus der Jugendzeit). Nur zuweilen ruft sie mit gellender Stimme ganz entrüstet über die Unordentlichkeit ihrer Schwester, der Rauchschwalbe, durch die Lüfte:

„Wenn se morrijens ut'n Schoarschteen kommt,
het se Zodd'ln an Kopp,
Kluntern an Rock,
Roam inne O'n,
ach herrejee!"

(Wenn sie des Morgens aus dem Schornstein kommt, hat sie Zotteln am Kopf, Fetzen und Schmutzklumpen am Rock, Ruß in den Augen). Bei Colmar soll sie sogar ihre Glossen über die Frauen machen und sehr indiskret rufen:

„Die Wiwere die rätsche-n-unn bätsche,
unn wenn sie heim kumme-n,
isch niene ke fünkele fir".

Ja in Spanien soll sie sogar schon leichtsinnig geworden sein und lustig in die Welt hineinsingen:

„Iß und trink,
borg das Geld;
doch sei flink,
eh' man dich hält,
und flieh, flieh, flieh,
Beatriiiiz!"

Wie dem auch sei, unsere deutsche Schwalbe ist ein so leichtfertiger und leichtsinniger Vogel noch nicht

*) In Bauernfeld's Gedicht „Die Reichsversammlung der Thiere treten die Enten als Hofdamen auf und schnattern untereinander:

Anstand! Nur Anstand!
Feiner Anstand
Ist kein leerer Tand,
Wir Hofdamen
Erscheinen mit Anstand
Und mit dem Hauskreuzordensband.
Anstand! Nur Anstand!
Feiner Anstand ist kein Tand.
Nur Anstand!

geworden; sie ist allem Gemeinen noch fern: ja sie scheint auch mit großer Anhänglichkeit ihr Vaterland und ihr stilles Heim zu lieben und nur mit schwerem Herzen sich zur Abreise zu rüsten. Wehmüthig ruft sie dann ihr „Witt, witt, witt!" durch die Lüfte, bis endlich die älteren und erfahrenen mit fortwährendem „Witt, witt, witt! Komm mit, mit, mit!" die jüngeren zum Aufbruch nöthigen.

Ganz anders und unbekümmert um Alles um sie her Vorgehende benehmen sich die Täubchen. Sie unterhalten sich nur im leisen Flüstertone, und der Täuberich umkreist seine Auserkorene girrend mit der lauten Versicherung: „Ich bin dir gut, gut, gut!"

(Schluß folgt).

Ueber das Nisten der Zwergpapageien.

Vom Herausgeber.

(Schluß).

Abgesehen von den im Eingange dieser Darstellung gerügten Uebelständen gehören alle vier Zwergpapageien, welche in den Handel gelangen, doch zweifellos zu den mit Recht beliebtesten aller Stubenvögel. Für diese Behauptung seien mir einige Beweise beizubringen gestattet.

Der Sperlingspapagei ist nicht allein schön, sondern auch interessant in seinem Wesen. Wer die Gelegenheit findet, ein Pärchen während des Nistens zu beobachten, wird dieser Behauptung zweifellos zustimmen. Freilich dürfen es nicht die Sperlingspapageien oder Inseparables sein, welche im engen Käfige scheu und verängstigt Stunden und Tage hindurch regungslos dasitzen, mit Angst und Zagen nach dem Futter hinabkriechen und bei jeder menschlichen Annäherung wie toll und unsinnig im Käfige umhertoben. Von solchen Vögeln kann man von vornherein kein richtiges Bild gewinnen und sie dürfen weder als ein Schmuck der Häuslichkeit noch als ein erfreuender Gegenstand der Liebhaberei betrachtet werden.

Gelingt es dem Vogelliebhaber dagegen, einem Pärchen Zwergpapageien einen Raum zu bieten — gleichviel sei es eine Vogelstube oder ein geräumiger und zweckmäßig eingerichteter Käfig — in welchem sie sich heimisch und behaglich fühlen, so wird man sowol an den Sperlingspapageien als auch an jeder der übrigen drei Arten viel Vergnügen und Freude erleben.

Die Sperlingspapageien entfalten dann ein ganz regelmäßig geordnetes, keinenfalls uninteressantes tägliches Leben und schreiten unter günstigen Verhältnissen in den meisten Fällen zur erfolgreichen Brut. Da diese bereits bei recht vielen Vogelzüchtern glücklich von Statten gegangen ist, so brauche ich sie hier nicht weiter zu schildern.

Ein Pärchen Unzertrennliche hält man selbst im geräumigen und auf das zweckmäßigste eingerichteten Käfige fast regelmäßig für nichts weniger als anmuthige und liebenswürdige Geschöpfe. So schön das Vögelchen an und für sich wirklich ist, so langweilig, ja geradezu stumpfsinnig können sie dem Besitzer erscheinen, und dies liegt einzig und allein an ihrer Scheu und Aengstlichkeit, welche sie freilich nur außerordentlich schwierig ablegen, so daß es zuweilen wol jahrelang dauert, bis sie sich völlig eingewöhnen, ruhig, zutraulich oder doch dreist werden und dann erst nisten. In der Weise, daß ich ein Pärchen Unzertrennliche in einem zweckmäßig eingerichteten Käfige Jahr und Tag hielt, habe ich diese Vögel erst recht kennen gelernt. Sie zeigen sich dann nicht allein schöner als die Sperlingspapageien und nicht minder schön als die beiden andern Arten, sondern sie entfalten auch ein liebliches und angenehmes Wesen. Das Männchen trippelt tanzend vor dem Weibchen hin und her, indem es den bunten Schwanz fächerartig ausbreitet, den Kopf dreht und wendet und dabei sehr eifrig sein anmuthiges Geplauder erschallen läßt. Dann ist er keineswegs ein „stumpfsinniges Vieh", wie ein Schriftsteller ihn zu bezeichnen beliebt, sondern ein wirklich reizender, in seinem Wesen anmuthiger, wenn auch freilich sehr zarter Vogel.

Die Brut geht dann fast regelmäßig von Statten und zwar in der Weise, daß das Weibchen einfach auf den Sägespähnen eines nicht zu tiefen Nistkastens drei bis vier Eier legt, sie auch eifrig bebrütet, wobei es von dem Männchen in liebevollster Weise gefüttert wird. Immer sind die Eier aber entweder taub oder die Jungen sterben sogleich nach dem Ausschlüpfen. Niemals haben es diese Vögel bei mir weiter gebracht, obwol ich Jahr für Jahr Züchtungsversuche mit ihnen angestellt und diese auch jetzt noch fortwährend fortsetze. Im Interesse der Vogelzucht und Wissenschaft Ornithologie zugleich seien hierzu auch andere Züchter dringend angeregt.

Mit den Rosenpapageien habe ich in der ersten Zeit, wie dies wol meistens der Fall zu sein pflegt, mancherlei Pech gehabt. Das erste Pärchen, welches mir die Direktion des Berliner Aquarium auf sechs Monate für den Zweck der Züchtung geliehen hatte, hielt ich in einem geräumigen Käfige. Die Vögel zeigten sich jedoch einerseits so sehr stürmisch und andererseits so fabelhaft scheu, daß ich wenig Freude an ihnen erlebte. So lange ich in der Vogelstube weilte, blieben sie im Nistkasten und selbst wenn ich stundenlang ruhig mich verhielt, lugten sie nur vorsichtig hervor und schlüpften bei jedem Geräusch schleunigst wieder in die Tiefe zurück. Glaubten sie sich sicher, so tobten sie förmlich mit durchdringend schrillen und anhaltendem Geschrei im Käfige umher. Wehe jedem Vogel, der sich in ihrer Nähe auf das Drahtgitter niederließ; ihm wurde sofort der Fuß zerbissen und ich habe in jener Zeit sehr empfindliche Verluste gehabt. Trotz ihrer Wildheit nisteten die Vögel dennoch; da ich aber ihre Sitten nicht kannte, so hatte ich ihnen kein entsprechendes Nistmaterial geboten. Bei der Zurückgabe an das Aquarium fand ich in dem Nistkasten die Sägespähne durch Unrath in häßlichen Schmutz verwandelt und in demselben eine Anzahl verdorbener und zerbrochener Eier.

Nach mehreren Jahren erhielt ich sodann wieder ein Pärchen Rosenpapageien durch Herrn Karl Gudera in Leipzig und späterhin zwei Paar von Herrn Chs. Jamrach in London. Das erstere

Pärchen waren ungemein kräftige und große, und garnicht scheue Vögel. Sie hatten sich bald in dem geräumigen Käfige eingewöhnt und entfalteten nun ihre ganze Lebhaftigkeit, ohne jedoch so stürmisch und unbändig zu sein, als die ersten. Sie begannen dann sogleich eine Brut und ich fand nun reichlich die Gelegenheit, den wunderlichen Nestbau dieser Vögel zu beobachten. Zunächst will ich jedoch den weiteren Verlauf meiner Züchtung beschreiben.

Nachdem die erste Brut im besten Gange war, bemerkte ich, daß der zweite Rosenpapagei, den ich für das Männchen gehalten, in einen andern im Käfige befindlichen Nistkasten schlüpfte und auch Spähne eintrug. Ich sah nach und fand in diesem zweiten Kasten ebenfalls drei Eier, während im ersten fünf Eier vorhanden waren. Mein herrliches Pärchen Rosenpapageien waren also zwei Weibchen. Das Glück begünstigte mich nun aber dahin, daß ich von Herrn Vekemans in Antwerpen noch einen dritten Rosenpapagei erhielt, freilich ohne sichere Gewähr, ob Männchen oder Weibchen. Der Ankömmling war beträchtlich kleiner und keineswegs lebhafter gefärbt, als die beiden andern. Als ich ihn aus dem Versandtkasten in den Käfig fliegen ließ, entwickelte sich eine hübsche Scene. Die beiden Weibchen saßen von einander entfernt und das Männchen hüpfte hinein, so daß es in die Nähe des einen Weibchens sich setzte. Dies Weibchen sah den Ankömmling starr an, jedoch ohne sich zu rühren; plötzlich aber schwirrte das andere herzu, trieb dieses mit einem Schnabelhiebe davon, setzte sich dicht neben den Ankömmling, welcher durch Füttern aus dem Kropfe augenblicklich seine Liebesbezeigungen begann. Da die Vögel im Uebrigen alle drei mit einander friedlich lebten, so ließ ich sie beisammen und hatte bald die Freude, daß das eine Weibchen wieder auf fünf und das andere auf drei Eiern brütete. Während die beiden Weibchen dabei aber ganz friedlich beisammen lebten und ich die beste Hoffnung hegen durfte, daß mein gefiederter Graf Gleichen mit einer zahlreichen Nachkommenschaft mich erfreuen werde, fingen eines Tags die beiden Weibchen plötzlich Fehde an und verließen dann sogleich die Nester. Ich fand in den Eiern des ersten Weibchens vollkommen zum Ausschlüpfen reife und in denen des zweiten mehr als halbentwickelte Junge. Jetzt fing ich das zweite Weibchen heraus. Als das Pärchen aber nach einer Pause wiederum nistete, hatten sie abermals Unglück, denn ich mußte leider die Wohnung wechseln, gerade als das eine ausgebrütete Junge etwa halb flügge war. Während der Unruhe und Störungen, welche das Einreißen und Abbrechen der Nistgelegenheiten in der Vogelstube verursachte, ließen die Alten das Junge umkommen. Auch späterhin in der neuen Vogelstube folgte noch eine Fehlbrut, dann aber zogen sie drei Junge auf und nach abermals zwei Fehlbruten noch einmal glücklich zwei Junge. Ich glaube nun also das Nisten dieser Vögel in ausreichender Weise beobachtet zu haben.

Die Rosenpapageien zerschleißen nicht allein allerlei weiche und zähe Holzarten, sondern auch mancherlei andere Stoffe. So bot ich ihnen starke Strohhalme und Gräser und dergleichen. Von allem Holz wählten sie am liebsten die trockenen leichten Spähne von hölzernen Schachteln, z. B. solchen, in denen Kinderspielzeug verkauft wird. Diese zerschleißen sie in großen Massen und tragen die feinen Spähne in der Weise zu Nest, daß sie jedesmal einige solche bis zwei Zoll langen Splisse hintenüber zwischen die Federn des Unterrückens und Bürzels stecken, dann im schnurrendem Fluge auf und zum Neste fliegen und hurtig in dasselbe hineinschlüpfen. Diese Arbeit verrichtet jedoch nur das Weibchen, während das Männchen nur das Holz zerschleißen hilft und das Weibchen jedesmal auf dem Fluge zum Nistkasten begleitet, auch mit hineinschlüpft. Wie weit es sich aber drinnen an der Herstellung des Nestes betheiligt, vermag ich nicht anzugeben Die Arbeit wird unter häufigem schrillen Geschrei, welches bei jeder Störung sehr unangenehm gellend erschallt, verrichtet und währt von früh morgens bis Nachmittags je nach der Jahreszeit um vier bis sechs Uhr fast ununterbrochen fort, so daß sie nur inzwischen von Zeit zu Zeit zum Futter eilen. Sonderbar erscheint es, daß von den Spähnen, welche das Weibchen sich einsteckt, die meisten immer wieder auf den Boden herabfallen und daß also eine staunenswerthe Rastlosigkeit dazu gehört, bis ein Nistkasten, namentlich wenn es ein hoher Schleusinger ist, zur Hälfte, zuweilen sogar bis zu Zweidrittel mit dem losen Nistmaterial angefüllt wird. Uebrigens ist die Erklärung, daß dieser Papagei die Splisse deshalb zwischen die Federn stecke, weil er den Schnabel zum Klettern braucht, keineswegs richtig, denn die Vögel fliegen beide, unter lebhaftem Geschrei, unmittelbar vom Boden des Käfigs bis auf die Anflugstange des Nistkastens und schlüpfen hurtig hinein, ohne den Schnabel hierbei im Geringsten zu gebrauchen. Ebenso ist die Bezeichnung des „Huckepacktragens" der Spähne, wie in dem „Führer" des Berliner Aquarium angegeben, eine durchaus unglücklich gewählte, denn beim Huckepacktragen denkt man doch jedenfalls an eine schwere Last, welche auf den Schultern, bezüglich dem Rücken ruhen muß. Wozu also durch solche unglücklich gewählten Bilder die Vorstellung verwirren und irreleiten! Niemals sah ich das Männchen auch einen Spahn sich einstecken und tragen; dagegen füttert es während der 20—22 Tage währenden Brut das Weibchen, so sorgsam, daß dieses am Tage nur ein- bis zweimal auf ganz kurze Frist vom Neste kommt. Die Jungen werden natürlich von beiden gemeinsam gefüttert. Wer übrigens das Glück hat, ein Pärchen dieser Zwergpapageien (nachdem er sie überhaupt erhalten, denn sie sind sehr schwierig zu erlangen) in geeigneter Weise mit Glück zu züchten, für den können sie ungemein einträglich werden, denn sie entwickeln eine fabelhafte Fruchtbarkeit. Ein einzelnes mannloses Weibchen bei Herrn Mineralwasser-Fabrik-Besitzer Struve in Dresden legte in kurzer Zeit hintereinander gegen zwanzig Eier. Dabei biß dieser Vogel jedes zu ihm gebrachte Männchen naheverwandter Arten, Inseparable und Sperlingspapagei, in einigen Tagen regelmäßig todt. Mit diesen Mittheilungen über den Rosenpapagei muß ich mich vorläufig be-

gnügen, indem ich darauf hinweise, daß ich die ausführlichen Lebensbilder aller dieser Zwergpapageien nebst ihren farbigen Abbildungen demnächst in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" bringe.

Der grauköpfige Zwergpapagei nistet ebenso leicht unter günstigen Umständen, als der Rosenpapagei und der Sperlingspapagei. Die ersten beiden Pärchen erhielt ich ebenfalls von Herrn Gudera in Leipzig zu damals noch recht hohen Preisen; dann folgte eine größere Anzahl von Herrn Hieronymi in Braunschweig, so daß ich alle mir befreundeten Vogelzüchter mit denselben versorgen konnte. Meine beiden Pärchen waren anfangs recht scheu, wurden aber in sehr kurzer Zeit so ruhig und dreist, daß sie trotz meiner Anwesenheit in der Vogelstube ungestört ihren Verrichtungen nachgingen. Der Grauкopf ist zweifellos der lieblichste und liebenswürdigste aller dieser Zwergpapageien und ich komme wol späterhin auf eine Schilderung seines Wesens hier noch einmal zurück.

Bereits nach drei Wochen begann das eine Pärchen zu nisten. Sie wählten einen tiefen Schleusinger Nistkasten und wurden jetzt wieder ungemein scheu und ängstlich. Wenn Jemand in der Vogelstube war, saßen sie auf den höchsten und hintersten Zweigen oder das Weibchen flüchtete und fiel förmlich in den Nistkasten. Nun beobachtete ich durch die Thürspalte und bemerkte bald, daß das Weibchen, immer vom Männchen begleitet, in den trockenen Blättern eines Birkenbusches und eben solchen Nadeln der Kiefernzweige sich zu schaffen machte — und zwar, um von denselben, ganz in der Weise der Rosenpapageien zu Neste zu tragen. Meine Ueberraschung war groß, um so mehr, als diesen eigenthümlichen Nestbau doch weder die Sperlingspapageien noch die Inseparables zeigen.

Die Brut der Grauköpfchen ging verloren und zwar in sehr ärgerlicher Weise. Unterhalb des Nistkastens hatte nämlich ein Paar Oryx-Weber ein Nest mit Eiern und das Männchen war so sehr aufgeregt, daß es jeden nahenden Vogel hastig verfolgte. In diesen Tagen mußte ich leider schleunigst verreisen, sonst hätte ich den Oryx herausgefangen. Als ich zurückkehrte, hatte der Weber das Grauköpfchen so lange gejagt und vom Futter vertrieben, bis es todt am Boden lag. Die Untersuchung des Nestes ergab drei stark angebrütete Eier in einem Nest aus zerschlissenen Kiefernadeln und Blätterstückchen.

Das zweite Pärchen nistete in geraumer Zeit garnicht. Dann nach vier Fehlbruten erbrüteten sie mit bestem Erfolg doch noch drei Junge. Sonderbarerweise habe ich bei diesem Paar in all' den Bruten niemals die geringste Spur von Nestbau bemerken können. Ich denke mir dies Verhältniß aber in der Weise, daß nämlich das Weibchen dieses letzteren, wie das übrigens leider bei den meisten Pärchen der Fall ist, so fabelhaft ängstlich war, daß es, trotz des Nisteifers zur Herstellung seiner naturgemäßen Brutstätte nicht gelangen konnte. Deßhalb sind auch die meisten Bruten dieser Zwergpapageien vergeblich, weil sie in ihrer fabelhaften Scheu und Aengstlichkeit regelmäßig bei der Begattung gestört werden. Namentlich ältere Pärchen sind so unglaublich scheu, daß sie selbst freifliegend in der Vogelstube bei jedem Nahen ihr krächzendes Angstgeschrei erschallen lassen und dies wol Monate hindurch beibehalten. Sobald sie aber dreister geworden, sind sie auch desto lieblicher.

In der letzteren Zeit hat Fräulein Hagenbeck die Grauköpfchen in solcher großen Zahl eingeführt, daß sie beinahe auf die Hälfte des früheren Preises herabgegangen sind. Leider giebt es aber vielmehr Männchen als Weibchen, so daß letztere verhältnißmäßig theuer sind. Daher ist es um so angenehmer, daß die Männchen auch sehr gut mit Sperlingspapageien-Weibchen sich paaren. In meiner Vogelstube nistet jetzt auch ein solches Pärchen.

Vogelkrankheiten.

Bei einer Wellensittichbrut habe ich eine eigenthümliche Krankheitserscheinung beobachtet, die ich in Nachstehendem kurz angebe. Die Brut, aus 6 Köpfen bestehend, ist von der Mutter arg gerupft worden, sodaß ich diese letztere schließlich entfernte und dem Vater die Aufzucht der Jungen allein überließ. Als die Jungen halbflügge waren, bemerkte ich bei dem einen eine Geschwulst des Kropfes an jeder Seite des Halses von der Größe einer Bohne; jetzt wo die Jungen flügge sind und den Brutkasten verlassen haben, ist der ganze Kropf unnatürlich aufgeschwollen und von der Größe einer Zwetsche. Das Thierchen leidet an Athmungsbeschwerden, wird aber von dem Alten ebenso wie die andern Jungen gefüttert und nimmt auch an Größe zu. Die Geschwulst ist größtentheils unbefiedert, durchscheinend und gleicht in ihrem Aussehen einer Fischblase; die gefütterten Körner sieht man deutlich. Die übrigen Jungen sind ganz gesund. Welches mag nun die Ursache dieser übernatürlichen Anschwellung des Kropfes sein? Jedenfalls rührt sie von eingedrungener Luft her, diese kann aber von dem Thierchen nicht wieder entfernt werden. Vielleicht hat der Herr Redakteur oder einer der Leser ein ähnliches Vorkommniß beobachtet und ist so freundlich, dasselbe mitzutheilen.

W. Bischkopff in Wiesbaden.

(Sie dürfen den blasigen Kropf mit einer feinen Nadel dreist aufstechen und die angesammelte Luft hinauslassen. Ein ebenso erkrankter junger Prachtfink in meiner Vogelstube wurde durch diese Operation völlig hergestellt und ist jetzt nach 1/2 Jahr gesund und kräftig. D. H.).

Krämpfe bei kleinen Vögeln.

Ein großer Theil aller Erkrankungsfälle rührt bei den fremdländischen Vögeln von Erkältungen her, welche namentlich dann häufig auftreten, wenn es diesen, an Licht und Sonne gewöhnten Westen in ihren, theilweise oft sehr dunklen Käfigen, gänzlich deren

gebricht. Diese anfänglich oft langsam auftretende Krankheit, wird nicht selten chronisch und wird durch Zugluft in höchstem Grade gesteigert. Vögel welche nur in geringem Grade von Krämpfen befallen sind, werden oft nur theilweise gelähmt, wie durch Aufhören des Flugvermögens, wobei sie jedesmal herabfallen wenn sie zu fliegen versuchen. Eine fernere Erscheinung sind Krämpfe in den Beinen oder blos in den Zehen, wobei diese aufgehoben oder die Zehen fortwährend mit dem Schnabel beknabbert werden. Greifen die Krämpfe noch weiter um sich, so fallen die Vögel öfter von den Aesten oder Stangen herunter, bleiben vorübergehend liegen und helfen sich später so gut es gehen will wieder auf. Der höchste Grad der Krämpfe tritt ein, wenn der übrige Körper davon befallen wird, wobei solche Vögel gänzlich unbehilflich am Boden liegen und meistens auf dem Rücken liegen bleiben, welcher Zustand sogar mehrere Tage andauern kann. Der Körper eines solchen Vogels wird alsdann sichtbar stark erschüttert und können die Krämpfe sogar das arme Thier hin und her werfen. Vorzüglich sind die Wellensittiche zu solchen Krampferscheinungen geneigt, doch habe ich auch viele andere Vögel davon befallen gefunden und will hier in Kürze meine desfallsigen Erfahrungen mittheilen.

Man ist in der Regel so gern geneigt, seine Zuflucht zum Quecksilber zu nehmen, giebt Oel oder sonst andere Dinge ein, welche alle nichts helfen, die armen Thiere werden geplagt und geplagt und sterben endlich trotz aller Medikamente. Hier ist mit nichts Anderem zu helfen, als mit Wärme. — So lange noch die Beine und Flügel von den Krämpfen allein befallen sind, ist eine täglich mehrstündige Sonnenwärme an einem geschlossenen Fenster, bei nach der Stubenseite verhängten Käfig, und laues Wasser zum Baden, vollkommen ausreichend zu einer wirksamen Kur. Ist dagegen das Uebel bereits bis zur vollständigen Lähmung der Beine vorgeschritten, so hülle man den Kranken bis auf den Kopf in ein weiches Tuch und lege ihn mit demselben auf erwärmten trocknen Sand in eine Cigarrenkiste, die man von unten mit Spiritusfeuer zeitweise erwärmt. Nach einigen Stunden suche man den kranken Vogel mit Milchsemmel oder auch anderem Futter zu stärken, was er in der Regel gern annehmen wird. Auf diesem fortwährend und über Nacht durch einen heißen Ziegel oder Stein erwärmten Sand lasse man denselben so lange liegen, bis er Anstrengungen macht, sich aus dieser Hülle zu befreien. Ich habe auf diese Weise Vögel, welche schon einige Tage lang auf dem Boden lagen und bereits so schwach geworden waren, daß sie beständig die Augen fast zuschlossen, binnen zwei Tagen vollständig geheilt. Das Auffälligste betraf jedoch ein Wellensittich-Weibchen, welches seit Monaten völlig flügellahm gewesen und mir endlich gebracht wurde, als es mit geschlossenen Augen regungslos am Boden lag. Mit wenig Hoffnung, aber mit genauster Anweisung zur Behandlung, gab ich es seinem Besitzer zurück, welcher mir einige Tage darauf die erfreuende Mittheilung machte, daß am zweiten Tage nach dieser Kur, der Vogel nicht nur lebe sondern sogar sein Flugvermögen wieder erlangt habe.

Martin.

Noch einmal über das häufige Sterben der jungen Harzer Kanarienvögel.

Von W. Böcker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

An Krämpfen geht ein Harzer Kanarienvogel in der Regel nicht zu Grunde, dagegen giebt es allerdings in dieser Rasse eine erbliche Krankheit, die Lungenschwindsucht und ihre Ursache finde ich mit dem Herrn Verfasser des oben erwähnten Artikels in der mangelhaften Lüftung der Stuben, wie sie bei den Züchtern des Harzes allgemein üblich ist, ferner in der fortgesetzten Inzucht, wie sie dort betrieben wird, obgleich ich bei gesunden Stämmen eine Inzucht nicht für absolut schädlich halte. In der Zeit der Eröffnung der Hecke nähern sich die Harzer Züchter aber dem Beginn der natürlichen Brutzeit des Kanarienvogels mehr, wie es außerhalb des Harzes geschieht. Der wilde Kanarienvogel beginnt noch Bolle mit der Paarung und dem Nestbau im März, meist in der zweiten Hälfte desselben und die Zahl der Bruten während eines Sommers beträgt in der Regel vier, mitunter auch nur drei, also ganz so wie im Harz. Allerdings lebt der Vogel in der Freiheit in Monogamie, während man im Harz, namentlich in Andreasberg, auf einen Hahn durchweg vier Weibchen — nicht blos drei — rechnet. Allein aus diesem Umstande dürfte eine Degeneration der Rasse noch nicht herzuleiten sein. Vor zu großer Abschwächung der Zuchthähne schützt sie das in reichlichem Maße dargereichte Eifutter; in einer derartig eingerichteten Hecke giebt es erfahrungsmäßig gemeiniglich weniger klare Eier, wie in solchen mit je einem Hahne und einem oder zwei Weibchen; die Zuchthähne sind gegen das Ende der Brutzeit hin noch sehr gut genährt; die meisten sind eher zu fett, wie zu mager und sie überstehen daher auch die Mauser sehr gut. Während der Zeit des Federwechselns und nachher bis zum völligen Durchschlagen der Vögel bekommt ihnen eine Wärme von 18 bis 20 Grad sehr gut, ja, sie ist sogar erforderlich, damit der Vogel seinen Gesang möglichst wenig unterbreche. Zugluft ist während dieser Zeit schädlich, nicht blos in der Harzer Rasse, sondern auch bezüglich anderer Kanarienvögel; wenn diese anscheinend weniger davon leiden, so liegt es daran, daß die Gesangesübungen der Harzer Kanarienvögel viel schwerer sind, wie diejenigen der übrigen Rassen, daher sich bei diesen leicht Heiserkeit einstellt.

(Fortsetzung folgt).

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein zu Stettin.

Sitzung vom 25. März.

In der heutigen ersten ordentlichen Generalversammlung erstatteten die Rechnungsrevisoren, die Herren Mellin und Freese, den Kassenbericht. Danach betrugen die Einnahmen vom 17. Februar bis 31. Dezember 1873 489 Thlr. 6 Sgr. 6 Pf., die Ausgaben 271 Thlr. 14 Sgr. 4 Pf. und verbleibt somit am 1. Januar 1874 der baare Kassenbestand von 218 Thlr. 22 Sgr. 2 Pf. Auf Grund des verlesenen Abschlusses wurde die beantragte Decharge ertheilt, und dem Kassirer Herr A. Gatow der Dank der Versammlung für sorgsame Kassenführung dargebracht. — Die Namen der seit der letzten Sitzung aufgenommenen 76 Mitglieder gelangen zur Kenntniß der Versammlung, ebenso die Namen der zur Aufnahme neu Vorgeschlagenen. — Durch die große Ausdehnung, die der Verein in dem ersten Jahre seines Bestehens erlangt hat und durch die dadurch bedingte Arbeitslast für die einzelnen Vorstandsmitglieder veranlaßt, hatte der Gesammtvorstand fünf Anträge eingebracht, von deren Annahme er sich eine entsprechendere Vertheilung der Geschäftsleitung verspricht, und die einer etwaigen Ueberbürdung, namentlich des 1. Vorsitzenden und des 1. Schriftführers vorbeugen sollen. Der erste dieser Anträge, eine Erweiterung des Vorstandes um je einen Vorsitzenden und einen Schriftführer, wurde mit einem Amendement des Baumeister Keßler angenommen; ebenso der zweite und dritte, betreffend die Anstellung eines besoldeten Schreibers, eines eigenen Vereinsboten und eines Inventarienverwalters. Der vierte Antrag: Der Bezug ausländischer Vögel für Vereinsmitglieder durch den Verein, rief eine längere Debatte hervor. Herr Ereutz erblickt gerade hierin einen großen Hebel für die gedeihliche Fortentwickelung des Vereins, da es nur dann möglich sei, die ornithologischen Kenntnisse für viele Mitglieder zu erweitern, und das Interesse für Vogelliebhaberei zu erwecken und zu fördern; wenn den Mitgliedern die Möglichkeit geboten werde, sich fremdländische Vögel zu billigen Preisen durch den Verein zu beschaffen, ohne Zwischenhändlern in die Hände zu fallen; ebenso verhalte es sich mit dem Geflügel, dessen Zucht in unserer Provinz noch sehr im Argen liege. Der schriftlich erörterte Antrag wird darauf ebenfalls mit großer Stimmenmehrheit angenommen. — Den letzten Gegenstand der Tagesordnung bildete die Neuwahl des Vorstandes. Gewählt wurden zum 1. Vorsitzenden Herr Ereutz, zum 2. Herr Freese, zum 3. Herr Hauptmann Boedicker, zum 1. Schriftführer Herr Prütz, zum 2. Herr Dr. Schönn, zum 3. Herr Lischke, zum Kassirer Herr Gatow, zu Beigeordneten die Herren Direktor Haßlinger, Reimer, Mellin und Bernhardt.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Die **erste**

allgemeine Geflügel-Ausstellung des Vereins Fauna in **Düsseldorf** findet während der Pfingsttage vom 23. bis 26. Mai in den Räumen der städtischen Tonhalle Statt.

Die Ausstellung, verbunden mit Verloosung, umfaßt Hühner, Enten, Tauben, Sing- und Ziervögel.

244] Der Vorstand.

Gesucht **weibl. Rothwild.** [245
F. v. Laffert-Dammeretz bei Brahlsdorf (Mecklenburg).

Hier gezogene junge Reisvögel verkauft
246] **Julius Martin** in Frankfurt a./Oder.

Zu nachstehenden Preisen verschicke unter Postvorschuß gesunde schöne Vögel incl. Verpackung:

Paradiessittich	à Paar	30 Thaler,
Bourksittich	=	30 =
Madagaskarsittich	=	21 =
Wellensittich	=	5½ =
Diamantvögel	=	7½ =
Zebrafinken	=	5½ =
Schilffinken	=	4⅔ =
grüne Kardinäle	=	11 =
graue do.	=	8 =
rothe do.	=	6½ =
Senegal-Elstern	=	11 =
Sonnenvögel	=	15 =
ganz weiße Reisvögel	=	25 =
etwas gefleckte do.	=	14 =
weiße Bengalisten	=	10 =
gelbbunte do.	=	10 =
Cordonbleus, Hartlaubszeisige, Rothkopfweber, Blutschnabelweber, Orangebecs, St. Helenafasänchen, Tigerfinken, Grauedelfinken, Elsterchen	à Paar	3 Thaler.
Silberbecs, Astrilds, Amaranth, Bandfinken, Muskatfinken, Reisvögel, Goldbrüstchen, Travailleur 2c.	à Paar	2½ Thaler.

C. Gerstен, Vogelhändler
247] Hannover.

Eine große eiserne goldbronzirte, ganz massiv gebaute, achteckige neue [248

Volière

(von der Wiener Weltausstellung), aus 4 Abtheilungen bestehend, mit allen Vorrichtungen, welche gegen Wind und Wetter und gegen das Eindringen in dieselbe schützen, mit großer Fontaine, schön geformtem Dach mit kunstvollen am Sockel und Sims angebrachten eisernen Verzierungen 2c., ist bedeutend unter dem Selbstkostenpreis für 900 Thlr. unter günstigen Zahlungsbedingungen zu verkaufen. Einsendung des Planes auf Wunsch.

Die Großhandlung exot. Vögel und Naturalien von Karl Gudera, Leipzig.

Fasanen-Bruteier 1000—2000 Stück

werden bis Mitte Mai zu kaufen gesucht und nimmt Offerten entgegen **C. Schuerholz** in Hildburghausen. [249

Franz. Lapins, nur **echt** importirte Racen in Original-Zuchtthieren, als: Beliers, de garenne, argentes, clapiers und domestique, billigst unter Garantie liefert das Export- u. Importgeschäft **C. Schürholz,** Hildburghausen. [250

„Goldfische

„pro 100 Stck. 10 Thlr. loco Triest exclusive Emballage gegen „Vorausseudung des Betrages; auch werden Bestellungen auf „Nil- u. Ganges-Krokodille, Brillenschlangen 2c. 2c. entgegen „genommen. **Carl Baudisch,** Triest. [251

Das Etablissement Chas. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London

hat folgende Thiere in den letzten Sendungen erhalten: 91 graue Papageien, 2 weißgehaubte, 14 kleine gelbhaubige, 22 Rosen-, 20 Nasen-, 15 schwefelgelbe und 4 Leadbeater-Kakadus, 460 Paar Nymphen oder Kakadillen, 1140 Paar Wellensittiche, 110 Paar vielfarbige Sittiche, 30 Paar Königssittiche, 10 Paar Paradiessittiche, 30 Paar Barnardssittiche, 60 Paar Boa-Sittiche, 1 Paar Barrabands-Sittiche, 8 Paar Rockpepler, 6 Paar gelbe Prachtsittiche (P. flaveolus), 20 Paar purpurschillernde und 8 Paar grünschillernde Glanzdrosseln, 20 Paar verschiedene afrikanische Täubchen, 72 Paar Inseparables, 5 Kanarien-Perekiten, 1 Pflaumenkopf-Sittich, 5 Flötenvögel, 2 gehäubte Hirtenstare, 76 rothe Kardinäle, 1 Paar wilde Kanarienvögel, 2 Paar Dominikaner-Wittwen, 27 Paar Diamantvögel, 40 Paar Zebrafinken, 8 Paar Kapweber, 10 Paar doppelte Napoleons, 40 Paar Muskatvögel, 50 Paar Bandfinken, 8 Paar australische Fasänchen, 5 Blauraben, 3 große rothe Arraras. Außerdem zahlreiche große Vögel, wie Ibise, Hockohühner, Javapfauen, Emus, mehrere Geyer, Schlangenadler u. a. Sodann auch verschiedene Affen, große Raubthiere, Gazellen u. a., einen indischen Elephanten u. s. w. [252

Bruteier zu verkaufen:

von Prama-Putra à 5 Sgr., Spanier à 5 Sgr., La flèche à 5 Sgr, Breda (schwarz) à 4 Sgr., Hamburger Sprengel (Alltagleger) à 4 Sgr., Hamburger Silberlack à 4 Sgr., Hamburger Goldlack à 4 Sgr., Bergische Kräher à 4 Sgr., Holländer à 4 Sgr., Paduaner (Goldlack) à 4 Sgr., Paduaner (grau) à 4 Sgr., Paduaner (gelb) à 4 Sgr., Houdan (Wanzenauer) à 5 Sgr. Sämmtliche Stämme sind zuchtfähig und mehrfach prämiirt. Verpackung als die beste bewährt und bei 12 Stück gratis. Versandt reel und prompt gegen Nachnahme, oder Posteinzahlung mit Bestellung.

253] **Johannes Nill,** zum Thiergarten, in **Stuttgart.**

Ein Jamaika-Papagei, zahm und einige Worte sprechend, ist für 10 Thaler zu verkaufen. — Offerten befördert die Expedition. [254

Angeboten mehrere Paare zuchtfähiger Wellensittiche. Gesucht eventl. in Tausch Zebra- und Bandfinken. [255
Guben, Markt 38. **Franz.**

1 Paar Dompfaffen (Mnch. u. Wbch.) 2 Thlr., 1 gute schwarze Amsel 2 Thlr., 1 Mohrenlerche (russische) 1½ Thlr., 1 türkischer Rothschwanz (Männchen) 1 Thlr. sowie 2 gute Nachtigalenhähne à 4 Thlr. empfiehlt **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

Ferner:
Sommerrübsen 6¼ Thaler, Kanariensamen 6⅔ Thlr., Hanf 5¼ Thlr., Mohn blauen 10⅓ Thlr., weißen 9⅓ Thlr., Hirse weiße 7¼ Thlr., Hirse Blut- 4¼ Thlr., Mais 5⅓ Thlr., Hafer gespaltenen 7 Thlr., Salatsamen (gutes Vogelfutter) Pfd. 4 Sgr. pro Ctr. in guter Waare empfiehlt **Rudolph Schmidt,**
256] Erfurt.

Kanarienvögel,

vorjährige Männchen wie Weibchen aus guten Rollerstämmen, erstere durchschnittlich zu 5½ Thlr., letztere zu 20 Gr., Emb. für 1—2 Vögel 8 Gr. hat noch abzugeben.
257] **A. Maschke** in St. Andreasberg.

Von 2 tadellos befiederten, gut schlagenden, an einfachstes Winterfutter gewöhnten **Nachtigalen** giebt eine ab à 6 Thlr. incl. Verpackung **G. Gösler,** Alfdorf bei Lorch,
258] (Würtemberg).

Für Züchter und Liebhaber nicht zu übersehen.

Familien-Verhältnisse halber setze ich meinen Zuchtstamm prachtvoller [259

1, 3. Spanier 2 jährig,

sofort zu Thlr. 15 — incl. Emballage dem Verkaufe aus.
Königsbronn, Würtemberg. **D. Aysslinger.**

C. Reiche in Alfeld

empfing eine frische Sendung von rothen Kardinälen, sowie Rothflügel-Starlinge, Kuhstare, Karolinen-Sittiche, Wilde Puter. [260

Die Vogelhandlung von W. Mieth,
Friedrichsstraße 68 in Berlin

hat vorräthig: Kubafinken, mehrere Arten amerikanische Drosseln, ein Paar prachtvolle Blaue Gebirgs-Lori, Tigerfinken, verschiedene Nonnen, Flammenfinken u. s. w.; besonders aber gut sprechende graue Papageien, deren einer ganze Sätze spricht und Melodien flötet. [261

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: in **Steglitz** bei Berlin, Albrechtstraße 115 durch die Post oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Bernau.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 30. April 1874. Nr. 18.

Ausland.

Inhalt:

Die Vogelsprache im Volksmunde. —
Reisvogel-Bruten. —
Verschiedene Mittheilungen aus der Vogelstube. —
Vogelkrankheiten: Ein Schnabelbruch. —
Noch einmal über das häufige Sterben der jungen Harzer Kanarienvögel (Fortsetzung). —
Briefliche Mittheilungen: Gimpel-Bastardzucht; zur Kanarienzucht. —
Anfragen und Auskunft: Schädlichkeit des Gewitters für die Kanarienzucht. —
Aus den Vereinen: Bochum; Hamburg.
Ausstellungen: Bremen. —
Ehrenbezeigungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —

Die Vogelsprache im Volksmunde.

Mitgetheilt von W. Frenzel.
(Schluß).

Von den „freien" Vögeln haben es besonders die Sänger und Schläger verstanden, die Aufmerksamkeit des Menschen auf sich zu ziehen und seine Deutung herauszufordern. Für die lieblichen Töne unserer schönsten Sängerin, der Nachtigal, die sich mit ihrem Gesange in einem Kreise von 16—24 Melodien bewegen soll, hat der menschliche Scharfsinn noch keine Worte zu finden vermocht*). Er faßt sein Urtheil über sie zusammen in die zwei Worte: „sie dichtet!" Selbst für den stärksten Schläger, die ungarische Nachtigal oder den Sprosser, hat man nur Namen für die Eigenthümlichkeiten seines Schlages, wie der David, Woyak, Papst, Doppelschaller, Jakob, Ziak, Patti u. s. w. und nur seinen Lockruf hat man in die Worte „Glock' Arr!" und eine Liedstrophe in „Zieh' a', zieh' an, David, zieh' a' Glock!" zu fassen vermocht.

Weit besser ist dieses gelungen beim Finken. Die Anzahl der Schlagverschiedenheiten, die in den einzelnen Gegenden Deutschlands oft auf ganz engem Raum sehr verschieden sind, ist eine sehr bedeutende; nachstehende Namen charakterisiren namentlich den Schlußfall seines Schlages, als da sind: der Weingesang, und zwar der gute, der schlechte, der scharfe oder gleiche Scharte, der Würzebier, und zwar der grobe und der ordinäre, Hochzeitgebühr, Hochzeitbier, Weizenbier, Gerichtsgebühr, Malvasier, Sparbazier, Musketier, Mützeviel, Bräutigam, Davidja, Zitzigall, Gickgack, Pythia oder Irewittja, Reitzeug, Reiter, Kuhdieb, Harzer-Schlag, Tambacher, Kienöl oder Ovakja, Gutjahr und zwar das gemeine, das Harzer, das tolle, der Doppelschlag, das Werre, das Klappscheid, die erste und die zweite Putzscheere ꝛc. ꝛc. Wenn er singt, ruft er laut sein helles: „Pink, pink! Fink, Fink!"; wenn er rückt, sein tiefes, „irr, trief oder prüt", und wenn er lockt, sein bittendes „jub, jub!"; wenn er dagegen eine der obigen Schlagarten erschallen läßt, so lautet sein Ruf:

„Fritz, Fritz, Fritz, willst du mit zum Wein gehn?
Fritz, Fritz, Fritz, willst du auch den Bräutigam zieren?
Ich, ich, ich, ich bin der Bräutigam.
Ich, ich, ich, ich bin der königliche Offizier.
Ich, ich, ich, ich will dir wat bescheren.
Heut, heut, heut, heut ist Danzmusik.
Morgen, morgen, morgen muß ich marschier'n ꝛc."

Täuschend ähnlich dem „Pink pink" des Buchfinken ist der einsilbige Ruf der Kohlmeise; dagegen ruft sie beim ersten milden Lenzeswehen, wenn die

*) Von Ludwig Bechstein gibt es eine Uebersetzung des Nachtigalengesanges in menschliche Lautsprache.

warme Frühlingssonne vom tiefblauen Himmel herunterlacht, dem Landmann vom Gipfel des knospenden Baumes herunter zu: „Zieh aus den Pelz!“ und fordert ihn auf zur Feldarbeit und die Saaten und Wiesen nachzusehen mit: „Kiek in 't Feld!“ und jetzt den fertig geräucherten Schinken anzuschneiden mit „Schinkenflesch! Schinkenflesch!“ Wenn dagegen der Bauer zu früh seinen Garten bestellt, mahnt sie ihn wie aus Erfahrung:

„Sich bei föär“ (Sieh dich vor!), und wenn gar der liebliche Vorfrühling einem unfreundlichen Nachwinter hat Platz machen müssen und Märzschnee oder Aprilschauer über die Fluren jagen, dann ruft sie rathgebend dazwischen: „Flick dir'n Pelz!“ und wenn dann ringsum Alles noch einmal mit Schnee bedeckt ist und der Hunger sich meldet, sagt sie klagend: „Zit is da! — Schlimm — Ding!“ —

Von den übrigen Singvögeln des nord- und mitteldeutschen Laub- und Nadelwaldes ruft uns die Frühlingsmonate hindurch vor Allem der Stieglitz sein mahnendes „Lüg nit! Lüg nit!“ zu, und während die Schwarzdrossel fortwährend einen „David, Hans David!“ ruft, verräth uns die Singdrossel oder Zippe Näheres über denselben, indem sie scheltend und spottend dazwischenruft: „Kuhdieb! Kuhdieb! David, David, drei Nößel für eine Kanne! Prosit! Prosit! Kartenhaus! Kuhdieb!“

Wenn die Amsel den Wald durchruft nach ihrem „David“, fragt von den Wipfeln der Alleebäume der Oriolan jeden Kommenden und Vorbeigehenden nach einer verschwundenen Marie Louise: „Hefte unse Mareiliseken nich jesien?“ (Hast du unser Marie-Lieschen nicht gesehen?) und gibt ihm dann den guten Rath mit, damit ihn nicht ein gleiches Schicksal ereile: „Z' wit gehst! — Geh weg, weg, weg!“ Ebenso wohlmeinend mahnt aus dem Rohr am Weiher und See fast den ganzen Tag unablässig der Rohrsperling zur Vorsicht, damit Niemand unversehens ins Wasser falle; „Karrel, Karrel, Karrel, kiek, kiek, kiek, Karl, Karl, Karl kiek!“ (Karl, sieh!)

Aber auch die Schelmenzunft ist unter den Vögeln vertreten; nicht nur, daß nach anderer Deutung der Rohrsperling den neugierigen Karl neckend auffordert, ins Rohr zu kommen, sondern auch das kleine Wasserhuhn, dem der Verfolger im Grase oft so nahe zu sein glaubt, daß er ihm Salz auf den Schwanz streuen könne, ruft dem Häscher sein spottendes „Pärzschtärt“ (Pferdeschwanz) entgegen. Der Erzschelm aber von Allen ist der Spatz. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich! heißt's auch von ihm. Sich raufen und zanken und alle Welt „Dieb!“ schelten und dann bitten mit „Lieb!“ und „Gieb“ und pochen mit „Will ich!“, den keimenden Weizen loben mit: „Willich!“ und die Vogelscheuche verspotten mit: „Zwillich! Zwillich!“, das Alles und noch mehr bringt er fertig im Handumdrehen. Noch ärger ist der Goldammer oder der Grünsling in Mißkredit gekommen, weil er in eigennütziger Weise auf die Mildthätigkeit des Bauern zu pochen weiß. Wenn im Herbste die Felder kahl sind, stellt er sich auf den Bauernhöfen ein und bittet gar kläglich: „Bauer mieth' mich!“*) und nennt ihn einmal über das andere: „Fründ, Fründ!“ (Freund). Wenn aber der Frühling wieder ins Land kommt, zieht er stolz und frei von dannen und empfiehlt sich seinem Wohlthäter mit „Bauer, behalt deinen Dienst!“ Ja, wenn im Juli und August die reichen Korngarben gebunden werden, dann ruft er vom grünen und schattigen Baum herunter dem arbeitenden Schnitter zu: „Wenn ich ein Sichelein hätt', wollt ich mit schneiden!“, und der Volksmund sagt sogar, daß er sich dann selbst auf die Kornmandeln zu setzen erfreche und — und — mit einem ganz gemeinen Rufe davonfliege.

Als echter Grobian und „Großmogul“ beweist sich die Krähe, die ungefragt allenthalben mit ihrem ungewaschenen Schnabel dazwischenfährt. Wenn es schneit, was auch ohne Geschrei alle Welt sieht, etwa mit Ausnahme des Blinden, dann ruft sie bis zum Ueberdruß: „Klack, Klack!“ (Weicher Schnee). Wenn die Sonne wieder scheint, kommandirt sie: „Jack af! Jack af!“ (die Jacke ab- oder ausziehen). Wenn ein Fremder des Weges kommt und sie ihn gewahrt, schreit sie ihm schon von fern entgegen: „Wo kommst du her?“ und nachher titulirt sie ihn mit „Labsch, Labsch!“ (etwa Tölpel, Flegel, Tolpatsch). Sieht sie eine Vogelscheuche, oder wird sie irgendwo verjagt, so ruft sie sofort im flegelhaftesten Tone: „Quark ok! Quark ok!“, als: „wer kümmert sich darum“. Dieses dünkelhafte Selbstbewußtsein und dummstolze, vernagelte Sicherhabendünken über alle Andern theilen mit ihr in mehr oder weniger bornirter Weise der Kukuk, der ewig nur auf sich selber aufmerksam macht, und sein Küster, der Wiedehopf, der stets nur hup-hup-hup oder upupa oder hud-hud (plattdeutscher, lateinischer und orientalischer Name desselben; statt hup-hup auch Peädehupe) zu rufen weiß; ferner auch der Pirol, der stolz auf sein goldenes Kleid, fast wie ein reich gewordener, „sich fühlender“ Bauer oder wie ein zweiter „Bauer Troll“ sein „Ich bin der Schulte von Pryło (Bülow, Thyro, Prierort ꝛc.)“ Jedem, der's wissen will oder nicht in die Ohren ruft. Ob er bereits das behagliche Leben auch kennen gelernt hat, oder ob er von dem vielen Rufen eine trockene Kehle bekommen, gleichviel, zuweilen ruft er hastig dazwischen:

„Bülow, Bier hol'n!
Ausſaufen, mehr hol'n!
Viel oh, viel oh!“

Diesen Schreiern gesellen sich noch zwei kleine bei, die „stillvergnügt“ und mit sich selbst zufrieden in den Tag hineinleben, unbekümmert um Andre und was die Welt dazu sagt; es sind das Rothkehlchen und der Zaunkönig. Drollig nehmen sie sich aus, wenn sie durch Busch und Zaun hüpfen und schlüpfen und den kurzen Schwanz emporrichten, als wollten sie ihrer Zwergengestalt eine Elle zusetzen, und wenn Ersteres freudig dreirufft: „Zickterekick, der Rothbart bin ick!“ und triumphirend der Letztere, stolz auf seine dreimal errungene und behauptete Königswürde: „Zickterekick, der König bin ick!“

*) Auch anderswo im Volksmunde: Bu'r ein Körnken!

Zur Ehre des Kukuks und des Wiedehopfs muß ich aber hier noch nachtragen, daß ihr Ruf eigentlich anders lautet, und daß nur der hämische Mensch mit seinem verwöhnten Ohr etwas ganz Anderes heraushört. Kukuk, Wiedehopf und wilde Taube sollen vor Zeiten einmal gemeinschaftlich eine Kuh besessen haben. Je Einer hat dieselbe einen Tag hüten müssen, und in den Nutzen haben sie sich alle Drei getheilt. Als eines Tages der Kukuk das Hirtenamt zu versehen hat, geräth die Kuh in einen Sumpf und bleibt darin stecken. Voller Angst ruft er ihr nun zu: „Krup rut!" (Kriech heraus!); aber es will nicht gehen. Auf das Geschrei kommt nun auch der Wiedehopf herzu und versucht zu helfen und ruft mit: „Olle up, up, up! Olle up, up, up!" (Alte, auf!) Aber vergebens; die Kuh ertrinkt. Zu spät kommt die wilde Taube, und die kann nur noch klagen um ihre schöne Kuh, und noch bis auf den heutigen Tag jammert sie im Walde: „Mine schöne Ku Ku Ku! Mine schöne Ku Ku Ku Ku Ku Ku!

Da weiß die Rohrdommel (oder der Rodum) besseren Rath zu geben, damit solche Unglücksfälle nicht vorkommen; sie ruft aus ihrem Weiher dem weidenden Vieh zu: „Bunt herum! — Rund herum!" In anderen Gegenden jedoch scheint sie unsere Straßenjugend belauscht zu haben, denn da ruft sie: „Roh — dumm, so dumm!!" — Es wäre gewiß nicht zum Nachtheil der letzteren, wenn sie sich von diesem Vorwurf frei zu machen suchte und sich andererseits die sonst geschwätzigen Staare eine stille Mahnung zur Fortbildung sein ließe, wenn diese im Rohre oder in der hohen Pappel sitzen und — „Schule halten!"

Noch eindringlicher mahnt die Wachtel bis spät in die Nacht zur gewissenhaften Benutzung jeder Stunde, indem sie uns immer und immer wieder die Worte entgegenruft: „Die, cur hic!" So scheu sie von Natur auch vor dem Menschen ist, so wohlwollend und herzlich mahnt sie ihn ohne Aufhören aus ihrem sicheren Versteck im Kornfelde heraus. So wie sie selber den anbrechenden Morgen schon mit einem aufrichtigen „Gott sei Dank!" begrüßt, so ruft sie auch ihren Schwestern einen fröhlichen „Guten Tag!" hinüber, und den Menschen fordert sie auf: „Lobe Gott! Danke Gott! Fürchte Gott!" Wenn sie dann durch die frischbethaute Wiese dahineilt und die funkelnden Thauperlen an ihrem Kleide zerrinnen und es völlig durchnässen, dann ruft sie wol: „Werd' ich naß! werd' ich naß!" Aber ihren guten Humor verliert sie darum noch nicht; wenn sie nach gehaltenem Frühmahl wieder gemüthlich beisammen sitzen, dann ruft eine der andern leise zu: Krabb'le mi! Krabb'le mi!" Daß sie dann auch nach einem Pfeifchen Tabak verlange und rufe: „Pack, Tabak!" haben wol nur die Ohren eines Rauchers herausgehört, dem bei der Arbeit das edle Kraut ausgegangen war. Keck mahnt sie auch den müßig stehenden Arbeiter an seine Pflicht mit „Bück' den Rück'!", während sie sich andererseits flehend an den Schnitter wendet und bittet: „Trit mi nit!" und Angesichts des Stoppelfeldes ausbricht in die Klage: „Wehe mir! Ist mir leid!" Und doch sollte man's kaum glauben, wie keck sie wiederum sein kann und dem Jäger höhnend nachzurufen wagt: „Fürcht' mi nit! Fürcht' mi nit!" Ob es wirklich wahr ist, was Fama ihr noch nachsagt?! Früher soll sie nämlich nur einfältig gerufen haben: „quaftula" und im zehnten Jahrhundert „quakara" und „quatala", alles Andere aber erst im Laufe der Zeit hinzugelernt haben; ja in Frankreich soll sie sogar noch ein Wort hinzufügen, das ich in Deutschland noch nicht gehört, wol weil die deutsche Wachtel nicht französisch kann, nämlich: „Paie tes dettes!" — Zu alledem hat das Weibchen nur ein leises: „Pü! Pü!" zu sagen. — Wenn aber die Tage kühler und die Nächte lang und kalt werden, dann wird sie kleinlaut und nur zuweilen noch entringt sich ein kurzer Klageton ihrer Brust, so, wenn sie auf gepflügtem Acker übernachten muß: „Hartes Bett!" oder wenn die Felder leer sind, und die Körner selten werden: „Harte Zeit!", bis sie endlich mit einem wohlgemeinten: „B'hüt di Gott!" sich verabschiedet und nach Süden zieht.

Während die Wachtel den Boden selten oder nie verläßt, sondern stets zwischen den Halmen dahingleitet und ihren charakteristischen Schlag ertönen läßt, drängt es die Lerche, so hoch wie möglich in den reinen Aether zum Throne des Allvaters emporzusteigen, und ganz hingerissen von Dankbarkeit und Entzückung, vermag sie nur die Worte hervorzubringen: „Dir, Dir, Dir, und Dir!" Wenn aber frühmorgens die purpurne Gluth das aufgehende Tagesgestirn verkündet und endlich die Sonne selbst in majestätischer Pracht im Osten sich erhebt, dann begrüßt sie die Himmelskönigin mit ihrem seelenvollen Liede und fordert ihre noch schlummernden Mitschwestern auf, zu erwachen: „Die Fürstin kommt, die Fürstin kommt, die Fürstin steht am Thore!" Ihrem reinen und frommen Gemüthe erscheint die Welt von der Höhe herab in verklärtem, schönerem Lichte, und einmal über das andere bricht sie daher aus in die Worte: „Die Welt ist schön, ist schön!"

Während sie mit ihrem reinen Gewissen keine Furcht und Bangigkeit der Nacht kennt und selbst zu später Stunde noch ein kurzes Schlummerliedchen hören läßt, ruft die Stimme des Drachvogels ängstlich dazwischen: „Mei grielt, mei grielt!" (Mir graut!) An ihm scheint sich zu bewahrheiten, was die Menschen sagen, daß Furcht das Kennzeichen eines bösen Gewissens sei. Und in der That berichtet die Sage von ihm, daß er, als der liebe Gott einst von den Vögeln habe einen Bach graben lassen, sich zur Arbeit geweigert und die arbeitenden Vögel verspottet habe mit „Schippt, schiebt, zieht!", und daß er zur Strafe dafür nimmer aus jenem Bache habe trinken dürfen. Daher muß er noch heute, wenn der Himmel ehern und verschlossen scheint und kein Regentropfen die lechzende Erde und seine dürstende Zunge erquickt, rufen: „Geuß, gieß, giet!" — Doch wenn im Herbst der Pflug des Landmanns die Furchen über die Aecker zieht, und besonders krumme seinen Ordnungs- und Schönheitssinn beleidigen, dann ruft er dem pflügenden Bauer aus den Lüften hernieder: „Tüli! Tüli! Plo jliek, plö jliek!" (Pflüge gleichmäßig!)

Weniger furchtsam eigentlich, als mehr rath- und kopflos benimmt sich bei jedem Vorkommniß der Kiebitz, der bekanntlich sein kunstloses Nest unmittelbar auf die Erde baut. Sobald nun ein Eiersucher oder sonst Jemand die Wiese betritt, so kommt er schon aus einiger Entfernung herzugeflogen und umkreist mit lautem Geschrei und pfeifenden Flügelschlägen und Purzelbäumen den Eindringling, lockt ihn aber mit seinem „Türkewit, wit, wit! Türkewit! — Wo bliew' ick?" eher nach dem Standorte seines Nestes hin, als daß er es dadurch rettete.

Endlich will ich hier noch einige Vögel anführen, die zu belauschen besonders der Waidmann Gelegenheit hat. Wenn im ersten Frühlinge die Bäume anfangen sich zu belauben, dann sind es vor allen die Prachtvögel unseres Waldes, der Auer- und Spielhahn, das Birk- und Haselhuhn, die den Jäger durch ihren Falzruf unwiderstehlich anlocken. Während die größeren in ihren Knixen und Kratzfüßen bei dem „Süßholzraspeln" sich etwas ungeschliffen benehmen und mit ziemlich unzarter Stimme ihr Anliegen ihrer Angebeteten vorbringen, weiß dieses das Haselhuhn in der zartesten und allerweichsten Weise zu thun, wenngleich menschliche Ohren nur heraushören wollen: „Zieh, zieh, zieh, bei der Hitz', bei der Höh'!"

Wer nicht so glücklich ist, diese hohen Gäste zu den Besuchern oder Bewohnern seines Waldes zählen zu dürfen, begnügt sich mit einem Anstande auf dem Schnepfenstrich. Wenn dann Reminiscere oder Oculi herankommt, eilt der Waidmann hinaus an den Waldsaum und hart sehnsüchtig auf die kommenden Fremdlinge, zuweilen so eifrig und unverwandt, daß er darüber Zeit und Empfinden vergißt, bis ihm endlich Herr Blasius oder der Nachtfrost zu empfindlich auf die Haut rückt. Ob dann wirklich die Waldschnepfe dem abziehenden Waidmann ein spöttisches „Grog! Grog!" nachrufe, oder ob nur das heiße Verlangen des Letzteren darnach schalkhafter Weise so versteht, will ich unentschieden lassen. Allen diesen heiteren und fröhlichen Gesellen schließt sich wie die Nacht dem lichten Tage eine schwarze unheimliche Schaar an, die selbst heute noch manches Herz mit Furcht und Grauen erfüllt. Da ist es vor Allem der schwarze Gesell von Rabe, der schon seit der Sündfluth her nirgends seine Neigung nach Aas verbergen kann. Wo er sich sehen läßt, und es ihn nach Speise gelüstet, da ruft er mit heiserer Stimme: „Grab! Grab! — Kopp ab! Kopp ab!" Und fast noch schauerlicher als der Ruf dieses Galgenvogels schallt durch die Stille der Nacht die Stimme des Todtenvogels (Eule): „Komm mit! Komm mit!" Zum Glück ist aber die finstere Nacht dieses Aberglaubens mit Galgen und Rad fast ebenso verschwunden, und wol dem Jünglinge, der ihrem Rufe furchtlos folgt und sich von ihr führen läßt, zwar nicht auf einem mitternächtlichen Gange zu vergrabenen und brennenden Schätzen am Geisterberge, aber zum vollen Brunnen der Weisheit, und aus diesem für das Leben schöpft, so viel er nur vermag!

Reisvogel-Bruten.

Die glücklichen Erfolge, welche Herr Kierstein in Frankfurt mit seinen beiden Pärchen Reisvögeln erzielte, veranlaßten mich im August v. J. ein Pärchen in meine Vogelstube einzusetzen; ich hatte leider zwei Männchen bekommen, tauschte das Eine aus und erhielt nun, wie ich sicher nach 3 Wochen beobachtete, richtig ein Weibchen.

Die Vögel nahmen bereits nach sechswöchentlichem Beisammensein und ohne große Wahl einen ausgehohlten Baumstammkasten in Beschlag, bauten denselben ziemlich roh aus (auch an der Decke) und brachten aus den gelegten zwei Eiern glücklich 2 Junge groß, die ganz das Aussehen des vom Herrn Grafen York von Wartenburg im vorigen Jahre beschriebenen Jugendkleides haben.*)

Heute sind dieselben zehn Wochen alt und am 20. dieses hat das alte Pärchen wieder 5 Junge ausgebrütet. Ich habe diesmal die Brütezeit genau beobachten können; das erste Ei wurde am 28. November gelegt, am 1. Dezember lagen drei Eier im Nest und am 20. dss. fand ich unter dem Nest eine Eischale und von diesem Tage an fressen auch die Alten wieder Ameiseneier, die sie sonst nie anrühren. —

Im Ganzen habe ich, nebenbei bemerkt, in meiner Vogelstube noch wenig Glück gehabt; Bandfinken und Silberfasänchen haben öfter Junge gehabt, aber kein Einziges groß gezogen; Astrilds, Amaranths und Elsterchen haben nur unbefruchtete Eier bebrütet, doch hatte ich von letzteren Beiden, die in dieser Brutzeit das zweite Mal nisten, jetzt auch Junge zu ziehen.

Herr Kierstein beabsichtigt, die jungen Reisvögel, welche jetzt schon allerlei Unfug treiben, nisten zu lassen sobald dieselben wollen. Wie denken Sie darüber? Glauben Sie, daß dieselben im ersten Jahre schon zur Zucht taugen? Es wäre mir lieb, Ihre Meinung zu vernehmen und möchte ich ohne Ihren Rath bei weiteren Züchtungen nicht handeln, habe ich doch aus Ihren Büchern und der „Gefiederten Welt" bisher meine Weisheit geschöpft.

Spätere Benachrichtigung: Zu meiner großen Freude kann ich heute mittheilen, daß soeben bei mir wieder sechs junge Reisvögel ausgeflogen sind; ich hatte nur fünf gezählt und traute meinen Augen kaum, als ein Sechster noch angeflogen kam. Die Vögelchen sind sämmtlich sehr gut genährt, und berechtigen also zu den besten Hoffnungen. Curt Steinbock,

Papierfabrikant in Pulverkrug bei Frankfurt a/O.

(Wir halten es nicht für zweckmäßig, daß man die jungen selbstgezüchteten Vögel zu früh nisten lasse, keinenfalls vor einem vollendeten Jahre nach dem Flüggewerden. Sie tändeln und spielen anfangs (wol bereits im Alter von wenigen Wochen nach dem Flüggewerden) mit dem Nistmaterial umher, kommen jedoch erklärlicherweise noch zu keiner ernsten Brut, gewöhnen sich dagegen die Spielerei dermaßen an, daß späterhin aus allen ihren Bruten nichts wird. D. R.).

*) Eine abermalige genaue Beschreibung wäre sehr erwünscht gewesen. D. R.

Verschiedene Mittheilungen aus der Vogelstube.

Mein Goldstirn- oder Halbmondsittich- (P. aureus) Männchen hat sich mit einem Paradiessittich- (P. pulcherrimus s. paradiseus) Weibchen gepaart. Beide arbeiten stundenlang im Nistkasten. Sollte das Weibchen zur Brut schreiten, dann Näheres.

Seite 302 Ihres „Handbuch für Vogelliebhaber" I. schreiben Sie bei Beschreibung der Nistvorrichtungen für Papageien: Sorgfältig beachten wolle man aber, daß die Nistkästen immer an allen Seiten luft- und lichtdicht sein müssen. —

Ich halte dies durchaus nicht für nöthig. Ich habe aus leichten Kistenbrettern selbst meine Nistkasten verfertigt, die fast alle Luft und Licht an den Seiten durchlassen, und die Papageien nisteten dennoch darin. Zwei Kasten, dicht am Fenster hängend, der eine mit halbem Deckel, sind zur Zeit bewohnt; ich kann zu jeder Stunde das brütende Wellensittich-Weibchen durch das Loch im Deckel beobachten. Das Thierchen läßt sich beim Brüten nicht stören, es ist ein Weibchen, erst ein Jahr alt und hat nur 1 Junges, das in 14 Tagen etwa flügge sein wird. —

Seite 92. Vom Diech-Weibchen heißt es: Schnabel beim Weibchen wachsgelb. Dies ist nur der Fall während der Zeit in der das Weibchen das Winterkleid trägt, im Hochzeitskleid ist der Schnabel roth.*) Ich habe seit 3 Jahren zwei Weibchen, oft legen sie innerhalb eines Jahres kein Hochzeitkleid an. Vom Prachtgefieder des Männchens heißt es: vom März bis September. Die Zeit des Tragens des Prachtgefieders ist aber sehr verschieden. Ein Männchen hat in unserm Sommer, ein anderes in unserm Winter seine Hochzeitszeit. Zwei Männchen sind bei mir zu sehen, die stets abwechseln in Anlegung des Prachtkleides**)

Seite 96 im „Handbuch" heißt es vom Napoleonsvogel: In der Größe ist er dem Blutschnabelweibchen ziemlich gleich. Er ist nach meiner Meinung bedeutend kleiner. Ferner bauen meine Napoleonsweber wie alle übrigen, statt einen senkrechten (vertikalen) Kranz, niemals einen wagerechten; sie haben bei mir das Eigenthümliche, daß sie sich nie völlig ausmausern, sondern stets schwarz und gelbfleckig bleiben, auch pflegen sie nur 9 Monate in Pracht zu sein.

Vom Feuerfink heißt es Seite 99 im „Handbuch": Die mehr oder minder lebhafte Färbung des Prachtgefieders hängt von den Altersstufen des Vogels ab. Ich bin anderer Meinung, nämlich, sie hängt vom Futter ab; bei Fütterung mit frischen Ameisenpuppen ist die Färbung prachtvoll dunkelroth, bei schlechtem Futter hell und gelblich.

Seite 100 heißt es: Der Feuerfink fällt sogar über den Oryx her, so daß dieser sich nicht vor ihm zu retten weiß. Ich habe 3 Oryx und mehrere schöne Feuerfinken gehabt, aber an den Oryx wagt sich keiner, nicht einmal ein großer Edelweber. Ferner wählen bei mir die Feuerfinken nicht Birkenreiser, sondern bauen wovon es ihnen beliebt, ich könnte Ihnen ein Nest von Lindenzweigen senden.

Vom Oryx S. 101 heißt es: Prachtkleid vom September bis Januar. Meine vom März bis November, also 3/4 Jahr. Sie weben bei mir nur aus Manilabast und Baumwolle, die Flugröhre stets aus frischem Gras. Ich habe 1 Männchen und 2 Weibchen, das Männchen hat sich mit beiden Weibchen gepart, beide Weibchen haben drei Mal 3 Eier gelegt, ausgebrütet, aber die 8 Tage alten Jungen verlassen, das stürmische Männchen verfolgte die Weibchen stets mit neuen Liebesanträgen. Dieser Beitrag wird Ihnen werthvoll sein, ich finde nirgends etwas davon. Der Oryx wählt Tannen, Weißbuchen, Hollunder u. dgl., verschmäht bei mir durchaus Birkenreisig. Er nimmt eine Stubenecke völlig für sich in Anspruch, lebt mit den Wellensittichen, die neben ihm im Kasten nisten aber in Frieden, er hat sogar geduldet, daß die Diechweibchen in zwei von ihm erbaute verlassene Nester Eier legen.

Gegen die Verfärbungsansicht bin ich ganz entschieden. Ich habe 4 Jahre hindurch den Oryx frei und im Käfig beobachtet, das Gefieder (das graue) färbt sich nicht glänzender und fällt dann erst aus. Es bleibt schlicht ohne jede erhöhte Färbung und die hervorbrechenden rothen und schwarzen Federn verdrängen die grauen, die allmälig ausfallen, der Vogel sieht dann wunderlich grau, schwarz und roth gefleckt aus. Hierüber demnächst ausführliche Mittheilungen.

Fr. Sch. II. in W.

*) Umgekehrt, werthester Herr S., im Hochzeitskleide ist der Schnabel des Diechweibchens ganz entschieden schön wachsgelb, während er im Winterkleide gleich dem des Mch. roth erscheint. Dr. K. R.

**) Dies hängt natürlich davon ab, aus welchem Theile Afrikas die Vögel herstammen. D. R.

Vogelkrankheiten.

Ein Schnabelbruch.

Vor einigen Tagen beunruhigte mich am Morgen beim Erwachen der Umstand, daß gerade mein bester Sprosser im Nebenzimmer, der um diese Zeit gewöhnlich am schönsten schlug, hartnäckig schwieg. Von meinem Bett aus erblickte ich indeß den Vogel anscheinend ganz wohlbehalten, aber still auf seinem Sprungholz sitzend. Trotzdem beeilte ich mich jedoch aufzustehen, um meinen Liebling näher zu besehen, und gewahrte nun zu meiner sehr unangenehmen Ueberraschung, doch erst beim Reichen der Mehlwürmer aus der Hand, da der Vogel dieselben diesmal trotz seiner eifrigsten Bemühungen, nicht greifen konnte, daß er sich über Nacht den Oberkiefer bis fast zu den Nasenlöchern abgebrochen hatte. Das nachgebliebene kurze Ende war ganz blutig. Was war da zu thun? Offenbar war dem armen Thier der stehengebliebene Unterschnabel jetzt das hinderlichste Glied seines Körpers, daher schnitt ich ihm auch diesen, so weit es anging, ohne Blutgefäße zu verletzen, ab. Und damit habe ich entschieden das richtigste chirurgische Verfahren getroffen, denn mein Sprosser kann nun, obgleich noch immer recht unbequem, doch das

Futter zu sich nehmen. Nur zwei Tage hat er etwas getrauert; jetzt fängt er allmählich bereits wieder an sich hören zu lassen.

J. Schulze,
Regulirungs-Dirigent
in Riga.

Noch einmal über das häufige Sterben der jungen Harzer Kanarienvögel.

Von W. Böcker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Der Gesang der Harzer Kanarien kennzeichnet sich überhaupt durch eine Kunstfertigkeit, die ohne Aufbietung einer bedeutenden körperlichen Kraft nicht denkbar ist; es ist daher auch nicht einleuchtend, daß sie so kleiner schwächlicher Statur sein sollten. Ich besitze und habe früher besessen verschiedene Stämme sowol Original-Andreasberger als selbstgezogene Harzer, die durchweg an Größe der gemeinen deutschen Rasse nicht nachstanden. Kleinere Exemplare giebt es allerdings in jeder Hecke; es mag auch ganze Stämme kleiner Vögel geben; das sind indeß nicht selten ganz vorzügliche Sänger und eben so gute Heckvögel.

Daß einjährige Vögel im Harze, namentlich in Andreasberg, mit Vorliebe zur Zucht verwendet werden, ist unleugbar, schädlich scheint es mir aber ebenfalls nicht zu sein. Der einjährige Vogel ist durchaus fortpflanzungsfähig, ja es sind Fälle vorgekommen, wo junge Vögel noch im nämlichen Sommer wiederum Junge gezeugt haben.

Im Heizen des Brutraumes — außer der Mauserzeit — thun die Züchter des Harzes allerdings des Guten zu viel; sie mögen damit das schnelle Wachsthum der Jungen befördern, aber die alten Zuchtvögel werden dadurch gegen Kälte nur um so empfindlicher und die Stubenluft wird bekanntlich um so schlechter, je nachhaltiger eingeheizt wird. Es hilft hiergegen auch nicht das übliche wöchentliche Ausräuchern der Zimmer, wie solches in meinem diesjährigen Reiseberichte erwähnt worden; im Gegentheil vermindert es den den Vögeln unentbehrlichen Sauerstoff nur noch mehr.

Die Harzer Bauerchen schaden der Gesundheit der Vögel nicht; es ist das ein anscheinend aus dem Berichte des Herrn Lintz in Nr. 10 der „Gefiederten Welt" entnommenen Irrthum, welchen Herr Reiche späterhin bekämpft hat. Da Herr Lintz des Letztern Anführungen als richtig nicht anerkannt, so sei es mir gestattet, meine neuesten Erfahrungen in dieser Hinsicht hier kurz mitzutheilen:

Während eines Zeitraums von 14 Monaten habe ich nahezu 300 männliche Kanarienvögel in Harzer Bauerchen gehalten und zwar bis zu 4 Monaten, außerdem in Flugkäfigen und in besondern Zimmern ungefähr eben so viel Weibchen. Von den Männchen war nur eine kleine Anzahl in den Bauerchen eingewöhnt, als ich sie empfing; die weitaus größte Anzahl habe ich selbst eingewöhnen müssen. Es waren dies sowol Original-Andreasberger, als auch Vögel eigner Zucht. Von allen diesen Vögeln erkrankte mir im vorigen Winter einer im Harzer Bauerchen an einer Unterleibsentzündung; er wurde in einem der von Herrn Lintz empfohlenen größern Dratbauer wieder gesund, jedoch nur in Folge eines gründlichen Futterwechsels. Ein anderer Vogel ging im Laufe des Sommers an unheilbarer Heiserkeit in einem ganz ähnlichen Dratbauer ein; an dieser Krankheit litt derselbe, als ich ihn erhielt. Ein dritter, blasser, blutarmer junger Vogel erkrankte mir in diesem Herbst in einem mäßig besetzten Brutraum, er wurde auch in dem erwähnten Dratbauer nicht wieder gesund. Vor dem Einsetzen in die Harzer Bauerchen, im Monat September dieses Jahres erkrankten mir in meiner durchaus nicht übermäßig besetzten Heckstube plötzlich über ein Dutzend junger Männchen, wie ich glaube, an schlechtem Sommersamen. Ich war zufällig genöthigt für etwa 10 Tage meinen Bedarf an Samen aus den hiesigen Kaufläden zu entnehmen. Derselbe war theils müffig, theils mit Hederichsamen stark vermischt.

Die kranken Vögel wurden eingefangen, so weit dieses mit möglichster Schonung derselben geschehen konnte. So oft ein solcher Vogel, der nicht grade „auf dem letzten Loche pfiff" eingefangen ward, wurde er in ein kleines Harzer Bauerchen gesteckt, im Uebrigen aber im Heckzimmer gelassen und der Vogel war damit gerettet.

Ich habe zur Zeit noch in denselben Harzer Bauerchen mehrere jetzt vollkommen gesunde Vögel, die zu jener Zeit bedenklich erkrankt waren. In der fliegenden Hecke, während des freien Umherfliegens, starben mir aber etwa sechs junge Vögel an ein und derselben Krankheit. An den eingefangenen jungen Vögeln habe ich keine Veränderung des Futters vorgenommen, nur sorgte ich für möglichst guten Samen. Sonst ist mir kein Vogel eingegangen; sie sind im Gegentheile alle gesund und schlagen sehr fleißig. Einen Uebelstand hat allerdings der Gebrauch der kleinen Harzer Bauerchen im Gefolge; dieser ist von beiden oben genannten Herren nicht hervorgehoben.

Unruhige Vögel verderben sich darin leicht das Gefieder. Der Verlust des Schwänzchens würde noch angehen, bei einigen Exemplaren werden aber die Flügelfedern so abgenutzt, daß sie in fliegender Hecke sich kaum noch etwas vom Boden erheben können. Einen solchen Vogel habe ich, da er ein sehr vortrefflicher Sänger war, in diesem Frühjahre gehalten, er wurde dann aber wieder flugfähig.

Es dürfte aus diesem Grunde daher anzurathen sein, statt der kleinsten Sorte Harzer Bauerchen die größere Mittelsorte, die s. g. Gimpelbauerchen, besser noch die größten zu verwenden, soweit es der Raum gestattet. —

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

.. Wie ich Ihnen schon mitgetheilt, treibe auch ich Bastardenzucht. So habe ich einen Gimpel mit einem Kanarienweibchen zusammengeworfen. Das Weibchen legte dann auch 4 Eier, wovon je 2 nach

Farbe, Größe und Zeichnung vollständig verschieden sind; ich schließe daraus, daß die einen unbefruchtet, die anderen aber befruchtet sind. Das Weibchen brütet seit etwa zehn Tagen mit großem Fleiße, was auch hoffen läßt, daß ich Junge erhalten werde. Mir erscheint dieser gehoffte Erfolg deßhalb interessant, weil ich in Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber" gelesen habe, daß sich eine Gimpelbastardenzucht nur erreichen läßt, wenn man jung aufgezogene Gimpelweibchen mit Kanarienhähnen zusammengibt. Ueber Erfolg oder Mißerfolg werde ich seiner Zeit berichten.

Kürschner, Premierlieutenant in Bamberg.

(Wir bitten um gefälligen Bericht. D. R.).

... Bei meinen Kanarien habe ich im vorigen Jahre die Beobachtung gemacht, daß gehäubte Eltern sehr schöne gehäubte Junge groß zogen, und merkwürdiger Weise haben meine Kanarien die Jungen fast nur mit Ameiseneiern gefüttert; die ersten Jungen, welche mit Eierbrot, Semmel und Ei, viel gequelltem Rübsen gefüttert wurden, starben mir alle, und ich war dadurch so mißmuthig geworden, daß ich weder Quellfutter noch Semmel und Ei hinstellte. Die Jungen, welche später auskamen, haben eben nur Ameiseneier und was die Alten sonst fressen, Kanariensaat, Rübsen und Grünes bekommen und dabei habe ich zuerst bemerkt, daß Kanarien überhaupt Ameiseneier gefressen haben. C. S. in P. bei F.

Anfragen und Auskunft.

Ist es möglich oder wahrscheinlich, daß ein brütendes Weibchen während eines Gewitters ihre Eier aus Furcht, Schreck oder Angst vor dem grellen Blitz oder heftigem Donnerschlage zerdrücken kann?

Während eines Gewitters im vorigen Frühjahre scheint mir der Fall vorgekommen zu sein, denn ich wüßte sonst keinen anderen Grund, weßhalb ich von drei Eiern zwei nicht nur zerdrückt, sondern auch zertreten am Morgen im Neste fand.

Im Interesse der Liebhaberei wäre es, glaube ich, wünschenswerth, wenn Sie diese Anfrage in der „Gefiederten Welt" beantworteten und gleichzeitig vielleicht Rath geben wollten, wie man am besten und zweckmäßigsten die Vögel gegen solches Unglück beschützt. W. Neubert in Berlin.

Aus den Vereinen.

In **Bochum** in **Westfalen** ist soeben ein Verein für Geflügel- und Stubenvogelzucht in der Bildung begriffen, an dessen Spitze Herr Joh. Chr. Leye, Inhaber einer chemisch-technischen Fabrik steht. — Ebenso erhalten wir die Nachricht, daß auch in **Hamburg** ein ebensolcher Verein sich gebildet, der sogleich eine sehr erfreuliche Ausbreitung gewonnen hat und demnächst seine erste, wol recht großartige Ausstellung veranstalten wird.

Ausstellungen.

Soeben geht uns die Benachrichtigung zu, daß die Anmeldungsfrist von allerlei Geflügel zur **Internationalen landwirthschaftlichen Ausstellung in Bremen** noch bis zum 1. Mai verlängert ist. Wir machen hierauf sehr gern aufmerksam, mit dem Hinweis, daß Ausstellungsprogramme, Anmeldeformulare und alle weitere Auskunft, von dem Sektions-Chef der III. Abtheilung (Geflügel, Sing- und Schmuckvögel) Herrn Dr. Finsch, Konservator am Museum in Bremen zu beziehen sind. —

Ehrenbezeigungen.

Der Verein für Geflügelzucht in München ernennt, in Anwendung des § 6 der Vereinssatzungen, Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin, Schriftsteller und Herausgeber der Zeitschrift „Die gefiederte Welt", in Anbetracht seiner Verdienste um Förderung der Geflügelzucht, zu seinem korrespondirenden Mitgliede. — München, 1. Januar 1874.

Die Vorstandschaft.

Pfister, Präsident. C. v. Leveling, Schriftführer.

Mit Freude und aufrichtigstem Dank nimmt der Herausgeber der „Gefiederten Welt" auch diese ihm erzeigte Ehre entgegen. Für Jeden, der viele Jahre hindurch rastlos auf einem Gebiete arbeitet und dann den Erfolg sieht, daß eine solche Angelegenheit, in der erfreulichsten Weise und auf das Lebhafteste von vielen vereinten Kräften verfolgt, einen kaum geahnten Aufschwung durch das ganze deutsche Vaterland gewinnt, liegt darin allein bereits eine beglückende Belohnung für sein Streben. Um so reicher ist diese aber, wenn dazu dann auch noch die persönliche Anerkennung kommt — und in diesem Sinne darf ich, namentlich als Schriftsteller, solche Ehrenbezeigungen von Seiten deutscher und fremdländischer Vereine als Aufmunterung in meinem Streben und meiner ganzen Thätigkeit fortzufahren, begrüßen. Denn die mir erzeigte Ehre gilt ja von vornherein hauptsächlich der Sache und nur in geringem Maße der Person.

Auch die obige Ernennung wurde mir in einem sehr schön ausgestatteten Diplom übersandt. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Robert Oettel, Präsident des Hühnerologischen Vereins in Görlitz: Wir haben den Brief des Herrn Freiherr von Karg-Bebenburg nach Ihrem Wunsche beantwortet und stehen Ihnen in allen solchen Fällen immer sehr gern zu Gebote. — Herrn Dr. Franz, Berlin: Ihre Anfrage in Betreff der in Nr. 12. angezeigten französischen Kaninchen können wir jetzt in Folgendem beantworten: Der Züchter dieser Thiere Herr E. Gayot ist ein wissenschaftlich gebildeter Mann, der sich seit Jahren um die Veredelung der französischen Kaninchenrassen bemüht und in seinen Leporiden (Kreuzung von Feldhase mit normännischen Kaninchenweibchen) wol den höchst erreichbaren Grad von Vollkommenheit, bezüglich Zartheit und Saftigkeit des Fleisches zu erzielen sucht und schon in beachtenswerther Weise erreicht hat, so daß diese Kaninchen als die empfehlenswerthesten für den Fleischgenuß angesehen werden dürfen.

Herrn Premier-Lieutenant Kirschner in Basel: Zunächst besten Dank. Eier von fremdländischen Taubenarten, namentlich gute, zum Bebrüten taugliche, dürften außerordentlich schwierig zu erlangen sein, einerseits, weil die fremdländischen Tauben nur selten in der Gefangenschaft nisten und andererseits weil jeder Liebhaber, der einen solchen seltenen Erfolg erzielt hat, doch keinenfalls das Nest berauben wird. Wollen Sie selber Züchtungsversuche mit den verschiedenen Arten dieser reizenden Täubchen machen, so wollen wir dazu durch Beschaffung derselben Ihnen gern behülflich sein. — Herrn Lehrer Fr. Wiegand in Anspach: Jeder aufmerksame Leser wird es wol ohne Verbesserung entnehmen, daß es in Ihrem Aufsatze Seite 106 Zeile 20 von oben nicht anders heißen darf, als: Man reiche jedem Vogel eine Messerspitze voll Eifutter. Druckfehler lassen sich bei einer Zeitschrift eben leider niemals völlig vermeiden. —

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

In **R. Hieronymi's Zoologischer Handlung zu Braunschweig** sind z. Z. vorräthig: Astrilden, Orangebäckchen, Goldbrüstchen, Amaranthvögel, Schmetterlingsfinken, Zebrafinken, Elsterchen, Silberfasänchen, Muskatfinken, Reisvögel, Bandfinken, Paradies- u. Dom.-Witwen, Blutschn.-, Napoleons- und Orange-Weber, Kanarienvögel, Hartlaubszeisige, rothe Kardinäle, Wellensittiche, Nymphen- u. Karol.-Papageien, Tovi-perikiten, zahme u. sprech. hellbl. u. blaugelbe Arara, Grau-papageien, zahme Amazonen- u. Surinam-Papageien, zahme u. sprechende große gelbhaub. Kakadu, Rosakakadu, Lachtauben, Sprosser, Nachtigalen, Drosseln, Stieglitze, Finken, Hänflinge, Rothkehlchen 2c., zahme Trupiale, Blaudohlen, Elstern, Stein-käuze, Silberfasanen, Affen, Opossum, Franz. Kaninchen, Meer-schweinchen, große und kleine Rassenhunde, namentlich junge Ulmer Doggen eigener Züchtung, Goldfische, diverse kleine Amphibien, Muscheln, neue Nistkasten für Nymphen- u. Wellen-papageien, Stare 2c. Dann noch einen Rest von ca. 45 Stück gebrauchten Nistkasten für Wellenpapageien, auch einige für Nymphen, die von den Vögeln bedeutend vorgezogen werden; Käfige, fein verzinnte und andere, wie auch 10—20 Stck. ge-brauchte Kastenkäfige, passend als Heckgebauer für Amadinen, Bruteier, Futtersämereien 2c. 2c. [262

Die Großhandlung exot. Vögel und Naturalien von Karl Gudera,

Leipzig und Wien

empfiehlt: Band-, Schmetterlings-, Tiger-, Muskat-, Reis-, (gewöhnliche und weiße), Schilf-, Diamant-, Zebra-, Atlas-, Saffran- und Edelfinken, Goldbrüsteln, Astrilds, Amaranthen, Schönbürzel, Orangebecs, Elsterchen größte u. gewöhnl, Silber-becs, Nonnen, Paradies u. Dominikanerwittwen, Blutschnabel-, Rothkopf-, Napoleons-, Feuer-, Textor-, Swainson- u. dotter-gelbe Kernbeißerweber, Kardinäle rothe, graue u. grüne, rosen-brüstige Kernbeißer, Karmingimpel, Mozambiquezeisige, Kappen-ammern, 3 Arten Pfaffen, Magellanzeisige, wilde Kanarien, Wellen-, Sperlings- (grauköpfige u. gewöhnliche), Nymphen, Sing-, Halbmond-, Gras-, Alexander- (groß u. klein), und Karolinapapageien, Inseparables, Rosellas, Pennantis, Viel-farbige, Pracht- und Neuseeländersittiche, Jakos, Amazonen- u. Surinampapageien, grüne Loris, rosa u. kleine gelbhaubige Kakadus, Gebirgslori, Zwerg-, brasil. Erd-, indische Bronce-flügeltauben u. blaue Araras, Sittiche, Sperber- u. Wandertauben, Scharlachtanagras, Flötenvögel, Spottdrosseln (rothe u. ge-wöhnliche), Katzen-, Wander- u. Alicendrosseln, Rothflügel-, Kuh-, Heuschrecken-, Glanz- u. japan. Stare, Jamaika- u. gold-gelbe Trupiale, amerik. Steinröthel, japan. Sonnenvögel, weiße und gelbe gefleckte Mövchen, Pariser Kanarien. Außerdem werden alle Arten Sämereien für exot. Vögel, besonders Hirse in Kolben, alger., Senegal- und indische Hirse, Nistgegenstände 2c. empfohlen. [263

Kanarienvögel,

vorjährige Männchen wie Weibchen aus guten Rollerstämmen, erstere durchschnittlich zu 5½ Thlr., letztere zu 20 Gr., Emb. für 1—2 Vögel 8 Gr. hat noch abzugeben.

264] **A. Maschke** in St. Andreasberg.

Gekauft werden:

1 Paar ältere Nymphen-Kakadus; ferner je ein Weibchen von Paradiessittich (pulcherrimus), Schönsittich, Zebrafink und zwei Amaranthweibchen, aber alles nur ältere, eingewöhnte Thiere; endlich ein Männchen (alt) vom Grauedelfink und Kapland-kanarienvogel. Dr. F. Franken Baden-Baden. [265

Eine überzählige weibliche Nymphe suche gegen 1 Männ-chen Halbmondsittich zu vertauschen oder zu verkaufen. [266

A. Beyschlag in Schweinfurt.

Ein Paar blaue Gebirgs-Lori, welche schon einmal ge-nistet haben, sind zu verkaufen. Näheres in der Expd. d. Bl. Wilhelmstr. 32. [267

Grau-Papagei, Pracht-Exemplar, der sehr viel spricht u. ganz zahm ist, zuverk. Berlin, Gips-Str. 12a 3 Treppen l. — Daselbst ist auch ein grüner Papagei zu verkaufen. [268

Suche eine eingewöhnte, sehr gut und fleißig schlagende Nachtigal, nur Tag- und Nachtschläger. **J. Scurla** in Norden 269] (Ostfriesland).

Ein Paar Ind. Perlhalsband-Täubchen verkauft zu 4 Thlr. 270] **C. F. Hitzschke**, Naumburg a. S.

Für Züchter und Liebhaber nicht zu übersehen.

Familien-Verhältnisse halber setze ich meinen Zuchtstamm prachtvoller [271

1, 3. Spanier 2 jährig,

sofort zu Thlr. 15 — incl. Emballage dem Verkaufe aus.

Königsbronn, Würtemberg. **D. Aysslinger.**

Gesucht **weibl. Rothwild.** [272

F. v. Lassert-Dammeretz bei Brahlsdorf (Mecklenburg).

Naturalienhandlung

von **Wilh. Schlüter** in Halle a. S.

Die Preisverzeichnisse Nr. 39 über spanische und Nr. 40 über kalifornische Säugethiere und Vogelbälge, Schädel, Eier, Nester 2c. sind erschienen und stehen auf Verlangen gratis zu Diensten. [273

Franz. Lapins, nur **echt** importirte Racen in Original-Zuchtthieren, als: Beliers, de garenne, argentes, clapiers und domestique, billigst unter Garantie liefert das Export- u. Importgeschäft **C. Schürholz,** Hildburghausen. [274

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Praktische Anleitung

zur

künstlichen Ausbrütung

der

Eier aller Arten Geflügels

und der

Aufzucht der künstlich ausgebrüteten jungen Hühner, Enten, Gänse und Truthühner.

Mit 4 Zeichnungen nebst einem Anhange über die **rationelle Kaninchenzucht.**

Herausgegeben

von

J. H. Krantz.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage

Preis 10 Sgr.

Berlin. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung

275] 32 Wilhelmstraße SW.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: in **Steglitz** bei Berlin, Albrechtstraße 115 durch die Post oder durch Vermittelung einer Buch-handlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.

C. F. Pilger's Buchdruckerei in Hermsn.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 7. Mai 1874. Nr. 19.

Inhalt:

Die Verfärbung des Honigsaugers. —
Nochmals über die Erkrankung der Graupapageien. —
Noch einmal über das häufige Sterben der jungen Harzer Kanarienvögel (Fortsetzung). —
Weiteres über die Fruchtbarkeit der Bastarde. —
Zu der Frage: sind Bastarde fruchtbar oder nicht? —
Anfragen und Auskunft: Verkrüppelte Wellensittiche. —
Aus den Vereinen: Stettin. —
Briefwechsel. — Anzeigen. —

Die Verfärbung des Honigsaugers.

Mittheilung des Herrn Kreisgerichtsrath Heer in Striegau.

Sämmtliche Bewohner meiner Vogelstube sind munter und guter Dinge. Auffällig finde ich, daß die Grauköpfchen bei ihrem Wohlbefinden keine Anstalt zum Nisten treffen. Auch die schwarzköpfigen Zeisige bekümmern sich garnicht um einander.

Der Honigsauger ist nun völlig ausgefärbt und unbeschreiblich reizend. Als ich Ihnen im Oktober v. J. über seine Verfärbung schrieb, war mein Urtheil darüber aus Bedauern, daß er grau und unschön bleiben werde, zu hastig, daher verfrüht.

Der Vorgang des Farbenwechsels ist bei diesem Vögelchen ein ungemein zögernder und ganz geeignet, die Geduld des Beobachters auf harte Probe zu stellen.

Das Prachtkleid, welches mein Vogel im August v. J. von Herrn Gudera mit zu mir brachte, hielt nur noch etwa 3 Wochen aus; dann mauserte sich das Thierchen leicht und zeigte sich bald darauf in recht häßlichem, schmutzig graugrünem Gefieder. Die Flügel blieben tiefschwarz. Nach Verlauf von etwa sechs Wochen machte diese schmutzige Farbe des Kopfes, Halses und Rückens, nach und nach einem schönen Olivengrün Platz und die Brust bedeckte sich mit kleinen blauen Fleckchen. Ich glaubte nun, der Vogel würde oberhalb olivengrün bleiben und nur die schöne blaue Brust sich wiederherstellen; allein nach kurzer Zeit entfärbten sich diese blauen Fleckchen wieder und ich stand verblüfft vor einer neuen Metamorphose. So, wieder schmutzig graugrün an Hals, Brust und Bauch, verblieb der Vogel wieder mehrere Wochen und ich gab alle Hoffnung auf die Wiederkehr der früheren Schönheit auf. Da sah ich, unter den Flügeln am Bürzel wieder die herrlich blauen Federchen erscheinen, einzelne kleine schmutzig grüne Federn aus der Brust ausfallen und sich durch schöne blaue ersetzen. Große blaue Flecke zeigten sich und überzogen Brust und Bauch und Hals. Auf dem Kopfe sproßten neue Kielen hervor und enfalteten sich rasch zu der prächtigen stahlgrünen Platte. Der Rücken färbte sich immer dunkler bis zu tiefschwarz und ihn durchzog von jeder Schulter ausgehend, ein kornblumenblaues Band, sich auf dem Unterrücken vereinigend.

Nun ist der Vogel vollständig ausgefärbt und ganz wundervoll schön, wie Metall erglühend, wenn ihn ein Sonnenstrahl trifft. Seine jetzige Pracht verhält sich zu seinem früheren Festkleide, wie Sonnenschein zu Nebel. Er erregt allgemeine Bewunderung.

Seine Erhaltung glaube ich doch einzig und allein der trocknen Fütterung danken zu müssen. Ein Versuch mit feuchtem Futter machte den Vogel krank. Er nimmt den Schnabel voll Futter aus dem Napf, fliegt damit jedesmal auf die Sitzstange und stößt es mit der langen, spechtartigen Zunge in den Schlund und trinkt dann sofort aus dem Trinkgeschirr.

Nochmals über die Erkrankung der Graupapageien.

Ich habe mehrmals in Ihrer Zeitschrift von der Krankheit der grauen Papageien gelesen, die seit 12 bis 18 Monaten unter denselben herrscht. Alles, was man als Ursachen angab, ist aber entschieden falsch. Die Ursache ist vielmehr folgende. Die Eigner der Schiffe, Postboote von der Küste von Afrika, wollen es nicht mehr erlauben, daß das Schiffsvolk Graupapageien mitbringt ohne Fracht; sie haben vielmehr 5 Schillinge Fracht auf jeden Papagei gesetzt und nun schmuggelt das Schiffsvolk die grauen Papageien bei der Nacht in das Schiff. Die Vögel werden dann in dem Maschinenraum versteckt, wo heiße, stänkrige und daher höchst ungesunde Luft ist, in welcher die bedauernswerthen Vögel 3 bis 4 Wochen verbleiben müssen. Kommen die Graupapageien dann in Europa an und werden der kalten Luft ausgesetzt, so haben sie sogleich eine Erkältung; dazu haben sie den Magen voller Oel und Kohlendampf und daher müssen sie also krank sein oder sie werden es, sobald sie in andere Verpflegung kommen.

Alle Graupapageien, die von der Küste Afrikas kommen in Segelschiffen sind dagegen gesund.

Chs. Jamrach,
Naturalist und Vogelhändler in London.

Noch einmal über das häufige Sterben der jungen Harzer Kanarienvögel.

Von W. Böcker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Die den Züchtern des Harzes eigenthümliche Fütterung mit Sommerrübsamen und einer Mischung von gekochtem Hühnerei und eingeweichtem oder geriebenem Weißbrote wird vielfach auch von den Händlern, namentlich von den Vogelhändlern meiner Bekanntschaft fortgesetzt, nur geben diese, um der Heiserkeit der vielen zu gleicher Zeit singenden kleinen Virtuosen möglichst vorzubeugen, dem Eifutter noch einen kleinen Zusatz von braunem Kandis, feuchten auch den Samen, um ihn vom Staube zu befreien und die Hülse leichter löslich zu machen, etwas mit Wasser an, wie dies im Harze ebenfalls geschieht. Wahr ist es nun allerdings, daß sich ein so gepflegter Vogel mitunter ohne einiges Unbehagen, ja ohne große Unpäßlichkeit nicht sofort an ein gemischtes Körnerfutter gewöhnt; es sind mir sogar Fälle bekannt, wo Vögel an solchem plötzlichen Futterwechsel zu Grunde gingen. Man wird daher wohlthun, dem Sommerrübsamen nur allmählich und Anfangs in ganz geringen Quantitäten andere Körnerfrucht beizugeben. Am besten eignet sich hierzu nach meinen Erfahrungen geschälter Hafer, den man ja in jeder Stadt in guter Qualität erlangen kann. Später können demselben auch einige Körner Kanariensamen beigegeben werden, auch zeitweise etwas Mohn. An ein solches gemischtes Futter lassen sich die Harzer Kanarienvögel allerdings gewöhnen, sie halten dabei auch länger aus, als bei bloßem Sommerrübsen, der auf die Dauer den Vögeln nicht genügt. Bei dieser Gefangenkost halten dieselben meiner Erfahrung nach nur wenige Jahre und werden dabei zuletzt noch matt und faul im Gesange, selbst wenn der gefütterte Sommerrübsen von tadelloser Beschaffenheit war. Aus dieser Ursache setze ich daher auch alle meine männlichen Kanarienhähne in die Hecke, füttere auch außerhalb der Brutzeit statt der gemischten Körnerfrucht neben dem Rübsamen Eifutter, allerdings vielmehr zur Erhaltung eines guten Gesanges als aus Besorgniß vor Erkrankung der Vögel. Man ist nämlich vielfach der Ansicht und wie mir scheint, mit Recht, daß bei gemischtem Körnerfutter die Stimme des Vogels an Rundung und Klangfülle verliere; doch sind die Meinungen hierüber zur Zeit noch getheilt.

Guter reiner Sommerrübsen ist gewiß in manchen Städten schwer zu erlangen; die Aufgabe der Vereine für Geflügel- und Singvogelzucht möchte es sein, sich nach den besten Bezugsquellen zu erkundigen und die Samenlieferungen für ihre Mitglieder zu vermitteln. In meinem diesjährigen Reiseberichte habe ich meine eigne Bezugsquelle: L. C. Kahl in Frankfurt a. Main., Römerberg 20 und 22 angegeben und von Herrn Reiche wird Karl Kapelle in Hannover empfohlen.

Da der Sommerrübsen die Hauptnahrung der Harzer Kanarienvögel bildet, so müssen bei schlechter Beschaffenheit des Samens nothwendig eine Anzahl dieser Vögel im Laufe der Zeit zu Grunde gehen. Die wenigsten Liebhaber sind im Stande, die Güte des Samens richtig zu beurtheilen; aber die Thatsache steht fest, der Vogel ist zu Grunde gegangen, obgleich er doch regelmäßig getränkt und gefüttert wurde, er ist an angeborner Auszehrung, an ererbter Schwindsucht zu Grunde gegangen, weil er einen unersättlichen Appetit entwickelte und dabei doch immer magerer wurde. Der Irrthum ist verzeihlich, aber es ist darum nicht minder ein Irrthum. Ein Kanarienvogel gemeiner Rasse würde bei demselben Futter ebenfalls eingegangen sein, wie andrerseits ein Vogel Harzer Rasse sich bei gemischtem Körnerfutter sehr wohl befinden kann. Im Jahre 1861 habe ich verschiedene Vögel aus dem Harze hierhergebracht; einer derselben ging in die Hände eines Liebhabers über, der nur gemischte Samen — Hafer, Kanariensamen, Mohn, Hanf und verhältnißmäßig wenig Sommerrübsen — fütterte. Grade dieser Vogel schlug vor einigen Jahren noch sehr fleißig. Aehnliche Fälle sind mir öfters zur Kenntniß gekommen.

Manche Liebhaber lassen sich aus Freude an dem vortrefflichen Sänger verleiten, ihm allerhand Leckerbissen zuzustecken. Die Folge davon ist nicht immer die erwartete. Der Vogel verdirbt sich den Magen, bläht sich auf und bekommt ein krankhaftes Aussehen, oder er wird übermäßig fett, unbehilflich in seinen Bewegungen und faul im Gesange. Einen solchen Vogel habe ich einmal auf Ersuchen seines Besitzers untersucht; er war fett, wie eine gemästete Gans, seinen Gesang hatte er seit Wochen ganz eingestellt.

Ein hiesiger Liebhaber und tüchtiger Kenner des Gesanges hatte seinen Vögeln, um ihre Kehle möglichst glatt und geschmeidig zu erhalten, Speck und viel

frische Butter zwischen die Drähte gesteckt. Kurze Zeit darauf konnten sämmtliche 4 Vögel nicht mehr auf den Beinen stehen. Wie gelähmt lagen sie auf dem Bauche am Boden des Käfigs und es kostete viele Mühe, dieselben von dieser Krankheit wieder zu heilen.

Andere Liebhaber haben die Gewohnheit, die Käfige als eine Zierde ihres Zimmers zu betrachten und sie am allerunpaßendsten Orte, über der Stubenthüre, anzubringen. Was sie selbst nicht aushalten würden, das zu ertragen muthen sie einem verhältnißmäßig schwachen und zarten Geschöpfe zu und können nachher kaum begreifen, wie es kommt, daß ihr Vogel an Heiserkeit oder Krämpfen leidet, oder ungewöhnlich struppig aussieht.

Wieder andere Liebhaber glauben den Vogel und sich selbst zu erfreuen, wenn sie ihn in einen recht schönen Käfig bringen, in ein Glockenbauer etwa. Der Käfig ist recht hübsch grün angestrichen, er hat auch, was sich besonders geschmackvoll ausnimmt, weiß angestrichene Dräte. Dem Vogel scheint das nun auch zu gefallen; knabbert er doch beständig an den weißen Dräten herum. Freilich, der Gesang, ja, den könnte er doch etwas öfter hören lassen, der Schlingel wird ja mit jedem Tage fauler und endlich — der Vogel ist ja wahrhaftig krank, trotz des schönen Käfigs und bester Pflege. Der herbeigerufene Thierarzt, der hierbei allemal ein renommirter Vogelzüchter ist, besieht sich erst den Käfig und dann den Vogel und zeigt dem besorgten Besitzer, daß derselbe einen entzündlich anzusehenden Unterleib habe. Der Vogel hätte sich an den mit Bleiweiß angestrichenen Dräten tödtlich vergiften können! Ich bin selbst in der Lage gewesen, die Schädlichkeit von dergleichen Käfigen, mit denen mir ein guter Freund aushalf, zu konstatiren. Der Vogel, der sich darin nur wenige Tage befunden, stellte seinen Gesang ein, wurde unwohl und trug noch nach 2 Monaten die Spuren dieses Leidens.

Es giebt nun auch Liebhaber, die alle diese Fehler kennen und vermeiden. Sie wissen, der Vogel ist ein Kind der Lüfte und des Lichts, daher an's Fenster mit ihm! Da hat er ein helles Plätzchen; ja, er kann von da sogar ins Grüne, in den herrlichen Garten schauen, das muß ihm gefallen!

Und es gefällt ihm wirklich, er singt sehr fleißig, ein wenig laut, eigentlich etwas sehr laut zwar; aber das wird sich schon legen; er kann's ja besser, hat er doch früher schöner gesungen. Madame ist eine tüchtige Wirthschafterin, sie scheuert und bürstet, sie fegt mit dem langen Besen, zum Entsetzen des kleinen Sängers in allen Ecken der Stube herum; sie sperrt Thüren und Fenster auf, um den aufwirbelnden Staub herauszutreiben und überläßt es dem Herrn Gemahl, sich unterdessen auf sein Zimmer zu begeben, oder wenn ihm kein solches zu Gebote steht, sich ins Freie zu flüchten. Könnte es der Vogel doch auch so machen! Der aber muß ruhig in seinem Käfige ausharren. Zuerst hat er sich erhitzt, weil er in gar zu bedenkliche Nähe mit dem tückischen Borstwisch gekommen ist und nun, ja an Abkühlung fehlts ihm nicht, der heftige Nordost hat ihm sogar einen ganz gehörigen Husten besorgt. Wenn das so fortgeht (und warum sollte es nicht?) so ist die beste Aussicht vorhanden, daß der kleine, früher so fidele Sänger nach einigen Monaten gestorben ist. Madame wird dann sicherlich nicht verfehlen, dem Herrn Gemahl überzeugend darzuthun, daß so ein Harzer Vogel doch ein recht schwächliches Wesen sei, daß es eigentlich eine Sünde sei, so schmählich viel Geld für ein solches Gethier auszugeben. Madame hätte sich die Mühe eigentlich sparen können; denn sie hat diesmal dem Herrn Gemahl aus der Seele gesprochen. Beide aber denken dabei sicher nicht im Geringsten daran, daß es ihnen selbst unter ähnlichen Umständen mindestens einen gründlichen Schnupfen eingetragen haben würde. —

Meines Erachtens gehört der Vogel garnicht ans Fenster; schon des beständigen Wärmeausgleichs wegen, der sich daselbst vollzieht und den Vogel nöthigt, mehr Nahrung zu sich zu nehmen, wie er sonst gewohnt ist. Mir ist noch gut im Gedächtniß, daß sich ein Liebhaber hierorts bitter bei mir beklagte, daß ein um Weihnachten angekaufter Vogel nach 10 Tagen noch garnicht singen wolle. Es war kein Wunder; der Vogel hing am Fenster und der betreffende Herr hat sich nachher, als er zur bessern Einsicht gekommen war, gar sehr entschuldigt.

(Schluß folgt).

Weiteres über die Fruchtbarkeit der Bastarde.

In Verfolg der hier aufgeworfenen Frage: „Sind die Bastardkanarienvögel fruchtbar oder nicht?“ kann ich aus eigener Erfahrung Nachstehendes mittheilen:

Im vergangenen Jahre, und zwar Anfang Mai, setzte ich ein Männchen Stieglitzbastard (von Kanarien-Weibchen und Stieglitz-Männchen) mit einem Kanarien-Weibchen zusammen, um daran meine Versuche zu machen. Die Thiere parten sich, das Weibchen baute sein Nest, das Männchen betrat das Weibchen vor meinen Augen öfter, und schließlich wurden fünf Eier regelrecht bebrütet. In dieser ganzen Zeit habe ich nie ein Füttern des Männchens beobachtet.

Gegen die Zeit, in der Junge auskommen sollten, trat ich einen zehntägigen Urlaub an, und war in dieser Zeit sehr gespannt, was im Besonderen aus dieser Brut werden würde. Nach der Rückkehr war mein erster Gang zu diesen Thierchen; zu meinem Leidwesen mußte ich aber die Entdeckung machen, daß alle Eier trotz des langen und pflichttreuen Brütens nur Eier geblieben waren. Am nächsten Tage, da das Weibchen immer noch getreulich auf dem Neste saß, öffnete ich die Eier und fand dieselben sämmtlich unbefruchtet. Begattung hatte entschieden stattgefunden, wie ich beobachtet habe, aber sie war ohne Erfolg geblieben.

Dieselben Bastarde hatte ich nach dieser Zeit noch in einer fliegenden Hecke, aber auch da habe ich keine Züchtungsergebnisse erzielt.

Ein anderer Fall, den ich jetzt in dieser Zeit erst beobachtete und noch weiter verfolgen werde, ist folgender:

Im Laufe des Winters kaufte ich von einem Händler als Kanarien-Weibchen einen besonders auffallend gezeichneten Vogel, (braungraue Brust, gelbgrünen Schwanz mit grünen Federn). Nach genauerer Betrachtung fand ich, daß dieser Vogel ein Bastard vom Kanarienvogel und grünem Hänfling ist, was mir der dem Hänflinge eigene und vom Kanarienvogel abweichende Schnabel, sowie seine theilweise entsprechende Färbung und vor Allem seine Stimme zur Genüge bewies. Dieser Vogel nach meiner Ueberzeugung ein Weibchen, befindet sich seit 14 Tagen in einer fliegenden Hecke. Während nun die Kanarienhähne außer ihren Weibchen auch Stieglitz-Weibchen z. B. eifrig verfolgen und überhaupt ihre Aufmerksamkeit schenken, wird dieses Bastard-Weibchen garnicht von ihnen beachtet. Es hat bisher auch garnicht Anstalten zu einem Nestbau gemacht und lebt unbeachtet von seinen Gefährten.

Ich habe die Ueberzeugung, daß meine ferneren Beobachtungen dahin führen werden, daß eine Paarung dieses Vogels mit Kanarienhähnen nicht stattfinden wird. Ebenso bin ich der entschiedenen Ansicht, daß die fraglichen Bastarde unfruchtbar sind; für diese meine Ansicht spricht wenigstens der erwähnte erste Fall. v. B. in Hannover.

Zu der Frage: sind Bastarde fruchtbar oder nicht?

In meiner Stuben-Voliere mit etwa fünfundzwanzig verschiedenen inländischen Vögeln, befinden sich auch 3 Bastarde — 1 Mnch. und 2 Wbch. — zweijährig, vom Stieglitzmännchen und Kanarienweibchen abstammend. Dies Mch. verfolgt zwar in jetziger Paarzeit fortwährend ein grünes Kanarien-Weibchen, auch legte eins dieser Bastardweibchen in etwa 8 Tagen drei ganz kleine olivengrüne Eierchen (etwa wie eine stramme Erbse groß, von welchen ich noch 2 Stück besitze) unten auf den Boden. Deßhalb halte ich die Bastarde nicht für fruchtbar.

L. Wegener in Treptow a. d. T.

Anfragen und Auskunft.

Anfrage: Mein Paar Wellensittiche brütete und vor sechs Wochen schlüpften die Jungen aus. Fünf Wochen später kam ein Junges mit krummen Füßen zum Vorschein und weil es weder laufen noch fliegen konnte, steckte ich es nochmals in den Nistkasten, aber am andern Morgen war es todt. Ich öffnete den Kasten und fand das Junge beim Schnabel angebissen und noch blutend. Ich untersuchte weiter und fand noch von drei Jungen Füße, Flügel und Köpfe, von welchen einer 8, 14 und 25 Tage alt sein konnte. So bin ich denn in der Lage, Sie zu bitten einen Rath zu ertheilen, ob man das Uebel nicht verhindern könnte?

Ferdinand König in Reichenberg.

Antwort demnächst in dem Aufsatz über die Zucht der Wellensittiche. D. R.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein zu Stettin.

Sitzung vom 8. April.

Die in der vorigen Sitzung eingegangene Frage: „Wodurch verdienen die Stare den besonderen Schutz und Vorzug des Ornithologischen Vereins?" beantwortet Herr Hauptmann Boedicker wie folgt: Unter den für den Naturhaushalt vorzugsweise nützlichen Vögeln steht der Star oben an, da er sich hauptsächlich von dem allerschädlichsten Ungeziefer, Kerbthierlarven, Maden, Würmern, Schnecken, Raupen, Heuschrecken u. s. w. nährt. Man sieht ihn nicht nur in Gesellschaft mit Dohlen und Krähen hinter dem Pfluge einherziehen und zu Tage geförderte Engerlinge als Beute für sich oder für seine Jungen erhaschen, sondern auch dem weidenden Vieh auf dem Rücken sitzen und es von dem lästigen Ungeziefer befreien; der Star ist um so geschätzter, weil er als großer Vogel auch verhältnißmäßig eine große Quantität Nahrung gebraucht. Daß er auch Kirschen, Beeren und Weintrauben nicht verschmäht, dürfte wol kein Grund sein, ihn der Verfolgung preiszugeben. Deshalb wird der Schutz der Stare von allen Thierschutz- und Ornithologischen Vereinen nicht nur empfohlen, sondern durch Aushängen von Nistkästen thatkräftig in die Hand genommen. Herr Lieutenant v. Dankbahr hatte zur Ansicht einen lebenden Star ausgestellt, der sich durch sein drolliges Wesen die Anwesenden bald zu Freunden erwarb. — Die zweite Frage: „Welcher Vogel baut die eßbaren Nester, woraus bestehen sie und wie heißt er? beantwortete Herr Prütz in einem längeren Vortrage, dem wir Folgendes entnehmen. Die seit mehreren Jahrhunderten bekannten, doch noch heutigen Tages wenig gekannten Schwalben, welche die eßbaren Nester bauen, sind die Salanganen (Collocalia) und die verbreitetste Art derselben die Collocalia nidifica, welche an der Südküste Javas und im Indischen Archipel vorkommt. Bis in die Neuzeit war die Ansicht der Reisebeschreiber und Forscher die, daß der Stoff zu den Nestern dem Meere und seinen Erzeugnissen entnommen werde. Erst durch Bernstein's umfassende Beobachtungen wissen wir ganz genau, aus welchem Stoff die eßbaren Schwalbennester bestehen. Sie haben im Allgemeinen die Gestalt des Viertheils einer Eierschale, wenn man sich diese ihrem Längedurchmesser nach in vier gleiche Theile getheilt denkt. Von oben sind sie offen, während der Felsen, an dem sie befestigt sind, zugleich die hintere Wand des Nestes bildet. Sie bestehen aus einem durchscheinenden weißen oder bräunlich gefärbten, leimartigen Stoffe, der nichts anders ist, als eine Absonderung der Speicheldrüsen, welche nur während der Brutzeit zu zwei großen Wülsten anschwellen, schon während des Eierlegens aber wieder zusammenschrumpfen und dann weniger größer erscheinen, als dieselben Drüsen bei andern Vögeln. Diese Drüsen scheiden in reichlicher Menge einen dicken, zähen Schleim ab, der sich im vorderen Theile des Mundes, in der Nähe der Ausführungsgänge der genannten Drüsen unterhalb der Zunge ansammelt. Dieser Schleim, der eigentliche Speichel, hat viel Aehnlichkeit mit einer gesättigten Lösung von Arabischem Gummi und ist gleich diesem so zähe, daß man ihn in ziemlich langen Fäden aus dem Munde herausziehen kann. An der Luft trocknet er bald und ist dann in Nichts von jenem eigenthümlichen Neststoff verschieden. Wenn nun die Vögel mit der Anlage ihres Nestes beginnen wollen, so fliegen sie wiederholt gegen die hierzu gewählte Stelle an und drücken hierbei mit der Spitze der Zunge ihren Speichel an das Gestein. Dies thun sie oft zehn bis zwölf Mal hintereinander, ohne sich inzwischen mehr als einige Ellen zu entfernen. Die Anfangs dickflüssige Masse verdunstet bald und bildet nun eine feste Grundlage für das weiter zu bauende Nest. Der Vogel klammert sich, je mehr der Nestbau fortschreitet, an dasselbe an und trägt unter abwechselnden Seitenbewegungen des Kopfes den Speichel auf den Rand des schon bestehenden verhärteten Nestes. In dieses Nest legt die Salangane ohne weitere Unterlage zwei glänzend weiße, ziemlich lange und spitze Eier. Die dunkelbräunlichen, im Handel weniger geschätzten Nester sind ältere, in denen Vögel ausgebrütet und aufgezogen sind, die weißen theuren dagegen sind neu angelegte. Die ergiebigsten Bruthöhlen befinden sich an der Südküste Java's. Die kühnen Nestsucher lassen sich an einem 90 Faden langen Seile Einer nach dem Andern in die oft schauervolle Tiefe hinab. Wer stürzt ist rettungslos verloren.

Auch in den Höhlen selbst wird ihnen die donnernde Brandung noch gefährlich. Fast alle gesammelten Nester gehen nach China, woselbst die Chinesen für diese Speichelleckereien in des Wortes eigentlichster Bedeutung fabelhafte Summen zahlen. Zur Veranschaulichung hatte Redner aus dem Pommerschen Museum ein präparirtes Exemplar der Salangane und zwei verschieden gefärbte Nester derselben ausgestellt. — Hr. Maader spricht über die Schädlichkeit der Reiher und Kormorane, fordert zu ihrer Ausrottung dringend auf, und ladet diejenigen Mitglieder, welche sich speziell dafür interessiren, zu einer Sonntag, den 12. April stattfindenden Reiherjagd bei Curow ein, was von vielen Anwesenden dankend angenommen wird. — Herr Creutz macht Mittheilung über die Konstituirung des neuen Vorstandes, und die beabsichtigte zweckmäßigere Vertheilung der Arbeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder. Zum Inventarienverwalter wurde einstimmig Herr Kaufmann Freese gewählt. — Aus Neustettin war dem Vereine ein präparirter schwarzer Sperling zum Geschenk übersandt, der der Vereins-Sammlung dankend einverleibt wird. Vom Ausstellungs-Komitee der im Juni in Bremen stattfindenden internationalen landwirthschaftlichen Ausstellung waren Plakate und Prospekte zur Betheiligung daran eingegangen, die zur Kenntniß der Versammlung gelangten, ebenso der Jahresbericht des Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht (Sektion des westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst) in Münster. Neu aufgenommen werden acht Mitglieder.

Briefwechsel.

Herrn Rendant Kannenwurf: Ihren Beitrag mit Dank empfangen und für die betreffende Zeit bereit gelegt. — Herrn Ernst Lieb Palmyra: Der uns freundlich zugesagte Besuch in der Vogelstube soll willkommen sein, ebenso wie Ihre Beiträge, deren letzten wir soeben erhalten haben. — Herrn F. R. Harren in Kissingen: Wenden Sie sich zum Bezug der von Ihnen gewünschten Vögel an die Vogel-Handlung von A. Hendschel in München, welche wir Ihnen als durchaus reel und zuverlässig auf das Wärmste empfehlen können. — Herrn Burdötz von Kövend, Stationschef in Abro: Durch die Erkrankung des Herausgebers war die Beantwortung Ihrer Anfrage ebenso wie unzählige andere verzögert. Wir bitten sehr um Entschuldigung und geben Ihnen nun den Bescheid, daß Herr Händler Brune in Berlin, Gartenstraße 62 die von Ihnen gewünschten Vögel von Zeit zu Zeit aus Rußland mitbringt. Am besten ist es, wenn Sie dieselben im Voraus bei ihm bestellen. Recht schöne Alpenlerchen hat übrigens der Herausgeber der „Gefiederten Welt" in einigen Pärchen abzugeben.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Die
erste allgemeine Geflügel-Ausstellung
des Vereins
„Fauna"
in **Düsseldorf** findet während der Pfingsttage
vom 23. bis 26. Mai
in den Räumen der städtischen Tonhalle Statt.

Die Ausstellung, verbunden mit Verloosung, umfaßt **Hühner, Enten, Tauben, Sing- und Ziervögel,** sowie auch **Kaninchen.**

Programme sind von Herrn Dr. **Schoenfeld,** Loose à 10 Sgr. von Herrn Bankier **Leouh. Scheuer** in Düsseldorf zu beziehen. [276

Der Vorstand.

C. Reiche,
Alfeld, Provinz Hannover
erhielt frische Zufuhr
Sonnenvögel oder Pecking-Nachtigalen und Blauheher.
277] Außerdem noch am Lager:
Karolinen-Sittiche, rothe Kardinäle und wilde Puter.

Ein großer, sehr schöner, ganz zahmer, weißer **Kakadu** mit weißer Haube, Männchen, ist Umzugshalber für 20 Thaler verkäuflich bei [278
C. Lischke, Stettin, gr. Domstr. 20.

Eine Drossel, die fleißig und schön singt, mit Hanf sich füttern läßt, sowie noch 2 Schwarzplättchen à St. 2 Thlr. in feinen Exemplaren hat noch abzugeben. Fried. Kieser, Karlstadt a/M. [279

Ich suche 1 Weibchen kalifornische Wachtel oder 2 Weibchen u. 1 Männchen zu kaufen, und habe 1 St. einjährigen Goldfasanhahn zu 5 Thlr. zu verkaufen. J. Seybold,
280] Baumeister in München.

12 bis 16 Paar schöne Schwäne verschiedenen Alters, à Paar 20 bis 24 Thlr. sind abzugeben. Offerten unter C. R. III. befördert die Expd. d. Blattes. [281

1, 3. Hamburger Silberlack vorjährig Thlr. 10.
1, 1. Türk. Enten Thlr. 5½
282] Königsbronn, Würtemberg. **D. Aysslinger.**

Naturalienhandlung
von **Wilh. Schlüter** in Halle a. S.
Die Preisverzeichnisse Nr. 39 über spanische und Nr. 40 über kalifornische Säugethiere und Vogelbälge, Schädel, Eier, Nester 2c. sind erschienen und stehen auf Verlangen gratis zu Diensten. [283

Berichtigung.
In meiner Annonce in Nr. 17 muß es heißen:
grüne Kardinäle 14 anstatt 11 Thlr.,
etwas gefleckte Reisvögel 18 = 14 =
Senegal-Elsterchen 5½ = 11 =
C. Gerstein, Vogelhändler
284] Hannover.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Praktische Anleitung
zur
künstlichen Ausbrütung
der
Eier aller Arten Geflügels
und der
Aufzucht der künstlich ausgebrüteten jungen Hühner, Enten, Gänse und Truthühner.
Mit 4 Zeichnungen nebst einem Anhange über die **rationelle Kaninchenzucht.**
Herausgegeben
von
J. H. Krantz.
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage
Preis 10 Sgr.
Berlin. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung
285] 32 Wilhelmstraße SW.

Die

C. Hagenbeck'sche

Handelsmenagerie

Hamburg

hat vorräthig: hell- und dunkelrothe Araras, Nasen-, Rosa- und kleine gelbhaubige Kakadus, Graupapageien, Surinam-, Amazonen-, Neuholländer-, Sonnen- und Brillenpapageien, 1 Mohrenpapagei (Conurus jendaya), blaue Gebirgsloris, Pennantis, Rosellas, Königs-Sittiche, Portlinkoln-, Ring-, Vielfarbige-, Rothrumpf-, Barrabands-, Rothstirnige Neuseeländer- und Nymphen-Sittiche, Gelbwangensittiche, Wellensittiche (direkt importirte) à Paar 6 Thlr., Inseparables, grauköpfige Inseparables, von letzteren sind noch einige Weibchen vorräthig; Sperlingspapageien, rothe, graue und Dominikaner-Kardinäle, letztere à Paar 6 Thlr.; Safranfinken, kastanienbrüstige Schilffinken, schwarzköpfige Nonnen (noch nicht in Farbe), Muskatvögel, bunte japanesische Mövchen, Bandvögel, Reisvögel, gelbschultrige Wittwen, Sammetweber, Napoleonsvögel, Feuerfinken oder Orangeweber, Madagaskar-Weber, Rothkopfweber, Indische Gelbkopfweber (Ploceus bengalensis), Maskenweber, Männchen von Ploceus textor, kastanienbrüstige Weber, große Orangeweber, Chinesische Heherdrosseln (Garrulax chinensis), Chinesische Spottvögel, Amerikanische Spottvögel, kleine und große Beo, Chinesische und gemeine Mynah, weißgeschäckte Indische Stare, schwarze Büll-Büll, sehr schöne Sänger, à Stück 7 Thlr.; Rothflügelstare, Kuhstare, Seidenstare, rothbrüstige Stare von Chili (Sturnus militaris), Sonnenvögel, Hüttensänger, Jamaika-Trupiale, Indische Perlhalsbandtäubchen, Flötenvögel.

[286]

In den nächsten Tagen trifft eine große Sendung afrikanischer Finken ein.

J. F. UMLAUFF

Naturalienhandlung

Spielbudenplatz № 8. St. Pauli

Hamburg

empfiehlt

sein Lager roher und gereinigter **Konchilien** und **Korallen.**

Alle Sorten Muscheln, gereinigt und roh,

en gros & en detail,

287]

Gartenmuscheln in großer Auswahl.

Ethnographische Sachen, Antilopen- & Hirschgehörne 2c.

Alle Arten Naturalien,

Gold- & Silberfische, Schildkröten für Aquarien.

Nach meiner Rückkehr von Südamerika habe ich meinen Wohnsitz vorläufig wieder in **Grünau** bei Berlin genommen.

Ich brachte einen beträchtlichen Transport

wilder Thiere und Vögel

mit, und von denselben sind noch folgende immer vorhanden: Spottdrosseln, graue und rothe Kardinäle, virginische Wachteln, Morgenfinken, blaue Hüttensänger, Baltimore-Oriols, Katzen- und Wanderdrosseln.

Villa Schöbel.

Rudolf Schoebel,

288] Vogel- und Thierhändler aus Amerika.

Ein großes schönes fast neues mess. Papagei-Bauer ist billig zu verkaufen. Näheres in der Expedition d. Bl. 32 Wilhelmstraße. [289

2 Paar kräftige selbstgezogene Hartlaubszeisige sind à P. 4½ Thlr. abzugeben.
290] Böttcher, Oranienstraße 66 III.

Den geehrten Herren Vogelliebhabern und Händlern zur gefälligen Anzeige, daß ich am hiesigen Platze eine Filiale der

Handelsmenagerie und Naturalienhandlung

von

Chs. Jamrach

aus London

errichtet, und einen beträchtlichen Transport an Vögeln, Affen und andern Thieren, sowie Muscheln u. dgl. von London mitgebracht habe, durch welchen ich jeden Auftrag pünktlich effektuiren kann.

Besonders zu erwähnen sind: zwanzig verschiedene Arten Affen, graue Papageien, Kakadus, chinesische Sonnenvögel, Blaue Gebirgslori, Amazonen, Königssittiche, verschiedene Parakets, Wellensittiche, Silberfasänchen, Bandvögel u. s. w. [291

R. Risser

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz **21.**

Bruteier zu verkaufen:

von Brama-Putra à 5 Sgr., Spanier à 5 Sgr., La flèche à 5 Sgr, Breda (schwarz) à 4 Sgr., Hamburger Sprengel (Alltagleger) à 4 Sgr., Hamburger Silberlack à 4 Sgr., Hamburger Goldlack à 4 Sgr., Bergische Kräher à 4 Sgr., Holländer à 4 Sgr., Padnaner (Goldlack) à 4 Sgr., Padnaner (grau) à 4 Sgr., Padnaner (gelb) à 4 Sgr., Houdan (Wanzenauer) à 5 Sgr. Sämmtliche Stämme sind zuchtfähig und mehrfach prämiirt. Verpackung als die beste bewährt und bei 12 Stück gratis. Versandt reel und prompt gegen Nachnahme, oder Posteinzahlung mit Bestellung.

292] **Johannes Nill,** zum Thiergarten, in **Stuttgart.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin. C. F. Pilger's Buchdruckerei in Bernau.

Dieser Nr. liegt ein Programm nebst Anmeldebogen des Vereins „Fauna" zu Düsseldorf bei.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 1 Thlr.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 14. Mai 1874. Nr. 20.

Inhalt:

Heilung eines Jako. —
Noch einmal über das häufige Sterben der jungen Harzer Kanarienvögel (Schluß). —
Weshalb taugen so sehr viele Kanarienweibchen nichts? —
Weiteres über Bastarde. —
Zur Ueberwinterung.
Heizstoff für den Ofen der Vogelstube. —
Zur Fütterung: Gemisch für Wurmvögel. —
Das italienische Huhn. —
Briefliche Mittheilungen: Schleiereule; Nachtigal; Wellensittiche; Kreuzschnabel; Vogelzucht und Liebhaberei; Reisvogelzucht. —
Anfragen und Auskunft: Kahlgewordene Vögel; Fütterung der Insektenfresser; Hühner. —
Briefwechsel. — Anzeigen.

Heilung eines Jako.

Vor etwa einem Jahre erhielt ich ebenfalls von Herrn Hagenbeck drei Graupapageien mit dem Bemerken, daß diese kein Trinkwasser, sondern nur altbackenes, eingeweichtes und ausgedrücktes Weißbrot und Hanf bekommen sollten. Ich fütterte demgemäß so: Der Hanf wurde aber gänzlich verschmäht, sie lebten nur vom Weißbrot, fraßen aber ziemlich gut; ich hielt sie sämmtlich zusammen in einem großen geräumigen Käfige. Der eine war schon krank und sehr schlecht auf den Beinen, als ich sie erhielt und starb nach 4 Wochen, und alle gaben sie sehr wässerige Exkremente von sich. Die beiden Andern lebten zwar, aber wie ich sehen konnte, ebenfalls in krankem Zustande, trotz aller möglichen Sorgfalt. Da starb nach 2—3 Monaten auch der zweite. Ich machte mich nun ernstlich daran, den dritten zu retten, welches mir auch glänzend gelungen ist, denn der Vogel befindet sich nun seit einem halben Jahr so gesund wie ein Fisch. Er hält den Schnabel den ganzen Tag hindurch nicht, lernt Alles was man ihm vorspricht, pfeift und übt gymnastische Künste, so daß es ein wahres Vergnügen ist, den Vogel zu sehen und hören.

Meine Kur bestand in Folgendem. Ich gab diesem Vogel, nachdem der vorletzte gestorben war, weiter nichts als: Kicks (feines englisches Theebrot), welches bekanntlich nur aus feinstem Weizenmehl und ein wenig Zucker besteht, ohne jegliche Spur von Hefen. Dazu erhielt er täglich zwei bis drei gute Wallnüsse und soviel Johannisbrot als er haben mochte, dabei ließ ich ihn zweimal täglich trinken, und er trank dann sehr viel. Später, als sich der Vogel sichtlich erholt hatte, auch fliegen konnte, setzte ich ihn mit diesem Futter in die große Vogelstube zu den andern kleinen Vögeln und Wellensittichen, die er durchaus garnicht behelligt oder schädigt. Hier kann er trinken, soviel er will.

In der letzten Zeit reiche ich ihm anstatt der Kicks wieder ganz altes Weißbrot des Vormittags, aber Nachmittags bekommt er noch seine Nüsse und dabei befindet er sich gesund und wohl, doch scheint er mir weniger zu trinken. Sollte ich aber wieder das geringste Anzeichen von Erkrankung entdecken, so werde ich gleich wieder zurück zu den Kicks greifen.*) Bis jetzt sind die Exkremente jedoch immer ganz natürlich. Noch muß ich bemerken, daß der Vogel, der ja Zugang zu allem Futter in der Vogelstube hat, sich täglich eine Portion gekochtes Hühnerei und 4—5 Mehlwürmer als besondere Leckerbissen holt, aber von Sämereien und Ameiseneiern Nichts anrührt.

F. Werner, Fabrikant in Aarhuus in Dänemark.

*) Denn ich gebe den Hefen im Weißbrot die Schuld.

Noch einmal über das häufige Sterben der jungen Harzer Kanarienvögel.

Von W. Böcker in Wetzlar.

(Schluß).

Bei einem andern hiesigen Liebhaber hatte ich vor mehreren Jahren Gelegenheit, einen ehedem sehr fleißigen und sehr vorzüglichen Sänger zu besichtigen, der seinen Gesang in den besten Monaten des Jahres eingestellt hatte. Der Vogel war sehr mager, das Futterglas gefüllt; aber in dem Letztern befanden sich unter einer geringen Quantität Samen die Hülsen aus langer Zeit. Alles hatte einen muffigen Geruch und das Trinkgeschirr war ebenfalls in langer Zeit nicht gereinigt. Bei einem dritten Liebhaber fand ich einmal beide Futtergläser gänzlich leer, und dabei noch die Klage, daß der Vogel so wenig sänge!

Einem Liebhaber in Siegen, einem Schankwirth seines Gewerbes, war sein sehr trefflicher Kanarienvogel heiser geworden. Bei dem starken Ab- und Zugehen der Gäste mochte sich der Vogel eine Erkältung zugezogen haben; vielleicht war ihm auch der überaus dichte Tabacksrauch lästig gefallen. Kurz, der Vogel mußte aus der Schenkstube heraus, er wanderte in ein anderes Zimmer, aber — es war nicht geheizt und so ungemüthlich kalt, daß ich es selbst nicht lange darin aushalten konnte. Darin sollte nun der Vogel wieder gesund werden!

Diese Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, wie die Vögel außerhalb des Harzes oft behandelt werden. Welcher Abstand zwischen der sorgfältigen Pflege der Harzer Züchter sowie der einsichtiger Händler! Die jetzt verstorbene Händlerin Frau Dölitzsch aus Andreasberg trug in Köln niemals einen Vogel über einen schmalen Flur in ein anderes Zimmer, ohne den Käfig vorher sorglich mit einem Tuch zu bedecken.

Es ist mir oft, wenn ich mich der zweckwidrigen Behandlung der Harzer Kanarienvögel erinnerte, der Gedanke gekommen, daß ihrer noch viel mehrere zu Grunde gehen würden, wenn sie nicht eine so schmiegsame Natur besäßen.

Bei alledem bin ich der Letzte, der es bestreitet, daß die Vögel in der Harzer Rasse im Allgemeinen ausdauernder sein könnten, denn manche gehen allerdings ohne Schuld des Besitzers an der oben erwähnten erblichen Krankheit zu Grunde; soviel ist indeß wol unbestreitbar, daß sie lange genug am Leben bleiben, um von ihnen eine zahlreiche und gesangestüchtige Nachzucht zu erhalten.

Eine andere Gefahr bedroht aber die Liebhaberei an dem Halten der Harzer Kanarienvögel. Es ist nachdem, was wir in diesen Blättern darüber gelesen haben, wol nicht mehr zu bezweifeln, daß der Gesang dieser Vögel seit den letzten 20—30 Jahren im Allgemeinen zurückgegangen ist.

Eine Ursache hat Herr C. Reiche in seinem Bericht über die Ausfuhr der Harzer Kanarien mit anerkennenswerther Offenheit dargelegt; es ist die massenhafte Ausfuhr zu einer Zeit, wo die jungen Vögel kaum, ja nicht einmal halb ausgebildet sind. Hiergegen wird sich nichts machen lassen.

Eine andere Ursache ist das allzufrühe Versenden der Vögel, wie es in neuester Zeit einzureißen droht und zwar zum Schaden beider Theile. Wenn vom Monat August ab schon junge Vögel versendet werden, so bin ich zwar der Ueberzeugung, daß dies im guten Glauben geschieht, in der ehrlichen Meinung, der junge Vogel werde sich schon selbst fortzuhelfen wissen; aber ein jeder erfahrener Züchter wird mir darin Recht geben, daß derartige so früh von ihren Lehrmeistern getrennte Vögel — ganz seltene Ausnahmen abgerechnet — das nicht werden, was sie unter andern Umständen hätten werden können. Mit mittelmäßigen Vögeln ist aber ein guter Gesang in der Nachzucht nicht zu erreichen; in den meisten Hecken bleiben ohnehin die jungen Vögel hinter den Leistungen der alten Zuchthähne zurück. — Man lasse sich in dieser Hinsicht nicht durch die Erklärungen Anderer beirren, welche behaupten, bei derartigen Zusendungen gute Vögel erhalten zu haben. Man höre selbst; denn nicht jeder Liebhaber ist zugleich Kenner eines guten Gesanges.

Vor Anfang oder Mitte November sollte kein junger Vogel abgegeben werden, selbst das ist noch ein früher Termin. Erfahrene Züchter werden mir darin beipflichten, daß der Gesang der jungen Harzer Kanarien um Weihnachten ungleich besser ist, als Anfangs November und daß sehr viele junge Vögel auch nach dieser Zeit noch besser im Gesange werden.

Weshalb taugen so sehr viele Kanarienweibchen nichts?

Es ist leider nur zu wahr, was bereits mancher Berichterstatter der „Gefiederten Welt" ausgesprochen hat, nämlich: daß man neben vielen guten Erfolgen in der Vogelzucht, noch über viel mehr Mißerfolge zu berichten hat. — So will ich mir heute erlauben, über die Kanarienweibchen Klage zu führen, in der Ueberzeugung, daß viele Kanarienzüchter in diesem Punkt Mitleidende sind und sich gleich mir, freuen und es höchst dankbar anerkennen würden, wenn irgend ein erfahrener Züchter, etwa Herr Kontroleur Böcker in Wetzlar, die große Freundlichkeit haben wollte, die oben gestellte Frage, soweit es sich thun läßt zu beantworten und hinzuzufügen, ob es denn nicht Merkmale giebt, woran man die zur Hecke brauchbaren Weibchen von den unbrauchbaren unterscheiden kann, ohne es mit einem jeden Vogel erst auf die Probe ankommen zu lassen, wobei, ganz abgesehen von dem Verdruß für den Liebhaber, viel Zeit vergeht und die Hähne unnütz angegriffen werden.

Ich selbst züchte schon seit Jahren Kanarienvögel, stets in Heckbauern zu je einem Hahn und 2—3 und ausnahmsweise auch 4 Weibchen in jedem Käfig und mache alljährlich die böse Erfahrung, daß von den eingeworfenen Weibchen immer höchstens die Hälfte sich als brauchbar erweisen. Am meisten wundert mich dabei auch noch das, daß oft Weibchen, die im ersten Jahre vorzüglich gebrütet haben, im nächsten es nicht nur zu keiner Brut bringen können, sondern sich noch allerlei Unarten angewöhnen.

In diesem Jahre habe ich drei Hecken eingerichtet und acht dem Aeußeren nach schöne und gesunde Weibchen eingeworfen, darunter zwei alte, die bereits im vorigen Jahre sich bewährt hatten. Und wieder taugen schon vier von ihnen nichts. Von den erwähnten Alten mußte ich das Eine ganz entfernen, weil es selbst nur fortwährend bauend und von Zeit zu Zeit Eier ohne Schale legend (für Kalk war durch Darreichung von Hühnereierschalen gesorgt), den Hahn dabei dennoch dermaßen mit sich allein zu beschäftigen verstand, daß derselbe für die übrigen Weibchen garkeine Zeit hatte. Ein zweites, überaus schmuckes Weibchen parte sich sofort nach dem Einwerfen, war in 10—12 Tagen mit dem Ausbau ihres Nestes fertig und brütet jetzt bereits über zwei Wochen ganz fest — leider ohne ein einziges Ei gelegt zu haben! Ein drittes Weibchen legte drei ganz winzige auffallend helle Eierchen, welche in einigen Tagen auch wieder zerdrückt und verschwunden waren, füttert aber jetzt wenigstens ein untergeschobenes Pflegekind. Ein viertes Weibchen endlich versuchte ich nach einander zu allen drei Hähnen zu lassen, mußte es aber aus reinem Mitleid aus allen Hecken wieder fortnehmen, weil es in keiner derselben von den Hähnen gelitten, sondern allemal fast todt gemacht wurde. Und in ähnlicher Weise geht es mir beständig und dadurch bin ich gezwungen, stets die doppelte oder gar dreifache Anzahl Weibchen als ich eigentlich brauche, vorräthig zu haben.

J. Schulp,
Regulirungs-Dirigent in Riga.

Noch Weiteres über die Bastarde.

Ich setzte vor einigen Jahren einen schönen männlichen Bastard, den ich von einem männlichen Distelfink und einem weiblichen Kanarienvogel gezogen hatte, mit einem Kanarienweibchen zusammen in einen Heckkäfig. Das Band der Liebe vereinigte sie nach wenigen Tagen, und ich war Zeuge einer oftmaligen Begattung. Das Weibchen legte 4 Eier, brütete eifrig und wurde auf dem Neste von dem Bastard gefüttert. Nach 8—10 Tagen untersuchte ich das Gelege und fand alle Eier klar. — Ich entfernte dieselben und ließ das Pärchen zur zweiten Brut schreiten. Es erfolgte wieder die Begattung und tadelloses Brüten von Seiten des Weibchens. Nach 10 Tagen fand ich die Eier wieder unfruchtbar. Das Jahr darauf setzte ich den nämlichen Bastard zu einem andern Weibchen und ließ zwei Bruten machen, die aber denselben ungünstigen Erfolg hatten, als im vorhergehenden Jahr. Da der Bastard offenbar einen regen Geschlechtstrieb zeigte, so halte ich eine fruchtbare Parung demnach für möglich und werde meine Versuche fortsetzen. Sehr interessant würde es doch jedenfalls sein, wenn die wol noch ungelöste Frage durch recht viele zuverlässige Mittheilungen endlich völlig festgestellt würde.

Adolph Herold, Lehrer in Cronenberg.

Da auch wir der am Schluß ausgesprochenen Ansicht sind, so wollen wir alle Mittheilungen über Erfahrungen in dieser Hinsicht gern aufnehmen.

D. R.

Zur Ueberwinterung.

Im ersten Jahrgange Ihrer Zeitung beklagt sich Herr E. Linden in Radolfzell über die Verluste, welche ihn betroffen, als er seine Vögel aus den Sommer-Räumlichkeiten in das Winterquartier brachte und dasselbe hört man auch nicht selten von verschiedenen andern Züchtern. — Es wäre mir interessant zu erfahren, ob diese Herren seitdem auch schon Versuche gemacht haben, ihre Vögel in einer gegen Zug geschützten Voliere im ungeheizten Raume oder ganz im Freien das ganze Jahr, Sommer und Winter hindurch zu belassen, ohne im Winter etwas mehr zu thun, als zur Abhaltung der ärgsten Kälte an einigen Stellen Fensterscheiben anzubringen und den übrigen Theil der Voliere mit Strohmatten zu umstellen. Ich habe mehrfach gefunden, daß sogar der zarteste Vogel ebenso gut Kälte (wenn sie nicht übertrieben ist), als Hitze vertragen kann und die Vögel sich wohler im Freien als im geheizten Zimmer fühlen, wenn auch die Kälte bis zu 12—15 Graden sinken sollte. Man muß nur reichlich und gut füttern, dabei, wenn das Wasser gefriert, es nicht an frischem mangeln lassen, so hat es wenig Gefahr. Beweise hierfür habe ich reichlich, da ich und mehrere meiner Freunde hier Volieren haben, in denen Kanarien, Webervögel, Nymphen, Wellensittiche u. a., ferner Amseln, Nachtigalen, Rothkehlchen, Schwarzköpfchen sogar bei 20 Grad ausgehalten haben und nur dann hin und wieder ein Wellensittich starb, wenn es in die Voliere regnete.

Wenn ich sehe, wie dies in manchen zoologischen Gärten der Fall ist, daß den Vögeln in heißen Räumen, irgendwo sogar in einem stinkenden Affenhause der Wohnsitz angewiesen ist, dann weiß ich nicht, wie sehr ich die armen Vögel bedauern soll.

Häufiger Temperaturwechsel kann jedem Vogel nur schädlich sein und es muß doch eine sehr sorgsame Heizung stattfinden, wenn es nicht eintreffen sollte, daß einmal 7 Grad und dann wiederum vielleicht bis zu 20 Graden Hitze sich entwickelt.

P. Beines, Fabrikant in Rheydt.

(Wir bringen diese Anregung mit der Bitte, daß die Leser alle etwaigen Erfahrungen in Betreff der Ueberwinterung der verschiedenen fremdländischen Vögel recht zahlreich hier mittheilen mögen. D. R.).

Heizstoff für den Ofen der Vogelstube.

Der Vogelzüchter und Liebhaber hat wol mit mannichfachen Unannehmlichkeiten zu kämpfen und manchen recht herben Verlust zu beklagen, dadurch, daß er die Stätte, welche er seinen gefiederten Freunden zum Aufenthalte angewiesen hat, bei eintretender kalter Jahreszeit entweder garnicht heizen kann, oder eine Erwärmung der betreffenden Lokalitäten doch nur ungenügend, mitunter aber in einer, das zarte Leben der Vögel nur zu sehr gefährdenden Weise vornehmen kann.

Obwol den Meidinger'schen Füllregulirösen ihre guten Eigenschaften durchaus nicht abzusprechen sind, so ist es doch das in Anwendung kommende Brenn-

material, (Coaks oder Steinkohlen) resp. die während des Verbrennungsprozesses dieser Stoffe sich entwickelnden Dämpfe, welche der Gesundheit der Vögel äußerst nachtheilig sind und manchem edlen Sänger das Leben rauben, ohne daß sich der Eigenthümer dessen Tod erklären könnte. Und wie leicht kann nicht der Fall eintreten, daß durch zu festes Schließen der Klappe, oder durch irgend einen anderen unglücklichen Zufall während der Abwesenheit des Pflegers, der Rauch, statt durch das Rohr des Ofens zu strömen, seinen Ausweg durch alle Ritzen und Oeffnungen in die Vogelstube sucht, und diese nach und nach so mit Qualm anfüllt, daß die ganze darin befindliche gefiederte Gesellschaft elend ersticken muß! (siehe „Gefiederte Welt" Jahrgang 1873 Nr. 8: Kohlendunst in der Vogelstube).

Es ist nun in jüngster Zeit ein Erzeugniß in den Handel gekommen, welches sich, neben vielerlei technischen und industriellen Zwecken, nach damit anzustellenden Versuchen als äußerst zweckmäßig zur Erwärmung von Vogelstuben und Brüträumen erweisen dürfte; es ist dies die sogenannte „Preßkohle". — Abgesehen davon, daß sich deren Verbrennungsproceß sowol der Intensität als auch der Zeitdauer nach genau reguliren läßt, und somit Grad und Dauer der Wärmeerzeugung in die Hand des Anwendenden gibt, besitzt die Preßkohle noch die, für den vorliegenden Zweck hauptsächlich in die Wagschale fallende werthvolle Eigenschaft, daß dieselbe, während ihrer Verbrennung durchaus keinen Rauch oder schädliche Gase erzeugt, und, wenn angezündet ohne jedes weitere Zuthun und Nachsehen von der angezündeten Fläche aus ruhig und gleichmäßig fortbrennt resp. glüht. Außer dieser, von dem Vogelfreund nicht hoch genug anzuschlagenden vorzüglichen Eigenschaften der Preßkohle, liegen die weiteren Vorzüge in der Handlichkeit, Reinlichkeit und leichten Verwendung des meistens in Backsteinform gepreßten Stoffes, zu dessen Anwendung in den meisten Fällen eine besondere Einrichtung nicht erforderlich ist, und endlich in der Vermeidung jeglicher Schlacken-Bildung, Schmutz- oder Sprühfunkenerzeugung — Schattenseiten, die fast jedes andere Brennmaterial mit sich führt.

Die Anwendung der Preßkohle ist eine äußerst einfache: Man braucht nur eine solche an einer der schmalen Flächen anzuzünden, und in dem vorhandenen Ofen, auf eine Eisen- oder Steinplatte, oder noch besser in einem zu diesem Zwecke hergestellten wenig kostspieligen Apparat zu legen, um des Tags und der Nacht über eine geregelte, gänzlich ungefährliche Wärme zu haben, die keines weiteren Nachschürens bedarf. Ist eine Kohle abgebrannt, so wird sie einfach durch eine neue ersetzt und auf diese Weise eine stets gleichmäßige Temperatur unterhalten, was doch bei der Vogelzucht, namentlich aber während des Brutgeschäftes von höchster Wichtigkeit ist. Bei der Heizung mit anderen Brennstoffen besteht immer die Gefahr der Erzeugung zu großer Hitze oder des gänzlichen Erlöschens. Wie lange Zeit eine Preßkohle gebraucht, bis sie gänzlich verbrannt ist, und alsdann durch eine neue ersetzt werden muß, wird sich durch die Praxis sehr leicht ergeben, da in dieser Beziehung der Grad der Wärmeerzeugung bestimmend ist.

Der Preis der Preßkohle ist 6 Thlr. p. 100 M. ab hier, in Kisten von ca. 2 Ctr., welche letzteren extra berechnet werden; jede einzelne Kohle ist in Papier verpackt. Es werden indeß auch kleinere Quantitäten abgegeben; Zahlungsbedingung entweder Einsendung oder Gestattung der Nachnahme des Betrages.

Ich richte diese Zeilen an Sie, da ich weiß, daß Sie jede praktisch befundene neue Einrichtung den vielen Vogelfreunden durch Wort und Schrift zugänglich machen. Die vorzüglichen Eigenschaften der Preßkohle, als Heizmaterial für Vogelstuben dürften gewiß wichtig genug sein, um solche einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, weßhalb ich mir erlaube Ihnen anbei einige Stücke zu senden, in welchem Kaliber die Preßkohle meistens angewendet wird. Es soll mir zur großen Freude gereichen, von Ihnen zu vernehmen, daß Sie, nach gemachter Probe die Meinung, welche ich von der Preßkohle hege, theilen, wonach ich gerne die Quelle zum Bezug derselben veröffentlichen werde.

Hch. Hisgen in Frankfurt a. M.

Zur Fütterung.

Um das lästige Mitnehmen des Fleisches von meiner Mittagstafel aus dem Gasthause zu vermeiden, kam ich auf den Einfall, anstatt Fleisch das Liebig'sche Fleischextrakt zu verwenden, welches ich im heißen Wasser zur guten Suppe aufgelöst, noch im warmen Zustande auf ein Gemenge von gleichen Theilen getrockneter Ameisenpuppen und Eierbrot gieße und dadurch ein wirklich ausgezeichnetes gesundes Futter erreiche, wobei auch die Ameisenpuppen durch diese warme Suppe aufgequellt werden, was besonders für die zarteren Vögel sehr vortheilhaft wirkt. Diese Futterbereitung hat, wenigstens für mich, jenen großen Vortheil, daß es sehr schnell bereitet wird, während das langweilige Mörenreiben und Fleischschneiden jedenfalls längere Zeit beansprucht. — Nur etwas wäre dagegen einzuwenden, daß die Vögel leicht zu fett werden, was jedoch durch kleinere Portionen behoben werden kann. C. Paulin in Klagenfurt.

Das italienische Huhn.

Oder richtiger das Huhn von Livorno genannt.

Nachdem wir hier bereits einmal (vergl. Nr. 20 v. J.) eine ausführliche Besprechung des italienischen Landhuhns aus der Feder des Herrn A. Rumpf in Zürich mitgetheilt, ist gerade dies Huhn neuerdings gleichsam als Gegenstand einer Streitfrage aufgetaucht und zwar in Folge der Ausstellung des Vereins „Cypria" in Berlin. Wir kommen daher vielseitigen Wünschen gern nach und bringen noch eingehende Ergänzungen.

Herr Rumpf, welcher bekanntlich diese Hühner nach Deutschland einführt, fügt zu seiner damaligen Darstellung noch Folgendes:

Die eigentliche Heimath dieses Landhuhns ist in der Umgegend von Livorno zu suchen. Von hier aus hat dasselbe eine weite Verbreitung nicht allein über Italien, sondern auch nach Amerika, England und neuerdings in Deutschland gefunden. Die in früherer Zeit ausgeführten Hühner dieser Art haben bereits gezeigt, daß diese Hühnerrasse einer ganz bedeutenden Veredelung fähig ist, während sie schon an und für sich, so wie sie eben von der Heimath ausgeführt wird, durch empfehlenswerthe Eigenthümlichkeiten sich auszeichnet, sie ist daher von vorn herein, wenn auch noch nicht zu den Edelhühnern zu zählen, so doch zu denen, welche in der Hand verständnißvoller Züchter zu hoher Vollkommenheit geführt werden können. Es ist ja bekannt, daß alle unsere am höchsten geschätzten edlen Hühnerrassen keineswegs in diesem vollkommenen Zustande bereits in ihren betreffenden Heimathsländern umherlaufen, sondern daß sie sämmtlich gleichsam als Kunstprodukte der Züchtung angesehen werden müssen.

Dies italienische Landhuhn, welches also bereits herrliche Eigenschaften zeigt und einer noch ungleich größeren Veredelung fähig ist, findet sich gegenwärtig schon in der Lombardei, Venetien und so ziemlich in ganz Italien in bedeutender Anzahl verbreitet, während es daneben hier auch andere, bedeutend weniger edle und der Veredelung fähige Landhühner in Italien giebt, welche zugleich viel zahlreicher als jene edleren vorhanden sind. In dem „The illustrated boock of Poultry“ von Wright sind diese letzteren Hühner als Leghorns in verschiedenen Farbenvarietäten beschrieben und abgebildet, und ich füge nur noch hinzu, daß diese Hühner von Livorno gegenwärtig in Italien und zwar aus den nördlichen Provinzen über die Alpen gebracht, am häufigsten gelb oder rebhuhnbunt vorkommen, während die gelblichweißen, schwarzen und braunen seltener sind. Als charakteristische Kennzeichen erachte ich glatten Kopf, überhängenden Kamm, durchweg hohe und gelbe Beine; die Hähne müssen entweder einen hohen, festen Schwertkamm, oder einen zierlichen Muschelkamm haben. Letzterer ist jedoch sehr selten in vollkommener Form vorhanden. Die braunen Hühner mit hellem Behang bleichen schon im ersten Jahre schwach ab; sie dürfen aber niemals fleischfarben oder grau werden.

An diese Mittheilungen fügen wir eine Darstellung aus dem vorhin genannten „The illustrated boock of Poultry“*) von L. Wright, (welches auch den deutschen Lesern, die der englischen Sprache mächtig sind, dadurch leichter zugänglich ist, daß die Herren Verlagsbuchhändler C. C. Meinhold und Söhne in Dresden den Vertrieb für Deutschland übernommen haben). Dieselbe lautet zwar wie folgt, indem zunächst die in Amerika gezüchteten und von dort ausgeführten Italienischen Hühner besprochen werden:

In den Tagen, als die Streitfrage über den Ursprung der Brahma-Hühner noch hitzig im Gange war, äußerte ein bekannter englischer Züchter den Wunsch: „Wenn Bruder Jonathan dies Geflügel schuf, so wünsche ich, daß er noch mehrere andere Rassen schaffen möge.“ Seitdem ist es allgemein bekannt geworden, daß das edle Brahma-Geflügel keineswegs amerikanischen Ursprungs ist; dagegen steht es fest, daß Amerika einige andere Hühner-Spielarten in hoher Vollkommenheit hervorgerufen hat, welche wol der Aufmerksamkeit aller Geflügelzüchter werth sind.

Die Leghorns (strohfarbige, hornfüßige Italiener) sind von den vorhandenen, von Amerika ausgeführten Hühner-Arten und Rassen in England am längsten bekannt. Die ersten in England eingeführten Exemplare waren, soweit uns erinnerlich, von der weißen Varietät; der Herr, welcher sie erhielt, züchtete sie untereinander ein Jahr hindurch und gab dann den ganzen Stamm fort, welcher seitdem in England beträchtlich verbreitet worden ist. Ein oder zwei weitere Einführungen haben seitdem stattgefunden, aber fast alle diese Hühner hatten etwas zu kurze und zu blaßfarbige Beine, um dem Geschmack der Preisrichter zuzusagen. Aber unsere abgebildeten, welche ausschließlich zur Portraitirung für dies Werk übersandt, sind gewiß die besten, welche jemals nach England geschickt wurden, indem sie lange, glänzend gelbe Beine haben, mit dem vollständigen Vollblut-Aussehen, welches von amerikanischen Liebhabern so sehr gesucht ist.

In dem „Amerikan Agrikulturist“ vom März 1869, welcher einen Artikel über weiße Leghorns mit Illustration enthält, giebt der Verfasser an, daß seine eigene Kenntniß dieses Geflügels nicht zehn Jahre übersteigt und daß der früheste Stamm, auf welchen seine Aufmerksamkeit damals gerichtet war, „im Allgemeinen“ gelbe Füße, einfachen Kamm und weiße Ohrläppchen hatte und vornehmlich von frisch eingeführten Stämmen gezüchtet war. In Betreff alles Näheren bekennt er sich in Unsicherheit und kann nur feststellen, daß, während sie „weiße Spanier“ genannt wurden, man bis dahin in den Vereinigten Staaten noch keine wirklichen weißen Spanier gehabt oder gar gezüchtet hatte; er meint, daß sie mehr den Hamburgern gleichen. Jetzt haben wir gesehen, daß in England bereits seit vielen Jahren reine Zucht stattgefunden hat, sowol von weißen Spaniern, als auch von weißen Minorkas, welche beide Arten sich aber entweder durch weiße oder durch dunkel nelken- oder rosenfarbige Beine von den Leghorns unterscheiden.

Merkwürdigerweise ist in demselben Artikel zu lesen, daß nelken-, rosenfarbige oder weiße Beine bei diesen Hühnern auf den Höfen der besten Züchter immer von Zeit zu Zeit vorkommen; alle Hühner aber mit diesen abweichend gefärbten Beinen durchaus auszumerzen, würde nach unserer Meinung unrecht sein, den guten Eigenschaften gegenüber, welche alle diese Hühner, gleichviel, welche Farbe ihre Beine haben, übereinstimmend zeigen.

Ohne Zweifel stehen die Leghorns dem spanischen Huhn sehr nahe und diese Familie ist ja um das ganze Mittelmeer verbreitet. Die in Amerika zu be-

*) Demnächst kommen wir auf dies Werk hier in einer eingehenden Besprechung zurück. D. R.

deutender Vollkommenheit durch die zweckmäßigste Züchtung geführten Leghorns sollen ganz entschieden nicht von spanischen abstammen, sondern von italienischen Hühnern. Wie nahe beide Rassen einander aber stehen, geht, abgesehen von allen äußerlichen übereinstimmenden Eigenthümlichkeiten, am meisten daraus hervor, daß die Leghorns ebenso wie die Spanier niemals oder doch nur höchst selten brüten, während sie dagegen ebenso vortreffliche Leghühner sind. Jedenfalls hat das amerikanische Klima, nebst allen übrigen dort vorhandenen günstigen Verhältnissen zur Vervollkommnung dieser Eigenthümlichkeiten außerordentlich viel beigetragen, während andererseits eine sehr verständige Züchtung ebenfalls das Ihrige dazu gethan hat. Wir unsererseits haben sogar die persönliche Meinung, daß unsere amerikanischen Freunde in den Leghorns uns nur ein in seinem Charakter wesentlich spanisches Huhn geliefert haben, welches aber in Hinsicht der Dauerhaftigkeit und Nutzbarkeit weit schätzbarer ist, als eine der andern Spanischen Varietäten, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des andalusischen Huhns. (Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

... Neulich habe ich im Habichtskorbe, der von Drat und oben offen mit einem Netze ist, des Nachts — eine alte Schleiereule gefangen, die offenbar nicht durch Zufall, sondern aus Raubgelüste (ich hatte mit einer lebenden Taube geködert) hineingerathen ist. Dieser Fall sei zur Charakteristik der Eulen mitgetheilt. R. G. in G.

... Der Liebling unter allen meinen Vögeln ist eine Nachtigal, die, Nachts sich im Warmraum bergend seit dem 1. Dezember am Tage draußen in unbedecktem Raum bei Eis und Kälte unter fast fortwährendem Singen verbringt und eben mit voller Macht ihre Töne zu mir hinschmettert. Ist das nicht nahezu ein Naturwunder? Neuß, Apotheker in Essen.

... Die beiden Wellensittich-Weibchen die ich besitze, haben ein Männchen erwählt, und die andern beiden Männchen werden garnicht beachtet. Das eine Weibchen hat bereits zwei Junge, die das Nest verlassen haben, und dieser Tage werden bereits wieder drei solche zur Welt kommen. Das andere Weibchen hat vier acht Tage alte Junge. Das Männchen hat abgebrochene Schwanzfedern und deßhalb kenne ich es genau; es füttert in beiden Nistkasten.

Otto Pausch, Silberwaarenfabrikant in Berlin.

... Ich machte in diesem Jahre mit 4 Paar Wellensittichen Zuchtversuche. Unter diesen ist ein Weibchen, welches sich lebhaft in dem sehr engen Wasserbehälter badet und paddelt, eine gewiß seltene Erscheinung. Schon früher hatte ich bemerkt, daß dasselbe sich auf nasser Vogelmiere so lange herumtrieb, (förmlich wälzte), bis es durch und durch naß war. Stephan, Apotheker in Fürth.

... Schon seit 8 Jahren habe ich einen Kreuzschnabel und dies spricht doch ganz entschieden gegen die Behauptung mancher Vogelwirthe, daß dieser Vogel nur höchstens 2—3 Jahre in der Gefangenschaft aushält. Mein Kreuzschnabel singt allerliebst und ist überhaupt ein drolliger Bursche. Jetzt ist er liebebedürftig und hat schon ein ganzes Nest zusammen geschleppt, auch verfolgt er aus Liebe alle anderen Vögel. Wenn ich daher ein Weibchen für ihn erhalten könnte, so wäre mir dies sehr erwünscht.

... Ich habe im vorigen Jahr an meinen Nymphensittichen viele Freude gehabt. Von einem Paar erhielt ich in vier Bruten 16 Junge. Ich bin dadurch unverdienterweise in hiesiger Gegend als Vogelzüchter zu einer Autorität herangewachsen. Es ist doch ein schönes Ding um die Vogelzucht. Sie hat neben sonstigem Vergnügen und Nutzen auch eine schöne Aufgabe, die nämlich, einander ganz fremde Menschen ohne Weiteres zusammen zu führen. Während man sich sonst im Leben bekuxt und bekomplimentirt, schreibt ein unbekannter Vogelliebhaber an den Andern, und siehe da, ohne weiße Kravatte und dito Handschuhe, kommen sie zusammen und sitzen zusammen und plaudern als ob sie schon einen Scheffel Salz miteinander gegessen hätten. Das macht, sie sind durch ein gleiches Ziel und eine gleiche Aufgabe, meinetwegen auch ein erhebliches Vergnügen, mit einander verbunden. Die Thoren sagen freilich: auch durch gleiche Schrullen und Wunderlichkeiten. Immerhin, ihre Neigungen und nicht selten auch ihre Herzen haben sich gefunden. J. B., Pfarrer in R.

... Jetzt ist von meinem Reisvogelpaare auch die dritte Brut mit 8 Jungen flügge geworden, so daß dieselben nun in drei Bruten 16 Junge erzogen haben. Seit etwa 8 Tagen brüten dieselben aber bereits wieder. Curt Steinbock.

— Ich wohne hier seit grade 7 Jahren und besitze seit dieser Zeit 1 Kalanderlerche, 1 Haidelerche, 1 Nachtigal, 1 Spötter (erst 4 Jahre), 1 Grasmücke, 1 Mönch und 1 Rothkehlchen und seit einigen Jahren auch einen Grauedelfinken. Alle diese Vögel habe ich seither mit dem in den Handbüchern empfohlenen Mischfutter aus Hanf, getrockneten Ameisenpuppen, geriebenen Gelbrüben und desgleichen altbackenem Milchbrot, die beiden Lerchen sowie den Finken gleichzeitig mit Hirse und Mohn gefüttert. Alle sind schön befiedert, zahm und vollkommen gesund geblieben, und was die Hauptsache ist, singen sehr fleißig.

Nun habe ich dieser Tage beim Durchblättern eines Bandes der „Gefiederten Welt" gefunden, daß Sie die Beimischung des zerquetschten Hanfes als naturwidrig bei Insektenvögeln entschieden verwerfen*) — was soll ich nun thun? Ich möchte doch gerne meine Vögel vor späteren üblen Folgen bewahren. Die Ballen z. B. die das Rothkehlchen ausspeit, bestehen fast ausschließlich aus Hanfschalen, ebenso wie im Sommer wenn ich Käfer sammle, mit Flügeldecken u. dgl. untermischt. Für die Winterzeit weiß ich mir aber keinen Ersatz-Stoff für die harten Insektentheile

*) Das ist unsere Meinung; es wäre aber sehr wünschenswerth, wenn recht viele erfahrene Liebhaber dieser Vögel, darüber sich aussprechen möchten. D. R.

zu schaffen, denn Mehlwürmer kann man hier nicht haben und sie würden auch für meine Verhältnisse zu theuer sein; meine Wohnung ist aber so klein, daß ich nur ein einziges Zuchtkistchen haben kann, so daß es jedem Vogel höchstens 3 Stück für den Tag einträgt. Im Sommer haben meine Vögel gute Zeiten, denn an Heuschrecken, Ohrwürmern und Käfern lasse ich es nicht fehlen, frische Ameisenpuppen hingegen kann ich nicht bekommen, wol aber allerlei Beeren in Masse und ebenso Grünes; wir wohnen vor der Stadt, nur von Gärten umgeben, nicht weit vom Walde.

Das Rothkehlchen ist vor 3 Jahren im Frühjahr fortgeflogen obwol es sonst ganz zahm war und sich stets greifen ließ, den Vormittag über sah es meine Frau noch mehrmals in den verschiedenen Gebüschen im Garten, am anderen Tage aber war es verschwunden und ließ sich den ganzen Sommer über nicht sehen. Im Spätherbst sitzt meine Frau am offenen Fenster in der Nachmittagsonne und sieht auf einmal dicht bei sich auf der Brüstung ihren Liebling sitzen, in gewohnter Weise seinen artigen Knicks machend und gar nicht besonders scheu; sie sprach erst eine Zeit lang freundlich mit ihm, holte ihm dann einen Mehlwurm und da ließ er sich wieder greifen wie früher; — die Freude war sehr groß, allein im Zimmer herumfliegen darf der arme Hans nun nicht mehr. Meine liebe Frau starb vor zwei Jahren und da möchte ich um keinen Preis ihren kleinen Schützling verlieren.

Die Grasmücke hat in diesem Winter zum ersten Male an Fettsucht gelitten; anfangs gab ich ihr sehr mageres Futter, allein es half nichts, dann setzte ich den Grauedelfink zu ihr hinein, um ihr mehr Bewegung zu verschaffen, worauf es etwas besser wurde. Die aufgeweichten Holderbeeren fraß sie nur 2 oder 3 Tage, dann kein Stück mehr, es war also guter Rath theuer, bis mir auf einmal einfiel die Beeren in wenig Wasser mehrere Stunden lang ruhig liegen zu lassen bis es sehr stark gefärbt ist, mit diesem Saft feuchte ich all' ihr Futter stark an (seit nun etwa 14 Tagen) und jetzt hat sie bereits einen fast ganz neuen Schwanz nebst neu befiedertem Bürzel.

Sepia fressen alle meine Vögel gern, die Kalanderlerche und der Fink vom Stück weg, die Anderen aber nur in kleinen, dünn abgeschnittenen Stückchen die ich auf's Futter streue, der Schwarzkopf am Meisten.

Zu Züchtungsversuchen hatte ich seither keine Zeit, da ich den Tag über sehr beschäftigt bin; ich ziehe jedoch zu Anfang des nächsten Monats von hier weg und auf's Land (nach Bayern) wo ich dann Muße genug habe, um auch in dieser Hinsicht meiner Liebhaberei Rechnung tragen zu können. An bloßen Ziervögeln habe ich vorläufig noch keine rechte Freude, desto mehr aber an allen Sängern.

Noch muß ich bemerken, daß meine Kalanderlerche ihrer Leistungen als Spötter wegen in der ganzen Gegend berühmt ist; allein von Ende Januars an singt sie schon so laut, daß man es im gleichen Zimmer nicht auszuhalten vermag. Sie hängt übrigens den ganzen Winter hindurch kalt und singt doch!

Albin Groß in Göppingen.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Ein Schmetterlingsfink welchen ich besitze, ist seit einiger Zeit im Nacken und am untern Kopfende sehr kahl geworden, befindet sich übrigens aber ganz wohl. Darf ich bitten, mir ein Mittel anzugeben, wodurch sich das Uebel heben läßt? Außerdem habe ich ein Kanarienvögelchen, das auf dem einen Beine besonders, etwas auch auf dem andern mir lahm zu sein scheint, so daß es nicht ganz fest auf dem Stengel sitzen kann. Was ist da zu machen? Können Sie mir einen guten Rath geben?

Hermann Costenoble, Verlagsbuchhändler in Jena.

Antwort: Die meisten kleinen Prachtfinken-Arten leiden, wenn sie selbst auf das Sorgsamste mit Sepia oder anderem Kalk versorgt sind, doch an solcher Störung in der Mauser, wenn sie entweder infolge nicht guter und zweckmäßiger Pflege abgezehrt sind, oder wenn die Temperatur des Zimmers in dem sie gehalten werden, zu niedrig ist. Sobald das Wetter demnächst wärmer wird, befiedern sich, bei sonstiger verständnißvoller Pflege (siehe „Handbuch für Vogelliebhaber") alle solche kleinen Schwächlinge in kurzer Zeit. Sollte dies nicht geschehen, so sind wol Parasiten vorhanden, und man bestreicht dann die nackten Stellen mit einem Gemisch aus 1 Theil Karbolsäure mit 100 Theilen Mandelöl. — Ihr Kanarienvogel hat wol durch Zug Rheumatismus bekommen und dabei hilft zunächst Wärme, dann auch vorsichtiges Bepinseln des Schenkels mit Spiritus. Wir setzen jedoch voraus, daß an dem Fuße sonst keine Ursache der Lahmheit, wie Anschwellung oder dgl. zu bemerken ist.

Frage: Die Red. bitte ich gelegentlich darüber sich aussprechen zu wollen, ob Mehlwürmer eigentlich für Insektenfresser durchaus nothwendig sind, wenn dieselben mit Ameisenpuppen gefüttert werden. Ich möchte also wissen ob sie: 1. unentbehrlich, oder 2. wünschenswerth oder 3. zu speziellen Zwecken nöthig, also zur Verbesserung des Gesanges, oder ob sie 4. ganz entbehrt werden können? Ich habe zwar immer mit Mehlwürmern gefüttert, wenn diese aber zeitweise nicht zu haben waren, was von Zeit zu Zeit immer etwa 14 Tage hindurch vorkam, keinen Unterschied bei meinen Vögeln gefunden. Falls die Mehlwürmer durchaus und immer nothwendig sind, so möchte ich wissen, wieviel täglich für den Insektenfresser erforderlich. Amlong in Köslin.

Antwort: Es kommt doch einigermaßen auf die Vögel an, welche Sie halten und sodann auf die Futtermischung, welche Sie geben. Wollen Sie daher gefälligst in dem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. nachlesen, so werden Sie Ihre Fragen nach den Erfahrungen und Ansichten nicht des Verfassers allein, sondern auch der zuverlässigsten übrigen Vogelkenner, Züchter und Liebhaber beantwortet finden.

Anfrage: Als Leser erlaube ich mir die Frage, ob der Hahn bei Hühnern immer dabei sein muß, wenn alle Eier befruchtet sein sollen, oder ob das einmalige Treten desselben die Wirkung hat, daß mehrere Eier auf einmal befruchtet sind und wie viele etwa. Ich erinnere mich gelesen zu haben, daß das einmalige Treten etwa 15 Eier befruchten soll. Die Beantwortung dieser Frage würde jedenfalls von Interesse für viele Hühnerzüchter sein. C. Schuerholz.

Briefwechsel.

Herrn P. P., Unterschrift Cervus in Görlitz: Dank für die Mittheilung; doch dürfen wir selbstverständlich von einer anonymen Zuschrift keinen Gebrauch machen. — Herren Lehrer Stendel in Neuhaldensleben, Rendant Kannwurf in Eisenach, Kaplan Dr. jur. H. M. in S.: Ihre Beiträge haben wir mit bestem Dank empfangen. — Frau C. Lottermoser in Königsberg: In Betreff Ihres kahlgewordenen Tigerfinken bitten wir das in dieser Nr. unter Anfragen und Auskunft Gesagte zu beachten.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Das Etablissement von Chs. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180 St. Georges Street, East

hat in den letzten Sendungen folgende Thiere erhalten: 4 Paar Lori von den blauen Bergen, 10 Königssittiche (P. scapulatus), 1 grünen Edelpapagei (P. polychlorus), 12 Paar blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps), 1 Pflaumenkopfsittich (P. cyanocephalus), 1 großer Alexandersittich, 10 Amazonen, 30 Karolinensittiche, 13 Paar Inseparables, mehrere Leadbeater-, Rosa- und Dukorps-Kakadus, 10 Paar Diamantfinken, 8 Paar Schilffinken, 10 Paar schwarzköpfige Nonnen, 10 Paar Malabarfasänchen, 10 Paar Flammenfinken, 63 Paar rothe Kardinäle, 15 Paar Rothschulterstare, 10 Jamaika-Trupiale, 1 indischer Minnah (Acridotheres ginginianus), 100 Paar Schmetterlingsfinken, 10 Paar Grauedelfinken. Außerdem kamen mit: 1 Emu, 3 asiatische Eulen, 1 Halsband-Fasan von China, sowie auch eine große Anzahl vierfüßiger Thiere, darunter zahlreiche verschiedene Affen, Zibelhkatzen, Nasenbären, Biber, Gazellen und dgl. Ferner 3000 oldenburgische Goldfische und schließlich 3000 Stück brasilische Vogelbälge. — [293

Abzugeben ein sprechender Graupapagei, einige Pärchen Alpenlerchen, mehrere Pärchen fremdländische Tauben. Auskunft giebt die Redaktion. [294

---

1 Wachtelhahn

zum Umtausch gegen 1 W.-Huhn gesucht von **E. Gutheim** in Paderborn. [295

Süssen in Württemberg.

Aus meiner

Kaninchenzucht-Anstalt

habe ich eine beträchtliche Anzahl der fruchtbarsten und größten Normandiner-Rasse abzugeben und liefere bei Partheen von mindestens 12 bis 20 Stück 6 Monat alte Thiere, das Stück zu Thlr. 2, — zuchtfähige im Alter von 9 bis 15 Monaten das Stück für Thlr. 3, — extra schwere Exemplare Thlr. 4, — dabei sind ⅓ Weibchen. Meine Lapins wurden auf den meisten deutschen Ausstellungen prämiirt. Als Spezialität habe ich Silberkaninchen das Paar zu Thlr. 15 preuß. Courant. [296

(H. 71358) **H. W. Schaible.**

Die

„Gefiederte Welt",

herausgegeben

von **Dr. Karl Ruß.**

Jahrgang I. & II. (1872|73).

297] Preis à Thlr. 2 — broch.

Ein schöner kräftiger Rehbock, einjährig mit prachtvollem 6er Geweih, und vollkommen zahm wird abgegeben durch F. Jäger in Großostheim. [298

---

1 Nachtigal, einige Schwarzköpfe, sowie Mehlwürmer ½ Liter 1½ Thlr., auch neue feine Vogelkäfige für Körnerfresser à 25 Sgr., desgl. frische Ameiseneier ½ Liter 20 Sgr. empfiehlt **Rudolph Schmidt** in Erfurt. [299

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Praktische Anleitung

zur

künstlichen Ausbrütung

der

Eier aller Arten Geflügels

und der

Aufzucht der künstlich ausgebrüteten jungen Hühner, Enten, Gänse und Truthühner.

Mit 4 Zeichnungen nebst einem Anhange über die

rationelle Kaninchenzucht.

Herausgegeben

von

J. H. Krantz.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage

Preis 10 Sgr.

Berlin. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung

300] 32 Wilhelmstraße SW.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: in **Steglitz** bei Berlin, Albrechtstraße 115 durch die Post oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.
C. F. Pilger's Buchdruckerei in Bernau.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 21. Mai 1874. Nr. 21.

Ausland

Inhalt:

Die Ueberwinterung der Vögel des Herrn Schneider in Wittstock. —
Eine Vogelkolonie in Ostpreußen. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Stare; Fischadler. —
Antwort in Betreff der Störung brütender Kanarienweibchen durch Gewitter. —
Das italienische Huhn (Fortsetzung). —
Briefliche Mittheilungen: Schwalben; zum Vogelschutz.
Anfragen und Auskunft: Spottdrossel; Gewinnung der Ameisenpuppen. —
Briefwechsel. — Anzeigen.

Die Ueberwinterung meiner Vögel.

Auf vielfache Anfragen von Mitlesern der „Gefiederten Welt", weshalb ich meine Beobachtungen nicht mehr veröffentliche, und ob ich mit dem Herausgeber genannter Zeitschrift zerfallen sei, sehe ich mich zu folgender Erklärung genöthigt. In meinen freundschaftlichen Beziehungen zu Herrn Dr. Ruß ist keinerlei Aenderung eingetreten und was den ersten Punkt betrifft, so bin ich leider durch überhäufte Arbeiten in meinem Berufe und durch fortwährendes Unwohlsein behindert, meine Erfahrungen zu Papier zu bringen.

Ich habe in dem vergangenen, allerdings sehr milden Winter meine Vögel, 9 Arten Papageien, größtentheils Plattschweiffittiche, 4 Witwenarten, 18 Arten Weber und einige Schmuckfinken, wiederum im kalten, ungeheizten Zimmer überwintert. Die Temperatur hielt sich auf etwa 2 bis 6° Wärme nach Réaumur im Durchschnitt. Einige Male, bei heftigem Ostwinde, habe ich, vornehmlich der Witwen wegen, ein wenig geheizt, weil die Temperatur auf 0° gesunken war. Die Papageien hielten sich ohne Ausnahme sehr gut, am munterſten waren die Loris (Trichoglossus Novae-Hollandiae). Sie badeten bei jeder Temperatur, bei trüber und heller Witterung, oft sogar täglich zweimal. Unverändert munter und regsam zeigten sich auch die nun schon 4—5 Jahre in meiner Vogelstube hausenden Paradies- und Vielfarbensittiche (P. pulcherrimus und P. multicolor); die ersteren brüteten sogar. Leider zeigten sich die Eier, die ich gern Ornithologen zur Verfügung stelle, nach vierwöchentlicher, eifriger Bebrütung unbefruchtet. Die Wellensittiche und Nymphen brüteten ebenfalls, letztere in einem Wellensittich-Nistkasten ohne Decke und die Jungen sind kräftig und gesund, bereits auch ausgeflogen.

Im Februar erhielt ich ein Pärchen Kragensittiche, (P. semitorquatus; Port-Linkoln-Sittiche nach Hagenbeck), ein Pärchen Barrabandssittiche (P. Barrabandi), Schildsittiche oder Barnardssittiche (P. Barnardi) u. a., auch ein Pärchen der niedlichen Grauköpfchen (Psittacula cana) und trotzdem ich von jetzt an die Fenster bei Tage, von Mitte März auch bei Nacht offen stehen ließ, gewöhnten sich die Vögel schnell ein und sind jetzt, nach glücklich bestandener Mauser des Kleingefieders, völlig gesunde Prachtexemplare. Von Papageien habe ich seit September 1873 nur 1 Weichen des blaubäuchigen Keilschwanzlori, (Blauer Gebirgslori, Hagb.) beim Eierlegen verloren. Ich fand den Vogel, der nicht eine Minute vorher sich krank gezeigt hatte. Ob die Eier von einem Gelege oder von zweien stammen, kann ich nicht angeben. Daß die niedrige Temperatur Schuld am Eingehen dieses prachtvollen Vogels war, glaube ich sicher nicht; denn ein zweites Paar hat jetzt ebenfalls Eier. Dieselben wurden in den letzten Tagen des April, die bei uns sehr kalt waren, bei

2° Wärme gelegt, ohne daß das legende Weibchen das geringste Unwohlsein kund gab.

Von Webern sind, abgerechnet 1 Männchen dottergelber Weber (Pl. vitellinus), ein dgl. weißbäckiger und gelbköpfiger Baya-, sowie ein dgl. Fuchsweber (Pl. hypoxanthus, P. bengalensis, P. castaneofuscus), die sämmtlich krank ankamen und nicht eingewöhnt werden konnten, keine gestorben. Die stets beweglichen Vögel büßten von ihrer Munterkeit nichts ein, sogar auch im Winterkleide nicht, namentlich die Edelweber (Hyphantornis), und übten ununterbrochen ihre Baukünste aus. Nur dem Oryx behagte die niedrige Temperatur sehr wenig; der sonst so stürmische Vogel verhielt sich still und saß unbeweglich in einer Ecke in Birkengebüschen. Jetzt ist er desto lustiger, prangt im schönsten Hochzeitskleide und seine beiden Weibchen haben bereits gebrütet, leider die Jungen auch wieder nach wenigen Tagen aus dem Nest geworfen. Die indischen Weber hatte ich im Herbst 73 erst erhalten und sie verloren nicht das Geringste von ihrer Munterkeit, sangen eifrig, der Manyiar (P. manyar) alle überschreiend, und mausern jetzt, wie alle meine Weber zum Hochzeitskleide.

Auch die Witwen ertragen die niedrige Temperatur sehr gut, am besten die Trauer- und gelbschultrige Witwe (V. macroura und V. flaviscupulata), sie trugen ihr knarrendes Lied, das dem des Kap-Feuerwebers (P. capensis), täuschend ähnlich ist, mit sichtlichem Behagen vor. Weniger munter war die Dominikaner-W. (V. serena), und die Paradies-W. (V. paradisea) leider, mit Ausnahme eines Männchens, garnicht. Diese zarten Vögelchen hatten, namentlich bei trübem Wetter stets den Kopf unter die Federn gesteckt, suchten jeden Sonnenstrahl auf und ließen nur selten ihre melancholischen, pfeifenden Töne hören, am häufigsten noch die erstern. Ich verlor je ein Männchen von beiden Arten. Ich fand den Schnabel der Thierchen am Grunde, an den Nasenlöchern zerstört, wahrscheinlich in Folge eines chronisch gewordenen Schnupfens.

Die Schmuck- oder Prachtfinken, Tigerfinken u. a., sowie ein Grauedelfink, ein Mozambiquezeisig u. a., letztere beide die Virtuosen meiner Voliere, haben während des Winters nichts von ihrem Frohsinn eingebüßt, sondern lustig ihre kleinen Kehlen geübt

Sodann muß ich noch die Fütterung erwähnen. Ich habe den Tisch meiner Pfleglinge vom November bis Ende Februar nur sehr einfach beschickt, mit Hirse und Spitzsamen. Zwar versuchte ich ihnen, nach Herrn Lintz' Vorschlag nur Spitzsamen zu reichen, aber die Witwen verlangen Hirse, sie verschmähen bei mir den Spitzsamen, fraßen daher einige Tage so gut wie nichts, nur Speisereste der anderen Vögel und gingen so merklich zurück, daß ich ihnen wieder Hirse verabreichte. Vom März an gab ich den Papageien täglich frische Zweige von Flieder, Linden, Weiden ꝛc., deren Knospe und Rinde sie sehr gern fressen. Einige leisten im Benagen von Zweigen Erstaunliches. Die Kragensittiche (Port-Linkoln-S. Hagb.; P. semitorquatus) sind im Zerstören von Strauchwerk wahre Meister. Ich setzte ihnen eines Morgens acht große Lindenzweige, 2—3" dick und 10' hoch in die Vogelstube. Sofort machten sich die Vögel daran, zunächst die Knospen abzunagen, was ihnen bald genug gelang. Jetzt wurde als zweites Gericht die Rinde verspeist. Sie bissen zu diesem Zwecke fingerstarke Zweige durch, so schnell und so ohne alle Mühe, als schnitte sie ein Mensch mit der Gartenscheere fort. Die Zweige wurden in Stücke zerbissen, in einen Fuß genommen und entrindet, beleckt. Ich bin nicht im Stande, trotzdem mir in meiner hohen Eigenschaft, als Direktor der ziemlich ausgedehnten städtischen Anlage, Strauchwerk und Zweige in Massen zu Gebote stehen, das Bedürfniß der Vögel zu befriedigen. Die bereits angeführten Plattschweifsittiche sind dazu fähig, eine ganze Tracht Zweige in einem Tage zum größten Theil in Spähne zu verwandeln. Man sieht hieraus, daß das Sterben, der als hinfällig verschrieenen Vögel mit darin seinen Grund hat, daß die wenigsten Liebhaber in der Lage sein dürften, ihre Papageien ausreichend mit frischen Zweigen jahraus, jahrein zu versorgen; dazu ist wol kaum das Berliner Aquarium und der großartige Berliner Zoologische Garten im Stande.

Ein ebenso beliebtes Futter als Rinde und Knospen frischer Zweige sind Grasrispen. Vom März an füttere ich jeden Tag einen großen Marktkorb, sage einen Marktkorb voll Grasrispen vom Ruchgrase (Anthoxanthum). Groß und Klein meiner Schüler beeifert sich mein Lieferant zu sein; natürlich habe ich in der Naturgeschichtsstunde Gelegenheit, sie ein wenig dazu anzuregen. Es ist keine Uebertreibung, wenn ich berichte, daß die Rispen eines Grasplatzes von zwei Morgen Größe im März und April von meinen Vögeln aufgezehrt sind, es haben sich an diesem Verbrauch auch alte Weber betheiligt. Vogelmiere reiche ich meinen Vögeln im Winter nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß ihnen Vogelmiere (Alsine media) bei niedriger Temperatur geradezu nachtheilig ist, weil sie zu stark abführt. Ich lege sie den Vögeln daher erst vor, wenn die Luft im Vogelzimmer über 5—6° Wärme hat. Ameisenpuppen setze ich Winter und Sommer vor. Im Winter getrocknete, im Sommer frische, und nicht nur die Weber, auch die Papageien nehmen gern davon, sowol Nymphen, als auch Wellensittiche und Plattschweifsittiche. Ebereschenbeeren streue ich immer hin, sie werden nie verschmäht, selbst wenn sie getrocknet oder ganz schwarz geworden sind. Ich habe mich im Laufe dieses Winters wiederum hinlänglich davon überzeugt, wie heilsam sie den Vögeln sind. Ich hatte einen Vorrath von mehreren Scheffeln, der leider verdarb, weil mich eine schlimme Epoche meines Herzleidens ganz unthätig für einige Wochen machte, während welcher Zeit die in Kisten stehenden Beeren gährten und verdarben. Ich rettete nur soviel, daß ich einige Hände voll einem kranken Vogel vorlegen konnte, dem sie schnell zur Genesung halfen. Einige Male zeigten einige Vögel, bei starkem Ostwinde Durchfall. Ich setzte ihnen dann regelmäßig weißen und blauen Mohn und Leinsamen vor und hatte die Freude, daß sie davon fraßen und nach mehreren Tagen wieder hergestellt waren.

Dies geschah unter anderen mit einem Männchen Paradies-Sittich und einem Weibchen Vielfarbiger Sittich. Im Uebrigen aber finde ich, daß die niedrige Temperatur den australischen Plattschweifsittichen sehr gut bekommt, denn sie ist durch unaufhörliches Lüften stets rein, während sie in stark geheizten Vogelstuben sicher dunstig und unrein sein dürfte. In früherer Zeit heizte ich einen kleinen Nebenraum sobald ich neue Vögel erhielt, um sie nach und nach abzuhärten. Das thue ich jetzt nicht mehr. Ich nehme im Winter keine Vögel an, am liebsten nur im Sommer, doch aber auch im Herbst und im Frühling, weil gerade im Frühjahr die meisten Australier eintreffen. Ich setze die Vögel, nachdem ich mich überzeugt, daß sie gesund und gut genährt sind, sogleich in ein ungeheiztes Zimmer, versehe sie aber mit ihrer Lieblingsnahrung, und habe selten einen verloren. Daß die australischen Papageien bei niedriger Temperatur leicht beim Eierlegen starben, kann ich nach meinen Erfahrungen nicht für richtig halten, sie sind mir in früherer Zeit bei einer Wärme von 15—20° auch an Legenoth zu Grunde gegangen. Ich habe freilich einen großen Vortheil, wie Herr von Schlechtendal mir jüngst schrieb; ich erhalte nämlich von Fräulein Christiane Hagenbeck die Vögel zu meinen Versuchen, die schwerlich ein Liebhaber in dem Umfange wie es bei mir geschieht, anzuschaffen wagen würde, unentgeltlich geliefert und jeden gestorbenen ersetzt. Die Leser haben jedoch aus Obigem ersehen, daß meine Verluste, mit Ausnahme des einen Lori, nur sehr geringe, kaum nennenswerthe sind. Leider aber gehen auf der Reise, die Vögel sind 20 Stunden unterwegs, 7 Stunden in der Post und das ist das Schlimmste, so manche zu Grunde. Beispielsweise in dieser Woche ein Paar der interessanten rothstirnigen Neuseeländer Sittiche (von Herrn Dr. Ruß nach ihrem Lockton sehr bezeichnend „Ziegensittiche" benannt). Trotz des erhöhten Porto's und Postverschlusses, waren sie unter alle Kisten gestellt, der Käfig umgefallen, theilweise zertrümmert und die Vögel so verletzt, daß der eine todt ankam, der andere nach wenigen Stunden starb.

Ueber die Plattschweifsittiche werde ich, auf vielfältigen, besonderen Wunsch nächstens weiter berichten; denn ich besitze jetzt aus jeder der von Herrn Dr. Finsch*) aufgestellten Gruppen oder Unterabtheilungen ein oder zwei Pärchen.

Wittstock, 5. Mai 1874.

Fr. Schneider II.

Eine Vogelkolonie in Ostpreußen.

Mittheilung von Herrn Oberlehrer Foertsch in Elbing.

Von Interesse für Vogelkundige und Jagdfreunde dürfte die Mittheilung sein, daß die Kormorane (Phalacrocorax carbo, Linné) und Reiher (Ardea cinerea L.), welche in der Danziger Stadtforst, Belauf Pröbbernau eine Brutkolonie besaßen, jetzt im Belauf Bodenwinkel, etwa 1½ Meile von der früheren Wohnungsstätte, eine neue Niederlassung gegründet haben. Die alten überhaubaren Bestände des erstgenannten Forstbelaufs sind vom Danziger Magistrat verkauft und die Abholzung derselben ward in diesem Winter vollständig beendet und somit den genannten Vögeln die alte Brutstelle genommen. Besonders eigenthümlich war nun aber das Benehmen der Kormorane, die zuerst am 6. März in zahlreichen Schwärmen ankamen. Diese Vögel umkreisten mehrere Male im hastigen Fluge die jetzt so veränderte Brutstelle, beiläufig bemerkt eine Fläche von etwa 96 Morgen, zogen sich dann alle über derselben zusammen, einige Augenblicke auf derselben Stelle, mit Geschrei flatternd, und vertheilten sich hierauf, theils den Flug nach der See, theils nach dem Haff wendend. Mehrere Tage lang hielten sie sich immer in der Nähe der genannten Stellen auf, bis sie endlich sich die neue Heimath wählten. Auf der alten Brutstelle waren es aber nicht nur Reiher und Kormorane allein, die dieselbe bevölkerten. Es horsteten dort alljährlich, außer dem Baumfalken (Falco subbuteo), und je einem Pärchen des schwarzen und des rothen Milans (F. ater et F. milvus L.) auch noch Wanderfalken (Falco peregrinus L.), sowie Fischadler Falco haliaëtus). Diese Oertlichkeit bot somit dem Natur-, wie dem Jagdfreunde ein höchst interessantes Bild. Stundenlang konnte man, ohne zu ermüden das Treiben der Vögel beobachten. Hier verfolgte der Flußadler einen vom Fischen zurückkehrenden Reiher, bis derselbe endlich einen Fisch fallen ließ, den der Adler blitzschnell im Fallen ergriff; dort flog eine Krähe auf einen von dem Reiher oder Kormoran augenblicklich verlassenen Horst, gleich darauf mit dem, daraus geraubten kleinen Jungen hastig davonfliegend; auf einer zweiten Stelle ist eine andere Krähe nicht so glücklich und wird von dem zum Horst zurückkehrenden Reiher verjagt, ehe sie den Raub vollführen kann. Dazu das emsige Ankommen und Fortfliegen der Thiere, die nicht etwa nur in einzelnen Köpfen, sondern vielmehr zu Hunderten vorhanden waren, so daß wol ein einzelner Baum bis 13 Horste trug. Während hier so das regste Treiben in immer neuen Gestaltungen sich dem Beobachter bot, zogen oben wie in der Luft schwimmend die Milanen ihre malerischen Kreise. Das immerwährende verschiedenartige Geschrei zu schildern, ist unmöglich; das piepte, pfiff, knurrte und gurgelte in so vielen mannichfaltigen Tönen, daß es jeder Beschreibung spottet. So Mancher hat dort, im Schauen des hier flüchtig geschilderten Lebens und Treibens stille Freuden genossen, die sobald keine andere Oertlichkeit in dieser Weise zu bieten vermochte. Es ist der Zweck dieser Zeilen alle Naturfreunde auf die jetzt neu gegründete Niederlassung aufmerksam zu machen, denn wer weiß, wie lange auch diese Stelle den Vögeln eine Heimat bleiben wird.

*) „Die Papageien" (J. J. Brill in Leyden).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

. . . Es hat sich herausgestellt, daß unsern Aufforderungen, den Star zu hegen, von so vielen Besitzern Folge geleistet worden, daß die großen Scharen

dieser Vögel den Landleuten Schaden an ihrer Kirschernte zu thun anfangen, auch die Rohrernten am Drausensee schädigen. Allein die vernünftigeren Landwirthe erklären alle diese Benachtheiligung dem großen Nutzen dieser Vögel gegenüber, gern mit in den Kauf nehmen zu wollen.

Schon seit einigen Tagen bemerke ich, daß die Stare ihre Kästchen im Garten nicht mehr besuchen und habe mich nun davon überzeugt, daß das erste Gelege, bezüglich die erste Brut durch die hier seit 14 Tagen herrschende rauhe Witterung (Eis in jeder der 4 letzten Nächte) vernichtet ist.

Es werden hier in jedem Frühjahr mehrere geschossene Fischadler (A. albicilla) zum Verkauf auf den Märkten feilgehalten, und ich kaufe dieselben zum Ausstopfen à 1 Thlr. das Stück (alte männliche Vögel). Oberlehrer Foertsch,

Vorsitzender des Elbinger Vogelschutz-Vereins.

Antwort in Betreff der Störung brütender Kanarien-Weibchen durch Gewitter.

Die in Nr. 18 der „Gefiederten Welt" gestellte Anfrage, ob es möglich oder wahrscheinlich sei, daß ein brütendes Weibchen während eines Gewitters seine Eier aus Furcht, Schreck oder Angst vor dem grellen Blitz oder heftigen Donnerschlage zerdrücken könne, will ich versuchen, nachstehend zu beantworten:

Die Möglichkeit derartiger nachtheiligen Folgen eines Gewitters bei Nacht läßt sich meines Erachtens nicht wol bezweifeln; es genügen oft viel geringere Störungen, die Vögel plötzlich heftig zu erschrecken. Unvermuthete rasche Bewegung, Händeklatschen und überhaupt jedes stärkere Geräusch in der Vogelstube stört die Vögel aus ihrer Ruhe auf; sie fliegen ohne Ueberlegung in den nächsten besten Versteck, oder in dessen Ermangelung den gewöhnlichen Ruheplätzen zu, und wenn die Störung fortdauert, so theilt sich die Unruhe den brütenden Weibchen mit; diese fliegen von den Nestern, um unter der übrigen Gesellschaft Schutz zu suchen.

Wer des Abends die Vogelstube mit einem brennenden Lichte betritt, wird unfehlbar den einen und den andern Vogel in seiner Ruhe stören und diese aufgeschreckten und flatternden Vögel können die ganze Gesellschaft in Aufregung versetzen.

Das in Folge eines nächtlichen Gewitters heftig erschreckte brütende Weibchen wird beim Abfliegen einen mehr als gewöhnlichen Kraftaufwand entwickeln und ist sehr wol im Stande, durch den hierbei auf die Eier ausgeübten Druck diese zu zerbrechen. Es wird aber um so eher sein Nest verlassen, je mehr es durch das ängstliche Umherflattern des Männchens oder anderer Vögel beunruhigt worden.

Derartigen nachtheiligen Einfluß haben die bei Tage sich entladenden Gewitter nicht; es wird dadurch kaum der Gesang, geschweige denn das Brutgeschäft der Vögel in der Gefangenschaft unterbrochen.

Wer in seiner Vogelstube, oder überhaupt in dem Raume, wo brütende Weibchen sich befinden, Rouleaux angebracht hat, wird gut daran thun, wenn er ein nächtliches Gewitter befürchtet, diese herunter zu lassen; außerdem empfiehlt es sich, die Brutkästchen, wenn solche von oben Licht einlassen, nicht so anzuhängen, daß deren Oeffnungen dem Fenster zugekehrt sind; endlich ist anzurathen, den Vögeln stets zerkleinerte Eierschalen in ausreichendem Maße zu reichen, damit das Gelege nicht zu dünnschalig werde. Damit ist aber auch Alles gethan, was zur Abwehr im Fragefalle geschehen kann.

Uebrigens ist die Gefahr, auf solche Weise um die Nachzucht zu kommen, nicht sehr groß; ich vermag aus meiner langjährigen Erfahrung keinen Fall nachzuweisen, wo ich aus Veranlassung eines nächtlichen Gewitters zu Schaden gekommen wäre. Die Ursachen, warum Eier in den Nestern zerdrückt oder zertreten werden, sind in der Regel andere; und zwar zeigen sich als solche die folgenden:

1. Mangelnde Reinlichkeit. Sie verursacht eines Theils die starke Vermehrung der Vogelmilben, welche das brütende Weibchen ganz besonders des Nachts belästigen und es veranlassen, mit den Füßen fortwährend den kleinen Peinigern zu wehren; anderen Theils hat sie zur Folge, daß sich an den Zehen und den Klauen der Vögel gar leicht Extremente festsetzen, welche in der Folge verhärten und den doch sehr dünnschaligen Eiern derselben gar leicht gefährlich werden können. Milben lassen sich durch Eintauchen oder Abwaschen der Nistvorrichtungen mit siedend heißem Wasser oder durch Bestreichen der betreffenden Stellen mit Lein- oder Rüböl vertilgen, und einen Vogel mit beschmutzten Zehen fange man ein und reinige dieselben in lauwarmem Wasser.
2. Das Darreichen von Niststoffen in großen Mengen. Hierdurch wird man namentlich bei der Käfighecke nicht selten Veranlassung geben, daß die Niststoffe von den Extrementen der Vögel beschmutzt und zur Auspolsterung der Nester untauglich werden. Man reiche daher dieselben immer nur nach Bedürfniß und, wenn möglich, in der Käfighecke in einem außerhalb des Käfigs angebrachten den Vögeln durch eine Drahtöffnung zugänglichen Behälter.
3. Das Anbringen der Nistvorrichtungen innerhalb des Käfigs. Ein Gelege in einer solchen Nistvorrichtung entbehrt des nothwendigen Schutzes. Die Jungen einer vorhergegangenen Brut und selbst der Zuchthahn in der Hecke werden häufig sich in der Nähe des Nestes zu schaffen machen, das brütende Weibchen zum Abfliegen nöthigen und die Eier beschmutzen oder zertreten oder auch an den Niststoffen so lange herumzupfen, bis die Eier beschädigt sind. Man bringe daher die Nistvorrichtungen stets außen am Käfig an; es gewährt das noch den besondern Vortheil, daß man die Nester bequemer untersuchen kann.
4. Die unzweckmäßig eingerichteten Nestbehälter in der Vogelstube. Eine oben offene Nistvorrichtung taugt nichts, weil sie die Extremente der Vögel, die ihren Ruheplatz auf derselben wählen, durch-

fallen läßt. Beschmutzte Eier aber geben keine Jungen und die daran haftenden Exkremente können verhärtet und mit ihren oft sehr scharfen Kanten gar leicht andere desselben Geleges schädigen.

Man gebe daher den Nistvorrichtungen und namentlich den als solche häufig verwandten Harzer Bauerchen eine schützende vorne offene Umhüllung von starkem Papier oder besser noch von leichter Pappe. Derartige geschützte Nester werden überdies von den Vögeln besonders bevorzugt und sie gewähren zugleich den Vortheil, daß sich die Weibchen nicht gegenseitig das eingetragene Baumaterial entwenden; sie sind überhaupt vor dem Besuche anderer Vögel mehr gesichert.

W. Böcker.

Das italienische Huhn.

(Fortsetzung).

Mr. W. Simpson, welcher uns von seiner Besitzung bei New-York die Portraits reiner weißer Leghorns übermittelte, hat uns mit einer kurzen Mittheilung zugleich die unten folgende Eiertabelle vorgelegt, in welcher er die Einträglichkeit dieser Hühner nachweist, nebenbei bemerkend, daß er glaube, der erste Züchter dieser Leghorns in Amerika gewesen zu sein. Im Jahre 1853 erhandelte er von einem jungen Mann, welcher solche Hühner von einem Schiffe erhalten hatte (aus welchem Hafen dasselbe kam, konnte er nicht erfahren) einen Hahn und vier Hennen weiße und eine Henne blaue Leghorns. Sie unterschieden sich von den jetzt vorhandenen Leghorns dadurch, daß sie etwas größer waren und ganz weiße Beine hatten. Er züchtete diese Hühner in Inzucht, bevor er anderes frisches Blut zur Kreuzung erhalten konnte und von der blauen Henne erhielt er einige prächtige sog. Dominique-Leghorns (welche in England als kukuksfarbene bezeichnet werden), die er auf dem amerikanischen Prachtmarktinstitut in New-York City mehrere Jahre hindurch ausstellte, wo sie viele Aufmerksamkeit erregten, ihm aber, weil es neue Züchtung war, keinen Preis eintrugen. Im Jahre 1860, sagt er, wurden mehrmals gelbbeinige Hühner eingeführt und weil man diese Farbe bevorzugte, verschwanden die weißbeinigen bald völlig.

Wir sind indessen der Meinung, wie wir dies auch bereits bei den Kochinchinesen ausgesprochen; daß in den meisten Fällen das gelbe Bein und die Fähigkeit der Ausdauer zugleich durch eine Kreuzung mit asiatischen Hühnern herbeigeführt sei — zu welcher Kreuzung die amerikanischen Züchter, wie man bemerkt haben will, sich sehr hinneigen und welche bekanntlich in der Züchtung der weißen Antwerpener einen ähnlichen Erfolg hervorgerufen hat.

Das weiße Leghorn-Geflügel ist von mehreren Züchtern eine Reihe von Jahren hindurch mit großer Sorgfalt gezüchtet und erscheint nun als ein mittelgroßes Huhn mit großem Kamm, aufrechtstehend beim Hahn und überfallend bei der Henne (den Spaniern gleich), mit reinweißen Ohrläppchen, rothem Gesicht, weißem Gefieder und glänzend gelben Beinen. Die Form des Kopfes, die Gestalt und Haltung des ganzen Körpers gleichen in der ganzen Erscheinung denen des spanischen Huhns. Das Fleisch, sagt Mr. Simpson, ist nicht sehr vorzüglich, sondern nur mittelmäßig für den Tischgebrauch, aber die Henne ist eine merkwürdig gute Legerin, noch dazu von großen weißen Eiern, während sie schlecht oder garnicht brütet.

Wir fügen die schon erwähnte Eier-Tabelle hier an, weil wir der Ansicht sind, daß ein solcher entschiedener Beweis ungleich größern Werth hat, als eine allgemeine Bemerkung und wir setzen nur noch hinzu, daß das Geflügel bei guter Fütterung im Frühjahre in einem eingezäunten Raum sich befand, weil es vom Garten ferngehalten werden sollte. Der Ertrag war also folgender:

Jahr 1854. Sechs Hennen legten:

Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.
104	93	102	123	142	107	32	24	60

Oktobr.	Novembr.	Dezembr.	Total.
79	54	34	954

Jahr 1856. Zehn Hennen legten:

Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.
163	205	241	219	169	171	120	47	19

Oktobr.	Novembr.	Dezembr.	Total.
29	47	98	1528

Jahr 1868. Fünf Hennen legten:

Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.
84	96	102	119	104	97	59	21	35

Oktobr.	Novembr.	Dezembr.	Total.
33	26	43	813

Man sieht, daß die Durchschnittszahl des ersten Jahres 159, des zweiten 153 und des dritten 169 Eier betrug und da bekanntlich eine Henne nicht selten besser als die andere legt, so muß die Ertragsfähigkeit der besten sehr bedeutend gewesen sein.

Gerechterweise müssen wir die Leghorns allerdings zu den besten Legerinnen zählen, von allem Geflügel, welches wir kennen, während es noch von großem Vortheil ist, daß ihre Züchtung einen mäßigen eingeschränkten Raum sehr wol erträgt und daß sie keiner weiten Herumstreiferei bedürfen. Sie zeigen also die Vortheile zugleich, daß sie als Legerinnen ergiebig, durchaus ausdauernd und auch leicht aufzuziehen sind.

Noch müssen wir angeben, daß bei den amerikanischen Hühner-Liebhabern verschiedene Ansichten in Betreff des Schwanzes des weißen Leghorn-Hahns bestehen. Ein Züchter hält dafür, daß derselbe sehr hoch über dem Rücken getragen werden müsse, dem Schwanze eines Eichhörnchens ähnlich, wie wir sagen wollen; der andere Züchter dagegen behauptet, daß der Schwanz dem des spanischen Hahns gleichen und freier, etwas fegend getragen werden könne. Unsere Abbildung zeigt den Schwanz in mittlerer Höhe getragen und die meisten Leghorn-Züchter in England sind mit uns der Ansicht, daß man die Bedingung eines vollendeten Eichhörnchenschwanzes keineswegs als entscheidendes Merkmal der Vollkommenheit dieses Hahns wird festhalten dürfen, sondern daß derselbe immerhin getragen

werden dürfe, wie der Geschmack des Züchters dies zu erzielen oder das Schaffen der Natur ihn hervorzubringen vermag. Dagegen ist bei der Zucht der weißen Leghorns die reine weiße Farbe des Geflügels doch eine so große Hauptsache, daß man die Strohfarbe mit voller Entschiedenheit vermeiden muß. Ferner sind lange und glänzende gelbe Beine, sowie reinweiße Ohrläppchen Bedingungen der vollkommenen Schönheit dieses Geflügels, während allerdings die allerliebste Brut dieser Hühnerrasse gerade in dieser Hinsicht so sehr leicht abweicht und ausartet.

Das „Boock of Pultry" bringt sodann noch eine ganz genaue Beschreibung, welche wir nicht fortlassen zu dürfen glauben. Ein tadelloser Hahn der weißen Leghorns muß folgende Erscheinung zeigen: Schnabel lang, stark und dick. Kamm lebhaft roth, groß, gerade aufgerichtet, also ein Einzelkamm, gerade ohne Wellen und nach keiner Seite sich neigend, tief gezackt, sich weit zurück über den Kopf dehnend und ohne Seitenauswüchse und Warzen, Kopf kurz und tief, mit großen und vollen Augen. Gesicht glänzend roth, frei von Runzeln oder Falten. Ohrläppchen undurchsichtig reinweiß, fast hängend, sehr dünn, dicht an dem Kopf anliegend, glatt ohne Falten und Runzeln; ebenso der Bart, lebhaft roth, lang, dünn und hängend. Genick lang und wohlgeformt. Brust voll, rund und hübsch vorn herausgetragen. Rumpf fast quadratisch, doch der schwerste Theil nach vorn. Flügel groß und wohlheraufgezogen. Schwanz breit und voll, hoch aufrecht getragen; Schwanzfedern groß und hübsch gebogen. Schenkel von mittlerer Länge, Beine lang, von hellgelber Farbe. Gefieder fest und dicht, durchaus reinweiß; allenfalls im Genick, am Kragen und auf dem Sattel ins Goldgelbe oder Strohfarbene schillernd. Haltung aufrecht und gefällig.

Die echte Henne der weißen Leghorns: Schnabel lang und stark. Kamm lebhaft roth, groß, einfach, nach einer Seite geneigt, gezackt, aber ohne Seitensprossen. Kopf kurz und voll, mit großen glänzenden Augen. Gesicht glänzend roth, ohne Runzeln und Falten. Ohrläppchen reinweiß, undurchsichtig und fast hängend, dünn und dicht an den Kopf schließend, glatt und ohne Runzeln. Bart glänzend roth, dünn und an dem unteren Saum abgerundet. Genick lang und zierlich. Brust voll und rund. Rumpf vorn breiter als hinten. Flügel groß und wohlaufgezogen. Schwanz breit und voll, gerade, aufrecht getragen, mit breiten Federn. Schenkel lang und voll, mit langen reingelben Beinen. Gefieder fest und dicht, von reinweißer Färbung; je freier von jedem gelben Anflug, desto werthvoller ist das Huhn. Haltung nicht so aufrecht, als beim Hahn.

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Stettin, im Mai. Seit Anfang dieses Monats sind die ersten Schwalben hier eingekehrt; auch Nachtigalen und Sprosser, deren Männchen bekanntlich den Weibchen um etwa 14 Tage vorauseilen, sind bereits und zwar in größerer Anzahl als im vorigen Jahre wahrgenommen worden. Der Ornithologische Verein hat, um diese lieblichen Sänger zu fesseln, an geeigneten Orten Futterstellen mit dem unentbehrlichen Wasser für dieselben einrichten lassen und eine Prämie von 5 Thlrn. für Denjenigen ausgesetzt, der den Fang von Nachtigalen zur Anzeige bringt. Leider ist gegen das Beschleichen der Nester durch Katzen noch immer kein wirksames Schutzmittel gefunden. Im Uebrigen ist der Ornithologische Verein für den Vogelschutz auch in weiteren Kreisen thätig, indem er an die Förster und Schullehrer der Provinz Aufforderungen ergehen läßt, sich für den Vogelschutz zu interessiren und dem Vereine als außerordentliche Mitglieder beizutreten. Ihnen wird jeder Vortheil der Vereinsmitglieder unentgeltlich zugestanden und dafür nur die Verpflichtung auferlegt, jährlich einen Bericht über ihre Wirksamkeit abzustatten. Die erforderlichen Schutzmittel werden vom Vereine unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Vor einigen Jahren bezog ich eine graue amerikanische Spottdrossel. Der anscheinend gesunde Vogel hörte nach und nach auf zu fressen, verschmähte zuletzt sogar Mehlwürmer, und starb bald an Abzehrung. Einem tüchtigen Vogelkenner und Züchter, Herrn Registrator Riese in Coesfeld, erging es mit dreien dieser Vögel ähnlich; auch er verlor dieselben nach kurzer Zeit an Abmagerung. Um den Gesang dieses vielgerühmten Vogels doch noch kennen zu lernen, bezog ich aus einer kürzlich in Berlin angekommenen Sendung (Schoebel) nochmals ein Exemplar, welches aber leider wieder ähnliche Krankheitserscheinungen zeigt. Ich bitte die Redaktion um Rath, bez. diese Anfrage aufnehmen zu wollen; vielleicht haben Andere Erfahrungen und kann Rath ertheilt werden.

Grub, Apotheker in Salzwedel.

Antwort: In gleicher Weise als Ihnen, ist es zahlreichen Liebhabern dieses herrlichen Sängers ergangen. Die uns zur Untersuchung übersandten Exemplare zeigten sämmtlich fast übereinstimmend irgend eine Erkrankung, welche von Erkältung herrühren mußte. In einem Falle war es Lungen-, im andern Bauchfellentzündung, außerdem Wassersucht und in allen Fällen natürlich bedeutende Abmagerung. Wir haben solche Vögel aber nicht allein nach dem Tode untersucht, sondern auch vom ersten Stadium der Erkrankung an auf das aufmerksamste beobachtet. Der Kranke fraß gewöhnlich bis zuletzt gut und dem entsprechend zeigten sich alle Ernährungsorgane nach dem Tode in naturgemäßem Zustande. Nun beobachteten wir die Vögel bei den Händlern und bei den Liebhabern zugleich und glaubten die Erkrankungsursache mit ziemlicher Sicherheit feststellen zu können. Alle oder doch die meisten dieser Drosseln sind bekanntlich aus den Nestern genommen und künstlich aufgefüttert worden. Sie sind daher weichlich und vermögen ungünstigen Einflüssen weder eine zähe und ausdauernde, noch eine elastische Natur entgegenzusetzen. Da sind Erkältungen durch starke Temperaturwechsel, Zugluft, kaltes Trinkwasser u. s. w. nicht leicht zu vermeiden und sie legen eben nur zu bald den Keim zur Entwickelung einer tödtlichen Krankheit. Obwol Nordamerikaner, ist die Spottdrossel daher doch zu den weichlicheren Vögeln zu zählen und wir bitten dringend alle Liebhaber derselben, diese Mahnung zur Vorsicht doch ja sorgfältig zu beachten.

Anfrage: Ich bitte um Mittheilung, auf welche Weise Ameiseneier am bequemsten gewonnen werden und um welche Zeit selbige am besten sind. H. B. in Recklinghausen.

Antwort: Da gegenwärtig die Zeit herangenaht ist, in welcher die ersten frischen Ameisenpuppen bereits auf den

Markt kommen, so wollen wir Ihre Frage nach dem „Handbuch für Vogelliebhaber" beantworten: Man scharrt eine Stelle nicht zu nahe an einem Ameisenhaufen, von allem Laub, Reisig u. s. w. frei, entfernt auch den Rasen bis auf den Sand, darüber breitet man eine Lage von trockenem Reisig, deckt über dieses ein baumwollenes oder leinenes Tuch und schüttet hierauf nun einige tief aus dem Ameisenhaufen geholte Schaufeln voll Spreu nebst den Ameisen und Puppen. Während man nach und nach immer mehr aus dem Haufen dazuschüttet und darin oberflächlich umrührt, suchen die geängstigten Ameisen ihre Brut zu retten und schleppen sie unterhalb des Tuches zusammen, wo man sie dann bequem auflesen kann. Dabei versäume man nicht, diese Ameisenpuppen-Ernte immer nur bei warmem Wetter vorzunehmen und zugleich durch Zurückschütten der Spreu nebst den Ameisen für die Erhaltung der Haufen Sorge zu tragen.

Briefwechsel.

Herrn Freiherr von S., Major in der 10. Gendarmerie-Brigade in St.: Zu unserm sehr großen Bedauern kann weder die Redaktion, noch die Expedition d. Bl. Ihren Namen und Wohnort mit Sicherheit aus den vorliegenden Briefen entnehmen. Wir sind sonst gern bereit, Ihre Wünsche zu erfüllen. Die Schilderung des sprechenden Jako Ihrer Frau Gemahlin wollen wir mit Vergnügen aufnehmen. — Herrn Oberlehrer Foertsch, Vorsitzender des Elbinger Vogelschutz-Vereins: Ihren Jahresbericht haben wir erhalten und denselben zur Aufnahme bestimmt. Zugleich beglückwünschen wir den Verein mit aufrichtiger Freude über seine tüchtigen Fortschritte. —

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Bruteier zu verkaufen:

von Brama-Putra à 5 Sgr., Spanier à 5 Sgr., La flèche à 5 Sgr, Breda (schwarz) à 4 Sgr., Hamburger Sprengel (Alltagleger) à 4 Sgr., Hamburger Silberlack à 4 Sgr., Hamburger Goldlack à 4 Sgr., Bergische Kräher à 4 Sgr., Holländer à 4 Sgr., Paduaner (Goldlack) à 4 Sgr., Paduaner (grau) à 4 Sgr., Paduaner (gelb) à 4 Sgr., Houdan (Wanzenauer) à 5 Sgr. Sämmtliche Stämme sind zuchtfähig und mehrfach prämiirt. Verpackung als die beste bewährt und bei 12 Stück gratis. Versandt reel und prompt gegen Nachnahme, oder Posteinzahlung mit Bestellung.

301] **Johannes Nill,** zum Thiergarten, in **Stuttgart.**

Diamantvögel, Tigerfinken, fremdländische Täubchen in verschiedenen Arten, Blaue Gebirgslori sind abzugeben. Wo? sagt die Redaktion. [302

Einen rein weißen Star, guten Sänger, hat um Thlr. 3 zu verkaufen, oder gegen Prachtfinken umzutauschen [303

Sigmund Büchele, Kürschner in Memmingen (Baiern).

Süssen in Württemberg.

Aus meiner

Kaninchenzucht-Anstalt

habe ich eine beträchtliche Anzahl der fruchtbarsten und größten Normandiner-Rasse abzugeben und liefere bei Parthieen von mindestens 12 bis 20 Stück 6 Monat alte Thiere, das Stück zu Thlr. 2, — zuchtfähige im Alter von 9 bis 15 Monaten das Stück für Thlr. 3, — extra schwere Exemplare Thlr. 4, — dabei sind 3 Weibchen. Meine Lapins wurden auf den meisten deutschen Ausstellungen prämiirt. Als Spezialität habe ich Silberkaninchen das Paar zu Thlr. 15 preuß. Courant. [304

(H. 71358) **H. W. Schaible.**

Ein schöner kräftiger Rehbock, einjährig mit prachtvollem 6er Geweih, und vollkommen zahm wird abgegeben durch F. Jäger in Großostheim. [305

Vier Stück Dachse 1 Jahr alt, ganz zahm und gesund, sowie 1 Ulmer Dogge 3 Mon. alt, hat abzugeben F. Schröder in Parchim (Mecklenburg), Berliner-Str. 161. — [306

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Praktische Anleitung

zur

künstlichen Ausbrütung

der

Eier aller Arten Geflügels

und der

Aufzucht der künstlich ausgebrüteten jungen Hühner, Enten, Gänse und Truthühner.

Mit 4 Zeichnungen nebst einem Anhange über die **rationelle Kaninchenzucht.**

Herausgegeben

von

J. H. Krantz.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage

Preis 10 Sgr.

Berlin. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung

307] 32 Wilhelmstraße SW.

Die

„Gefiederte Welt",

herausgegeben

von **Dr. Karl Ruß.**

Jahrgang I. & II. (1872|73).

308] Preis à Thlr. 2 — broch.

Das Etablissement von Chs. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180 St. Georges Street, East

hat in den letzten Sendungen folgende Thiere erhalten: Reisvögel, gelbschulterige Trauerwitwen, Dominikaner-Kardinäle, Rothschulter-Stare, Kuhstare, Muskatvögel, Zebrafinken, Kakadillen oder Nymphen-Sittiche, große gelbhaubige Kakadus, Karolinensittiche, Quäkersittiche, Wellensittiche, Pennantssittiche, Blutrumpf- oder Singsittiche, Bulla-Bulla-Sittiche; außerdem verschiedene große Vierfüßler und auch Zier- und Schmuckmuscheln in großer Anzahl. 309]

Drahtgeflecht zu Volièren.

Wir empfehlen unsre **Maschinen-Drat-Geflechte** von 3/8 bis zu 2″ Weite zu großen und kleinen Vogelkäfigen, Hühnerhäusern ꝛc. und stehen mit Proben und Preisen gern zu Diensten.

Rosslau a. d. Elbe.

Foest & Loesche,
Metall-Drat-Weberei.

310]

Berichtigung.

Der Inhaber der Filiale der Handlungsmenagerie und Naturalienhandlung **von Chs. Jamrach aus London**

(Inserat in Nr. 19 Seite 152)

311] heißt nicht R. Risser, sondern **R. Ritter.**

Eine große Volière

mit vier Abtheilungen, worin sich einige zwanzig Wellensittiche, rothe Kardinäle, Paradieswitwen, Astrilds, Goldbrüstchen, Bartfinken, Zebrafinken, Reisvögel und Kanarienvögel befinden, die theilweise in einem darin künstlich angebrachten Baumstamm mit sehr gutem Erfolg genistet haben, soll zusammen billig verkauft werden. [312

Näheres zu erfahren bei **Gustav Gruner,**
Ammon-Str. 6 in Dresden
oder i. d. Redaktion dieser Zeitung.

1 Paar gesunde Wellensittiche sind für 7 Thlr. zu verkaufen bei E. Goedicke in Halberstadt, Fischmarkt 6. [313

Es werden zu kaufen gesucht:

1 Paar Karolinen-Enten (oder 1 Männchen allein im Nothfalle),
1—2 = türk. Enten,
1 = Flamings. [314

Offerten erbeten an **Holm von Rose,** Zwickau.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: in **Steglitz** bei Berlin, Albrechtstraße 115 durch die Post oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin.

C. F. Pilger's Buchdruckerei in Bernau.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 28. Mai 1874. Nr. 22.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Aus meiner Vogelstube. —
Stubenvogelzucht als Erwerb. (Fortsetzung.)
Neue Geräthschaften und Apparate in der Vogelstube. —
Das italienische Huhn. (Schluß.) —
Aus den Vereinen: Ulfingen; Stettin; Elbing. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —

Die Beilage enthält: Schattenseiten der Ausstellungen; Anzeigen. —

Zum Vogelschutz.

Aus Anlaß der Wiener Weltausstellung wurde in Wien vom 19. bis 24. September 1873 unter Leitung des Kaiserlich Königlichen Ackerbau-Ministers, Ritters von Chlumecky, ein internationaler Kongreß der Land- und Forstwirthe abgehalten, an welchem Delegirte der Regierungen des Deutschen Reichs, von Belgien, Frankreich, Italien, der Niederlande, von Oesterreich-Ungarn, Rußland, Schweden und Norwegen, der Schweiz, sowie von Brasilien, und zahlreiche Land- und Forstwirthe aus europäischen und außereuropäischen Staaten Theil nahmen. Den jetzt im Druck (Wien 1874, Verlag von Faesy und Frick) erschienenen „Stenographischen Protokollen des ersten internationalen statistischen Kongresses der Land- und Forstwirthe" entnehmen wir, daß der letztere sich in seiner ersten Sitzung mit der Frage des Schutzes der für die Land- und Forstwirthschaft nützlichen Vögel beschäftigt hat. Die Ansichten der Versammlung wurden in der zweiten Sitzung in einem Beschluß dahin zusammengefaßt, daß die K. K. österreichische Regierung ersucht wird, den Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel durch internationale Verträge mit allen europäischen Staaten zu sichern, wobei u. A. die Bestimmung getroffen werden soll, **daß insektenfressende Vögel gar nicht, größtentheils körnerfressende in der Zeit vom 1. März bis 15. September nicht gefangen oder getödtet werden dürfen.** (Deutscher Reichs-Anzeiger.)

Aus meiner Vogelstube.

Vom Herausgeber.

Nach jedem Umzuge habe ich die Erfahrung gemacht, daß die Vögel in der neu eingerichteten Vogelstube mit ungleich größerer Emsigkeit zu nisten begannen und im Vergleich gegen früher überraschend günstige Erfolge erzielten. Als ich dies in einer der letzten Sitzungen des Vereins „Cypria" mittheilte, bestätigten alle Mitglieder, welche praktische Taubenzucht betreiben, insbesondere Herr Haushofmeister Meyer, es als eine längst bekannte Thatsache, daß auch bei der Anlage von neuen Taubenschlägen jedesmal ein gleicher Erfolg sich zeige.

Uebrigens ist diese Erscheinung auch sehr erklärlich, insbesondere bei der Vogelzucht. Beabsichtigt man einen Umzug oder richtiger gesagt, ist man zu demselben gezwungen, so erscheint es doch selbstverständlich, daß man in der letzteren Zeit vor dieser Umwälzung einerseits den Vögeln alle Nistgelegenheiten entzieht und andererseits die kräftige und erregende Fütterung (Eigelb u. dgl.) ihnen vorenthält. Wenn sodann

aber in der neu eingerichteten, saubern und gemüthlichen Oertlichkeit den im Uebrigen wohlgenährten Vögeln nicht allein zahlreiche, ihnen zusagende Nistplätze, sondern auch die zweckmäßigste Nahrung geboten wird, so ist es doch wol erklärlich, daß sie zu emsigstem Nisteifer sich angeregt fühlen.

Eine Lehre sollte man aber aus den Erfolgen, die sich dann zeigen, doch noch ganz besonders entnehmen, die nämlich, wie nothwendig es erscheint, daß alle Vögel die man züchten will, nicht jahraus und -ein ganz in derselben Oertlichkeit und ohne jede Veränderung in der Ernährung gehalten werden. Wenn man keine andere Abwechselung zu bieten vermag, so sollte man unter allen Umständen alljährlich doch wenigstens durch eine gründliche Reinigung, durch Herausfangen, Ausmustern und mindestens vierzehntägige Entfernung von den bisherigen Brutstätten die naturgemäßen Verhältnisse, welche der Wechsel der Jahreszeit, das Wanderleben u. s. w. mit sich bringen, einigermaßen zu ersetzen suchen.

Nach diesen beiläufigen Bemerkungen habe ich den Lesern zu erzählen, daß in meiner neu eingerichteten Vogelstube bereits in den ersten drei Wochen folgende Bruten in der Entwicklung begriffen sind oder mit anderen Worten, daß folgende Vögel jetzt schon nisten: Beide Pärchen Rosenpapageien, ein Paar schneeweiße Reisvögel, drei Paar Sonnenvögel, zwei Paar Diamantvögel, zwei Paar Zebrafinken, fünf Paar weiße, gelb- und braunbunte japanesische Mövchen, ein Paar rosenbrüstige Kernbeißer und das Pärchen Aurorafinken (A. phoenicoptera). Das alte Weibchen Pflaumenkopfittich (P. cyanocephalus), dessen Männchen leider gestorben, legt immerzu Eier, während das junge von ihr gezüchtete Männchen soeben erst in der Verfärbung begriffen und also noch nicht nistfähig ist. Ein anderes Männchen oder vielmehr zwei — denn ich habe zwei prachtvolle Weibchen — ist aber leider nicht aufzutreiben.

Vorzugsweise interessant ist ohne Frage gerade die erste Züchtung, welche ich in der neuen Vogelstube erzielt habe. Vor mehreren Monaten erhielt ich von Fräulein Hagenbeck in Hamburg zwei Vögel, welche ich noch niemals besessen und von denen ich auch nicht finden konnte, daß sie in der neueren Zeit in der Gefangenschaft lebend vorhanden gewesen. Es sind zwei Männchen Rothkopf-Amadinen. (A. erythrocephala; Sparow of Paradise, *Edwards;* Moineau de Paradise; Le grivelin, *Vieillot;* Cardinalis angolensis, *Brisson:* Sporothlastes erythrocephalus, *Cabanis*). Vieillot hat den Vogel allerdings gehabt und früher soll man ihn auch bereits anderweitig in Paris und London lebend erhalten und sogar zur Fortpflanzung gebracht haben. Neuerdings muß dies aber wol nicht mehr der Fall gewesen sein, denn ich habe weder durch briefliche Anfragen etwas über denselben erfahren, noch in der gesammten Literatur, außer den Angaben von Reichenbach und einer kurzen Notiz von Dr. Bolle im Journal für Ornithologie, in dieser Hinsicht etwas gefunden. Als ich den Vogel nun in der Rubrik „Neue und seltenere Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts" erwähnte, schrieb mir Herr A. F. Wiener in London Folgendes: „Die beiden Rothköpfe sind mir längst bekannt; ihrer Seltenheit wegen hat der Besitzer sie in Frankreich, England und den Niederlanden überall zu den Ausstellungen geschickt, und als sie endlich jetzt verkäuflich waren, habe ich sie nicht erworben, weil ich sie für zu alte Knaben hielt." Dennoch machte ich mit ihnen einen Versuch in der Weise, daß ich ihnen Weibchen der am nächsten stehenden Art und zwar des allbekannten Bandfinken (A. fasciata) zum Nisten gab. Die beiden alten Knaben kümmerten sich zunächst um die schmachtenden, liebebedürftigen Weiber gar nicht; dann fingen sie an, dieselben mit Schnabelhieben zu verfolgen, während sie doch sonst gegen die gesammte Bewohnerschaft der Vogelstube eine entschiedene vornehme Gleichgültigkeit an den Tag legten. Wiederum nach einer Frist aber geriethen die beiden Alten in einen bis dahin wol in vielen Jahren nicht vorgekommenen eifrigen Hader. Einer verfolgte den Andern und der schwächere schloß sich nun mit einmal den Bandfinkenweibern sehr innig an. Jetzt ging aber wiederum hier der Unfrieden an. Die Weiber begannen jetzt ebenso eine heftige und unduldsame Fehde, das eine von ihnen wurde ebenfalls vertrieben und das Ende vom Liede war, daß sich die ganze Gesellschaft in zwei Pärchen theilte, welche jetzt recht friedlich neben einander leben. Schon in der vorigen Vogelstube, unter den ungünstigsten Verhältnissen der letzteren Zeit, begann das eine Paar zu nisten und als ich mit dem Abbruch der ganzen Einrichtung ernstlich beginnen mußte, hatten sie gerade zwei Junge, welche etwa acht Tage alt waren. Dieselben gingen leider zu Grunde. Als nun aber nach dem Umzuge die Vogelstube neu eingerichtet worden, gehörte dies Pärchen zu den ersten unter allen Vögeln, welche ihr Nest erbauten, während das zweite Paar in etwa vierzehn Tagen folgte. Zu meiner sehr großen Freude flog jetzt, kaum fünf Wochen nach der neuen Einrichtung, bereits die erste Brut aus und zwar bestehend in einem jungen Bastard von dem einen alten Knaben Rothkopf-Amadine und dem Bandfinken-Weibchen. Dieser junge Vogel ist ein Männchen von folgender Färbung. Oberhalb das Gefieder des jungen Bandfink im Jugendkleide, nur verwaschener. Alle größeren Federn breit fahl gesäumt, namentlich breit die Schwanzfedern. Kopf mäusegrau, dunkler geschuppt, an der Stirn, bis etwa zur Hälfte hinauf jedes Federchen roth geschuppt. Kinn grau, dunkler geschuppt, dann ein weißliches Band, darauf folgt abwärts ein rothes Band, aus zarten Schüppchen der grauen Federn bestehend; dann ein weißliches Band mit dunkeln Schuppen. Die Rebhuhnzeichnung an der Brust ist nur schwach angedeutet, der Bauch reinweiß; Schnäbelchen glänzend schwarz, Füße weißlich horngrau.

Sobald dieser sonderbare Bastard seine volle Färbung erhalten, werde ich ihn hier nochmals beschreiben.

Stubenvogelzucht als Erwerb.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung; vergl. Nr. 26 v. J.)

Schon längst hatten wir versprochen, förmlich gedrängt durch zahlreiche Aufforderungen, einerseits diese Darlegungen fortzusetzen und andererseits namentlich alle Erfahrungen über die Zucht der Wellensittiche übersichtlich zusammenzustellen. Verzögert wurde diese Absicht nicht allein durch Erkrankung, sondern auch durch die Sorge, ob wir den Lesern eben in dieser Darstellung auch wirklich eine Fülle von Anhaltspunkten und Hinweisen bieten könnten, welche dem Titel dieser Rubrik entsprechend sich zeigen würden. Gelegenheit dazu, solche Erfahrungen zu sammeln, haben wir im Laufe der Zeit allerdings genugsam gewonnen. Wir haben die großartigsten und ergiebigsten Wellensittich-Zuchtanstalten gesehen und ebenso die Wellensittichzucht im Einzelnen und Kleinen verfolgt. Bevor wir aber die eigenen Erfahrungen veröffentlichen, wollen wir auch hier die Anderer vorangehen lassen.

Herr Kaufmann August Schuster in Löwenberg in Schlesien schreibt Folgendes:

Da ich schon seit Jahren mich mit der Zucht von Wellensittichen befaßte, will auch ich meine Erfahrungen den Freunden der gefiederten Welt mittheilen:

Zuerst begann ich mit der Zucht in der Vogelstube, kam aber bald davon zurück, da es stets Unfrieden und grobe Raufereien gab; besonders waren es die Weibchen, welche fremde Bruten zerstörten und sogar andere Weibchen mordeten. Wollte ich nun einen solchen Bösewicht herausfangen, gesellte er sich unter die Andern und somit war das richtige Erkennen vereitelt.

Nun ließ ich mir Gebauer anfertigen, worin immer je zwei Pärchen zur Zucht schreiten sollten. Dies war aber nicht viel besser, als das vorige Verfahren. Trotzdem ich hier leichter den Störenfried herausfangen konnte, gab es doch ebenfalls sehr oft Kämpfe, in denen die Weibchen einander zerfleischten und umbrachten.

Jetzt machte ich den letzten Versuch, nämlich: die Zucht einzelner Paare für sich je in einem Gebauer. Dies hatte bessere Erfolge, denn es gelang mir, im vorigen Jahre über 400 Köpfe junger Wellensittiche zu züchten.

Somit glaube ich annehmen zu können, daß die Zucht von einzelnen Paaren wol die geeignetste ist, obgleich auch sie ihre Schattenseiten hat, wenn man den großen Kostenpunkt der Gebauer, so wie die enorme Zeit, welche man zur richtigen Bedienung der ganzen Bevölkerung braucht, in Betracht zieht.

Dieses Jahr habe ich über 50 Gebauer aufgestellt, hoffe also eine noch größere Anzahl von Jungen, als im vorigen Jahre zu erzielen. Trotzdem ich zur Nachzucht nur Weibchen verwende, welche bereits mindestens ein Jahr alt sind, kommt es leider noch sehr oft vor, daß dieselben an Legenoth leiden. Sie werden dann, nach dem im „Handbuch für Vogelliebhaber" von Dr. Ruß angegebenen Verfahren behandelt. Ich nehme den Vogel in die eine Hand und drücke mit zwei Fingern der anderen Hand das Ei langsam zur Legeröhre hinaus, bestreiche Letztere stark mit feinem Oel und drücke sie vorsichtig zurück. Bei diesem Verfahren stirbt mir nur sehr selten ein Weibchen. Dem wiederhergestellten Weibchen entziehe ich dann aber die Nistgelegenheit auf einige Tage, damit es sich erst wieder kräftigen kann. Futter und Einrichtung sind in dem „Handbuch für Vogelliebhaber", so wie in der „Gefiederten Welt" schon so oft besprochen, daß ich hier nichts hinzuzufügen habe. Aus meiner Zucht kann ich jederzeit abgeben:

Pärchen, sowie einzelne Weibchen, welche bereits Junge gezogen. Ferner 300 Dutzend gut ausgefärbte junge Vögel; außerdem etwa 50 Köpfe junge Vögel, deren Gefieder etwas unregelmäßig und lückig ist. Letztere würde ich zu sehr billigen Preisen abgeben.

August Schuster in Löwenberg in Schlesien.

(Fortsetzung folgt.)

Neue Geräthschaften und Apparate in der Vogelstube.

Die Vogelhandlung von **A. Hendschel** in München sandte uns zur Ansicht eine Vorrichtung, bestehend in einem großen Trinkgefäß für den Gesellschaftskäfig oder die Vogelstube, in welchem durch eine einfache zweckmäßige Vorrichtung das übermäßige Baden ganz nach Ermessen eingeschränkt werden kann. Ein etwa 1½ bis 2 Zoll (c. 4—5,2 Cm.) tiefes Porzellangefäß mit aufrecht stehenden Wänden (am besten in der Form eines gewöhnlichen Spucknapfs) wird, je nach der Tiefe, halb bis zu dreiviertel mit Wasser gefüllt und den Vögeln zum Trinken und Baden überlassen. Wenn dies jedoch in so übertriebener Weise geschieht, daß selbst ein weiter Blechuntersatz kaum Schutz gegen das Verspritzen gewähren kann, so bietet die Hendschel'sche Einrichtung die beste Abhülfe. Ein Geflecht aus verzinntem Eisendrat, mit Maschen von reichlich 1 Quadratzoll (2,6 Quadrat-Cm.) Größe, auf drei Füßen von 1 bis 1½ Zoll (2,6—c. 4 Cm.) Höhe stehend, welches gerade den inneren Raum des großen Trink- und Badegefäßes ausfüllt, wird nun in dasselbe hineingestellt, nachdem es vorher gereinigt worden, und darauf gießt man bis zur Höhe des Dratgeflechts frisches reines Wasser hinein. Den Vögeln bleibt dadurch das Trinkwasser immer erhalten, während ihnen die Gelegenheit zum übermäßigen Baden entzogen worden. In meiner Vogelstube habe ich, weil ein sehr großes Blechgefäß

vorhanden ist, in welchem das Trink- und Badegeschirr steht, und über welches hinaus die Vögel kein Wasser verspritzen können, die Einrichtung getroffen, daß fortwährend zwei große Näpfe zugleich im Gebrauch sind, der eine, welcher den Vögeln bedingungslos zum Baden überlassen bleibt und möglichst häufig frisch gefüllt wird, während in dem andern das Blechgestell vorhanden ist, welches jedes Baden verhindert und also keine Verunreinigung oder völliges Verspritzen des Wassers vorkommen läßt. Seitdem bin ich dessen ganz sicher, daß es niemals geschehen kann, daß bei einem Ausfluge oder sonstiger längerer Abwesenheit ein Nothstand in dieser Hinsicht bei meinen Vögeln eintreten kann. Ich empfehle diese Vorrichtung daher den Lesern zur Beachtung.

Dr. K. N.

Das italienische Huhn.

(Schluß.)

Noch beliebter sind die braunen Leghorns, welche in den Vereinigten Staaten sogar zu beträchtlicher Berühmtheit gelangten. Es scheint, als ob diese bereits seit längerer Zeit gezüchtet und dennoch viel weniger bekannt waren. Ihre Beschreibung in dem amerikanischen „Standard of Excellence“ ist fabelhaft unsorgfältig und unvollständig, offenbar, weil man dies Huhn dort nicht besonders hoch achtete. Erst in den letzten zwei Jahren ist die Züchtung desselben in Amerika mehr populär geworden und im Jahre 1872 wurden die Eier dieser Hühnerrasse zu dem hohen Preise von 10 Dollars für das Dutzend annoncirt.

Aus einem Artikel von Mr. A. M. Halsted in dem New-Yorker „Hühnerzucht-Bulletin“ vom Mai 1873 entnehmen wir Folgendes:

Diese wundervolle Hühnerart kommt täglich mehr in Gunst und zur allgemeinen Verbreitung und verheißt in nicht fernen Tagen die weiße Varietät an Beliebtheit bei den Hühnerliebhabern und Züchtern auszustechen. Fast größer als die reinweißen, sind die braunen zugleich ausdauernder und auch angenehmer in ihrer Erscheinung für den wählerischen Geschmack unserer Liebhaber. Als Eiererzeugerinnen stehen sie aber unerreicht da; jüngere Hennen fangen häufig bereits im Alter von 4½ Monat an zu legen und fahren damit ohne Aufhören bis zum Winter hin fort. Bei den New-Hampshire-Farmen sind diese Hühner ganz allgemein verbreitet und dies ist der beste Beweis für ihre starke Körperkonstitution und ihre vortreffliche Gesundheit, wodurch sie befähigt sind, den Einflüssen des langen und verderblichen Winters dort gut zu widerstehen. Es ist übrigens noch gar nicht lange her, seitdem diese Hühnerrasse auf unsern Ausstellungen eine gewisse Sensation erregte und im letzten Jahre hat die ausgestellte Anzahl dieser Hühner den Preisrichtern viel Arbeit gemacht.

Die früheste Kenntniß von den braunen Leghorns haben wir durch Mr. Kinney von Worcester (Massachusetts) erhalten, welcher schreibt: Die ersten dieser Hühner, welche ich besaß, kaufte ich an Bord eines Schiffes in Boston im Frühjahr 1853. Diese drei braunen Leghorns waren die ersten, welche ich bisher gesehen und ich glaube, daß sie die ersten waren, welche überhaupt nach Amerika gelangt sind. Seitdem habe ich noch zwei andere kleine Familien direkt von Italien bezogen und erwarte deren noch mehrere von dort. Die ersten drei wogen zusammen 9¾ Pfund und waren erst einjährig. Ihre Kämme und Bärte waren groß und rauh, die Ohrläppchen ganz roth, gerade so wie das Gesicht, Kamm und Bart. Es war keine schwarzrothe Spielart, sondern die eigentlichen braunrothen Leghorns. Der Hahn hatte eine dunkelbraune, heller gefleckte Brust, mit braunbuntem Kragen. Die Hennen waren ebenso gefiedert und gefärbt, als gegenwärtig diejenigen, welche man für die echtesten hält. Besonders zeichnet sich das Gefieder durch einen wundervollen Farbenschiller aus.

Seit jener Einführung haben dergleichen sehr zahlreiche stattgefunden, so daß man jetzt die braunen Leghorns mit voller Sicherheit als eine ganz bestimmte Hühnerrasse betrachten darf. Soviel sie aber eingeführt werden, direkt aus den italienischen Häfen und so viele gegenwärtig auch schon in Amerika selber gezüchtet sind — immer herrscht noch eine große Meinungsverschiedenheit unter den amerikanischen Liebhabern über die Farbe ihrer Ohrläppchen.

Mr. Halsted und Andere behaupten, daß die Ohrläppchen aller früher importirten Hühner dieser Art roth waren, während Mr. Beard, Mr. Bonney und andere bewährte Züchter sagen, daß alles dies frühere Geflügel weiße Ohren hatte. Am zutreffendsten dürfte die Annahme sein, daß die eine wie die andere Behauptung richtig gewesen und überdies erscheint diese Frage auch ohne alle weitere Bedeutung, seitdem man allgemein darin übereinstimmt, daß die kleinen Nebenohren unter allen Umständen weiß sein müssen. Und dies ist auch mit dem ganzen Typus der italienischen und spanischen Hühner durchaus übereinstimmend. Uebrigens ist es sehr schwierig, nur Küchel mit weißen Ohren zu züchten; ohne Zweifel wird dies jedoch in nicht ferner Zeit ganz regelmäßig erreicht werden.

Die amerikanischen Züchter haben ohne Frage die braunen Leghorns bereits bedeutsam vervollkommnet und dies erscheint, namentlich für die spätere Züchtung von Gewicht. Mr. Bonney schreibt: Bei den braunen Leghorns ist die gesammte äußere Erscheinung anziehend und gefällig und das Wesen lebhaft und zierlich, wie das Gefieder angenehm gefärbt und außerdem zeichnen sie sich auch, was gar nicht oft genug wiederholt werden kann, durch andere rühmenswerthe Eigenschaften aus. Sie reifen früh, Küchel im Alter von drei Monaten fangen bereits an zu legen und fahren die ganze Legezeit hindurch fort. Dabei sind sie bekanntlich keine Brüter und ebenso wenigen Erkrankungen unterworfen; mir ist nie ein

Fall von Heiserkeit oder irgend einer erblichen Krankheit während der ganzen Zeit meiner erfolgreichen Züchtung dieser Hühner vorgekommen. Nachdem ich alle Rassen und Arten von Hühnergeflügel gezüchtet habe, gebe ich den braunen Leghorns vor allen anderen ganz bedeutend den Vorzug; ich werde fortfahren, sie zu einer ganz besonderen Spezialität zu züchten und selbstverständlich von Zeit zu Zeit, sobald es nöthig erscheint, frisches Blut unter ihnen einführen. Ich züchte diese Hühner seit dem Jahre 1860 und anfangs fielen sie in allen Farben, braun, schwarz, dominique u. s. w. aus, und im Jahre 1862 erhielt ich sogar ein weißes Küchel (Hennchen). Seitdem ich frisches Blut zugeführt und keine Mühe gescheut, durch sorgfältigste Züchtung einen erlesenen Stamm heranzubilden, ist mir dies auch vollkommen gelungen.

Kennzeichen der echten braunen Leghorns:

Die General-Kennzeichen stimmen natürlich mit denen der weißen Leghorns überein, mit alleiniger Ausnahme dessen, daß die Farbe des Gefieders also anders ist und die Schenkel kürzer sind.

Beschreibung des Hahns: Schnabel gelb. Kamm, Gesicht und Bart glänzend roth. Ohrläppchen undurchsichtig und reinweiß. Kopf voll, röthlich braun, mit hellerer Schattirung am Genick. Kragen reich goldigroth, jede Feder schwarz gestreift. Rücken, Schulterdecken und Flügelbug sehr dunkelroth, fast schwärzlich, am untern Theil des Rückens jede Feder goldig-gelb gesäumt oder mit einem solchen Halbmond gezeichnet. Brust lachsbraun, der Schaft jeder Feder weiß und ebenso der untere Theil der Federn heller schattirend. Unterkörper und Dickbeine schwarz, ins Aschbraune übergehend. Beine gelb. Aeußere Flügeldecken braun, mit reichem metallisch-schwarzem Glanz. Flügelansätze matt schwarz, die äußeren Federfahnen braun gerändert. Innere Flügeldecken schwarz, maschenartig braun gezeichnet. Schwanz schwarz, obere Schwanzdecken braun schillernd.

Beschreibung der Henne. Kopf dunkelbraun, jede Feder leicht schwarz gestreift. Genick gelblichbraun, die Federn mit schwarzen und goldigen Streifen schillernd, die Schäfte der Federn weiß. Kamm, Gesicht und Bart glänzend roth. Schnabel gelb. Ohrläppchen undurchsichtig, weiß. Rücken und Schulterdecken braun, unregelmäßig schwarz schillernd, je zarter und bemerkbarer, desto besser. Flügelspitzen matt schwarz, jede Feder am Außenrande braun besäumt. Flügel innen schwarz, außen von reichem Braun, schwarz schillernd. Schwanz schwarz, braun schillernd. Brust lachsbraun, jede einzelne Feder heller schattirt und mit weißem Schaft. Schenkel aschbraun, lichter schillernd. Beine gelb.

Uebertragen von Robert Ruß.

Aus den Vereinen.

Die Verlosung, welche wir im Mai vornehmen wollten, mußte verschoben werden und wird nun Mitte Juli stattfinden. Wir wollten auf der Frankfurter Ausstellung unseren Bedarf an Vögeln, Tauben und Hühnern aufkaufen, konnten dies aber nicht, da bis dahin von auswärts kaum eine Nachricht über den Absatz unserer Lose eingelaufen war. Wir werden nun auf der Wiesbadener Ausstellung einkaufen, was uns noch fehlt.*) Die Gewinnliste kann seiner Zeit unentgeltlich von Herrn Buchdrucker Wagner dahier bezogen werden; bei demselben sind auch ferner Lose zu haben.

Der Verein für Vogelschutz in Usingen.
O. Weygandt.

Der Ornithologische Verein in Stettin

übergiebt hiermit seinen ersten Jahresbericht der Oeffentlichkeit, indem er mit dieser Veröffentlichung eine Pflicht des Dankes gegen seine Mitglieder, besonders auch gegen seine Gönner erfüllen zu müssen glaubt. Dann aber auch soll sich aus dem Rückblicke auf sein bisheriges Leben und Streben und den daraus gewonnenen Ergebnissen zeigen, ob und wie weit er im Stande gewesen ist, seine Aufgabe zu lösen, und ob er Vereinen derselben oder ähnlicher Richtung würdig sich an die Seite wird stellen dürfen. Diese Aufgabe erfüllt sich einfach in dem Streben zur Förderung des Angenehmen und Nützlichen im Dienste der Menschheit; sie will die Kenntniß der Vogelwelt fördern, der Rohheit und Zerstörungswuth wehren und den Volkswohlstand mehren, und, wenn die Schonung und Pflege des Schönen und Guten eine edle Seite der menschlichen Natur ist, so können die Ziele des Ornithologischen Vereins als edle betrachtet werden. Gerade unserer Zeit ist es vorbehalten, den hohen Werth der Naturwissenschaft für den Volkswohlstand, für das praktische Leben recht schätzen zu lernen, und ihre Gebiete durch die freie Forschung fortwährend nach allen Richtungen hin zu erweitern. Auch unserem Vereine fallen viele schöne Früchte der Naturwissenschaft zum Genusse und zur Ausnutzung zu, und uns diese nicht entgehen zu lassen, haben wir im vergangenen Vereinsjahre redlich gestrebt.

Seitdem in Preußen das Fangen und Feilhalten der einheimischen Singvögel verboten ist, und je mehr die Liebhaberei in Folge dessen für inländische Stubenvögel abnimmt, um so mehr steigert sich täglich die Vorliebe für fremdländische Vögel. Alljährlich treffen bereits gegen 300,000 solche kleine und große ausländische, meistens tropische Vögel lebend in Europa ein, die sofort nach ihrer Ankunft in den Besitz von Vogelfreunden übergehen. Jeder, durch die Anmuth oder Schönheit dieser reizenden Fremdländer gewonnene Liebhaber wirbt andere, und so sehen wir denn heute schon die werthvollsten Stuben- und Hofvögel fremder Länder in Käfigen und Fluggebauern, selbst von weniger bemittelten Liebhabern gehalten. Die natürliche Folge hiervon war, daß sich in der Mehrzahl der größeren Städte Vereine bildeten, welche sich die Aufgabe gestellt, die Vogelkunde und das Verständniß für dieselbe volksthümlich zu machen.

Auch in Stettin bestand schon seit längerer Zeit das Bestreben einzelner Vogel- und Geflügelfreunde, in Pommerns Hauptstadt einen Verein ins Leben zu rufen, der die Kenntniß, die Pflege, die Zucht und den Schutz der gefiederten Welt fördert und einen möglichst lebhaften Verkehr und eine innigere Berührung aller Freunde derselben hier und in der Provinz anstrebt. Auf Anregung des Herrn G. Prütz und in Folge eines von ihm und den Herren Dr. Hartwig, Fabrikant R. Grimm, Konservator Schweitzer, Kaufmann A. Creutz, Fabrikbesitzer W. Bernhardt, Kassirer A. Gatow und Fabrikant C. Engeler unterzeichneten und in den hiesigen Blättern veröffentlichten Aufrufs zur Bildung eines Vogel- und Geflügelzucht-Vereins hatten sich am 17. Februar 1873, Abends 8 Uhr, etwa dreißig Freunde der Vogelwelt im Restaurant Stephan zur Besprechung dieser Angelegenheit eingefunden. Das allgemeine Vertrauen, welches den Vertretern der Idee

*) Wenden Sie sich doch an die Ihnen nächste Vogelhandlung von A. Hendschel in München, von der Sie auf das gewissenhafteste bedient werden. D. R.

entgegengebracht wurde, ergab die feste und frohe Gewißheit, daß dieser Plan ein zeitgemäßer sei, und eine glückliche Durchführung erwarten ließ. Begegneten sich ja alle Anwesenden auf dem Gebiete der gemeinsamen Arbeit an einem großen und schönen Werke: dem Bestreben, den gefiederten Lieblingen eine so wohlige Heimstätte als möglich zu bereiten, ihr Dasein so zu gestalten, als es für sie am beglückendsten und für uns am erfreulichsten ist.

Nachdem Herr G. Prütz in warmen und beredten Worten Mittel und Zweck des zu stiftenden Vereins klar gelegt und Herr A. Creutz in einer längeren Rede die großen Vortheile eines jeden Vereinsmitgliedes ausführlich hervorgehoben, wurde auf Antrag des Herrn R. Grimm sofort zur Konstituirung des Ornithologischen Vereins und zur Wahl des Vorstandes geschritten. Es wurden gewählt: Dr. Hannsmann zum ersten Vorsitzenden, Kaufmann Ad. Creutz zum zweiten Vorsitzenden, G. Prütz zum ersten Schriftführer, Dr. Hartwig zum zweiten Schriftführer, A. Gatow zum Kassirer. Außerdem unterzeichneten sich zwölf der Anwesenden als Mitglieder des Vereins. Seitdem ist derselbe durch die Theilnahme des Publikums, die seinen Bestrebungen in überaus lebhafter Betheiligung entgegentrat, in erfreulicher Weise gewachsen, da er sich nicht allein auf die strenge Wissenschaft beschränkt, sondern seine Grenzen so weit als irgend möglich ausdehnt, und neben den Fachgelehrten auch jeden Liebhaber und Freund der gefiederten Welt herzlich willkommen heißt.

Die Ausdehnung des Vereins und der damit verbundene Zuwachs an Arbeiten machte sehr bald die Vermehrung der Vorstandsmitglieder nöthig. Es wurden daher ferner als Beigeordnete gewählt: W. H. Bernhardt, Fabrikbesitzer; C. Engeler, Fabrikant; A. Mellin, Kassirer; C. J. A. Reimer, Kaufmann.

Daß die oben ausgesprochene Erwartung sich glänzend erfüllte, davon dürfte die Thätigkeit des Vereins im verflossenen Jahre den Beweis liefern. Außer den im Statut angegebenen Zwecken gewährt der Ornithologische Verein seinen Mitgliedern mancherlei Vortheile, als: Vermittelung des Ankaufs aller Arten in- und ausländischer Vögel und Geflügel zu den Preisen der Engroshändler, Ueberlassen von Bruteiern der vorzüglichsten und nutzbarsten Geflügelrassen, Beschaffung des besten Vogelfutters und der immer schwieriger zu erlangenden Ameiseneier, praktischer Gebauer, Brutkästen und Niststoffe, namentlich für die exotischen Vögel. Er vermittelt ferner das Ausstopfen der Vogelbälge und für Ologen die Besorgung, Bestimmung und den Tausch von Eiern zu Sammlungen.

Ausführliche Berichte über die Vereinssitzungen, in denen Vorträge populären und wissenschaftlichen Inhalts, Beantwortung der im Fragekasten enthaltenen Fragen und freie Besprechungen stattfinden, bringen sämmtliche hiesige Zeitungen und das Vereinsorgan „Die gefiederte Welt", herausgegeben von unserem korrespondirenden Mitgliede, Dr. Karl Ruß in Berlin. Diese Zeitschrift empfehlen wir allen Vogelfreunden angelegentlich. Ferner steht den Mitgliedern neben der Vereinsbibliothek und den verschiedenen Journalen und Zeitschriften auch die Bibliothek des Pommerschen Museums, dessen Mitglied der Verein ist, zur Verfügung. Zum regen Besuch des Museums, Rosengarten 1, dessen ornithologische Sammlung aus ungefähr 2600 Exemplaren besteht, laden wir unsere Mitglieder gleichzeitig ein. In welchem ausgedehnten Maße sich die Mitglieder obige Vortheile zu Nutzen gemacht, mag nachfolgendes Verzeichniß der durch den Vorsitzenden des Vereins, Herrn Creutz, bezogenen Vögel beweisen.

Es wurden für Vereinsmitglieder bezogen: 118 Köpfe Wellensittiche, 24 K. Gras-, 6 K. Gelbwangige, 2 K. Halbmond-, 1 K. Kanarien-, 2 K. Quäker-, 2 K. Rothrumpf- und 6 K. Nymphen-Sittiche, 8 K. Inseparables-, 10 K. Sperlings-, 4 K. Grauköpfige Zwerg-Papageien, 21 K. Grau-Papageien (Jakos), 1 K. Portoriko-Papagei, 105 K. Rothe Kardinäle, 2 K. Graue Kardinäle, 27 K. Amerikanische Spottdrosseln, 1 K. Amerikanische Wanderdrossel, 2 K. Amerikanische Hüttensänger, 1 K. Katzenvogel, 1 K. Baltimorvogel, 32 K. Reisvögel, 4 K. Weiße Reisvögel, 4 K. Japanesische Mövchen, 2 K. Safranfinken, 42 K. Zebrafinken, 6 K. Diamantfinken, 2 K. Gürtelgrasfinken, 12 K. Papstfinken, 6 K. Indigovögel, 6 K. Goldzeisige, 18 K. Bandfinken, 16 K. Helena-Fasänchen, 8 K. Astrilds, 10 K. Silberschnäbelchen, 12 K. Goldbrüstchen, 2 K. Amarantvögel, 10 K. Muskatfinken, 10 K. Orangebäckchen, 8 K. Elsterchen, 8 K. Schmetterlingsfinken, 6 K. Tigerfinken, 4 K. Grüne Bengalisten, 4 K. Atlasvögel, 4 K. Grisbleu, 4 K. Hartlaubzeisige, 2 K. Grauedelfinken, 6 K. Paradieswittwen, 6 K. Dominikaner-Wittwen, 4 K. Nonnen, 12 K. Goldweber, 2 K. Orangeweber, 3 K. Rothkopfweber, 4 K. Napoleonsweber, 8 K. Feuerfinken, 2 K. Oryx, 2 K. Pariser Kanarienvögel, 45 K. Harzer Kanarien-Roller (Männchen), 62 K. Harzer Kanarien-Roller (Weibchen), zusammen 742 Köpfe, bestehend in 57 Arten ausländischer Vögel im Gesammtbetrage von etwa 7500 Mark.

Der Elbinger Vogelschutz-Verein beschloß mit der letzten diesjährigen Versammlung das vierte Jahr seiner Thätigkeit. Herr E. Neumann, Kassirer des Vereins, stattete Bericht über den Stand der Kassenverhältnisse ab; die Einnahme betrug im verflossenen Vereinsjahre 112 Thlr. 5 Sgr. incl. 15 Thlr. Ertrag aus den zum Besten des Vereins gehaltenen Vorträgen des Herrn Oberlehrer Förtsch, 25 Thlr. die der Kreistag für dieses (und auch für das nächste) Jahr bewilligte, sowie eines Geschenkes von 10 Thlrn., seitens des Herrn v. Bargen, welches derselbe auch für alle kommenden Jahre versprochen hat. Von den Ausgaben wollen wir nur folgende Posten erwähnen: Für Inserate, Porto ꝛc. 44 Thlr. 8 Sgr. Drucksachen 9 Thlr. 11 Sgr., Fütterung der Vögel (Ausharfsel und Talg) und Lohn für die Futterleute 18 Thlr. 22 Sgr., Nistkästchen 33 Thlr. 17 Sgr. 10 Pf. incl. Anstreicherlohn. Es verbleibt demnach ein Kassenbestand von 6 Thlr. 6 Sgr. 2 Pf. Aus den demnächstigen Mittheilungen des Hrn. Oberlehrer Förtsch, die Vereinsthäthigkeit betreffend, heben wir Folgendes hervor: Der Verein zählt in der Stadt 127 Mitglieder, ferner haben sich sämmtliche Mitglieder des sogenannten neuen und die meisten Mitglieder des alten, landwirthschaftlichen Vereins angeschlossen: (aus der Kasse des ersteren wird jährlich ein Pauschquantum von 10 Thlrn. als Beitrag gezahlt) so daß die Liste die Zahl von 250 Mitgliedern ergiebt, auch haben sich mehrere der Herren Geistlichen zum Beitritte gemeldet: ferner gehören 19 Lehrer dem Vereine an, von denen Einige recht interessante Berichte über ihre Thätigkeit und Erfahrungen auf dem Gebiete des Vogelschutzes eingesandt haben. Besonders dankenswerth sind die der Herren: Lehrer Helbing-Krebswalde, Telge-Streckfuß, Brunert-Behrendshagen. Zwei der Herren sind mit der Hegung des Staares nicht ganz einverstanden da derselbe die Kirschen- und Rohrernte beeinträchtigt. Herr Oberlehrer Förtsch behält sich vor, seine Ansicht darüber darzulegen. — Im verflossenen Vereinsjahre sind 800 Broschüren und 300 Flugschriften vertheilt worden; von 63 auf Kosten des Vereins angefertigten Nistkästchen sind 32 an Mitglieder umsonst abgegeben worden, um die Hegung nützlicher Höhlenbrüter zu befördern. Schließlich traten die Anwesenden folgenden, vom Herrn Vorsitzenden gestellten Anträgen bei: 1) Vor der Hand zwei Sammlungen ausgestopfter Thiere zu beschaffen, von denen jede aus 19 nützlichen Vögeln und mehreren Säugethieren besteht und diese solchen Lehrern, die thätige Vereinsmitglieder sind, mit der Bedingung zu übergeben, daß die Sammlungen Eigenthum des Vereins bleiben, es sei denn, daß die betr. Gemeinden oder die Schüler nach und nach einen Theil der durch den Ankauf entstandenen Kosten decken; 2) wird der Vorstand ermächtigt, gestützt auf ein Gutachten des Herrn Landraths beim landwirthschaftlichen Ministerium, das Gesuch einzureichen, dem Vereine eine jährliche, oder einmalige Unterstützung zukommen zu lassen; 3) sollen die Herren Mitglieder auf dem Lande nochmals durch die „Elbinger Post" ersucht werden, dem Vereine Berichte hinsichtlich ihrer Thätigkeit auf dem Gebiete des Vogelschutzes zu übersenden. —

Mit Recht kann wol behauptet werden, daß der Verein auch in diesem Jahre unverkennbare Fortschritte gemacht hat. Der Vorsitzende schloß die Versammlung mit dem Wunsche, daß ein stilles, ruhiges Vorwärtsstreben und Ausbalten auch ferner zu erfreulichen Ergebnissen auf dem Gebiete des Vogelschutzes führen möge.

Bücher- und Schriftenschau.

In den verschiedenen Rubriken dieses Blattes, welche der Herausgeber immer persönlich zu bearbeiten hat, in letzterer Zeit sind große Lücken eingetreten, eben durch die Erkrankung und die darauf folgende nur zu große Anhäufung von Briefen und anderweitigen dringend nothwendig zu erledigenden Arbeiten. Um nun die Leser und alle übrigen Betheiligten nicht noch länger warten zu lassen, wollen wir auf allen diesen Gebieten zunächst kurze Ueberschau geben und dann nach und nach alles Versäumte eingehend erledigen. Wir bitten dies zu beachten, ebenso wie hier in der „Bücher- und Schriftenschau", so auch in den Rubriken „Neue und seltenere Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts", „Briefwechsel" u. s. w. Somit zählen wir nun zunächst die uns vorliegenden Schriften nur auf und behalten uns ein näheres Eingehen vor.

Ornithologie Nordost-Afrikas, der Nilquellen- und Küsten-Gebiete des rothen Meeres und des nördlichen Somal-Landes von **M. Th. von Heuglin,** Lieferung 42/43. Cassel, Verlag von Theodor Fischer.

Der Tannenheher, ein monographischer Versuch von **Victor Ritter von Tschusi-Schmidhofen,** mit zwei Tafeln. Dresden, Druck von Julius Reichel.

Naturgeschichte aller Zimmer-, Haus- und Jagdvögel, Stuttgart, Verlag von Julius Hoffmann. 3. Lieferung.

Der Hühner- oder Geflügelhof, sowol zum Nutzen als zur Zierde, enthaltend eine praktische Anleitung, die Zucht der Hühner, Gänse, Enten, Truthühner, Tauben u. s. w. zu betreiben, sowie diejenige in- und ausländischer Ziervögel, namentlich der Schwäne, Pfauen, Fasanen, Perlhühner ꝛc., nebst naturgeschichtlichen und auf Erfahrung beruhenden Notizen über Eigenschaften und Gewohnheiten dieser Vögel, den Bau von Geflügelhäuser und nützlichen Anleitungen aller Art von **Robert Oettel,** Stifter und Präsident des Hühnerologischen Vereins zu Görlitz. **Fünfte** gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage von Gauß, „Hühner- oder Geflügelhof". Mit 8 Tafeln, enthaltend 43 Abbildungen. Weimar 1874. Bernhard Friedrich Voigt.

The Illustrated Book of Poultry, by L. Wright. (Author of „The Practical Poultry-Keeper", „The Brahma Fovol", &c.) illustrated with 50 colouped Plates of celebrated Prize birds of Every Breed, Painted From Life Expressly for tris Work; and with Noumerous Engravings on Wood. Cassel, Petter & Galpin: London, Paris & New-York. Agents for Germany: C. C. Meinhold & Sons, Dresden.

Zoologischer Garten in Basel, erster Geschäftsbericht des Verwaltungsrathes. Basel. 1874.

Jahresbericht des Ornithologischen Vereins zu Stettin, über das erste Vereinsjahr 17. Febr. 1873—1 Jan. 1874. Stettin. (Fortsetzung folgt.)

Briefwechsel.

Herrn Pastor Volkmar, hier: Ihren Wunsch können wir in bester Weise erfüllen, indem wir Sie auf die Anzeige des Herrn Johannes Nill, zum Thiergarten in Stuttgart verweisen. Wir kennen Herrn Nill und seine Anstalt, und können dafür bürgen, daß die von ihm ausgebotenen Bruteier in gewissenhafter Weise abgegeben werden. — Herrn Professor Dr. Schönberg in Nürnberg: Ihren Bericht haben wir mit Dank empfangen und nehmen denselben mit Vergnügen auf. — Herrn Dr. Math. Mayer in Wien: Die Adresse der Vogel-Groß- und Detailhandlung des Herrn Karl Gudera ist in Wien: Kolowratring Nr. 9.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Die Vogelhandlung
von D. Dufour, Behrenstrasse 51,
Passage-Gebäude,
empfiehlt die schönsten Papageien, grau und grün, zahm und gut sprechend, alle ausländischen kleinen Vögel, gutpfeifende Dompfaffen, die schönsten Harzer Kanarienvögel, Lichtschläger, schlagende Nachtigallen, Affen, kleine Damen-Hunde und eine Auswahl von Vogelkäfigen zu soliden Preisen.

Gut getrocknete 1874er Ameiseneir à Pfund 20 Sgr., hat von jetzt ab vorräthig Aug. Dietz in Burg b. Magdeb.

Einen gefunden, gut schlagenden **Sprosser** sucht zu kaufen: Apotheker **Max Freysoldt,** Uhlstädt in Thüringen.

Ein Ungerscher Sprosser, eine Nachtigall, beide 2 Jahr in der Gefangenschaft und ausgezeichnete Schläger, 3 Schwarzblättchen, 1 Jahr alt, sehr gute Sänger, so auch 3 Eisvögel, sind Veränderungshalber billig abzugeben.
A. Franziskus in Wittenberg.

2 Nachtigallen vertauscht gegen exotische Vögel
W. Eichentopf, Detmold.

Abzugeben: 1 Nachtigall à 4 Thlr. (vorz. Sänger). Näheres bei **G. Hilsz,** Ortenberg, Oberhessen.

Eine Zoologische Sammlung, ausgestopft, von ca. 250 Exemplaren, hat zu verkaufen
Dr. **Roeper,** Villa Hullerbuch bei Feldberg.

50 Stück schwarz polirte Schmetterlingskästen, beide Seiten Glas 37 u. 42 Cm. nebst Leisten à 45 Sgr. sind zu verkaufen. **A. Klebe,** Berlin, SW. Postitzstr. 8.

1 Stamm (1 Hahn und 2 Hennen) Silberlack-Hühner, sehr fleißig legend, ist wegen Mangel an Platz zu verkaufen, resp. gegen Wellensittiche zu vertauschen. Eier kosten, soweit der Vorrath reicht, 30 Pfennige per Stück.
Friedr. Mahnfeldt.

2—3 **tollige Goldbrabanter Hühner** werden zu kaufen gesucht. Adr. sub L. 10 in der Expedition dieses Blattes.

Die
Handlung überseeischer Vögel ꝛc.
von
Arnim Kraeger
in Leipzig, Zeitzerstraße Nr. 18
empfiehlt alle importfähigen Arten überseeischer Vögel als: Tiger- und Bandfinken, Astrilds, Silberfasänchen, Safranfinken, Mozambique (Hartlaubzeisige) rothe, grüne und Dominikaner-Kardinäle, Wellensittiche, Sperlingspapageien, Mönchssittiche, Königslori, Kakadus ꝛc.
Gut versendbar unter Garantie des lebenden Ankommens. Preislisten gratis.
Außerdem **Schildkröten, Amphibien.** Alle Sorten Vogelfutter. (Weißhirse, Glanz-Hanf, Hafer ꝛc.)

Ein eleganter runder Käfig von Messingblech, passend für einen Graupapagei oder ein Pärchen Sittiche ist billig abzugeben durch die Expedition.

Schwarzköpfe 1½ Thlr., Nachtigall 3½ Thlr., 1 Amsel, 1 Ludeleilerche, Hänflinge, Finken, Dompfaffen, frische Ameiseneier ½ Liter 18 Sgr., Mehlwürmer ½ Liter 1⅓ Thaler, Vogelkäfige und alle Vogelfutterserten empfiehlt

Rudolph Schmidt in Erfurt.

Franz. Lapins, nur **echt** importirte Rassen in Original-Zuchtthieren, als: Beliers, de garenne, argentes, clapiérs und domestique, billigst unter Garantie liefert das Export- und Importgeschäft **C. Schürholz,** Hildburghausen.

Aus der großen Garten-Voliere des Unterzeichneten sind fortwährend selbst gezüchtete, sehr kräftige **Wellensittiche** je nach Alter im Preise von 5 bis 7 Thlrn. zu beziehen.

Nürnberg, 16. Mai 1874.

Fr. Schönberg, Königsstraße 87.

Auf den bedeutendsten Plätzen in England und Frankreich habe ich persönlich ausgewählt und eingekauft und offerire: Große Partbie grauer Jako's mit grauen Augen, viele darunter zahm und sprechend, eingewöhnte Vögel, Amazonen, Königs-Loris, Penants-, große und kleine Alexander, Nymphen- u. Wellensittiche, Sperlingspapageien, Inseparables, Pflaumenkopfsittiche, javan. Edelsittiche — Mino Bee, sprechend und nicht sprechend, rothe und graue Kardinäle, weiße Reisvögel, weiße, gelb- und schwarzscheckige japanesische Mövchen, sehr kleine gelbe Trupiale (körnerfressend), größte Elsterchen (Selten) u. s. w. und die gewöhnlich gangbaren kleinen und größern exotischen Vögel. Feinste fehlerlose Harzer Kanar-Glucker, Koller ꝛc.

Vogelhandlung von Jos. Zuckerkandel,
Dresden, Zahnsgasse 26 I.

Dratgeflecht zu Volièren.

Wir empfehlen unsre **Maschinen-Drat-Geflechte** von ¾ bis zu 2″ Weite zu großen und kleinen Vogelkäfigen, Hühnerhäusern ꝛc. und stehen mit Proben und Preisen gern zu Diensten.

Rosslau a. d. Elbe.

Foest & Loesche,
Metall-Drat-Weberei.

Das Etablissement von Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180 St. Georges Street, East

hat in den letzten Sendungen folgende Thiere erhalten: 200 Paar verschiedene kleine Senegalvögel: Silberbeks, Bandfinken, Nonnen, Mozambiquezeisige, Graucdelfinken, Feuerfinken, Witwen u. dergl., 186 Graupapageien, 20 Mönchssittiche, Alexandersittiche, kleine und große Rosellas, Nymphensittiche, große weißhäubige Kakadus, große gelbe Araras, rothe Kardinäle, 1 Malabar-Mynah, Halbmondtauben, Bronzeflügeltauben, verschiedene Wachteln, Halsbandfasanen, 4 Pelikane und außerdem 9 verschiedene Affenarten, darunter ein Drang-Utang u. s. w.; auch ein Leopard.

1200 Nonpareils (Pabstfinken),
Goldzeisige, Baltimorevögel
und verschiedene andere Nordamerikanische
Vögel offerirt zu civilen Preisen.

C. Reiche. Alfeld,
Prov. Hannover.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Großmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

III. Jahrgang. Berlin, den 28. Mai 1874. Nr. 22.

Schattenseiten der Ausstellungen.

Die Geflügelausstellungen sind in den letzten Jahren so in Aufnahme gekommen, daß es nicht ausbleiben konnte, daß neben den vielen guten Seiten derselben sich auch Mängel einfanden. Einsender dieses, der bei einer großen Zahl von Ausstellungen persönlich thätig war, viele andere besuchte, und nicht minder über den Verlauf entfernter Ausstellungen Erkundigungen einzog, sieht sich veranlaßt, seine Erfahrungen und Anschauungen darüber zu veröffentlichen. Das Wo und Wann ist gleichgültig.

Der erste Anfang jeder Ausstellung sind die Anmeldungen, deren Entzifferung mit manchem Kopfzerbrechen verbunden ist, denn die Bestimmungen unseres einzigen „Geflügelzüchtertages“ werden in den Benennungen noch wenig genug beachtet und besonders manche Lokal-Bezeichnungen spotten oft jeder Sachkenntniß.

In Köln z. B. nennt man den gewöhnlichen Tümmler: Holländer, und so kam es einmal, daß diese „Holländer“ unter den kleinen Vögeln als holländische Kanarienvögel im Katalog standen.

Viele Aussteller lieben es noch, in den Anmeldungen ihrem Geflügel eine Empfehlung mitzugeben, z. B. „wurden da und da mit I. Preis bedacht!“ oder bei Hühnern das Alter (über 9 Monat alte sind mir äußerst selten angemeldet worden). Früher wurden derartige Angaben denn auch gedruckt; in den letzten Jahren geht man aber darüber mit Recht ohne Beachtung hinweg. Bei Brieftauben-Ausstellungen ist die Angabe der Reisen u. dgl. allerdings wichtig, allein diese Vögel sind ja von den betreffenden Vereinen gestempelt, und die Richtigkeit wird wol vom Verein bescheinigt sein müssen, ehe man solche Bemerkung in den Katalog aufnimmt.

Ein fernerer großer Uebelstand ist das Anmelden und nur zu häufige Nichtschicken, um so ärgerlicher namentlich, wenn es außergewöhnliche Vögel sind. So ist mir z. B. eine Anmeldung von schwarzen Mövchen mit weißen Binden bekannt, welche sowol als auch alle übrigen angemeldeten 10 Paar der seltensten Tauben niemals ankamen.

Ferner prangte in den Katalogen zweier verschiedener Ausstellungen eine zahlreiche Hühner-Sammlung, die aber nirgendwo ankam. Es scheint auch damit nur Reklame gemacht worden zu sein. Die Möglichkeit, daß besonders in der späteren Jahreszeit durch Brut u. dgl. die Absendung nicht stattfinden kann, ist denkbar, aber ganze Anmeldungen ausfallen zu lassen, erscheint denn doch zu rücksichtslos.

Noch schlimmer aber ist das bekannte Lied: „anstatt der Schwalben à 3 Thlr. sende ich Ihnen ein Paar Gimpel zu 5 Thlr.“, oder „ich füge noch das und das bei“. Zu welchen Irrungen dergleichen führt, das weiß Jeder der mit Ausstellungen zu thun hat. Obgleich ein Paragraph im Programm jeder Ausstellung für solche Zumuthung sofortige Rücksendung androht, so kommt derselbe aus irgend welchen Rücksichten doch wol nur selten zur Ausführung.

Sind sodann die Vögel glücklich angelangt, so kommt die Prämirung, „durch einheimische und auswärtige Sachkenner“, wie es im Programm meistens heißt. — Wer das angenehme Amt eines Preisrichters aber jemals bekleidet hat, der weiß, was dies zu bedeuten hat. In letzterer Zeit, da in den Ausstellungen alles Geflügel nach Rassen geordnet ist, (nur Berlin und Dresden machen in dieser Beziehung eine Ausnahme) wird die Prämirung allerdings erleichtert, und ein Urtheil ist ohne zu große Schwierigkeit wol zu fällen. Dann aber sind es die preisdürstigen Aussteller, welche sich der Preisrichter bemächtigen. „Herr R., sahen Sie schon meine Mövchen?!“ Unbarmherzig wird der Bedauernswerthe mitgenommen, er muß die ganze Naturgeschichte, haarkleine Schilderungen über Eltern und Eltern-Eltern, deren Tugenden u. s. w. geduldig mit anhören, während oft schon ein Zweiter ihn am Arme fassend zu seinen Tümmlern zerrt, Jenem mitten in die Rede fallend: „die sollten Sie einmal fliegen sehen, sechs Stunden sternehoch!“ Und nun obendrein das Alles nicht blos zu hören, sondern auch zu glauben — oder doch sich so zu stellen! Phlegmatische Kochins müssen sich erheben, Spanier sich drehen, Yokohoma den engen Käfig durchjagen, vor Kanarienvögeln wird der arme Preisrichter festgehalten, stehen und warten muß er, bis vielleicht einer singt. Dabei der ganze Trubel, die knappe Zeit und nicht selten schwere Ermüdung, von der Reise oder den Arbeiten zur Vorbereitung der Ausstellung. Ja, es ist ein hoher Genuß, Preisrichter zu sein!

Gefolgt vom neugierigen Publikum, und den preiserwartenden Ausstellern beginnen die Preisrichter sodann ihren Rundgang, und wie das Ergebniß auch ausfallen mag, Niemand ist befriedigt. Möge der fremde Preisrichter immerhin mit dem Bewußtsein treu erfüllter Pflicht in seine Heimath zurückeilen — trotz aller Opfer, die er gebracht, giebt es doch so und so viele Unbefriedigte, die (im besten Falle) achselzuckend ihm nachrufen: „der verstand auch nichts davon!“ —

Ein bekannter Hühnerologe machte einmal den Vorschlag: „prämiiren wir Alles mit erstem Preis; dann sind wir doch hoffentlich vor jedem Vorwurf geschützt“.

(Schluß folgt.)

C. Hagenbeck's

Handelsmenagerie

in Hamburg

hat vorräthig: Kleine gelbhaubige, Leadbeater-, Rosa- und Nasen-Kakadus; Grau-, Surinam-, Amazonen-, Portoriko- und Brillen-Papageien; Königssittiche, Rosellas, Mily-Rosellas, Pennantis, Bauers-Sittiche, Portlinkoln-, Barrabands-, Vielfarbige, Sing- und Nymphensittiche, Junge Conurus jendaya, Blaue Gebirgslori, Undulatus, Weibchen grauköpfiger Inseparables, Sperlingspapageien; rothe, graue und Dominikaner-Kardinäle, Safransinken, Mozambique- oder Hartlaubs-Zeisige, Graupfäffchen (Silberschnäbel, Picoplata), Kastanienbrüstige Schilfinken, Schwarzköpfige Nonnen (noch nicht in Farbe), Muskatvögel, Bunte japanische Reisvögel, Mövchen, Silberfasänchen oder Silberschnäbel, Bandfinken, kleinste Elsterchen, Cordonbleu, Astrilds, Atlasvögel, Paradies- und Dominikaner-Wittwen, Gelbschulterige Wittwen, Männchen Goldweber (Ploceus textor), Fuchsweber, Feuerfinken oder Orangevögel, Napoleonsvögel, Männchen Rothkopfweber, Indische Gelbkopfweber (Ploceus bengalensis), amerikanische Spottdrosseln, Kleine Beo (Gracula religiosa), Große Beo (Gracula intermedia), Chinesische Mynah (Acridotheres cristatella), gemeine Mynah, Weißohrige indische Staare, Rothohrige Mynah, Schwarze Büll-Büll, Chinesische Heherdrossel (Garrulax chinensis), Chinesische Spottvögel, Rothflügelstaare, Kuhstaare, Seidenstaare, Jamaika-Trupiale, Blaue Hüttensänger, Rothbruststaare von Chili, Blauheher.

Am nächsten Sonntage treffen einige hundert Paare verschiedener

afrikanischer Finken

ein.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 2. Juni 1874. Nr. 23.

Inhalt:

Taubenschießen in Pommern. —
Junge Kubafinken und Mozambique-Zeisige. —
Stubenvogelzucht als Erwerb. (Fortsetzung.) —
Das Einsammeln der Ameisenpuppen. —
Schattenseiten der Ausstellungen. (Schluß.) —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Nürnberg. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —

Taubenschießen in Pommern.

Stettin. Veranlaßt durch eine Mittheilung in einer hiesigen Zeitung, wonach der Pasewalker Reiterverein seine Mitglieder zu einer Generalversammlung behufs Feststellung eines Reglements für ein Taubenschießen einladet, gab Herr Prütz in der letzten Sitzung des Ornithologischen Vereins eine Schilderung dieses besonders in England sehr beliebten Sports. Die Theilnehmer versammeln sich einigemale wöchentlich auf Schießständen, um Tauben, die in einem Käfige gehalten und einzeln herausgejagt werden, massenhaft das Lebenslicht auszublasen. Wochenlang werden diese armen Schlachtopfer in engen Käfigen gehalten, um demnächst halbverhungert herausgejagt zu werden. Nur wenige Schritte hinter den Käfigen, mit den besten Schußwaffen aufgepflanzt, stehen die Schützen, um das mörderische Feuer auf alle die Thierchen zu eröffnen, welche von Hunger und Durst getrieben, die ihnen durch plötzliches Oeffnen des Käfigs gebotene Freiheit benutzen wollen. Wohl denen, welche durch das tödtliche Blei vollkommen zerschmettert, aus der Höhe herabfallen; aber welch' fürchterliches Loos ist der Mehrzahl dieser Tauben beschieden, welche nicht sofort tödtlich getroffen werden, sondern denen nur die Füße, Flügel und andere Körpertheile fortgeschossen sind; tagelang sieht man sie dann noch schwer verwundet und hungernd auf den Dächern und Bäumen sitzen, ihr sicheres aber trauriges Ende erwartend. Das Wesentlichste beim Taubenschießen ist Folgendes. Es wird ein kleiner Raum von einer Einfassung umgeben, und innerhalb derselben müssen die geschossenen Tauben niederfallen. Diejenigen, welche entweder außerhalb der Einfassung niederfallen, oder nur angeschossen herauskommen, gelten als nicht getroffen. Die Schützen machen gewisse, bisweilen sehr hohe Einsätze, aus denen die Gewinne vertheilt werden. Der Hauptgewinn fällt demjenigen zu, welcher die meisten Tauben so geschossen hat, daß sie in die oben angeführte Einfassung hinunterstürzen. Unter sieben Schüssen, die jeder Theilhaber frei hat, müssen fünf treffen. Da viele der Jäger auf jeden Schuß, also sieben Stück, treffen, so müssen sie schließlich wieder unter sich so lange schießen, bis einer fehlt, der dann auszutreten hat. Die gefallenen Tauben, ob todt oder nur flügellahm oder nur leicht verwundet, werden in einen großen Kasten geworfen, die verwundeten wieder geheilt (? D. R.) und für das nächste Schießen aufbewahrt. Die halbtodten Geschöpfe flattern zwischen den Leichen der Gefallenen und schlagen an die Wände des Behältnisses. Wer viel Geld gewinnen will, muß, wie bereits bemerkt, viele Tauben tödten oder sie am Weiterfliegen verhindern; je langsamer aber der

Vogel fliegt, um so sicherer ist er zu treffen, und so kommt es also hauptsächlich darauf an, ihn bei seiner Entlassung aus dem Käfig am schnellen Weiterfliegen zu verhindern. Zu diesem Behufe sticht man der Taube vorher heimlich mit einem glühenden Drate die Augen aus, andere drücken dem Thier das Brustbein ein, noch andere stecken ihm die Schwanzfedern an der Rückenhaut fest, oder betäuben die Taube durch starke Schläge auf den Kopf. Außerdem werden ihnen die Hauptflugfedern ausgerupft und die Flügel naß gemacht u. s. w. Selbst Damen der vornehmen Welt betheiligen sich an solchen abscheulichen „Vergnügungen"; ja es werden gerade bei solchen Taubenschießen „mit Damen" die kolossalsten Wetten geschlossen und dieselben bringen bei den oben geschilderten Kunstgriffen den Unternehmern oft große Summen ein. — Redner forderte am Schlusse seiner wesentlich auf einer Darstellung des Deutschen Thierschutzvereins in Berlin beruhenden Schilderung die Presse auf, ihre Verwahrung gegen die Einführung dieses scheußlichen Sports in unserer Provinz einzulegen*). Ist nun auch anzunehmen, daß der Pasewalker Reiterverein durch sein Reglement gerade jene schlimmsten Auswüchse fern zu halten suchen wird, so frägt es sich doch, wie weit das überhaupt möglich sein wird; und gerade wer sich für einen gesunden Sport interessirt, wird um so mehr wünschen müssen, daß derartige Abarten ganz von uns verbannt bleiben mögen.

Junge Kubafinken und Mozambique-Zeisige.

Von den drei jungen Kubafinken (F. canora), welche in erster Brut ausflogen, zeigte sich bei Zweien das Gefieder sofort in vollständiger Uebereinstimmung mit dem des Weibchens, nur war der Ton düsterer und das Gelb des Halskragens nach unten zu schärfer begrenzt, so daß sie bei einiger Aufmerksamkeit genau von dem alten Weibchen zu unterscheiden sind. Das dritte, sonst ganz gleich gefärbte Junge aber hat gar keinen Halskragen, sondern nur einen sehr deutlichen düstergelben Strich über den Augen. Ich glaube nun, daß erstere beide Männchen, Letzteres ein Weibchen ist, da sich nach 4 Wochen vom Verlassen des Nestes ab, noch nichts Wesentliches in oben beschriebener Färbung veränderte. Ferner zeigt das kleinere der jungen Männchen absonderlicher Weise eine große, breite, gelblichweiße Binde auf den Flügeln, indem die Schwungfedern bis auf die zwei ersten sämmtlich bis fast zur Spitze diese Färbung haben, auch der Schwanz hat eine dergleichen unterbrochene Querbinde, indem die Fahnen der Deckfedern in der Mitte hell, die Schäfte dunkel sind. Ich bin begierig, ob diese abweichende Zeichnung sich bei der Mauser verlieren wird.

Die Alten schritten sofort in demselben Nest zur zweiten Brut und haben bereits wieder 4 Junge. Die Eier waren schmutzigweiß mit einer Menge deutlicher brauner Punkte und Tüpfel an dem einen Ende. Das Nest befindet sich in einem Harzerbauerchen und ist vollkommen mit Indiafasern überwölbt, hat aber keine Eingangsröhre, so daß man bequem hineinsehen kann. Am Tage habe ich nur das Weibchen brütend bemerkt; ob es Abends abgelöst wird, weiß ich nicht.*)

Ueber die Färbung eines jungen Mozambique-Zeisig-Männchens will ich noch anführen, daß dasselbe dem alten Männchen bald fast vollständig glich, nur war der gelbe Ton des Gefieders nicht ganz so lebhaft, aber schöner; die Zeichnung dunkler und schärfer als beim alten Weibchen. Hauptsächlich unterscheidet es sich dadurch vom alten Männchen, daß es eine schmale dunkle Binde an der Kehle hat, welche dunkler und schärfer begränzt ist, als die des Weibchens, welche ziemlich verwaschen ist. Jetzt nach etwa 8 Wochen verliert sich diese Binde und der Vogel wird dem alten Männchen gleich, singt auch schon seit 14 Tagen recht hübsch.

Leider kann ich über die hier (S. 3 d. J.) beschriebene Brut der Maja keine erfreuliche Nachricht geben, da die Aufzucht der Jungen nochmals durch den störungslustigen Schilffinken hintertrieben und das Junge dann verlassen wurde und umkam. Seitdem brüteten diese Vögel nicht mehr.

G. Lincke in Lanisch.

Stubenvogelzucht als Erwerb.

(Fortsetzung.)

Nachschrift des Herrn Schuster. Bei meinem letzten Dortsein theilte ich Ihnen mit, daß es in meiner Zucht sehr viele Junge giebt, die schlecht befiedert sind. Trotzdem ich nun nach Ihrer Vorschrift den Vögeln sehr viel Sepia gebe, kommt es immer noch vor, daß beinahe nackte Junge das Nest verlassen. Die großen Flügelfedern sowie der Schwanz sind vorhanden, sonst sind sie mitunter vollständig unbefiedert. Die Nistkästen sowie den Inhalt habe ich schon sehr oft mit der Lupe untersucht, finde aber niemals Ungeziefer, was ich eigentlich als Grund vermuthete. Ob es nun an dem Stoff fehlt, welcher den Vögeln besonders zur Federbildung dient, und welcher ist wohl dieser? Uebrigens kommt es nur bei einigen Pärchen vor, während andere doch sehr schöne Junge aufziehen. Es wäre mir sehr viel daran gelegen, den eigentlichen Grund dieser Krankheit zu erfahren, sowie ein Mittel oder einen Weg, um solche Uebelstände zu beseitigen, da derselbe gerade die fruchtbarsten Paare betrifft. A. S.

*) Wir haben schon längst darauf hingewiesen, daß dies „Taubenschießen" eine unserer Zeit und ihrer hohen humanen Bestrebungen ganz unwürdige Spielerei ist. Die Leser wollen gefälligst die Schilderung von Franz Wallner in Nr. 13 u. 20 v. J. nachsehen. D. R.

*) Nein, das Weibchen brütet nur allein, wie bei allen hierher gehörenden Finken. D. R.

Hieran schließen wir eine soeben erhaltene Klage: ... Ich habe dieses Frühjahr in meiner Vogelstube viel Unglück gehabt und komme, Sie um einen Rath zu bitten, da ich nicht mehr weiß, wie zu helfen ist. Im November v. J. kaufte ich drei Paar alte gesunde Wellensittiche, setzte dieselben in eine über mannshohe, 1½ Meter breite Volière und hatte zu den Weihnachtsfeiertagen auch die Freude, alle Brutkästen mit Eiern besetzt zu finden. Alles ging seinen richtigen Gang; Ende Februar flogen die Jungen aus, fraßen sofort, waren die ersten drei bis vier Tage munter, fingen dann an zu trauern und starben ohne alle ersichtliche Krankheitsanzeichen bis auf zwei. Unterdessen hatten die Alten wieder gelegt, ein Paar sechs, das zweite sieben, das dritte acht Eier; die sieben Jungen vom mittelsten Paare wurden im Brutkasten acht Tage vor dem Ausschlüpfen getödtet, von den andern 14 Köpfen habe ich heute noch acht Stück, von denen vier gesund, die anderen vier aber an folgender Krankheit leiden: die Flügel- und Schwanzfedern stehen ganz seitlich ab, so daß die Jungen aussehen, als wenn sie von den anderen fortwährend gerupft und gebissen würden, was aber durchaus nicht der Fall, da meine Frau und ich scharf aufpassen. Diese jungen Vögel fressen gut, nach dem 14. Tage des Ausfliegens aus dem Brutkasten bekommen dieselben nur Hartfutter und Grünzeug abwechselnd, und trotzdem haben dieselben etwas wässerigen Koth, sitzen fast den ganzen Tag ruhig auf einem Fleck, und man sieht es ihnen an, daß sie sich nicht wohl befinden. Mein gewöhnliches Futter besteht in der Hauptsache aus weißer und Zuckerhirse, vermischt mit Hafergrütze, die sie sehr gerne mögen, Glanz und wenig Hanf. So lange die Alten brüten, etwas Nachtigalenfutter mit Eigelb, und wenn die Jungen ausgeflogen sind, die ersten 14 Tage obiges Hartfutter, nebenbei dasselbe aufgeweicht. Dabei fehlt es nie an Sepienschale, die sie viel verbrauchen, Salz und reichlich frischen Sand, Salat (hauptsächlich zum Baden) und ich glaubte demnach meine Schuldigkeit gethan zu haben, war aber lange in Zweifel darüber, ob ich die Alten zur dritten Brut, die sie jetzt begonnen haben, zulassen sollte, habe es jedoch gethan, in der Hoffnung, von Ihnen einen Rath zu erhalten. Die Jungen können natürlich gar nicht fliegen, sondern erreichen die hohen Sitzstangen durch Klettern mit dem Schnabel, plumpsen dabei aber sehr häufig herunter. Das Zimmer, in dem die Volière steht, war den Winter über ungeheizt, jedoch sank die Wärme nie unter 10° R., da ich die Thüre zum geheizten Nebenzimmer Tag und Nacht offen ließ, und waren die Fenster täglich einige Stunden geöffnet. H. Winckler, Verwalter in Fürth.

In den beiden obigen Auslassungen sind so ziemlich die schlimmsten Uebelstände dargelegt, über welche die Wellensittich-Züchter sich am häufigsten zu beklagen haben und wir wollen demnächst dieselben eingehend erörtern. D. R.

(Fortsetzung folgt.)

Das Einsammeln der Ameisenpuppen.

Für diejenigen, welche die Ameisenpuppen selbst sammeln, ist es oft gar zu ärgerlich, wenn längere Zeit Regenwetter eintritt, oder wenn sie während der Sammlung nach altem Verfahren vom Gewitter überrascht werden. Vielleicht ist es Manchem erwünscht, nachfolgende Art und Weise des Einsammelns kennen zu lernen.

Man versieht sich mit einem Stück grober Leinewand, das die Form eines Rechtecks haben muß. Diese Leinewand wird faltenlos auf dem Boden ausgebreitet. Sodann hält man vier Lattenstücke bereit, an deren acht Enden kleine Hölzchen so aufgenagelt werden, daß die genannten Lattenstücke, wenn sie der Länge nach auf dem ebenen Boden aufgelegt werden, hohl liegen und die Hölzchen ihnen also gleichsam als Füße an beiden Enden dienen. Die Länge der Lattenstücke muß jener der vier Seiten der ausgebreiteten Leinewand entsprechen, aber so, daß sie je zwei Handbreit kürzer sind, als die betreffende Leinewandseite. So ergeben sich also, gleich den vier Seiten der Leinewand, zwei längere und zwei kürzere Lattenstücke. Diese werden nun auf der Leinewand so aufgestellt, daß sie ein Rechteck bilden, das an allen Seiten eine Handbreit vom Rande des Tuches entfernt ist. Die Tuchränder schlägt man nun über die Latten, so daß sie etwas über dieselben hereinhängen. Die Tuchecken schlägt man ein und hält die Falten mit einer Stecknadel zusammen. Unter die hohl liegenden Latten legt man einige belaubte Zweige und breitet endlich auf der nicht bedeckten Fläche des Tuches die Ameisenpuppen sammt Unrath, so wie sie eben aus dem Haufen vermittelst einer Schaufel geschöpft sind, möglichst gleichmäßig aus, rührt von Zeit zu Zeit darin mit einem Stäbchen und in etwa einer Stunde sind alle Puppen unter die Latten getragen. Man hat nun nichts weiter zu thun, als mit einem großen Schaumlöffel die reinen Ameisenpuppen einzufassen. Dieses Verfahren läßt sich eben so gut im Freien als zu Hause anwenden. Ich für meine Person pflege die Ameisenpuppen sammt Ameisen u. dgl. in einer gutschließenden blechernen Botanisirkapsel nach Hause zu nehmen und in der Waschküche oder Scheuer das Tuch in oben beschriebener Weise auszubreiten. Wenn die Ameisenpuppen eingefaßt sind, wird das Uebrige den Hühnern preisgegeben. Bei Regenwetter giebt es kein bequemeres Verfahren. Verwendet man anstatt der Lattenstücke je 2—3 entsprechend lange, starke gleichlaufende Dräte, so macht sich die Sache noch weniger schwerfällig und die Vorrichtung läßt sich leichter in Wald und Feld mit hinausnehmen, wo man die Ameisenpuppen an Ort und Stelle einfassen will.

G. Göller, Pfarrer in Alfdorf.

Schattenseiten der Ausstellungen.

(Schluß.)

Wie prämiirt werden soll, nach welchen Regeln u. s. w., darüber ist schon viel geschrieben worden; es muß jedem Verein überlassen bleiben, das zu bestimmen, wie er zu verfahren am besten findet. Giebt es aber nur zu viele preisdürstige Aussteller, so giebt es doch noch mehrere verkaufssüchtige, und es wird darin oft Großartiges geleistet. Um einen Stamm Hühner zu verkaufen, werden oft Worte verschwendet, und es wird dabei gelogen, ähnlich wie es auf Viehmärkten zugeht. „Den Verkauf besorgt das Komité", sagt freilich das Programm, und der Aussteller hat sich davon ganz fernzuhalten. Dies geschieht jedoch keineswegs. Sind unter den Ausstellern gar Händler, so wird natürlich außer dem ihrigen alles übrige schlecht gemacht; ja, heimische Händler schleppen die Käufer nicht selten von der Ausstellung fort nach ihrem Geschäft, wo ja Alles billiger ist und wo keine Provision abgeht, wie versichert wird. Selbstverständlich werden dort Verkäufe auch ausgestellten Geflügels abgeschlossen — und der Verein ist um seine Provision betrogen; auch Vereinsmitglieder verschmähen mitunter diesen Weg nicht! Dies ist ein großer Uebelstand der Ausstellungen, welcher dieselben zum Geflügelmarkt herabwürdigt, und der Vorstand jedes Vereines sollte streng darauf sehen, daß sich in das Verkaufsgeschäft Niemand einmischt.

In vielen Programms der Ausstellungen heißt es: „die während der Ausstellung gelegten Eier werden zerstört", und dies geschieht auch meistens durch einfaches Eindrücken. Doch ist auf Ausstellungen auch schon beobachtet worden, wie man auf die Eier das Datum und die Katalog-Nummer schrieb. Ob damit eine Brutabsicht, oder nur die, einmal einen Aufsatz über den verschiedenen Geschmack der Hühnereier schreiben zu können verbunden gewesen, das lasse ich dahin gestellt sein. Daß durch die Wärter Eier verschleppt werden, läßt sich oft nicht vermeiden, aber jeder Verein wird wol beim Bekanntwerden sich solche „Veredler der Hühnerzucht" für künftig fernhalten.

Bei Vögeln wird das Futter anzugeben verlangt, bei Hühnern und Tauben nicht, und doch ist die Fütterungsweise vielfach verschieden. So erhielt Jemand von einer größern Ausstellung sein Geflügel abgemagert zurück und erfuhr später, daß man dort nur Gerste gefüttert, woran seine Hühner nicht gewöhnt waren. Ebenso frißt das aus England und Frankreich kommende Geflügel meistens Mais und rührt Gerste oder Wicken nur im Nothfall an, und daher wäre es wol angezeigt, allen fremden Hühnern, Tauben u. dgl. gemischtes Futter zu geben. Dadurch allein könnte sich jeder Verein vor dem Vorwurf schützen, daß das Geflügel auf der Ausstellung schlecht verpflegt worden sei.

Zu den Tauben, Hühnern und Vögeln kommen auf Ausstellungen auch häufig noch Kaninchen. Mit welchem Rechte denn aber? Nach unserer Meinung steht es bis jetzt noch keineswegs fest, daß die Zucht derselben lohnend sein und ein billiges Fleisch durch sie geboten werden soll. Bei dem jetzigen Kostenpreise derselben ist das wol so rasch noch nicht zu erwarten. Aber wehe dem Verein, der für deren Unterbringung kein geeignetes Lokal hat; die Besucher seiner Ausstellung werden durch die Wohlgerüche keinenfalls sehr erbaut sein — und zartnervigen Besucherinnen könnte solche Geflügelausstellung wol ein für allemal verleidet werden. Mir ist bekannt, daß zu einer Ausstellung die Kaninchen mit umfaßte, auch Alpenhasen und Murmelthiere angemeldet wurden.

Warum wollen wir denn also unsere Ausstellungen nicht gleich durch Zulassung aller nützlichen Hausthiere überhaupt vergrößern?

Soweit meine Anschauung und Meinung über die Ausstellungen. Welchen Nutzen uns dieselben gebracht haben und immerfort bringen, darüber später Weiteres. Die untenstehende Zusammenstellung der Ausstellungsergebnisse aller bedeutenderen Vereine wird zeigen, welchen Aufschwung die Geflügelzucht gegenwärtig in Deutschland nimmt.

Th. Hesse in Köln.

	1872				1873				1874			
	Taubenzahl.	pCt. verkäuflich.	Hühnerzahl.	pCt. verkäuflich.	Taubenzahl.	pCt. verkäuflich.	Hühnerzahl.	pCt. verkäuflich.	Taubenzahl.	pCt. verkäuflich.	Hühnerzahl.	pCt. verkäuflich.
Dresden . . .	692	96	217	90	313	89	159	93	500	93	204	91
Berlin					501	55	122	72	360	66	129	82
München . . .									334	75	180	61
Hannover . . .	671	91	310	90	486	93	350	90				
Braunschweig .	271	90	197	86	.	.	.	.	655	79	223	65
Köln, Columbia	309	58	142	81	225	77	124	80	208	87	144	80
Köln, Verein für Geflügelzucht .	.	.	.	.	424	67	229	83	359	68	208	79
Frankfurt a. M.	345	83	113	65					337	86	109	83
Solingen . . .					110	90	93	90	293	92	192	80
Mühlheim a. R.	241	73	170	54	227	77	200	52	260	83	264	65
Münster W. .	221	80	140	50	466	82	332	79				
Wiesbaden . .	384	78	158	70	553	78	191	70				

Bruchtheile sind überall weggelassen und die Aufstellung ist nach den Katalogen gemacht.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Die Zeit der Maikäfer ist wieder da; dies Jahr kann man sie freilich eher Junikäfer nennen. Wie kann man dies sonst so lästige Ungeziefer wenigstens etwas für die Vogelwelt und als leicht zu beschaffenden Ersatz für andere Fleischnahrung verwerthen und verwenden? Durch Trocknen oder Stampfen oder wie sonst? Ich habe schon einigemale von Maikäferschrot gelesen, weiß aber nicht, wie es bereitet wird, um es vor Faulen, bez. Verderben zu bewahren. Vielleicht auch nehmen Sie eine Anfrage über die beste Verwerthung der Maikäfer auf, und der eine oder der andere der Leser giebt seine Erfahrungen.

D. Borach, evang. Pfarrer in Rogasen (Posen).

(Dies geschieht hiermit, bittend, daß Erfahrungen, bez.

Vorschriften uns freundlichst schleunig mitgetheilt werden mögen. D. R.) *)

Beantwortung: Aus eigener Erfahrung weiß ich bestimmt, daß eine Pute (Truthenne) nach einmaliger Befruchtung 18 Eier gelegt, aus denen sämmtlich Junge erbrütet wurden. Die Henne mußte 3/4 Meilen weit zum Puthahn geschickt werden, da näher keiner vorhanden war, und sie blieb nur zwei Stunden dort; ein späteres Hinzukommen war nicht möglich. Ferner habe ich eine alte Frau gekannt, die jahrelang ihre Gans einmal zum Gänserich brachte und Junge davon aufzog. Auch sie wohnte 3/8 Meilen entfernt, so daß ich bestimmt glaube, daß die Gans sich nur einmal gepart hat. Bei der einmaligen Begattung dürfte es aber sehr bedeutsam darauf ankommen, daß dieselbe zur rechten Zeit vor sich geht.

Nun glaube ich aber nicht, daß es bei einem Huhn eben so sein würde, weil ein solches viel mehr Eier legt, als in seinem Naturzustande. Wollte man auch nur die ersten 16 bis 18 Eier zur Brut nehmen, die nach einer Parung gelegt worden, so glaube ich doch kaum, daß diese alle befruchtet sein würden, da durch das Legen von unnatürlich vielen Eiern das naturgemäße Verhältniß doch einmal gestört sein muß. Auch wird bei kleineren oder überhaupt bei allen Vögeln, die nur paarweise ihre Jungen aufzuziehen im Stande sind, eine Parung nicht genügen, da bei dem Abhandenkommen des Männchens die Brut doch zu Grunde geht und zumithin die Parung für eine ganze Brut dann doch keinen Zweck haben würde, da die Jungen ohne Hülfe des Männchens nicht aufgezogen, oft sogar garnicht erbrütet werden können. A. Rothe in Hindenburg.

*) Um jedoch die günstige Zeit nicht ungenutzt vorübergehen zu lassen, fügen wir noch sogleich hinzu, daß in Nr. 5 des ersten Jahrgangs von Herrn Seifert bereits eine Vorschrift zum Maikäferschrot mitgetheilt worden: Die getödteten Maikäfer werden getrocknet, von den Flügeldecken, Beinen und Köpfen befreit, und dann einfach gestampft. Das Schrot muß in trockenen, mit Kork fest verschlossenen Flaschen aufbewahrt werden.

Aus den Vereinen.

Vogel- und Geflügelausstellung in Nürnberg.

Die zweite Vogel- und Geflügelausstellung des Nürnberger Ornithologischen Vereins, welche vom 21. Februar bis 2. März c. abgehalten wurde, war in geräumigen Lokalitäten, den Sälen des Contumazgartens untergebracht. Trotz des theilweise schlechten Wetters war der Zudrang des Publikums zur Ausstellung von Anfang bis zum Ende ein außerordentlicher, bisweilen erdrückend starker, so daß die Säle sich dennoch zu enge erwiesen. Das Leben um das Ausstellungslokal gestaltete sich beinahe zu einem Volksfeste. Solche allgemeine Theilnahme ist ein erfreuliches Wahrzeichen, wie die Sache unserer deutschen Vogel- und Geflügelvereine nicht in der Luft schwebt, sondern einen guten Boden im Volke hat.

Der Nürnberger Ornithologische Verein ist ein noch junger Verein, der aber kräftig emporstrebt und in dieser seiner zweiten Ausstellung sehr bemerkenswerthe Fortschritte gemacht hat. Die Abtheilung der Vögel enthielt laut Katalog in 199 Käfignummern 448 einzelne Vögel. Wol ziemlich alle Vögel, welche gegenwärtig von Liebhabern im Käfige gehalten werden, waren in schönen Exemplaren vorhanden. Die Tauben waren vertreten durch 172 Paare. Am schwächsten waren die Hühner vorhanden, (für welche in den edleren Rassen hierorts erst noch ein weiteres Feld zu beschaffen bleibt) nämlich in 37 Stämmen. Enten waren nur zwei, jedoch sehr schöne Stämme ausgestellt. Außerdem war die Ausstellung bereichert durch eine Mannichfaltigkeit von schönen und billigen Käfigen und mancherlei Gerätschaften von den Herren Nagel und Weid dahier und Herrn K. Gudera in Leipzig, ferner durch eine reiche Anzahl von Nistvorrichtungen von Herrn Frühauf in Schleusingen, durch geschmackvolle Aquarien der Herren Gutzler und Weid von hier und durch Sortimente von Futter-Sämereien der Herren Kraft und Liebermann zu Nürnberg.

Der junge Verein hatte bisher so bedeutende Ausgaben für Beschaffung brauchbarer Ausstellungskäfige, und wird solche auch noch für das nächste Jahr haben, daß er von einer kostspieligen Prämiirung durch Medaillen oder Geldprämien absehen mußte, wollte er nicht die Förderung der anderweitigen Vereinszwecke schädigen. Doch war beschlossen, hervorragende Ausstellungsgegenstände durch würdige Ehrendiplome auszuzeichnen. Leider sind die Diplome nicht Kunstblätter geworden, wie sie vom Ausstellungskomité beabsichtigt gewesen; die Zeit war eben zu kurz, um für dieses Jahr noch eine entsprechendere künstlerische Leistung anschaffen zu können.

Als Preisrichter waren gewählt die Herren Beck, Bichler, Dorn, J. F. Engelhard, Gebhard, Schönberg, Stadelmann und Wild.

Mit Diplomen wurden ausgezeichnet:

A. in der Abtheilung der Vögel die Herren Böhringer (Kukuk), Hauser (Rosella, selbstgezüchtete Wellensittiche und Zebrafinken), A. Hendschel in München (reichhaltige und mit seltenen Vögeln ausgestattete Sammlung), O. Ganzenmüller (Züchtung fremdländischer Vögel), J. Gebhard (Jako, Züchtung von Wellensittichen und Kanarienvögeln), Fr. Rödel (Scharlach-Tanagra, Züchtung von Wellensittichen), König (Blauamsel), E. Wild (Amerikanischer Nußbeißer und Züchtung von fremdländischen Vögeln), Fr. Schönberg (selbstgezüchtete Zebrafinken, Bandfinken, Bastarde von Mezambiquezeisig-Männchen und Kanarien-Weibchen, Wellensittiche), Chr. Seeger (reichhaltige Sammlung schöner überseeischer Vögel), K. Gudera in Leipzig (reichhaltige Sammlung schöner und seltener Vögel).

B. In der Taubenabtheilung: die Herren G. Meisenbach (Kropftauben), Horntasch (Kropftauben), M. Winter (Hühnertauben, Karriers, Ballonkröpfer, Brünner Kropftauben), F. Wahlhammer in München (Hühnerscheckten), M. Biron in Mainz (Mövchen), Geiger (Mövchen, Almond-Tümmler), J. Engelhardt (pommersche Kropftauben), W. Lang (Rostocker Tümmler), R. Metzger in Reichenbach (Blauschuppflügel, englische Kropftauben), Bauernfeind in Schwabach (Trommeltauben), F. Claus in Siebenlahn (Trommeltauben), K. Kießel in Schweinau (Bagdetten), J. Schmidt (Feldtauben), W. Billeiter (Bagdetten), G. Volkert in Dürrenhembach (Lerchentauben), Kirmaier in Mühldorf (Sammlung).

C. In der Hühnerabtheilung: die Herren J. Beck in Sündersbühl (Truthühner, Prinz Albert-Hühner, Brahma-Putra, Fasanen-Malayen, Rebhühner), J. Hirschauer in Schwäbisch-Gmünd (Hamburger Goldlack, Kampfbantam), W. Röhrich in Stuttgart (La Flèche), Schiffmann (Gold-Bantam), König (Perlhühner), S. Schüler in Mühldorf (Paduaner).

Diplome erhielten auch die ausgestellten Enten des Herrn O. C. Daut in Altenthann (Stockenten) und des Herrn J. Beck in Sündersbühl.

Als erfreuliches Zeichen dürfte noch angemerkt werden, daß weitaus das meiste von auswärts eingesendete Geflügel, namentlich Tauben und Vögel, während der Ausstellung ihre Käufer gefunden haben.

Bei der mit der Ausstellung verbundenen Verloosung fielen auf folgende Loosnummern Gewinnste:

Nr. 40. 60. 94. 150. 351. 373. 592. 714. 721. 760. 821. 840. 936. 1026. 1243. 1250. 1271. 1281. 1453. 1454. 1476. 1757. 2004. 2075. 2204. 2292. 2305. 2330. 2402. 2476. 2531. 2564. 2695. 2838. 2915. 3027. 3212. 3263. 3343. 3577. 3654. 3677. 3881. 3900. 3917. 3995. 4166. 4168. 4185. 4568. 4613. 4867. 5018. 5073. 5110. 5262. 5685. 5715. 5764. 6109. 6168. 6298. 6440. 6621. 6775. 6895. 7027. 7064. 7137. 7164. 7180. 7483. 7503. 7580. 7603. 7850. 7852. 7858. 7944. 8071. 8124. 8146. 8298. 8310. 8416. 8469. 8499. 8592. 8609. 8851. 9126. 9297. 9316. 9525. 9586. 9731. 9989. 10031. 10104. 10139. 10260. 10277. 10292. 10322. 10394. 10465. 10565. 10570. 10743. 10752. 10756. 10768. 10841. 10915. 10918. 11179. 11244. 11478. 11646. 11930. 12031. 12038. 12081. 12205. 12588. 12716. 12740. 12782. 12812. 13082. 13307. 13429. 13608. 13805. 14030. 14034. 14127. 14129. 14281. 14421. 14621. 14722. 14787. 14825. 15109. 15139. 15339. 15474. 15535. 15613. 15621. 15685. 15739. 15768. 15861. 15907. 15930. 16117. 16259. 16332. 16448. 16510. 16855. 16927.

Prof. F. S.

Briefwechsel.

Herrn Wilhelm Bergh in Veile in Dänemark: Wenden Sie sich gefälligst an die Redaktion der in der nächsten Nummer erwähnten „Blätter für Kaninchenzucht". Dort erhalten Sie bereitwilligst jede Auskunft und in der Zeitschrift selbst finden Sie in umfassendster Weise die Befriedigung aller Ihrer Wünsche. — Herrn J. M. Noack in Bessungen: Ihre angebotenen Beiträge werden uns willkommen sein.

Herrn Apotheker Dr. K. Mikolasch in Lemberg: Weitere Mittheilungen werden uns angenehm sein. — Herrn Apotheker Jädike in Kindelbrück: Ihren Beitrag mit Dank empfangen. — Herrn A. F. Wiener in London: Recht aufrichtig bedauern wir mit Ihnen den Tod des schönen Vogels. Dieser australische Regentbirt ist Oriolus regens, also deutsch wol am besten: Königstrupial. Das uns übersandte Exemplar war ein prachtvolles Männchen, und daher um so mehr schade, daß es auch nicht einmal mehr zum Ausstopfen tauglich gewesen, da die Fäulniß bereits zu weit vorgeschritten. — Warum haben Sie Ihren Ausflug nach Deutschland nicht bis nach Berlin verlängert und mich mit Ihrem Besuche erfreut?

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

In der Handlung exotischer und hiesiger Vögel ꝛc.
[333] von **A. Hieronomi** in Braunschweig
sind gegenwärtig folgende Vögel vorräthig: Astrilds, Orangebäckchen, Goldbrüstchen, Amarantvögel, Schmetterlingsfinken, kleine Elsterchen, Silberfasänchen, Malabarfasänchen, Muskatfinken, Reisfinken, Bandfinken, Atlasfinken, Paradieswittwen, Dominikanerwittwen, Blutschnabel-, Napoleons- und Orangeweber, Safranfinken, Kanarienvögel, Hartlaubszeisige, Papstfinken, rothe Kardinäle, ungehäubte Kardinäle, Wellenpagageien, Nymphensittiche, Karolinasittiche, blaugelbe Araras, Grau-Papageien, Amazonen- und Gelbkopf-Papageien, Portorico-Papageien, Sperlingspapageien, ein rosenrother Kakadu, jung, zahm und sprechend, Lachtäubchen, Sperlingstäubchen, Virginische Wachteln, Sprosser, Nachtigallen, Schwarzdrosseln, Wachteln, Stieglitze, Finken, Zeisige, Plattmönche, Hänflinge, Pirole oder Bülo, Stare. Außer diesen Vögeln auch noch: Junge Ulmer Doggen eigener Züchtung, 10 bis 25 Thlr., Frettchen à Stück 4 Thlr., Affen, Goldfische, Käfige, Nistkasten u. dgl., Futterfämereien aller Art ꝛc. ꝛc.

Abzugeben sind: Selbstgezüchtete und importirte Sonnenvögel, Diamantvögel, Tigerfinken, verschiedene fremdländische Täubchen, 1 Paar gelbe Trupiale, 1 Paar rosenbrüstige Stare, 1 Paar Mohrenköpfe, Inseparables und Zebrafinken aus Dr. Ruß' Vogelstube. [334]

Ein eleganter runder Käfig von Messingblech, passend für einen Graupapagei oder ein Pärchen Sittiche ist billig abzugeben durch die Expedition. [335]

1 Stamm rothhalsige Kampfbantams, 1 Stamm weißhalsige Kampfbantams, 1 Stamm Seidenhühner, 1 Stamm Kochinahühner, 1 Hahn, 5 Hennen, 1 Paar Aylsbury-Enten, 2 Stämme Goldbantams, 2 Hennen Silberbantams (kann auch 1 Hahn dazu verschaffen), 1 Stamm bunte Zwerghühner engl. Rasse mit Federbausbacken, 1 Stamm gelbbunte Zwerge engl. Rasse ohne Federbausbacken, 1 Stamm gelbe Zwerge engl. Rasse, 1 Paar kukukfarbige Bantams, 1 Coutes Partheshenne.

Die Hühner sind 1 bis 2 Jahre alt, von sehr guter Zeichnung und Bau sowie in jeder Beziehung ächt; und erlasse ich die Thiere zum Einkaufspreis.
[336] **J. M. Noak**, Bessungen bei Darmstadt.

[337] **Die Vogelhandlung**
von D. Dufour, Behrenstrasse 51,
Passage-Gebäude,
empfiehlt die schönsten Papageien, grau und grün, zahm und gut sprechend, alle ausländischen kleinen Vögel, gutpfeifende Dompfaffen, die schönsten Harzer Kanarienvögel, Lichtschläger, schlagende Nachtigallen, Affen, kleine Damen-Hunde und eine Auswahl von Vogelkäfigen zu soliden Preisen.

[338] Gut getrocknete 1874er Ameiseneier à Pfund 20 Sgr., hat von jetzt ab vorräthig Aug. Dietz in Burg b. Magdeb.

Eine Zoologische Sammlung, ausgestopft, von ca. 250 Exemplaren, hat zu verkaufen
[339] Dr. **Roeper**, Villa Hullerbuch bei Feldberg.

1 Stamm (1 Hahn und 2 Hennen) Silberlack-Hühner, sehr fleißig legend, ist wegen Mangel an Platz zu verkaufen, resp. gegen Wellensittiche zu vertauschen. Eier kosten, soweit der Vorrath reicht, 30 Pfennige per Stück.
[340] **Friedr. Mahnfeldt** in Mirow in Mecklenb.

Franz. Lapins, nur **echt** importirte Rassen in Original-Zuchtthieren, als: Beliers, de garenne, argentes, clapiérs und domestique, billigst unter Garantie liefert das Export- und Importgeschäft **C. Schürholz**, Hildburghausen. [341]

Verein „Fauna".

Bei der heute stattgefundenen Verloosung sind auf folgende Nummern Gewinne gefallen:

125, 129, 157, 190, 212, 226, 319, 327, 357, 381, 413, 523, 547, 567, 621, 637, 643, 830, 844, 870, 879, 908, 913, 944, 946, 951, 957, 975, 1003, 1032, 1049, 1058, 1101, 1122, 1132, 1169, 1189, 1203, 1256, 1259, 1260, 1282, 1292, 1353, 1409, 1518, 1544, 1545, 1282, 1584, 1683, 1688, 1760, 1838, 1948, 1960, 2003, 2011, 2017, 2099, 2105, 2121, 2145, 2157, 2171, 2173, 2191, 2251, 2325, 2369, 2385, 2392, 2433, 2441, 2464, 2483, 2486, 2556, 2566, 2581, 2602, 2620, 2636, 2742, 2768, 2793, 2817, 2841, 2879, 2902, 2913, 2914, 2922, 2942, 2953, 2956, 2961, 2980, 2995, 3096, 3146, 3217, 3282, 3388, 3394, 3396, 3408, 3409, 3477, 3521, 3590, 3636, 3638, 3643, 3652, 3665, 3686, 3689, 3740, 3806, 3827, 3856, 3875, 3916, 3941, 3944, 3947, 3991, 4075, 4100, 4107, 4136, 4216, 4226, 4291, 4306, 4316, 4322, 4357, 4375, 4383, 4467, 4548, 4569, 4574, 4592, 4605 4667, 4686, 4688, 4702, 4705, 4738, 4852, 4856, 4869, 4870, 4877, 4904, 4917, 4986, 4996, 5033, 5049, 5091, 5099, 5115, 5128, 5141, 5144, 5169, 5185, 5183, 5208, 5213, 5214, 5263 5285, 5303, 5390, 5396, 5415, 5429, 5430, 5456, 5469, 5536, 5586, 5627, 5636, 5647, 5657, 5659, 5736, 5842, 5872, 5886, 5900, 5915, 5923, 5937, 5952, 5981, 5982, 5988, 5996, 6014, 6025, 6041, 6096, 6201, 6220, 6226, 6233, 6285, 6335, 6363, 6369, 6372, 5446, 6468, 6514, 6524, 6541, 6553, 6588, 6591, 6612, 6631, 6648, 6733, 6747, 6795, 6800, 6826, 6831, 6849, 6878, 6916, 6948, 6960, 6970, 6972, 7092, 7101, 7157, 7212, 7221, 7226, 7262, 7264, 7318, 7320, 7344, 7364, 7373, 7401, 7467, 7499.

Düsseldorf, den 26. Mai 1874.
[342] **Der Vorstand.**

Echte französische Kaninchen in Feldhasenfarbe, mit 12 Centim. langen Löffeln, ausgewachsen, 9 bis 10 Pfd., 6 Monat alt, der Preis 4 Thlr. 4 Monate alt, das Paar 2 Thlr. 15 Sgr. Photographie der Eltern wird auf Wunsch eingesendet. Familienzucht streng vermieden. Garantie lebender Ankunft. Anfragen ist Marke beizulegen. **Fritz Engel**,
[343] Woldegk, Mecklenburg-Strelitz. Maler.

Das Etablissement von Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

[344]

179. 180 St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen folgende Thiere erhalten: 46 Graupapageien, 23 Paar Liebesvögel (Inséparables), 22 Müllerpapageien, 1 Sittich von Java, Königssittiche, Reisvögel, Sperbertauben vom Senegal, größte Elsterchen (A. fringillina), Orangebäckchen; ferner 1 Emu, 4 Flammings, 3 Pelikane, 1 Geier von Angola; außerdem zahlreiche Affen, unter denen wieder 1 Orang-Utan, sodann 1 indischer Elephant, 1 Paar Wölfe u. s. w.

Dratgeflecht zu Volièren.

Wir empfehlen unsre ☞ **Maschinen-Drat-Geflechte** ☜ von 3/8 bis zu 2″ Weite zu großen und kleinen Vogelkäfigen, Hühnerhäusern ꝛc. und stehen mit Proben und Preisen gern zu Diensten.

Rosslau a. d. Elbe.

Foest & Loesche,

Metall-Drat-Weberei.

[345]

Drei tollige, silbergraue, türkische Hühner à 3 Thlr. sind zu verkaufen. Auskunft giebt die Expedition. [346]

Eine Anzahl junger Kanarienhähne, echt harzer Abstammung, versende ich unter Garantie Stück zu 1 Thlr. 20 Sgr.
[347] **W. Laugner,** Weichensteller.
Liegnitz, Uferstr. 1.

Italienische Hühner.

Importirte 1874r. Frühbrut
in Gelb, Weiß, Kukuksperber und Schwarz
können während der warmen Jahreszeit regelmäßig von mir bezogen werden.

Preis 3 Fr. pro Stück, Hahn oder Henne.

☞ Da ich nur echte und in Farbe wie Gestalt tadellose Exemplare versende, so kann es geschehen, daß in Folge kleinerer Auswahl (namentlich in Weiß) die verehrl. Besteller oft einige Zeit auf die Ankunft der Sendungen warten müssen, doch verlieren Sie dadurch nichts, da in diesem Fall die Hühner nur um so kräftiger und befriedigender ausfallen.

[348] **A. Rumpf,** Außersihl-Zürich.

Die
Handlung überseeischer Vögel ꝛc.
von
[349] **Armin Kraeger**
Leipzig, Zeitzerstraße Nr. 18

empfiehlt alle Arten überseeischer Vögel: Prachtfinken, Wittwen, Weber, Papageien, im prachtvollsten Gefieder, theils singend und züchtbar. Außerdem lebendes Wild, Amphibien, Schildkröten, Mineralien, Nistgegenstände, Volieren und Luxusgebauer sowie alle Sorten Vogelfutter.

Preislisten gratis. Händler, Rabatt.

Ein Amsel vertauscht gegen eine Drossel (mit Waldschlag), zugleich empfiehlt frische Ameiseneier, das Liter zu 36 Kreuzer oder 10 Silbergroschen. **G. C. Weiglein.**
[350] Zellingen (Bayern).

Allgemeine Geflügel-Ausstellung

verbunden mit
Verloosung, veranstaltet vom Verein für Geflügelzucht, Kreuznach
vom 19. bis 21. Juli 1874
in dem neuerbauten Ausstellungslokal in der Kurhausstraße.

Wir laden hierdurch höflichst ein, unsere erste Ausstellung allseitig beschicken zu wollen.

Anmeldungen sind spätestens bis zum 1. Juli unserm Schriftführer, Herrn Reinhard Schmithals, königl. Hofbuchhändler hier, mitzutheilen. — Die Einsendung der Thiere muß, bis 16. Juli eintreffend, an unsern Präsidenten Herrn Gutsbesitzer J. Baur hier geschehen.

Loose à 5 Sgr. zu der mit der Ausstellung verbundenen für die Mitspieler sehr günstig gestellten Verloosung sind gegen Einsendung des Betrages zu beziehen durch Herrn Reinhard Schmithals, königl. Hofbuchhändler, und Herrn Jakob Fels hier.

[351] **Der Vorstand.**

Gegen Baar:

1 Paar rothe Kardinäle 8 Thlr.
1 Männchen, wilder Kanarienvogel 5 Thlr.
1 Papageienschnäbchen, guter Sänger 4 Thlr,
1 Sprosser, vorzüglicher Sänger 5 Sänger.
Sämmtliche Vögel sind überwintert und Prachtexemplare.
[352] **S. Koch,** Hoflieferant. Wiesbaden.

Für Sprosser-Liebhaber.

Heute, den 22. bin ich mit einem großen Transport echter Ungarischer David-Sprosser, gute Gebirgsvögel, in Dresden eingetroffen. Die Vögel schlagen jetzt flott und versende ich unter Garantie des guten Ankommens und Schlagens das Stück mit 5 und 6 Thlrn.

[353] **H. Hromada.**
Zoologische Handlung, Dresden.

Zwei Paar weiße japanesische Bengalisten, die bereits mit Erfolg genistet, hat abzugeben à Paar mit 10 Thlr. incl. Emballage.
[354] **C. Engeler,** Stettin, Roßmarkt.

[355]

C. Hagenbeck's

Handelsmenagerie

in Hamburg

hat vorräthig: Kleine gelbhaubige, Leadbeater-, Rosa- und Nasen-Kakadus; Grau-, Surinam-, Amazonen-, Portoriko- und Brillen-Papageien; Königssittiche, Rosellas, Mily-Rosellas, Pennantis, Bauers-Sittiche, Portlinkoln-, Barrabands-, Vielfarbige, Sing- und Nymphensittiche, Junge Conurus jendaya, Blaue Gebirgslori, Undulatus, Weibchen grauköpfiger Inseparables, Sperlingspapageien; rothe, graue und Dominikaner-Kardinäle, Safranfinken, Mozambique- oder Hartlaubs-Zeisige, Graupfäffchen (Silberschnäbel, Picoplata), Kastanienbrüstige Schilfinken, Schwarzköpfige Nonnen (noch nicht in Farbe), Muskatvögel, Bunte japanische Reisvögel, Mövchen, Silberfasänchen oder Silberschnäbel, Bandfinken, kleinste Elsterchen, Cordonbleu, Astrilds, Atlasvögel, Paradies- und Dominikaner-Wittwen, Gelbschulterige Wittwen, Männchen Goldweber (Ploceus textor), Fuchsweber, Feuerfinken oder Orangevögel, Napoleonsvögel, Männchen Rothkopfweber, Indische Gelbkopfweber (Ploceus bengalensis), amerikanische Spottdrosseln, Kleine Beo (Gracula religiosa), Große Beo (Gracula intermedia), Chinesische Mynah (Acridotheres cristatella), gemeine Mynah, Weißohrige indische Staare, Rothohrige Mynah, Schwarze Büll-Büll, Chinesische Heherdrossel (Garrulax chinensis), Chinesische Spottvögel, Rothflügelstaare, Kuhstaare, Seidenstaare, Jamaika-Trupiale, Blaue Hüttensänger, Rothbruststaare von Chili, Blauheher.

Soeben sind noch angekommen: Schönsittiche oder Turkosinen, Diamantvögel, Pfaffenvögel, Zebrafinken, Grisbleu, Orangebäckchen, Atlasvögel, Amarantvögel, Bengalisten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 11. Juni 1874. Nr. 24.

Inhalt:

Haubentaucher (Podiceps cristatus) in der Mark Brandenburg. —
Zucht des Erlenzeisigs. —
Zur Warnung. —
Trauriges Mißgeschick einer Kanarienvogelzucht. —
Aus dem Zoologischen Garten von Berlin. —
Aus den Vereinen. Köln; Stettin. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anderweitige Liebhabereien; Verschiedene anderweitige Mittheilungen; Anzeigen. —

Haubentaucher (Podiceps cristatus) in der Mark Brandenburg.

Heute habe ich einige Mittheilungen zu machen, die vielleicht manche Leser Ihres Blattes interessiren werden.

Wenngleich mir selbst, als einem Boten des Friedens, das Pflegen des edlen Waidwerkes nicht gestattet ist, so versäume ich doch nicht gerne eine Gelegenheit, die mir erlaubt, als blos zuschauender Theilnehmer einer Jagd, Herz und Gemüth draußen in dem freien Reiche unserer schönen, großen Mutter Natur zu erfrischen. So hatte ich denn gestern auch bereitwilligst meine Begleitung dem Inhaber der hiesigen Gutsherrschaft, Majoratsherrn v. Wartenberg, zu einer Jagd von Wildenten zugesagt. Der Ort, an dem diese stattfinden sollte, dürfte seines Gleichen wenige in der Mark haben. Eine etwa 3000 Morgen große Wasserfläche, an den Ufern vom herrlichsten Buchen- und Fichtenwalde umsäumt, beherbergt alle Arten Wassergeflügels, vom Kormoran und Reiher herab bis zum zierlichen Wasserhuhn. Wir richteten unsere Fahrt nach einer kleinen Insel, die inmitten des Sees liegt, nur einige Morgen groß, aber von einem wahrhaft tropischen Pflanzenwuchs bedeckt und rings von dichtem Schilf umsäumt. Einige Kormorane und Reiher, die dort geläumt hatten, hielten, wie gewöhnlich, nicht aus zum Schusse und umkreisten in hoher Luft bei unserer Annäherung die Insel. Dagegen wimmelte es auf und um dieselbe von Geflügel aller Art. Hier fand ich brütend die Nachtigal, verschiedene Grasmücken, Rohrsänger, Staare, Amseln, Singdrosseln, Laubsänger, Turteltauben, Ringeltauben, Krähen, Stock- und Bläßenten, daneben leider Nester von Wasserratten u. dgl. Die Natur machte hier einen gleichsam wunderbaren, wie man zu sagen pflegt, keuschen und jungfräulichen Eindruck. Es wurden einige Wildvögel geschossen und dann ging es leider zur Jagd des großen Haubentauchers (podiceps cristatus), von dem unzählige Paare die Insel umschwärmten. Ich bat für die edlen Vögel um Schonung, konnte mich aber leider den Gegenvorstellungen nicht ganz verschließen, daß, wo dieser Vogel so zahlreich vorkomme, die Fischerei erheblich geschädigt werde. Ich hoffte, seine bekannte Vorsicht werde ihn bald das Weite suchen lehren, hatte mich aber darin sehr geirrt. Trotzdem sämmtliche Vögel nach den ersten Schüssen die Insel verlassen hatten, kehrten die Taucher immer wieder und wieder in gefährlichste Nähe zurück. Es wäre leicht gewesen, einige zwanzig zu schießen, wenn Herr v. W. nicht selbst zu großer Liebhaber der Thiere und Vögel gewesen. So ließ er es beim Erlegen von Dreien, einem Männchen und zwei Weibchen, bewenden und

begnügte sich, die Nester im Rohr aufzusuchen. Hier bot sich meinen Augen ein nie gesehenes Schauspiel. Auf einer Fläche von kaum zwei Morgen fanden wir einige zwanzig Nester des Haubentauchers, einige nur drei bis vier Fuß von einander entfernt. Sämmtliche Nester waren mit Eiern belegt, die lose mit Morast von den brütenden Weibchen bedeckt waren. Aus den erreichbaren allein wurden 64 Eier ausgenommen und mindestens ebenso viel, uns unzugängliche, waren noch vorhanden, die geschont wurden. Die höchste Anzahl Eier in einem Neste betrug sechs und sieben.

Ich lege auf diese Thatsache besonderen Nachdruck, weil man in den meisten Werken, und wohl auch mit Grund, angegeben findet, der Vogel sei höchst ungesellig und bewohne selbst größere Seen nur in einzelnen Paaren. Die hier vorhandene Ansiedelung kann ich aber nur mit den Ansiedelungen der Saatkrähe vergleichen. Ausdrücklich bemerke ich, daß es der große Haubentaucher ist, von dem ich rede, ein kleinwenig größer als die Stockente mit dem herrlichen Kragenschmuck und den aufgerichteten Ohrbuscheln. Mit lautem „Kraarro, kraarro" riefen sich nach unserer Abfahrt die Paare zusammen und der Friede kehrte nach Fortgang der mordlustigen Menschen wieder heim. Ich meinestheils habe nach besten Kräften dazu beigesteuert, den Vögeln ein mildes Loos zu bereiten.

R. Gensichen, Pfarrer in Geißen bei Königswalde.

Zucht des Erlenzeisigs.

Seit drei Jahren besitze ich ein Paar Erlenzeisige und benütze ein gegen Osten gelegenes Fenster dazu, um diesen niedlichen Sängern für den Sommer eine Wohnung im Freien einzurichten. An den beiden Seitenwänden brachte ich dieselbe Nistvorrichtung wie für Kanarienvögel an, kleine viereckige Kästchen, drei Zoll im Viereck, mit etwas Moos ausgefüllt.

Als die Witterung milder wurde, bemerkte ich zu meiner großen Freude, daß — also vor zwei Jahren zum ersten Male — die Vögelchen zu bauen begannen; bald hatte das Weibchen auch vier Eier gelegt, von denen aber nur Ein Junges ausschlüpfte, das jedoch bei den frischen Ameiseneiern, die ich nebst Hanf und Spitzsamen den Alten als Futter bot, sehr rasch großgezogen war. Leider war ich damals genöthigt, meine Kanarienvögel aus ihrer seitherigen Behausung zu nehmen, und da ich keinen anderen Raum für sie zur Verfügung hatte, sperrte ich die Kanarienvögel zu den Zeisigen. Dies war wol die Ursache, daß die Zeisige nicht zum zweiten Male zur Brut schritten.

Im vergangenen Jahre durften die Zeisige schon im Monate März ihre Sommerwohnung beziehen und ich hielt sie auch während des ganzen Sommers in dieser allein, ohne Gesellschaft anderer Vögel. Und schon anfangs Mai hatte das Weibchen fünf Eier gelegt. Nach Verlauf von 14 Tagen schaute ich mittelst eines Handspiegels in das Nest und fand sämmtliche fünf Eier glücklich erbrütet und an ihrer Stelle fünf Junge. Auch diese verließen bei der vorhin angegebenen Auffütterung, ehe drei Wochen verstrichen waren, das Nest.

Ein Bekannter von mir hat ein Pärchen dieser selbstgezogenen Zeisige zum Aus- und Einfliegen gewöhnt, bis sie sich im vorigen Spätherbst eines schönen Tages empfahlen auf Nimmerwiedersehen.

Im vorigen Sommer brachte ich die Zeisige zum zweiten Male zum Nisten, gegen Ende Juni mit weiteren fünf Eiern, diese jedoch gab ich, bevor sie angebrütet waren, einem Freunde für seine oologische Sammlung. Leider hatte ich im vorigen Herbst das Männchen in Folge der naßkalten Witterung verloren. Indessen scheint das Weibchen den früheren Verlust bei einem frisch gefangenen zweiten Gatten, den ich ihr beigesellte, bald verschmerzt zu haben; denn heute entdeckte ich — somit im dritten Sommer — wiederum ein niedliches Nestchen in einem Nistkästchen und darin die ersten Eier.

Nachdem schon im vorigen Herbst in diesen Blättern die Mittheilung von glücklicher Zucht des Erlenzeisigs gemacht worden, dürfte die Ansicht widerlegt sein, als gehöre es zu den größten Seltenheiten, Erlenzeisige zur Zucht zu bringen. Sollten auch andere Vogelfreunde eine Zucht mit Erlenzeisigen versuchen, so mögen denselben beifolgende Bemerkungen aus meiner Erfahrung dienen:

1. Das Zeisigpaar muß sich in einem kleinen Käfig ein paar Monate lang aneinander gewöhnt haben, bevor man sie in einen größeren Flug behufs der Zucht unterbringt.

2. Der Raum, in welchem die Zeisige nisten sollen, muß ziemlich hoch und weit sein, und wenn möglich ins Freie gehen. Kleineres Gesträuch in Töpfen sollte nicht fehlen.

3. Nicht blos während, sondern schon mehrere Wochen vor der Brut müssen, wenn nicht frische, so jedenfalls gedörrte Ameiseneier nebst Grünkraut und gemischtem Körnerfutter gereicht werden.

Diakonus Göller in Waldenburg (Württemberg).

Zur Warnung.

Die Zeit der frischen Ameisenpuppen ist da, und so überaus wohlthätig dieselben sich auch zeigen, so haben sie doch eine üble Wirkung geübt, auf welche wir hier nochmals (Vgl. Nr. 11 d. J. 1872) aufmerksam machen wollen. Herr Naacke in Braunschweig hatte zuerst die trübe Erfahrung gemacht, daß Gürtelgrasfinken (Bart- oder Pfaffenvögel; A. cincta) nach dem Genuß von frischen Ameisenpuppen

erkrankt und gestorben waren. Derselbe Fall kam bei einem alten, längst eingewohnten Pärchen in meiner Vogelstube vor und in diesem Jahre habe ich gleiche betrübende Berichte von Dr. Franken in Baden-Baden und Herrn Oskar Vetter in Ludwigsburg erhalten. Der erstere dieser beiden Herren schreibt: Mir sind vor einiger Zeit und mitten aus den anderen Prachtfinken, als Diamantvögel, Zebrafinken, Amarantvögel, Elsterchen u. a. heraus zuerst sämmtliche junge Pfaffenfinken und dann auch noch das alte Paar, welches ich bereits seit drei Jahren besitze, gestorben, ohne daß ich die Ursache davon auffinden konnte. Es war vorher keine Erkrankung zu bemerken, die Vögel lagen vielmehr morgens todt am Boden. Herr Dr. F. ist sodann aber auch darauf gekommen, daß Erkrankung und Tod nur eine Folge des vielleicht zu reichlichen Verzehrens von frischen Ameisensuppen sein konnten. Die von Herrn Dr. M. Lövinson an den bei mir gestorbenen Pfaffenvögeln ausgeführte Untersuchung ergab eine sehr starke akute Entzündung der Eingeweide (nicht des Magens) und deutete daher auf Vergiftung. Wie eine solche aber durch die Ameisenpuppen bewirkt werden kann, ist nicht leicht zu erklären, wenn nicht dadurch, daß die Vögel durch zu übermäßigen Genuß sich die Erkrankung zugezogen. Immerhin bleibt als Thatsache die Erscheinung zu beachten, daß die Fütterung mit frischen Ameisenpuppen für diese Vögel gefährlich und daher diese Warnung zu beherzigen ist. Dr. R.

Trauriges Mißgeschick einer Kanarienvogelzucht.

Nachdem ich auf einer Dachstube, mit einem Ofen und vergitterten Fenster nach Osten, im vorigen Jahre von wenigen Weibchen in den Monaten Mai, Juni und Juli 110 Stück Kanarienvögel gezogen und nur wenige durch zu arge Hitze und in Folge meiner Abwesenheit als Geschworener verloren hatte, richtete ich eine zweite größere Stube nach der Nordseite mit einem eisernen Ofen und zwei ziemlich großen Fenstern, die auf einen freien Platz gehen, sehr sorgsam und naturgemäß ein. Auf beiden Stuben, die wir A und B nennen wollen, that ich je 48 Weibchen und 9 Hähne und zwar auf A um Mitte Aprils, auf B am ersten Mai. Alle Weibchen bauten ohne Ausnahme und legten nicht unter vier Eier, ja mehr als die Hälfte fünf und sechs Eier. Alle ausgeschlüpften Jungen wurden von mir durch täglich dreimaliges Futtern mit einer Federspule großgezogen — das heißt bis zu einer bestimmten Größe. Auf A schlüpften vier kräftige Junge in zwei Nestern nebeneinander zuerst aus. Da lag eines Morgens ein Thierchen, welches schon Federn hatte und gerade am stärksten war, todt unter den andern, am nächsten Morgen lagen wiederum zwei und nachdem ich das vierte Junge (da ich das Weibchen im Verdacht hatte, vielleicht die Jungen getödtet zu haben) in das angrenzende Nest gethan, lag dies am dritten Morgen auch hier todt. Darauf nahm ich das andere Nest mit vier beinahe flüggen Jungen herunter in meine Stube, hielt sie Tag und Nacht warm und brachte sie noch vier bis fünf Tage weiter. Da starb das eine, dann das zweite, dritte und nach 14 Tagen das letzte Junge, welches schon im Zimmer herumflog. So ging es nun weiter! Ich habe über 300 Vögel aufgefüttert und alle 300 habe ich todt heruntergebracht. Traurig war es, diese vielen kleinen unschuldigen Geschöpfe so nach der Reihe hinschmachten zu sehen. Ich versuchte es mit dem verschiedensten Futter, gequelltem Rübsamen, Mohnsamen, Salatsamen, fütterte Salat u. s. w. — Alles umsonst, sie starben, sobald sie Federn zu bekommen anfingen. Ich überließ einige Nester gut fütternden Weibchen allein. Die starben erst recht und noch viel früher! Auf A begann die Sterblichkeit, auf B bekam ich binnen vier Tagen gegen 70 Junge, die lustig sperrten und ganz rasch zunahmen. Da starb eins, da starben zwei und so ging es weiter, bis auch hier alle, die ich auffütterte, denselben Weg gegangen. Dies wäre genug Aerger für mich gewesen, aber es kam noch schlimmer! Ich fand ein Weibchen todt auf dem Neste, den andern Tag lagen drei todt auf dem Boden, dann ging es so weiter; oft trug ich 12 Weibchen und 20 Junge zu Grabe. Ich glaubte aber immer noch, daß die Hähne noch frisch wären und beim Eintritte besserer Witterung die Krankheit sich legen würde. Ich heizte Morgens und Abends beide Stuben, öffnete am Tage öfters die Fenster. Aber Alles umsonst! Auch die Hähne wurden ergriffen und ich fing nun dieselben heraus und auch von den Weibchen die, welche nicht brüteten, und steckte sie unten in meiner Stube in einzelne Käfige und pflegte, versuchte und kurirte an ihnen herum in aller möglichen Weise. Ich bestrich ihnen den After mit erwärmtem Muskatbalsam, gab Opiumtinktur (verdünnt durch Wasser) ins Saufen, fütterte theueren Salatsamen, kaufte andern Rübsamen, obgleich der bisherige nicht schuld sein konnte, da ich ihn von Erfurt von Herrn Emmhardt besonders hatte kommen lassen. Alles umsonst. Auch unten starben die Weibchen und auch die größte Zahl der Männchen und sogar solche, welche noch acht Tage unten vergnügt sangen und keine Spur von Krankheit zeigten. So habe ich denn bis jetzt über 300 junge Vögel, 85 Weibchen und 15 Hähne, die ich besonders hochschätzte, in dieser grauenerregenden Weise verloren und mein ganzer, so erfreuliche Aussichten versprechender Stamm droht mir unter der Hand zu verschwinden.

Ich suchte späterhin mir andere Weibchen zu verschaffen, gab gewöhnlich mehr dafür, als sie werth waren, und legte 14 einzelne Hecken in meinem Zimmer an. Aber leider habe ich an den Weibchen nur den Auswurf gekauft; nur acht von ihnen brüten wirklich, die anderen bauen aber gar nicht oder bauen, legen aber keine Eier. Von den meinigen,

erprobten Weibchen sind nur noch 12 Stück am Leben, aber ich wage es vorläufig gar nicht, sie mit einem guten Hahne zusammenzubringen; denn ein Weibchen starb noch, nachdem ich es schon 20 Tage aus der Stube von oben genommen hatte. Ja ein zugekauftes Weibchen, welches ich mit einem Hahne von oben zusammengethan, starb brütend auf sechs Eiern, obgleich der Hahn bis heute ganz gesund ist. Es starb aber an derselben Krankheit wie alle die übrigen, nämlich der Darre oder Schwindsucht, welche so arg ansteckend und dann eben unheilbar zu sein scheint.

(Schluß folgt.)

Aus dem Zoologischen Garten von Berlin.

Am 1. Juni Abends wurde die statutenmäßige Generalversammlung der Aktionäre des Zoologischen Gartens in dem Seitensaale der Restauration abgehalten.

Nach dem Rechenschaftsberichte des Vorsitzenden des Vereins-Vorstandes, Herrn Banquier Ferd. Jaques, beziffert sich der Vermögensstand des Vereins zu Ende Dezembers 1873 an Aktivvermögen auf 70,160 Thlr. 4 Sgr. 7 Pf. Der Garten war v. J., Aktionäre und Abonnenten nicht mit eingerechnet, von 658,046 Personen besucht, die Abonnements (4201) betrugen 15,587 Thlr., die Gesammteinnahme am Schlusse des Dezembers 1873 137,611 Thlr.

Nach dieser Uebersicht gab Dr. Bodinus eine eingehende Schilderung der Verschönerung der Anlagen und des Thierbestandes des Gartens. Der letztere betrug am Schluß des Jahres:

Raubthiere . . .	41	Arten im Werthe von	21,063
Affen	14	„ „ „ „	1,006
Nagethiere . . .	18	„ „ „ „	1,033
Beutelthiere . .	11	„ „ „ „	3,160
Dickhäuter . . .	11	„ „ „ „	23,575
Einhufer . . .	5	„ „ „ „	4,530
Wiederkäuer . .	45	„ „ „ „	39,251
Raubvögel . . .	35	„ „ „ „	2,950
Sperlingsart. Vögel	82	mindestens „	1,739
Paarzeher (Vögel) .	51	„ „ „ „	3,714
Hühnerartige Vögel	57	„ „ „ „	9,635
Stelzvögel . . .	51	„ „ „ „	8,917
Schwimmvögel . .	53	„ (in zahlreich. Expl.)	4,860
Reptilien . . .	8	„ im Werthe von	585
		Gesammtwerth	125,697

Nachdem Dr. Bodinus noch die größten Seltenheiten dieses Thierbestandes namhaft gemacht und dabei auch des in einem prächtigen Auerochsenpaar bestehenden Geschenkes des Kaisers von Rußland gedacht, so wie des von dem Weinhändler und Hof-Lieferanten Herrn Keßler dem Garten verehrten Lämmergeiers, ging er schließlich auf die Schilderung der so schmerzlichen Verluste im Raubthierhause über.

Als Dr. Bodinus eines Morgens in das Raubthierhaus kam, fand er einen der jüngeren Löwen auf einem Hinterfuße lahm und bald dasselbe Uebel an einem andern; er hielt es für Erkältung. Als aber bei einem Löwen an der Backe eine geschwürige Stelle sich zeigte und der schwarzmähnige Löwe in ähnlicher Weise erkrankte, schickte er zu Geh. Rath Gerlach. — Vergebens, in noch nicht acht Tagen waren die schönsten dieser Thiere verloren. — Das erste Opfer war der schwarzmähnige Löwe. Dienstag Morgens paarte er sich noch, wenige Stunden darauf zeigte er Spuren von Krankheit, am folgenden Nachmittag war er eine Leiche. Das Untersuchungs-Ergebniß lautete auf Rotz. — Ob Fleisch ohne äußere Spur vergiftet sein kann, oder ob das Fleisch von fremder Hand zugeworfen? — Möglich, daß ähnliche Erscheinungen wie die der Rotzkrankheit auch durch andere Gifte erzeugt werden; höchst auffallend war es, daß die Krankheit so überraschend gefährlich auftrat, daß ein großer Löwe in 24 Stunden umstand, während andere, die dieselbe Nahrung erhalten, nicht die leiseste Andeutung einer Krankheit zeigten; noch auffallender, daß von mehreren der beisammen lebenden Raubthiere stets das stärkste, welches Herr und Meister im Käfig war, fallen mußte. Hätten die Thiere alle dasselbe genossen, so würden die schwächeren doch ohne Zweifel zuerst erlegen sein. — In einem Käfig mit Löwe und Tigerin fiel der erstere; von zwei Tigern das Männchen, von einem Löwenpaar das Männchen, von drei Löwen der stärkste. Nur zu berechtigt ist der Schluß, daß die Thiere je einen Bissen bekommen, dessen sich gewiß das stärkste bemächtigte, wie das auch bei der Fütterung zu geschehen pflegt.

Etwa 4 Wochen später, als der Wärter den Käfig der Waschbären reinigte, war es ihm auffallend, daß von den Thieren, die Abends noch munter und frisch ihre Nahrung genommen hatten, keines sich zeigte. Er öffnete die kleine Rückzugshütte und findet zwei alte mit vier Jungen (vor zwei Jahren im Garten geworfen) mit geschwollenen Leibern todt auf dem Rücken liegen. Ein siebenter Waschbär, der vorher wegen einer Drüsenanschwellung abgesondert war, entging dem Schicksal. Nachmittags verendete ein kanadischer Luchs unter Krämpfen, am Abend der männliche schwarze Panther. Am folgenden Morgen wurde die Entdeckung gemacht, daß zwei Hyänen todt waren; als Dr. Bodinus in das Raubthierhaus stürzte, fand er die Jaguare sich heftig erbrechend; das Pantherweibchen war ebenfalls krank. Durch Milch wurden diese Thiere, mit Ausnahme des Jaguarweibchens, noch gerettet. Mochte nun bei dem ersten Hinsterben auch unheilvoller Zufall gewaltet haben, bei dem zweiten war das unmöglich. Dr. Gerlach und der polizeiliche Thierarzt Dr. Pauli machten die Obduktionen und gaben, ohne ihre Ansichten ausgetauscht zu haben, ihr Gutachten dahin ab, daß eine akute Vergiftung vorliege. Eine chemische Untersuchung von Dr. Sonnenschein hat kein Gift nachzuweisen vermocht. Trotzdem räumte der-

selbe mündlich ein, daß eine acute Vergiftung stattgefunden haben müsse.

Die Generalversammlung beschloß, die mit Beifall aufgenommene Auseinandersetzung des Dr. Bodinus drucken zu lassen, um sie auch den abwesenden Actionären zugänglich zu machen. Es waren 25 Aktionäre mit zusammen 72 Stimmen versammelt; die statutenmäßig ausscheidenden Vorstandsmitglieder und Revisoren wurden einstimmig wieder gewählt.*)

Aus den Vereinen.

Ausstellungsbericht der II. allgemeinen Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht in Köln.

Die diesjährige Ausstellung, welche in dem gut gelegenen und geräumigen Deutschen Kaisersaale stattfand, zeigte 371 Nummern Tauben, 213 Nummern Hühner, 5 Nummern Verschiedenes und 125 Nummern Vögel. Das Amt der Preisrichter in der Abtheilung für Tauben war den Herren Haushofmeister Meyer in Berlin, Rudolph Ortlepp in Magdeburg, Wilhelm Birk und Eduard Weil in Wiesbaden übertragen worden.

Ihre Königl. Hoheit Frau Prinzessin Karl von Preußen hatte die Ausstellung mit neun verschiedenen Paar Tauben beschicken lassen, unter denen besonders die französischen Kropftauben durch Größe hervorragten. Da diese Taubenrasse weiter nicht vertreten war, so scheint es fast, daß deren rasche Beliebtheit entweder nachgelassen oder die Einführung aufgehört hat; wie dem auch sei, die Taube ist schön und bleibt eine Zierde jeder Sammlung; ebenso die sogenannten Wiener Gamsel, die in reiner Zeichnung eine Seltenheit sind. Die ausgestellten gelben Chinesen waren in jeder Beziehung tadellos. Bedenkt man, daß vor unserer Ausstellung fast unmittelbar die Ausstellung der „Cypria" in Berlin war, so sind wir unserer hohen Protektorin durch Beschickung unserer Ausstellung zu doppeltem Danke verpflichtet.

Den Reigen der nach Rassen geordneten Tauben eröffneten die Wildtauben mit sechs prachtvollen Paaren, ausgestellt von Herrn N. Funk, Direktor unseres zoologischen Gartens. Die Sammlung umfaßte Nikobar-, Schopf-, Zebra-, Wonga-wonga-Tauben, alle gut gepflegt und prachtvoll befiedert. Frau Auguste Hönig von hier hatte Lachtauben und Herr W. Haas von Nippes Ringeltauben und im Ganzen waren 13 Paar Wildtauben ausgestellt.

Die nächstfolgenden 36 Paare verschiedener Feldtauben einschl. Schwalben- und Schildtauben boten Hervorragendes nicht, waren billig und wurden verkauft.

Die Gimpeltauben der Herren Wahlhammer und Ratzinger waren von Farbe 2c. nicht schlecht, obgleich die im vorigen Jahre von ersterem Aussteller geschickten besser gehalten waren. Unter den Trommeltauben waren es besonders ein Paar blaue Altenburger von Herrn F. Schramm in Wiesbaden, die allen Ansprüchen der Kenner genügten. — Deutsche einfarbige Mövchen waren in zehn Paaren vorhanden, worunter besonders ein Paar weiße von Herrn A. Diekamp in Elberfeld sehr schön zu nennen war, besser vielleicht wie mancher Egypter aus Deutschland, die unter dieser Bezeichnung mit 4 bis 5 Thlr. Verkaufspreis in manchem Kataloge zu finden sind. — Mövchen mit farbigem Schwanze hatte Herr W. Haas in Nippes in vier Farben, ebenso 20 Paar Schildmövchen in allen Farben ausgestellt, und andere, auch roth und gelbe, breitgehaupte; es waren sämmtliche Paare mustergültig und dem Aussteller ist es nur zum Lobe anzurechnen, daß er keine Kosten und Mühen gescheut, um diese Sammlung aufzubringen.

Wenn auch Züchter und Liebhaber von Egyptischen Mövchen bei jedem Ankauf äußern, es seien dies die letzten, und viele uns bekannte Züchter des ewigen Absterbens wegen bereits müde wurden, so giebt es doch einzelne wieder, die Ausdauer genug besitzen. Einer dieser ist Herr August Diekamp in Elberfeld, dessen ausgestellten Paaren die Palme gebührt. Nächst diesen hatten auch die Herren J. Liebelt und W. H. Pepys von hier und Büttinghausen von Kalk einzelne schöne Paare ausgestellt, wie auch die sechs Paar von Herrn J. Baily & Sohn in London gut und schön genannt zu werden verdienen. Doch wie wenig Zutrauen zu dieser Rasse herrscht, das beweist, daß kein Paar verkauft wurde. — Beliebter scheinen die Chinesen zu werden, von denen 20 Paare unsere Ausstellung zierten, und unter diesen waren es die drei Paar weißen des Herrn J. F. König, welche das Verlangen gar mancher Liebhaber rege machten, aber leider unverkäuflich waren. Blaue hatten außer obigen noch die Herren Haas von Nippes, F. J. Mertens und Th. Hesse von Köln ausgestellt, sämmtlich schöne Vögel. Letztgenannter hatte noch gelb- und rothfahle, sowie schwarze ausgestellt; bei den schwarzen zeigt sich eben in der Farbe noch nicht jenes Schwarz, welches wir an Indianern 2c. sehen. A. Prosche in Dresden hatte ein Paar weiße mit blauen Schwänzen ausgestellt, welche in jeder Weise tadellos waren; der verlangte Preis 60 Thlr. war ein Beweis, daß diese Tauben noch nicht häufig zu haben sind. Wurden selbe auch auf unserer Ausstellung nicht verkauft, so sind uns doch Fälle genug bekannt, wo dieser Preis bezahlt wurde.

Die deutschen Tümmler boten abermals nichts Besonderes, als theilweise hohe Verkaufspreise. Kalotten und altstämmige fehlten ganz, nur hervorzuheben sind rothe und gelbe Elstertümmler des Herrn Karl Kögel in Wiesbaden. — Englische Tümmler hatte Herr J. F. König von hier, schwarzscheckige und agatfarbige in schönen Exemplaren und Herr J. Liebelt von hier zwei Paar prachtvolle bunte, wirkliche Almonds ausgestellt. — Herr Baily hatte drei Paar Almonds angemeldet, wovon zwei Paar schwarzscheckig und ein Paar Bärthgen, sogenannte Beards waren. Nach unseren deutschen Begriffen ist der Almond nur vielfarbig denkbar; wenn nun aber aus England selbst zweifarbige Tauben — von den Beards ganz abgesehen — als Almonds bezeichnet werden, so sind wir wieder so weit gekommen, daß jeder englische Tümmler, der die diese Rasse bezeichnende Schnabel- und Schädelbildung hat, ein Almond ist. Doch kann dies nur ein Fehler im Versandt sein, denn der Preis von 50 Thlr. ließ uns wirkliche Almonds erwarten.

(Fortsetzung folgt.)

*) Bis zu dem Zeitpunkt, daß dieser Bericht vorliegen und also eine wahrheitsgemäße und sachverständige Auslassung vorhanden sein würde, haben wir unsere Leser mit der Schilderung der trübseligen Vorgänge im Zoologischen Garten von Berlin ganz verschont. Von vorn herein hatten wir die Ueberzeugung, daß diese Unglücksfälle nur durch eine absichtliche Vergiftung herbeigeführt sein konnten. Jeder wohlunterrichtete Thierfreund, namentlich aber alle Diejenigen, welche diese Vorkommnisse gleichsam mit durchlebt haben, konnten doch keinen Augenblick darüber zweifelhaft sein, daß hier nur das finstere Werk der Bosheit vorliege. Ob der Beweggrund einer solchen, allerdings die schwärzeste Nachtseite eines Menschenherzens verrathenden Handlungsweise, in persönlicher Feindschaft gegen den Direktor oder worin sonst beruhte, das ist schwer zu ergründen. Daß eine Gehässigkeit gegen Dr. Bodinus so weit gehen könne, glauben wir jedoch ganz entschieden nicht — denn dann würde der Thäter wol ebensowenig vor dem Morde des Menschen als vor dem der Thiere zurückgebebt sein. Indem wir unsere Ueberzeugung dahin aussprechen, daß diese ruchlose That über kurz oder lang doch zweifellos der Entdeckung anheimfallen werde, wünschen wir aufrichtig, daß diese herrlichste Schöpfung unserer beginnenden Weltstadt Berlin keinenfalls fernerhin durch irgend welche derartige Vorkommnisse in ihrer Entwickelung zur vollen Herrlichkeit und Großartigkeit gestört werden möge. Dr. R.

Ornithologischer Verein in Stettin.

Sitzung vom 22. April.

Herr Musiklehrer Boeck hat an den Vorstand ein längeres Schreiben gerichtet, in dem er, anknüpfend an einen früheren Vortrag des Hauptmann Boedicker: „Ueber den Mangel an Singvögeln in der Umgegend Stettins"*) dem Verein weitere Vorschläge, den Vogelschutz betreffend, macht. Vor Allem empfiehlt er Beschränkung, bezüglich zweckmäßigere Ernährung der Katzen, namentlich der Favorit- oder Stubenkatzen, da sie nicht nur ganz unnütze Fresser, sondern auch viel zu verwöhnt sind, um Ratten oder Mäuse zu fangen. Einsender verkennt durchaus nicht den Nutzen guter Katzen betreffs Verminderung des Ungeziefers, obgleich es dagegen außer Gift noch viel bessere Mittel giebt, wozu in erster Linie Cementüberzüge in Kellern, Vorrathsräumen 2c. gehören. Verwöhnte Hauskatzen, deren es in der Umgegend Stettins, namentlich in den Gartengrundstücken Grünhofs und in nächster Nähe der Anlagen eine ungeheure Anzahl giebt, gehören zu den gefährlichsten Feinden der gefiederten Welt, da sie sowol bei Tage als auch bei Nacht die singenden oder schlafenden Vögel anschleichen und erhaschen.**) Ferner sind außer den vom Verein für die Vogelernährung empfohlenen Bäumen und Sträuchern neben Weißdorn und Buchenhecken, namentlich der zu den Ribesarten gehörende sogenannte Rosinenstrauch in erster Reihe zu nennen. Dieser mehrere Fuß hoch wachsende Strauch hat die großen Vorzüge, daß er sehr früh grün wird, außerordentlich sich verästelt und bestaudet ohne Seitenausläufer zu machen und deshalb zu Hecken sich ganz vortrefflich eignet. Er erfreut nicht nur zeitig das Auge und deckt unschöne Zäune, Mauern, Winkel u. s. w., sondern er bietet auch vom frühesten Frühling an bis in den spätesten Herbst hinein den Vögeln höchst willkommene und von ihnen bevorzugte Bruthaine, Zufluchts- und Schlafstätten. Ferner bietet die nördliche Umgegend Stettins, an den südlichen Abhängen der Zabelsdorf-Nemitzer Abdachung der Wussower Höhe an Hohlwegen, Quellbachschluchten und wüsten steilen Lehnen, allesammt leider jetzt fast gänzlich baum- und strauchlos, massenhaft Gelegenheit durch Wiederansammung und Anpflanzung zu wahren Vogelheerden und Hecken, wie dies der natürlichen Lage nach auch sicher schon früher gewesen sein muß. Auch in klimatischer, sanitätlicher und schönheitlicher Beziehung empfiehlt sich an genannten Orten eine ausdauernde Pflanzenbedeckung höchst dringend. Das Vorhandensein einer großen Stadt mit zahlreichen Vogelfreunden, leider aber auch mit Vogelfängern und Feinden erfordert nothwendig eine natürliche Vogelhecke in größerem Maße, eine Zufluchtsstätte für die den gefiederten Sängern gefährliche nähere Umgebung der Stadt. Außerdem könnten die bezeichneten Oertlichkeiten bei den immer höher steigenden Preisen allen Brennmaterials, aller Nutzhölzer und selbst junger Holztriebe zu Hand- und Bandstöcken, durch Baum-, Gesträuch- und Weidenzucht zu erheblichen Erträgen herangezogen werden, und die alsdann gut beschatteten Schluchten und Abhänge würden die dortigen noch vorhandenen, aber verschmachtenden Quellen stärker speisen, versiegte aufleben und dadurch die eingeschlafene Wasserkraft-Industrie des Grünhofer Thals vielleicht dereinst wieder erstehen lassen. Dies Alles zu bewirken würde nach Ansicht des Verfassers ein großes bleibendes Verdienst des Ornithologischen Vereins sein. — Um die von den Vereins-Mitgliedern erzielten Züchtungsergebnisse leichter zu verwerthen und sie zur Kenntniß der übrigen Mitglieder zu bringen, überreicht Herr Reimer ein hübsch ausgestattetes und zweckmäßig eingerichtetes Journal, worin alle diejenigen Erzeugnisse, welche zum Verkauf gestellt, bezüglich zu kaufen gesucht werden, zu verzeichnen sind. Dieses Journal kreist in allen Sitzungen unter den Anwesenden und liegt außerdem täglich zur Einsicht für alle Mitglieder in dem Geschäftslokale des Herrn Creutz auf. Herr Reimer macht ferner Mittheilung über Züchtungsversuche mit Bandfinken, deren Eier er einem Kanarienweibchen untergelegt hatte; sie kamen auch aus, aber die mehrere Tage alten Jungen sind wol aus Mangel an passender Nahrung gestorben. — Von den eingegangenen Fragen gelangen folgende von allgemeinem Interesse zur Beantwortung: 1) „Welche Mittel sind anzuwenden, um zu verhüten, daß die Sperlinge den frisch gesäeten Samen aus der Erde picken?" Herr Post-Inspektor Wernich empfiehlt als bestes Mittel, über die besäete Fläche in Höhe von 1 Zoll weiße Baumwollenfäden recht fest zu spannen, da von allen bisher geprobten Mitteln dies als das beste sich bewährt hat. Herr Gärtnereibesitzer Kunstgärtner Kallmeier hat dasselbe Verfahren stets mit gutem Erfolg angewendet, nur mit dem Unterschiede, daß er statt weißer Baumwolle dunkle benutzt hat. Alle übrigen Vorkehrungen, mit Ausnahme des Bespannens der besäeten Fläche mit feinmaschigen Netzen sind dem frechen Sperlinge gegenüber erfolglos, namentlich das Bedecken mit Sträuchern, das Anbringen von Wimpeln und Fahnen, ja selbst das Schießen mit Vogeldunst.*) 2) „Welche Nester sind für Bruthennen die besten und wie befreit man die Hühner von den sogenannten Hühnerläusen?" Herr Prütz empfiehlt zum Ausfüllen der Brutnester Folgendes: Der Natur angemessen, da die wilden Hühner im Gesträuch auf der Erde brüten, legt man im Frühjahr in jedes Nest (wozu sich am besten die von Drat geflochtenen eignen, wie sie in Stettin Herr Radlermeister Teltow nach Angabe des Vereins angefertigt hat) ein feuchtes, frisch gestochenes Rasenstück, worauf man etwas grobes Heu oder Hafer- und Gerstenstroh bringt. Ehe man die Bruteier unterlegt, erneuert man das Material. Auf so zubereiteten Brutnestern findet sich weniger Ungeziefer ein, ferner erzeugt der Rasen eine feuchte Wärme, was für die brütende Henne sehr wohlthuend ist. Diese feuchte Wärme hat aber auch auf die Eier großen Einfluß, indem sie verhindert, daß die Haut der Eier unter der Schale lederartig wird, und indem sie somit eine naturgemäße Ausbildung der jungen Hühnchen bewirkt. Nach dem Ausschlüpfen ist diese feuchte Luft ebenfalls angemessen, damit die Küken nicht allzuschnell abtrocknen und die zarten Federchen sich lockern und über den Körper ausbreiten. Auch wird die Kalkschale mürbe, so daß sie zur Zeit des Ausschlüpfens der Hühnchen durch den Druck des Schnabels von Innen leicht gesprengt wird, und ein Verkommen der Thierchen im Ei, wie es so häufig geschieht, ist dabei nicht zu befürchten. Um Läuse bei den Hühnern zu vertreiben empfiehlt er neben Insektenpulver folgendes Verfahren. Wenn die Hühner sich Abends in den Stall begeben haben, lege man die Zweige des Erlenbaumes in den Stall und am folgenden Morgen wird man sie voller Hühnerläuse finden, da diese den Geruch der Erlen außerordentlich lieben. Die Zweige müssen aber sofort verbrannt und dieses Verfahren muß mehrmals wiederholt werden, wodurch das Ungeziefer vollständig beseitigt wird. 3) „Sind buntlackirte Vogelbauer für die Gesundheit der Vögel schädlich?" Herr Creutz macht namentlich auf die häufig mit Schweinfurter Grün und Bleiweiß gestrichenen und auch sonst sehr unpraktischen sogenannten Schweizerhäuschen aufmerksam, die in den meisten Fällen die Ursache plötzlich eintretender Krankheit und schnellen Todes ihrer Bewohner sind, namentlich bei den Papageien u. a. Nagevögeln. Ein erst kürzlich vorgekommener Fall, in welchem ein Paar Wellensittiche in einem ähnlichen Gebauer erkrankt und gestorben sei, habe die Richtigkeit seiner Mittheilung bestätigt. Die besten Käfige für Körnerfresser sind unstreitig die aus verzinktem Drat, ohne jegliche Verzierung (welche gewöhnlich die Brutstätte des Ungeziefers bildet) hergestellten. — Die vom Vorstande beabsichtigte Extra-

*) Derselbe soll hier demnächst veröffentlicht werden. D. R.

**) In dem Jahresbericht 1873 des Westfälischen Vereins für Vogelschutz u. s. w. legt Herr R. Farwick ebenfalls die Schädlichkeit der Hauskatze dar. Zugleich sei darauf aufmerksam gemacht, daß ich bereits in meinem Buche „In der freien Natur" (Berlin 1868) Vorschläge zur Verminderung dieses Schadens gemacht habe.

Dr. Karl Ruß.

*) Die Leser wollen auch die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" in dieser Hinsicht gegebenen Rathschläge vergleichen. Dr. R.

fahrt nach Berlin zur Besichtigung des Zoologischen Gartens, Aquarium und Museum wird mit 25 gegen 17 Stimmen abgelehnt, und diese Angelegenheit der vorgerückten Zeit wegen bis zur nächsten Sitzung vertagt. Neu aufgenommen werden 20 Mitglieder, zur Aufnahme vorgeschlagen 8 Personen. — Mit dieser Versammlung haben die Wintersitzungen ihr Ende erreicht, und für das Sommersemester wird nur alle 4 Wochen eine Sitzung in dem unteren Speisesaale des Wolff'schen Lokals in der Birkenallee stattfinden.

Bücher- und Schriftenschau.

(Fortsetzung.)

Federzeichnungen aus der Thierwelt, von Aglaia von Enderes; Buda-Pest 1874, Franklin-Verein.

Die Thierwelt im Zoologischen Garten von Berlin, geschildert von Dr. Bodinus, Direktor des Gartens; Berlin 1874.

Die Fasanenzucht, von August Goedde, Oberförster in Dobrau; Berlin 1873. (Verlag von Wiegandt, Hempel und Parey).

Diezels Niederjagd. Lieferung 2 bis 12; Berlin. (Verlag von Wiegandt, Hempel und Parey).

Die deutsche Expedition an der Loango-Küste, nebst älteren Nachrichten über die zu erforschenden Länder. Nach persönlichen Erlebnissen von Adolf Bastian. I. Band, mit einer lithographirten Tafel und einer Karte. Jena 1874. (Hermann Costenoble).

Praktische Anleitung zur künstlichen Ausbrütung der Eier aller Arten Geflügels und der Aufzucht der künstlich ausgebrüteten jungen Hühner, Enten, Gänse und Truthühner. Mit 4 Zeichnungen, nebst einem Anhange über die rationelle Kaninchenzucht. Herausgegeben von **J. H. Krantz.** Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Berlin, 1874. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.

Ausstellungs-Bericht nebst Prämiirungs-Liste der II. allgemeinen Ausstellung des unter dem Protektorate Ihrer Königl. Hoheit, der Frau Prinzessin Karl von Preußen stehenden Vereins für Geflügelzucht in Köln. Köln 1874.

Jahresbericht 1873 des Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht. Sektion des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst. Herausgegeben von dem Vorsitzenden des Vereins, **Professor Dr. H. Landois.** Münster.

Die Kaninchenzucht oder Anleitung, mit geringen Kosten und Raumersparniß durch rationelles Verfahren ein rentables Unternehmen zu begründen. Aus dem Französischen von M. Redares. IV. Auflage, bearbeitet und nach neueren Quellen und Erfahrungen wesentlich umgestaltet von **Robert Oettel.**

Blätter für Kaninchenzucht, Zeitschrift für Züchter, Händler und Liebhaber. Organ des Vereins Hildesheimer Kaninchenzüchter, des ersten Hannoverschen Kaninchenzüchter-Vereins zu Hannover und des Kaninchen- (Lapin-) Züchter-Vereins Nürnberg. Herausgegeben von **C. Rasch,** Kammer-Assessor, Sekretair des Land- und Forstwirthschaftlichen Provinzial-Vereins für das Fürstenthum Hildesheim. Nr. 1—12. Verlag der Gerstenberg'schen Buchhandlung in Hildesheim.

Zeitschrift des Thierschutz-Vereins für das Großherzogthum Hessen, herausgegeben vom Verein. Darmstadt, Herbert. Nr. 1 und 2. Mai—Juni.

Deutscher Garten-Kalender auf das Jahr 1874. Erster Jahrgang. Herausgegeben von Th. Rümpler, General-Sekretär des Gartenbau-Vereins in Erfurt. I. und II. Theil. Berlin. (Wiegandt, Hempel und Parey.)

Die Erziehung der Jugend. Ein Handbuch für Eltern und Erzieher, von Friedrich Ascher. Berlin 1874; (Verlag von F. Berggold.)

Briefwechsel.

Die Fortsetzung des Aufsatzes „Stubenvogelzucht als Erwerb" kann erst in der nächsten Nummer Aufnahme finden.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

P. T. **Wien,** im Juni 1874.

Hierdurch beehre ich mich, ergebenst anzuzeigen, daß ich hierorts,

Kolowratring Nr. 9, Parterre,

eine

Handlung exot. Vögel und Naturalien

errrichtet habe.

Außer allen Arten überseeischer Vögel, als: Papageien, Prachtfinken, Paradieswitwen und Webervögel, Tangaren, Staar- und Drosselarten, exot. Geflügel (im prunkvollsten glänzendsten Gefieder, theils singend und züchtbar, auch im Freien zu halten; sehr gut versendbar unter Garantie des lebendigen Ankommens), liefere ich auch für diese Thiere geeignete Futterarten, unter denen namentlich neu importirte afrikanische und indische Sämereien, welche, als beste existirende Nahrung für exotische Vögel anerkannt, hervorzuheben sind.

Ferner: Volieren, Nist- und Luxusgebauer, Kletterstangen für Papageien, die neuesten vervollkommneten pneumatischen Futter- und Trinkgefäße, in welchen sich Futter und Wasser stets frisch und rein erhält. Nistgegenstände aller Art. Auch ausgestopfte Vögel und Säugethiere, Vogelgruppen unter Glasstürzen, Vogelbälge aller Arten, in Spiritus konservirte Thiere, Vogeleier, Reptilien, Fische, Aquarien und Terrarien, Goldfischbehälter, Käfer und Schmetterlinge, Muscheln und Korallen, Geweihe, Tuffstein 2c. Ausgedehnte Verbindungen in überseeischen Ländern, die ich auch für mein seit vielen Jahren **in Leipzig,** Markt Nr. 3, bestehendes Hauptgeschäft gleicher Branche unterhalte, machen es mir möglich, direkt und sehr vortheilhaft zu importiren, weßhalb ich zu sehr billigen Preisen verkaufen kann. Ich werde mir angelegen sein lassen, meine geehrten Abnehmer durch aufmerksame und reelle Bedingung zufrieden zu stellen, lade zum Besuch meiner Ausstellung höflichst ein und bin auch zu Mittheilungen über Pflege und Züchtung überseeischer Vögel, sowie zur Gratis-Verabfolgung von Preislisten gern bereit.

Hochachtungsvoll

[356] **Karl Gudera.**

[357] 1 Bartfink- und Sänger-Weibchen und 1 Elsterchen-Männchen sucht zu kaufen **A. Hoer,** Goldarbeiter in Görlitz.

Einige Paar alte Wellensittiche sind à 5 Thlr. abzugeben. Auch Frühauf'sche Nistkasten sind billig zu haben bei

[358] **Ludwig Luckhardt,** Cassel, Leipz. Thor.

Eine Steindrossel, guter Sänger und prachtvoller überjähriger Vogel, zu verkaufen. **H. Burghard** in Luckau. [359]

Italienische Hühner.

Importirte 1874r. Frühbrut
in Gelb, Weiß, Fuchsfperber und Schwarz
können während der warmen Jahreszeit regelmäßig von mir bezogen werden.

Preis 3 Fr. pro Stück, Hahn oder Henne.

☞ Da ich nur echte und in Farbe wie Gestalt tadellose Exemplare versende, so kann es geschehen, daß in Folge kleinerer Auswahl (namentlich in Weiß) die verehrl. Besteller oft einige Zeit auf die Ankunft der Sendungen warten müssen, doch verlieren Sie dadurch nichts, da in diesem Fall die Hühner nur um so kräftiger und befriedigender ausfallen.

[360] **A. Rumpf**, Außersihl-Zürich.

Franz. Lapins, nur **echt** importirte Rassen in Original-Zuchtthieren, als: Beliers, de garenne, argentes, clapiérs und domestique, billigst unter Garantie liefert das Export- und Importgeschäft **C. Schürholz**, Hildburghausen. [361]

[362] **Die Vogelhandlung**
von D. Dufour, Behrenstrasse 51,
Passage-Gebäude,
empfiehlt die schönsten Papageien, grau und grün, zahm und gut sprechend, alle ausländischen kleinen Vögel, gutpfeifende Dompfaffen, die schönsten Harzer Kanarienvögel, Lichtschläger, schlagende Nachtigallen, Affen, kleine Damen-Hunde und eine Auswahl von Vogelkäfigen zu soliden Preisen.

Allgemeine Geflügel-Ausstellung
verbunden mit
Verloosung, veranstaltet vom Verein für Geflügelzucht, Kreuznach
vom 19. bis 21. Juli 1874

in dem neuerbauten Ausstellungslokal in der Kurhausstraße.

Wir laden hierdurch höflichst ein, unsere erste Ausstellung allseitig beschicken zu wollen.

Anmeldungen sind spätestens bis zum 1. Juli unserm Schriftführer, Herrn Reinhard Schmithals, königl. Hofbuchhändler hier, mitzutheilen. — Die Einsendung der Thiere muß, bis 16. Juli eintreffend, an unsern Präsidenten Herrn Gutsbesitzer J. Baur hier geschehen.

Loose à 5 Sgr. zu der mit der Ausstellung verbundenen für die Mitspieler sehr günstig gestellten Verloosung sind gegen Einsendung des Betrages zu beziehen durch Herrn Reinhard Schmithals, königl. Hofbuchhändler, und Herrn Jakob Fels hier.

[363] **Der Vorstand.**

[364] Die
vierte große Geflügelausstellung
des Wiesbadener Geflügelzucht-Vereins findet in der Zeit vom 9. bis inkl. 14. Juli in der Reitbahn des Königlichen Schlosses statt.

Die Prämiirung geschieht am 9. und die Eröffnung der Ausstellung am 10. Juli.

Die Ausstellung ist mit einer Verloosung verbunden, wozu Loose à 5 Sgr. bei dem Kassirer Herrn C. Schmittus, Adelheidstraße, zu haben sind.

Programme und Anmeldebogen werden auf Verlangen durch den Präsidenten Herrn Wilh. Birk, Emserstraße, zugesandt.

Wiesbaden, den 2. Juni 1874. Der Vorstand.

Der am 2. Juni für meine Handlung angekommene Thier-Transport besteht in:

26 Giraffen, Hengste und Stuten, **2 Elephanten**, Weibchen, **4 Büffel**, 2 Paar, **2 Strauße**, 1 Paar, **6 Antilopen**, verschiedene Arten, **7 Hyänen**, **3 Leoparden**, **2 Warzenschweine**, **5 Affen**, **1 Teufel**, **3 Sekretäre**, **3 Gaukler**, **1 Marabu**, **Paradieswittwen**, **Bandvögel**, **Webervögel**, **Glanzstaare**, **Frankolins**, **Turteltauben**, **Rhinozerosvögel**, **Adler**.

[365] **C. Reiche,**
in Ahlfeld, Prov. Hannover.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

III. Jahrgang. Berlin, den 11. Juni 1874. Nr. 24.

Anderweitige Liebhabereien.

Züchtungsversuche mit einem Aquarienbewohner, dem Axolotl (Ambystoma Axolotl).

Seen und Flüsse Mejikos bergen einen Fischling, den Axolotl. In Gestalt und Farbe der Larve unseres Kammmolches ähnlich, jedoch erheblich größer, wurde derselbe von älteren Forschern als vollendeter Lurch, von Alexander von Humboldt und Cuvier hingegen als die Larve eines solchen angesehen. Spätere Zuchtversuche mit demselben im Akklimatisationsgarten zu Paris haben nun das interessanteste Ergebniß geliefert. Einmal ist es gelungen, von den Larven Junge in beträchtlicher Anzahl groß zu ziehen, ferner aber hat die bei einzelnen Exemplaren stattgefundene Verwandlung zu Land- und nur zeitweisen Wasserbewohnern, genau nach Art unseres Feuersalamanders den von A. von Humboldt und Cuvier angenommenen Larvenzustand auf das Unzweifelhafteste bestätigt, durch solche Beobachtungen angeregt, beschloß ich meinerseits ebenfalls Versuche mit diesem interessanten Wasserbewohner anzustellen, und es wurde mir auch möglich, mir ein Dutzend derselben, von denen aber leider auf dem Transporte und an den Folgen desselben 7 Stück zu Grunde gingen, von Paris aus zu beschaffen. Von den noch übrigen 5 Stück behielt ich nur drei und zwar ein Männchen, welches an dem stark hervortretenden Afterrand leicht vom Weibchen zu unterscheiden ist, und zwei Weibchen. Zur Aufnahme derselben diente ein Aquariumkasten im länglichen Viereck, welcher ungefähr 12 Eimer Wasser enthielt und mit Wasserpflanzen, besonders der Eloea canadensis (Wasserpest) und einem Tuffsteinfelsen, welcher es, bei etwaiger Verwandelung, den Thieren auch möglich machen sollte, sich außerhalb des Wassers aufhalten zu können, versehen war.

Ich erhielt meine Axolotls im Spätsommer des Jahres 1869 und gab ihnen als Nahrung Regenwürmer und kleine Fischchen bis zur Größe der Elrize (Phoxinus laevis). Diese letzteren wurden, wenn nur einigermaßen Hunger vorhanden war, mit großer Begierde verzehrt, und es gewährte einen höchst ergötzlichen Anblick, diese sonst so plumpen Geschöpfe die flinken und bei längerem Aufenthalt in ihrer Gesellschaft gewitzt und äußerst vorsichtig gewordenen Fischchen fangen zu sehen.

Sobald einer der Lurche, welche sich größtentheils auf dem Sand- und Steinboden des Beckens aufhielten, ein Fischchen in seiner Nähe wahrnahm, so verhielt er sich äußerst ruhig und scheinbar theilnahmlos, war nun eins der Fischchen unvorsichtig genug, ungefähr 2 bis 3 Zoll an dem Maule desselben zu erscheinen, so machte mein Fischling urplötzlich eine schnelle Kopfbewegung nach der Richtung des erspähten Raubes, riß dabei das Maul weit auf, ihn so mit der hinabstürzenden Wassermenge sicher erfassend. War das Opfer groß, so ging das Verschlingen, wobei beiläufig bemerkt der Kopf stets zuerst hinabglitt, ziemlich schwer und mit vielem Aufwand von Kraft von statten, so, daß oft der Schwanz des Fisches noch längere Zeit sichtbar blieb. Bei kleinen Fischchen hingegen genügte ein- oder zweimaliges Schlucken, und wennmöglich wurden fünf bis sechs kleinere Fischchen hintereinander genommen.

Waren nur noch wenige Futterfische vorhanden und hielten sich dieselben stets an der Oberfläche des Wassers auf, so erschienen die Axolotls von Raubluft getrieben, sehr bald ebenfalls an derselben, hielten sich hier wie auf dem Grund unbeweglich, schwammen auch wol ganz behutsam nach einer Ecke, in welcher sich verschiedene Fische befanden und erspähten so ebenfalls die günstige Gelegenheit zum Fang.

Nachdem ich einmal Fischfutter gereicht hatte, konnte ich mit Regenwürmern fern bleiben; dieselben wurden so lange noch irgend Aussicht auf den Raub eines Fischchens vorhanden und der Hunger nicht zu empfindlich mahnte, hartnäckig verschmäht und wenn auch schon wirklich erfaßt, doch häufig wieder ausgestoßen. Nur im Winter, wenn es mir oft Wochen lang nicht möglich war, die nöthigen Futterfischchen zu beschaffen, wurden auch einmal Regenwürmer genommen, größtentheils aber erst nach wiederholtem Ausstoßen wirklich verzehrt.

(Fortsetzung folgt)

Verschiedene anderweitige Mittheilungen.

Zur Ernährung der Kaninchen. Mörsch und Meyer in Kannstadt theilen mit, daß sie ihren Kaninchen weder im Sommer noch im Winter Wasser reichen; sie haben nämlich die Erfahrung gemacht, daß, je trockener die Fütterung ist, desto mehr Junge davon kommen. Im Sommer füttern sie mit frischem, aber trockenem Klee, Hafer, etwas Mören und Kleie, im Winter mit Zuckerrüben, Kohlrabi, Hafer und Heu.

Australisches Wild in Europa. In Frankreich sind mehrere Großgrundbesitzer seit einigen Jahren mit Erfolg bemüht, die verschiedenen Varietäten der Känguruhs zu akklimatisiren. Man hofft, daß diese sich ungemein rasch vermehrenden Thiere binnen wenigen Jahren ein trefflicher Jagdgegenstand sein und dem Sport reichliche Ausbeute bieten werden. Im Pariser Akklimatisationsgarten, der sich ebenfalls die Känguruhzucht zur Aufgabe gestellt hat, treiben sich in diesem Augenblicke in der für sie bestimmten Abtheilung nicht weniger als 22 Paare herum.

Zur Seidenzucht. Ein mit Seidenwurmeiern beladener Frachtwagen kam jüngst auf der Pacific-Eisenbahn von San Franzisko nach New-York. Sie waren von Japan für ein Pariser Haus bestimmt. Das Gewicht der Eier betrug 9½ Tons und ihr Werth belief sich auf über 2,000,000 Dollars. Sie waren auf Blätter, Schichte auf Schichte, gepackt und in luftdichte Zinnbüchsen, die wieder von Matten umgeben waren, gelagert, während das Innere des Wagens sorgfältig dunkel und in einer Temperatur unter (?) dem Gefrierpunkt gehalten wurde.

C. Hagenbeck's
Handelsmenagerie
in Hamburg

[367]

wurde durch umfangreiche Sendungen am letzten Sonntag kompletirt, so daß außer den in Nr. 23 dieser Zeitschrift genannten Vögeln jetzt noch vorräthig sind: große und kleine schwarze Papageien (Psittacus verus und Psittacus niger), grauköpfige Inseparables (Ps. cana) in richtigen Paaren, Rothrumpf- oder Singsittiche (etwas zerrupft, weil zu viel Vögel in die einzelnen Versandkasten gebracht waren, sonst aber gesunde und starke Vögel), Zebrafink, getigerte Bengalisten, St. Helena-Fasänchen.

R. Ritter.

[368]

Naturalien und Thierhandlung.

Filiale der Handlungsmenagerie von C. Jamrach aus London.

Hamburg, St. Pauly, Spielbudenplatz 21.

hat folgende Thiere vorräthig: graue, schwarze, Surinam-, Amazonen- und Portoriko-Papageien, 1 schönen sprechenden doppelten Gelbkopf, 1 zahmen sprechenden Dukorps-Kakadu, Rosakakadu, Nasenkakadu, Königslory, Blaue Gebirgslory, chinesische Lory, Wellensittiche, Carolina-, Quäker-, Alexander-, Halsband-, Prachtsittiche, Türkisinen, Inseparable, Rosella, Mula-Rosella, Penanti, kleine und große gelbhäubige Kakadu, Cacatoo ganga, Senegalvögel, Safran-, Diamant-, Schilf- und Barkfinken, Bandvögel, Fasänchen, Orange-Fasänchen, Brasil. Pfaffen, schwarze Schwäne, Pinguin-Gänse, 1 kleiner Leopard, Waschbären, Rüsselbären, 1 Paar Cybet-Katzen, 1 Paar Schummonds, 1 Packa, 15 verschiedene Arten Affen u. s. w.

Vereinsmitglieder haben zu verkaufen:

Eier von schwedischen Enten à 4 Sgr., von Spaniern à 4 Sgr., von Italienern (Leghorns, gesperbert, braun) à 3 Sgr., Silberbrabantern mit Helmhaube à 3 Sgr., mit größerer Haube à 2½ Sgr., gelben Cochins à 5 Sgr., Zwerghühnern à 2½ Sgr., Brabanter Albinos 10 Sgr.; ferner französische Lapins in großer Auswahl von jedem Alter, hasengraue Normandiner und die zur Zucht so sehr empfehlenswerthen englischen Schecken; halbjährige zuchtfähige Schecken (schwarzbraun und weißschwarz), das Stück 2 Thaler; ein ¾jähriger Rammler (über acht Pfund schwer) zu 2½ Thlr.; weiter drei fehlerfreie Harzer Hohlroller zu 7, 10 und 12 Thlr. (vorjährige Zucht). [369]

Usingen.

Der Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht.

---

[370] Gut getrocknete 1874er Ameiseneier à Pfund 20 Sgr., hat von jetzt ab vorräthig Aug. Dietz in Burg b. Magdeb.

Von meinen äußerst fruchtbaren Lapins, englische Schecken, gebe wieder ab: viermonatliche, bald zuchtfähige, das Paar 3 Thlr. 15 Sgr.; dreimonatliche das Paar 3 Thlr.; achtwöchentliche das Paar 2 Thlr. 15 Sgr.; sechswöchentliche 2 Thlr. Preise mit Verpackung. [371]

Eschbach bei Usingen. **C. Weygandt**, Pfarrer.

Ich suche zu kaufen: 2 bis 3 Stück Diamantvogel, Männchen, 2 bis 3 Stück Grasgürtelfinken, Weibchen, 1 Stück Mozambiquezeisig, Weibchen, unter Garantie des richtigen Geschlechts, und erbitte mir gefälligst Anerbietungen.

Nürnberg, Most, 2. **Otto Hanzenmüller.** [372]

Vier Stück brutfähige Wellensittich-Hähne à 4 Fl., 1 Paar schwarze fehlerfreie, kleine Indianer-Tauben zu 10 Fl. und 1 Paar weiße Mövchen zu 3 Fl. sind zu verkaufen.

R. Th. Hauser.

[373] Nürnberg äußere Laufergasse Nr. 8.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 18. Juni 1874. Nr. 25.

Inhalt:

Ankunft eines großen Thiertransports aus Afrika. —
Aus dem Familienleben gefangener Hüttensänger. —
Stubenvogelzucht als Erwerb (Fortsetzung). —
Vogelkrankheiten: Flötenvogel. —
Aus den Vereinen. Köln. (Fortsetzung.) —
Bücher- und Schriftenschau. (Fortsetzung.) —
Anzeigen.

Ankunft eines großen Thiertransports aus Afrika in der Handelsmenagerie des Herrn Reiche in Alfeld.

Den Löwenritt von F. Freiligrath haben wir Alle wol gelesen, während Mancher „das bunte Fell des Renners", auf welchem „der Thiere König nächtlich seines Reiches Grenzen durchsprengt", aus Anschauung noch nicht kennt. Die meisten unserer Leser haben jedoch wol schon eine einsame Giraffe majestätisch in einem zoologischen Garten einherschreiten sehen und das wunderliche Geschöpf, mit seinem fast geistreichen Hirschkopfe, dem langen Kamelhalse, durch den das Thier bis zur Höhe von 18 Fuß emporragt, und seinem buntgefleckten Parderfell bewundert. Nur Wenigen ist aber der überraschende Anblick einer ganzen Heerde dieser interessanten Thiere zutheil geworden, denn die höchste Anzahl, welche bis jetzt nach Europa auf einmal gebracht wurde, waren 14 Köpfe.*) In Alfeld haben wir in diesen Tagen neben einer ganzen Reihe anderer afrikanischer Thiere auch 26 Giraffen — ein bisher in Europa noch nicht gesehenes Schauspiel — in ihrem durch das gleichzeitige Aufheben der Füße einer und derselben Seite besonders auffälligen Gange die Straße nach den Stallungen unseres weithin bekannten Mitbürgers, des Thierhändlers Herrn Reiche, durchschreiten gesehen, denn am 2. Juni waren dessen Geschäftsführer und Gehülfen mit reicher Ausbeute von einer Expedition aus Afrika zurückgekehrt. Ein Besuch in den reichbesetzten Ställen gewährt hohen Genuß für den Naturfreund, der im angenehmen Verkehre mit dem liebenswürdigen Wirth auch die Bekanntschaft der Direktoren der verschiedenen zoologischen Gärten zu Berlin, Dresden, Hannover, Frankfurt, Rotterdam ꝛc. macht, welche zum Ankauf erschienen sind, sowie des allbekannten Thiermalers, Herrn Leutemann, dessen Thierbilder in der „Gartenlaube", „Illustrirten Zeitung", dem „Daheim" u. s. w. uns so manche neue Seite des Thierlebens aufgeschlossen haben, und der hier sein Skizzenbuch mit den Darstellungen neuer Thierformen bereichert. Uns giebt der wiederholte Besuch in dem Geschäft Veranlassung, eine kurze Schilderung dieses Unternehmens mit seiner Ausbeute, sowie des interessanten Thiergeschäfts des Herrn Reiche insbesondere hier zu geben.

Vor etwa 14 Monaten rüsteten die Gebrüder Reiche, deren Thiergeschäft in Alfeld und New-York in stetem Aufblühen begriffen ist, eine Expedition nach Afrika aus, um dort Thiere fangen und aufkaufen zu lassen. An die Spitze derselben wurde Herr Georg Schmutzer gestellt, welcher durch seine

*) Von Herrn C. Hagenbeck i. J. 1872. D. Red.

Reisen mit Kasanova, für das Geschäft von Hagenbeck in Hamburg, sowie durch längeren Aufenthalt in Amerika nicht allein das Thiergeschäft an sich, sondern auch dessen Art in Afrika genau kennt und zugleich durch die Kenntnisse der arabischen Sprache zur Leitung des Unternehmens besonders geeignet erschien. Ihm fiel besonders der technische Theil zu, während ihm zur Führung der Korrespondenz ein junger Geschäftsführer, Herr Lohse, der zum ersten Male einen solchen großen Ausflug mitmachte, beigegeben wurde. Die Expedition war auf 6 Monate berechnet, und es galt besonders Girafen, Rhinocerosse und Nilpferde, diese großen Seltenheiten für unsere zoologischen Gärten, heimzubringen. Ueber Triest, Alexandrien, Cairo, begaben sich die Reisenden nach Suakin (Sauakim) am Rothen Meere, bis wohin im Ganzen die Lande sich als „von der Kultur beleckt" auswiesen; hier aber mußte die Wüstenwanderung angetreten werden. Sie zogen im Ganzen die Straße, welche Malzac und Vayssieres i. J. 1852 nach Tarka u. s. w. beschritten und welche man auf guten Karten angegeben findet, über Tokar, Kasella nach Homran. In diesen Gegenden ließen sie jagen und fangen und kauften auf, indem als Zahlungsmittel die Marien-Theresienthaler dienten. Es soll hier nichts erzählt werden von den Gefahren der Reise, von der Mühseligkeit des Fanges der Thiere, deren Mütter so lange gehetzt werden, bis sie die Jungen, die man allein brauchen kann, unbeschützt zurücklassen. Es soll hier nichts erzählt werden von der Hitze der Tage und der Kühle der Nächte, von der Plage der Skorpionen, von den mancherlei Entbehrungen, die man trotz der Anstelligkeit der nubischen Bedienung und trotz deren Geschicklichkeit im Zelt- und Hüttenbau zu ertragen hatte. Nur über die Rückreise soll Einiges erwähnt werden. Man hatte endlich eine ziemlich ansehnliche Zahl Thiere zusammen, unter denen 27 Girafen den Grundstein bildeten; an diese schlossen sich 2 Rhinocerosse, die aber leider bald zu Grunde gingen, 2 Elephanten, eine schöne Heerde verschiedener Antilopen, 4 Kaffernbüffel, 5 Hyänen, 3 Leopards, 2 Warzenschweine, 2 Husarenaffen, 1 Schakal; dazu kamen noch 4 Nashornvögel, 3 Sekretäre, 3 Adler und verschiedenes andere Gefieder, während eine Kuhheerde und Ziegenheerde zur Ernährung diente, welche letztere nur in einzelnen Resten hier angekommen ist. Für die reißenden Thiere, die meist jung eingefangen waren, und für die Vögel wurden Kasten besorgt, um sie leichter zu transportiren, doch hatte man bei der Anfertigung derselben, wie sich erst später herausstellte, nicht genug Rücksicht auf die schnelle Entwickelung dieser Thiere genommen, so daß einzelne nur noch in gebückter Stellung in ihrem Käfig während der Reise verbleiben konnten: die Girafen, Antilopen, Kühe und Ziegen wurden getrieben. Um einen so großen Transport von Homran nach der Küste zu bringen, wurden gegen 130 Neger geworben, welche mit Kamelen zum Tragen der Käfige als Führer die Europäer nach Suakin geleiteten. Um einen Vergleich mit europäischen Lohnverhältnissen anstellen zu können, führe ich an, daß ein Nubier für die Reise von etwa 8 Wochen mit vier Theresienthalern, ein Kamel mit sechs Theresienthalern bezahlt wurde. Nicht immer ganz ruhig ging die Reise von Statten. Oefter fuhren die Führer des Nachts, erschreckt durch das Heulen und Bellen der Hyänen, aus ihren Zelten, um nach den Girafen, die oft im weiten Umkreis an Bäume gebunden waren, zu sehen, und einmal sogar kam es wegen des Trinkwassers, an dem sich die Karawane gelagert hatte, mit einer Dorfschaft zu blutigem Streite. Endlich war man in Suakin angelangt, hatte aber doch schon manchen Verlust an Thieren erlitten. Die besten wurden hier auf einen Dampfer verladen und nun ging es das Rothe Meer hinauf dem Hafen von Suez zu. Die Tücke dieses Meeres sollte der Transport auch erfahren, doch ging ein Sturm glücklich vorüber, ohne daß man, wie schon beabsichtigt war, Bergung in einem kleinen Hafen zu suchen brauchte. Von Suez wurde der Landweg nach Alexandria eingeschlagen, wo mancherlei Scherereien wegen des Eingangs- und Ausgangszolles den Führern bereitet wurden. Endlich waren nach langen Verhandlungen und mit einem goldenen Bakschisch die letzten Schwierigkeiten überwunden und Menschen und Thiere auf einem Lloyddampfer nach Triest eingeschifft; drei Neger, die unmittelbaren Diener der Führer, begleiteten die Reisenden nach Europa. In Triest wurde der Transport auf die Eisenbahn verladen, aber in Brünn mußte wegen des hohen Preises, der für die ersten Wagen gefordert wurde, eine nochmalige Umladung stattfinden. Endlich langte am Abend des 1. Juni die Expedition in einem Zuge von 7 Wagen mit den Thieren nach einer Abwesenheit von vierzehn Monaten auf dem hiesigen Bahnhofe an, wo am andern Tage die Ausladung begann. Den Reigen eröffneten die zwei Elephanten, die sich anfangs etwas ungeberdig anstellten, dann folgten die vier Kaffernbüffel und darauf die Girafen, welche mit wahrem Behagen, als sie aus den niederen Waggons herausgeschritten waren, wieder ihre Köpfe erhoben, so daß sie fast wie Maste emporragten. Mit Aengstlichkeit, aber auch mit kinderhafter Zuthunlichkeit und Neugier schauten sie auf die Menge, dann setzte sich die eine und die andere, da sie zuerst nur scheu vorwärts traten, plötzlich in Galopp, so daß zur Belustigung des Publikums die Führer etwas in's Stolpern und Purzeln geriethen. Die Antilopen- und Ziegenheerde wanderte friedlich durch die Straßen, die Fleischfresser und die kleineren Vögel wurden in Kasten transportirt, nur die beiden großen Strauße — zwei junge wurden getragen — liefen, von zwei Männern an den Flügeln gehalten, das Weibchen im Geschwindschritt, das Männchen, wegen eines etwas vertretenen Fußes, langsamer durch die Stadt nach dem Hofe des Herrn Reiche. Hier entwickelte sich bald ein buntes Leben. Besonders be-

haglich fühlten sich die Leoparden und Hyänen in ihren neuen größeren Käfigen, in die sie versetzt wurden, und friedlich schmausten die Giraffen in ihren hohen Ställen aus den Krippen und Raufen, die Antilopen von ihrem Heu, während die Büffel sich behaglich auf der Streu niederstreckten, die Strauße und Sekretäre unruhig die ihnen angewiesenen Räume durchliefen und die Nashornvögel dumpf hinbrüteten; das andere Geflügel, die Perlhühner, Turteltauben, die afrikanischen Stare und Adler saßen ziemlich ruhig. Eine Reihe Antilopen, darunter besonders eine neue Art der Kuhantilope, und die Neger in ihrem Nationalkostüm hat Leutemann bereits gezeichnet, so daß auch das größere Publikum bald Kunde von dem Unternehmen erhalten wird. Alle Sachverständigen, und deren sind schon eine ganze Reihe hier gewesen, sprachen sich besonders anerkennend über das gute Aussehen der Thiere aus und lobten die Umsicht und Fürsorge, mit welcher die Führer das Unternehmen geleitet haben, so daß alle Betheiligten mit Stolz auf dasselbe blicken dürfen. Für die Wissenschaft ist dasselbe insofern wichtig, als die ganz besonders gezeichnete Kuhantilope zu einer genaueren Bestimmung dieser Art führen muß. So viel wir erfahren, sind sämmtliche Antilopen bereits für den Berliner zoologischen Garten angekauft. Aber auch kaufmännisch betrachtet, ist das Unternehmen, das, wir dürfen dies hier sagen, etliche zwanzigtausend Thaler gekostet hat, nicht zu unterschätzen, und wir wünschen dem Verkaufe, der bereits einen guten Anfang gemacht hat, im Interesse der Unternehmer den besten Fortgang.

Das Thiergeschäft der Gebrüder Reiche ist in dieser Gestalt noch ein junges Unternehmen, welches erst seit etwa 7 Jahren betrieben wird; aber es hat sich durch die Tüchtigkeit seiner Inhaber bereits den ersten Thiergeschäften der Welt würdig an die Seite gestellt. Früher war das Geschäft nur eine großartige Vogelhandlung und es werden noch jetzt durch dasselbe jährlich etwa 40—50,000 Köpfe Kanarienvögel nach Amerika aus- und in entsprechender Anzahl andere Vögel eingeführt; nach und nach aber ist auch mehr der Handel mit größeren ausländischen Thieren von den Unternehmern gepflegt worden, und wir wünschen von Herzen, daß dieser Zweig immer mehr aufblühen möge.

Dr. Sch. im „Hannov. Courier."

Aus dem Familienleben gefangener Hüttensänger.

Von E. v. Schlechtendal.

Im Sommer vorigen Jahres (1873) fiel mir bei C. Gudera in Leipzig unter den australischen Sittichen, den Staarvögeln, Kardinälen und großen Webervögeln, welche zusammen im bunten Gemisch eine Zimmer-Abtheilung bevölkerten, ein Weibchen des amerikanischen Hüttensängers oder Blauvogels (Sylvia sialis) auf, das, unbekümmert um das Treiben der andern Vögel und unbeirrt durch die Störungen, welche das wiederholte Einfangen von Abtheilungsgenossen verursachte, Niststoffe in einen der aufgehängten Nistkästen trug. Ich konnte damals das liebenswürdige Thierchen nicht erwerben. Als ich nach einiger Zeit wieder nach Leipzig kam, fand ich das Hüttensänger-Weibchen noch vor und kaufte es nun. Durch die Güte des Herrn Professor Dr. Liebe in Gera erhielt ich ziemlich zu derselben Zeit noch ein Pärchen Hüttensänger, das in demselben Sommer bereits bei ihm genistet hatte. Das Weibchen dieses Pärchens hatte dabei zwar vortrefflich gearbeitet, dann aber am dritten Tage nach dem Ausschlüpfen der Jungen stets die der Erwärmung und des mütterlichen Schutzes noch dringend bedürftigen Kleinen aus unbekannt gebliebenem Grunde verlassen.

Ich brachte die drei Hüttensänger in einem geräumigen Käfig unter. Alle drei lebten hier im tiefsten Frieden mit einander: jeder hatte in dem Gezweige sein bestimmtes Plätzchen und kam eigentlich nur dann Unruhe in die Gesellschaft, wenn Mehlwürmer gereicht wurden. Diese bildeten die Lieblingsspeise; sonst erhielten meine Vögel ein Gemisch von Ameisenpuppen, Weißwurm und Eierbrot, sowie etwas Drosselfutter, daneben Hollunder- und zerschnittene Ebereschen-Beeren. In dem Verzehren dieser verschiedenen Futterstoffe leisteten alle drei das Möglichste, Zank und Streit kam aber nicht vor, so sehr es bei Mehlwurm-Spenden auch jedem Vogel darauf ankam, möglichst viele der in den Käfig geworfenen Würmer zu erhaschen.

Selbst dann noch blieb die alte Eintracht bestehen, als ich in diesem Frühjahre einen Nistkasten in dem Käfige aufhing und an Stelle der bisherigen Ruhe eine große Erregung ob solchen Ereignisses sich kund gab. Kaum hing der Kasten, welcher nach Art der Staarkästen gefertigt und mit Rinde bekleidet war, als auch schon das Männchen singend und den einen Flügel schwenkend, ihn aufmerksam untersuchte, neugierig in das Flugloch schaute und die eine Genossin zu gleichem Thun heranlockte. Die willig dieser Einladung folgende war aber nicht die Gattin vom Sommer 1873; das Männchen hatte eine andere Wahl getroffen und begann alsbald gemeinschaftlich mit seiner Auserkornen Heuhalme in den Nistkasten einzutragen, anfangs sehr eifrig, dann schien der Eifer wieder nachzulassen. Ich glaubte, die Vögel hätten das Nisten wieder aufgegeben und nahm den Nistkasten, der mir zudem etwas zu eng zu sein schien, wieder heraus, um ihn durch einen größeren zu ersetzen. Zu meiner Ueberraschung bemerkte ich jetzt, daß bereits ein verhältnißmäßig großes Ei von schöner blauer Farbe darin lag. Vorsichtig brachte ich nun den Kasten wieder an seinen alten Platz. Einige Tage darauf brütete das Weibchen fest und erschien nur, wenn es Nahrung suchen wollte. Das Männchen zeigte sich dann sehr zärtlich, schwenkte einen oder beide Flügel, gurgelte sein Liedchen und brachte der Gattin seinen Mehlwurm.

Das andere Weibchen sah neidlos und anscheinend ohne jede eifersüchtige Regung diesem Treiben zu. Im Laufe der Zeit fing das Männchen an, auch ihm kleine Aufmerksamkeiten zu erweisen und hielt ich es unter diesen Umständen für angemessener, das zweite Weibchen ganz aus dem Käfig zu entfernen. Das zahme Thierchen ließ sich durch reichliche Mehlwürmer-Spenden unschwer in einen andern Käfig locken und nun war das nistende Pärchen allein und ungestört. Am 1. Mai — nachdem etwa vierzehn Tage seit Beginn des Brütens verflossen waren — bemerkte ich, daß das Weibchen fütterte, und von dem Männchen dabei unterstützt wurde. Am 5. Mai lag ein todtes, bereits stark in Verwesung übergegangenes Junge im Käfig. Kaum war dasselbe entfernt, als ich zu meinem Schrecken sah, daß ein zweites, diesmal aber noch lebendes Junge im Sande des Käfigs lag. Das Thierchen war beim Herauswerfen aus dem Neste verwundet worden und das alte Weibchen noch beschäftigt, an dem Aermsten herumzupicken. Möglicherweise waren noch weitere todte Junge im Nistkasten und hatte das alte Weibchen statt dieser ein lebendes herausgeworfen; ich nahm daher den Nistkasten — der leider keinen Schieber hatte — aus dem Käfig heraus und konnte nun bemerken, daß drei noch lebende Junge in demselben lagen. Um die alten Vögel auf andere Gedanken zu bringen, warf ich, nachdem der Nistkasten wieder an Ort und Stelle gebracht worden war, eine große Menge Mehlwürmer in den Käfig; die Hüttensänger stürzten sich auf die nach allen Seiten hin flüchtenden Würmer, hatten bald aufgeräumt, begannen wieder zu füttern und haben dann ohne weiteren Zwischenfall ihre drei Jungen großgezogen. Seltsam war es, daß die alten Vögel nach verschiedenen Grundsätzen fütterten: das Weibchen ergriff, sobald Mehlwürmer in den Käfig geworfen, den ersten besten Wurm, flog mit ihm in das Nest und verfütterte ihn, dann kehrte es zurück, holte einen zweiten Wurm und verfütterte diesen. Das Männchen dagegen begann erst dann zu füttern, wenn es den ganzen Schnabel voll Mehlwürmer hatte. Entfiel ihm dann ein Mehlwurm, so mußte dieser erst wieder aufgenommen werden. Darüber fiel nicht selten ein zweiter aus dem Schnabel, das Männchen ruhte aber nicht, bis es seine volle Ladung hatte, dann erst begann es die Vertheilung.

Am 19. Mai zeigte sich das erste Junge am Flugloch des Nistkastens, am 20. Mai verließ es das Nest, am 22. und 23. Mai folgten die beiden anderen. Die drei jungen Hüttensänger zeigten sich als ruhige, vertrauensvolle Geschöpfe. Ruhig ließen sie sich auf den Finger nehmen und von dem Boden des Käfigs wieder auf einen Zweig oder das rindenbedeckte Dach des Nistkastens setzen. Dies Dach wurde bald ihr Lieblingsaufenthalt während des Tages und ihr Schlafplätzchen während der Nacht. Heute, am 30. Mai, fliegt das älteste Junge bereits mit den Alten nach den in den Käfig geworfenen Mehlwürmern, verschmäht es aber auch nicht, mit zitternden Flügeln und aufgesperrtem Schnabel die Eltern um weitere Gaben anzubetteln. Das alte Männchen füttert auch heute noch sehr eifrig, während der Eifer des Weibchens nachzulassen anfängt. Vielleicht hat es inzwischen gelegt und bedarf nun selbst der Stärkung. Bereits am 23. Mai nämlich fing das Männchen wieder an, hinter dem Weibchen herzujagen und dieses machte sich mit Hälmchen aus dem alten Neste zu schaffen. Als ich ihm darauf Heu anbot, trugen beide Vögel davon in den Nistkasten. Bis heute hat das Weibchen indeß noch nicht wieder angefangen zu brüten.

Das Gefieder der jungen Hüttensänger ist matt schiefergrau, die Unterseite heller, an Kehle und Bauch in Grauweiß übergehend; Rücken und Brust sind weißlich gefleckt, die Schwanz- und Schwungfedern bläulich überlaufen.

Obwol die Hüttensänger stille und ruhige Vögel sind, so wollen sie sich doch zeitweise ausfliegen können und beanspruchen schon deswillen einen geräumigen Käfig, der für ein Pärchen nicht unter 1 Meter lang sein darf.

Dabei ist ferner zu beachten, daß diese schönen und anmuthigen Vögel einen starken Verzehr haben, sich günstiger Verdauungsverhältnisse erfreuen und viel baden.

Der Käfig muß daher mit einem Schiebkasten von Zink versehen sein, der Sand in demselben häufig erneuert, das Wasser täglich zweimal frisch gereicht werden.

Dem oben über die Fütterung Gesagten füge ich zum Schluß noch die Bemerkung hinzu, daß das alte Weibchen, als es fütterte, auf geschabte Sepia sehr erpicht war, beide Vögel auch beim Füttern die Hülsen von weißer Hirse mit benutzten, die zufällig in den Käfig gerathen waren. Ein Zusatz von Maikäferschrot oder etwas Weizenkleie zu dem Futtergemisch wird daher empfohlen werden dürfen.

Stubenvogelzucht als Erwerb.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung.)

Der Wellensittich ist eigentlich als das Musterbild aller fremdländischen Schmuckvögel zu betrachten — wie der Kanarienvogel als das der fremdländischen Singvögel. Denn den letzteren wird doch wol Niemand unter die einheimischen Vögel mitzählen wollen, trotzdem er seit 300 Jahren bei uns eingebürgert und so verändert, daß er neben dem ursprünglichen Vogel von den Kanarischen Inseln kaum oder gar nicht wiederzuerkennen ist. Auch der Wellensittich wird im Laufe der Züchtung über kurz oder lang im Aeußeren und ganzen Wesen zweifellos mancherlei Veränderungen unterliegen — und diese so zu regeln, daß sie so wenig als irgend möglich unheilvoll für den Vogel werden, das ist die Haupt-

aufgabe einer verständigen oder, wie man zu sagen pflegt, rationellen Züchtung.

Wenn die Zucht der fremdländischen Stubenvögel bis jetzt, in der kurzen Zeit, seitdem sie in Deutschland im Allgemeinen betrieben wird*), schon ganz staunenswerthe Erfolge gezeigt hat, wenn all' die unzähligen Ereignisse und Widerwärtigkeiten, welchen derartige Versuche bekanntlich auf allen Gebieten fast immer ausgesetzt sind; und unter denen fast die meisten zu Grunde gehen, mit verhältnißmäßig überraschend günstigen Erfolgen überwunden werden, so steht als leuchtendes Beispiel unter allen andern dieser Vögel wiederum der Wellensittich da.

Die Züchtung des Wellensittichs ist bis jetzt bereits auf zahlreich verschiedenen Wegen versucht worden und in der größten Regsamkeit wird sie eben so mannichfaltig als eifrig andauernd fortgesetzt. Dennoch darf gegenwärtig noch Niemand behaupten, daß er einen sichern und exakten Weg zur ergiebigen Züchtung aufgefunden habe. Es liegt ja auch in der Natur der Sache, daß dies nicht in der Weise geschehen und daß es Leute geben kann, welche gleichsam ein Recept in der Tasche haben, mit Hülfe dessen sie die sichersten und erfolgreichsten Züchtungsergebnisse erreichen können. Wer sich ein solches Ansehen gibt, der ist zweifellos entweder zu sehr von sich selber eingenommen, so daß er wirklich wol gar an seine eigene Unfehlbarkeit glaubt, oder noch schlimmer — er spekulirt auf die Leichtgläubigkeit der Leute. Der sicherste Weg, auf welchen wir — ich meine den weiten Leserkreis der „Gefiederten Welt" — zu guten Erfolgen in der Vogelzucht und -Pflege überhaupt gelangen können, ist ganz entschieden der folgende. Jeder Vogelliebhaber, der von Eifer für die Sache, d. h. vor Allem von Liebe zu seinen Pfleglingen, aber auch zugleich von Achtung vor der Wahrheit, dem Ernst und der hohen Wichtigkeit der Wissenschaft erfüllt ist, stelle sich die Aufgabe, irgend ein Gebiet der Vogelpflege und -Zucht, und sei es ein noch so kleines, zu ergründen. Ein scharfer und klarer Blick, welcher jede Gaukelei der Phantasie ganz entschieden verbannt und nur das wirklich Gesehene und Erfahrene für Wahrheit hält und nichts Anderes als solche ausgibt, ist dazu Bedingniß, d. h. befähigt den betreffenden Vogelliebhaber dann dazu, daß er auf seinem, wenn auch noch so kleinen Gebiete die hochwichtigen Erfolge eines Naturforschers erreichen kann. Und dann, nebst diesem idealen und doch jeden Strebsamen am reichsten belohnenden Erfolge, zeigen sich auch die materiellen ganz von selber. Sobald wir nur erst alle Eigenthümlichkeiten dieser Vögel recht genau erforscht haben — ist damit zugleich der sicheren und einträglichen Zucht der Weg gebahnt.

Die Leser wollen diese Abschweifung verzeihen. Sie war nothwendig, um einmal die Bahn zu zeigen, auf welcher zweifellos allein diese unsere Bestrebungen zu wirklich beachtenswerthen Erfolgen gelangen können. Im Gegensatz dazu sei noch kurz darauf hingewiesen, daß die Vogelzucht, welche von vornherein nur gleichsam fabrikmäßig nach einer Schablone und mit der dringenden und drängenden Absicht des möglichst hohen Ertrages unternommen wird — fast regelmäßig nur auf Abwege führt und gewöhnlich unter großen materiellen Opfern endigt. Berücksichtigen wir aber, daß die Zucht fast alles anderen Geflügels, wie eigentlich aller Hausthiere überhaupt, doch ebenfalls noch zum großen Theile im Stadium der Versuche sich befindet, so können wir im Allgemeinen bereits mit Genugthuung auf die Erfolge blicken, welche wir in der Vogelzucht bis hierher schon errungen haben.

Die ersten größeren Erfolge in der Wellensittichzucht haben die zoologischen Anstalten in den Niederlanden aufzuweisen. Man züchtet dort seit einer Reihe von Jahren diese Vögel in mehr oder minder großem Maßstabe und mit wechselnden Ergebnissen, lediglich für den Zweck des Verkaufs an die Händler. Die zoologischen Gärten und auch Privatunternehmer versorgten alljährlich im Herbst die deutschen Händler mit Wellensittichen und deckten den Bedarf, welchen die Einfuhr von Australien in den Frühlingsmonaten keineswegs immer in ausreichender Weise befriedigen konnte.

Nebenbei bemerkt, liegt die Schuld daran, daß die Wellensittich-Einfuhr, und wenn sie auch zu vielen tausend Köpfen im Mai ankommen, doch nur vorübergehend den Markt ausreichend bevölkert, hauptsächlich in der leider nur zu ungünstigen Transportweise begründet, denn die Wellensittiche sterben nach der Ankunft zuweilen durch seuchenartige Erkrankung zu vielen Hunderten, ja Tausenden.

In letzterer Zeit haben sich diese Verhältnisse etwas geändert. Die Einfuhr von Australien und ebenso die Züchtung in Europa konnten den Begehr der deutschen Vogelliebhaber nach Wellensittichen auch nicht annähernd mehr befriedigen; so viele Vögel selbst bereits in Deutschland gezüchtet wurden, alle fanden reißenden Abgang. Dazu kam, daß die Züchtung in den Niederlanden zeitweise eine geringere Ausbeute gewährte und daß auch gerade damals (namentlich in den Jahren 1870, 72, 73) die Wellensittiche theils gar nicht eingeführt wurden, theils sogleich nach der Einfuhr in nur zu großer Anzahl zu Grunde gingen.

Nicht lange darauf traten einige deutsche Züchter mit recht großartigen Erfolgen auf. Ein Herr in Süddeutschland, der seinen Namen als Vogelzüchter nicht genannt sehen will, hatte importirte Wellensittiche zu Hunderten angekauft und mit recht gutem Erfolg die Zucht betrieben. Herr Julius Naacke in Braunschweig hatte von viel weniger alten Zuchtpaaren eine noch größere Anzahl gezogen; Herr Kaufmann Schuster in Löwenberg hat trotz der anfänglichen Hindernisse doch ebenfalls Hunderte von

*) Eigentlich doch erst seit meinen Schilderungen dieser Vogelwelt in der „Gartenlaube" im Jahre 1868. Dr. R.

Jungen erzielt, und daran schließen sich sodann die Erfolge zahlreicher anderer Züchter, welche in mehr oder minder großem Maßstabe und mit mehr oder weniger Glück doch endschließlich so viele dieser Vögel gezogen haben, daß die Preise, wenigstens zeitweise ganz bedeutend heruntergegangen sind.

Jener vorhin erwähnte Herr aus Süddeutschland setzte mir gleichsam die Pistole auf die Brust: Er war vor dem Beginn seiner Züchtung bei mir gewesen, hatte meinen Rath eingeholt darüber, welche Vögel er wol im großartigsten Maßstabe züchten könne, ohne eine Entwerthung befürchten zu müssen. Nun, da er eines so bedeutenden Erfolges sich zu erfreuen gehabt, sollte ich auch dafür sorgen, daß diese Vögel verkauft würden. Herr Naacke dagegen mußte seine Wellensittichzucht einer andauernden Krankheit wegen aufgeben. Auch von Belgien, durch Vermittelung des Herrn Fabrikant Beines in Rhedt, kam eine Anzahl Wellensittiche auf den Markt. Dann begann auch Herr Schuster allmälig zu verkaufen und schließlich hatten zahlreiche Züchtungen im kleineren Maßstabe Ausbeuten gegeben, welche ebenfalls untergebracht werden sollten. Da eine beträchtliche Zahl dieser Vögel durch meine Hände gegangen, so bin ich wol im Stande, dieselben nach der Art und Weise ihrer Züchtung zu beurtheilen. Und um ein vergleichendes Urtheil zu gewinnen, entnahm ich außerdem auch noch sowol von Fräulein Hagenbeck als auch von Herrn Ch. Jamrach in London zahlreiche Pärchen importirter Wellensittiche.

Noch muß ich bemerken, daß diese ganze Anzahl von 400 bis 500 Paar Wellensittichen ungefähr im Laufe von sechs Monaten verkauft wurde. Die Preise wechselten je nach dem Zustande der Sittiche zwischen 5, 5½, 6, 7, 8 bis 10 Thlr. für das Paar. Alte, sehr schwere Heckweibchen wurden größtentheils mit 5 Thlr. für den Kopf bezahlt. Im Ganzen ertrugen alle diese Vögel die Reise recht gut; selbst die von London gekommenen zeigten nur wenige Todesfälle. Ein arger Mißgriff war aber mit denen aus Süddeutschland geschehen. Sie waren nämlich in zu großer Anzahl in die Käfige zusammengedrängt worden und hatten bedeutend gelitten. Zunächst zeigte sich die auffallende Erscheinung, daß sie einander gegenseitig die Augenlider zerbissen. Dies ist mir übrigens bei recht kräftigen und gesunden Vögeln niemals vorgekommen. Wenn dieselben sich beißen, so geht es einander an die Hinterköpfe und gar nicht selten gibt es dann schwer Verwundete und Todte. Die erwähnten Vögel saßen in einer nur zu argen Hitze, welche beim Herausgreifen der Hand sogleich in unangenehmer Weise fühlbar wurde. Die Folge davon zeigte sich dann auch in zahlreichen Erkrankungen und Todesfällen. Außerdem waren gerade diese Vögel keineswegs so kräftig entwickelt, als die anderer Züchter und dies lag offenbar in dem Mangel irgend eines nothwendigen Ernährungsstoffes begründet.

Die kräftigsten von allen diesen Wellensittichen waren ganz entschieden die Naacke'schen. Selbst die jungen Vögel aus dieser Zucht zeigten einen so großen, vollen und kräftigen Körper, daß sie als alte hätten gelten können. Herr Naacke theilte mir in freundlicher und bereitwilliger Weise das Geheimniß des einfachen Verfahrens mit, durch welches er diesen schönen Erfolg erzielt hat.

Einerseits, schrieb er, bin ich der Ueberzeugung, daß die Wellensittiche zur naturgemäßen Ernährung ihrer Jungen durchaus einer Zugabe von Fleischnahrung bedürfen und ich habe daher so reichlich als irgend möglich Ameisenpuppen gefüttert. Andererseits aber habe ich eine ganz besondere Beobachtung gemacht. In meiner Hecke waren nämlich viele überzählige Männchen und diese zeigten sich durchaus keineswegs störend und schädlich, sondern im Gegentheil, alle solche ledigen Männer nehmen sich in eifrigster Weise der Fütterung der Jungen an.

Erklärlich sind diese beiden Ursachen allerdings, zumal die letztere, von dem Gesichtspunkte aus nämlich, daß jedes junge Thier doch ganz entschieden desto besser gedeiht, um so kräftiger und voller sich entwickelt, je reichlicher es von frühester Jugend her ernährt wird. Hiermit sind wir nun aber zur Besprechung der in Nr. 23 beklagten Uebelstände gelangt. (Fortsetzung folgt.)

Vogelkrankheiten.

Vor einigen Tagen erkrankte ein Flötenvogel (Gymnorrhina leuconota), welchen ich abgesondert in einem Zimmer hielt, an heftigen Krämpfen, verbunden mit einem blutigen Durchfall, nachdem er kurz vorher ganz gesund und lustig war und seinen melodischen Gesang ohne Unterlaß erschallen ließ. Die angeführten Erkrankungserscheinungen waren so überraschend und unerklärlich, daß ich vorerst nicht wußte, wie dem Vogel zu helfen sei. Ich wickelte ihn in warme Tücher ein, goß ihm nach gewaltsamem Oeffnen des krampfhaft geschlossenen Schnabels etwas warme Milch ein, doch half das Alles nicht viel. Der Vogel war augenscheinlich vergiftet, ich spähete nun im Zimmer umher und fand endlich in seinem Käfige, welcher stets offen stand, ein kleines Stückchen eines Blattes der in demselben Zimmer stehenden blühenden Azalie, eines gelbblühenden, riechenden und allerdings giftigen Strauches. Der Flötenvogel hatte also ein Blatt davon abgerissen, etwas davon verzehrt und dies war die Ursache der heftigen Erkrankung. Die Krankheitserscheinungen wurden indeß immer betrübender, der Vogel stöhnte wie ein Mensch und ich sann auf ein Mittel ihn zu retten. Als verzweifelten Versuch nahm ich etwa ⅓ Gran Opium und 1½ Gran Gerbsäure zu einem Pulver verrieben, und von diesem Pulver gab ich ihn ungefähr den zehnten Theil in einem Gläschen mit einigen Tropfen Milch darauf ein, indem ich es ihm durch den mit größter Anstrengung geöffneten Schna-

bel eingoß. Die Wirkung war überraschend, die Krämpfe und der Durchfall hörten augenblicklich auf, der Kranke wurde ruhig, lag unbeweglich etwa eine halbe Stunde in seiner Einhüllung, dann aber sprang er heraus, wackelte wie im Rausche einige Minuten im Zimmer umher, worauf er die ihm als Nachkur vorgesetzten Mehlwürmer mit Gier verschlang und sich seitdem des besten Wohlseins erfreut.

Dr. Karl Mikolasch, Apotheker in Lemberg.

Aus den Vereinen.

Ausstellungsbericht der II. allgemeinen Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht in Köln.

(Fortsetzung.)

Blos 42 Paar Indianer — großer Varietät hatte unsere Ausstellung aufzuweisen. Da der Indianer erst im Alter schön wird, wann bald die Zuchtfähigkeit aufhört, so waren die hervorragendsten Exemplare keine Jünglinge; doch es hat jeder Indianer die Fähigkeit der Entwicklung, aber die meisten versäumen es. Herr Th. Hesse von hier hatte weiße, gelbe und schwarze ausgestellt, die wol noch nicht besser gezeigt wurden; diesen schlossen sich die rothen, weißen und schwarzen des Herrn J. F. König an. Herr J. Neumann hatte ein Paar getigerte ausgestellt, die, obgleich noch jung, doch in der Entwicklung nicht zurückbleiben, wie auch die von Baily aus London im nächsten Jahre anders aussehen werden.

Von den so viel verleumdeten Sultans hatte Herr A. Büttinghausen in Kalk mehrere schöne Paare ausgestellt, in Schwarz, Roth und Gelb, ebenso Herr Ferd. Melchior von hier ein Paar schwarz-braune, die den Ansprüchen genügten. — Türken, Bagadetten und Karrier waren schwach vertreten; von letzterer Rasse hatte Herr R. Baumann in Ehrenfeld ein Paar prachtvolle lederfarbige ausgestellt; ebenso waren die drei Paare des Herrn Baily tadellos, doch noch zu wenig entwickelt, um auf Preise Anspruch machen zu können.

Brieftauben waren nur drei Paar vorhanden, machten aber den Eindruck, als ob die gegenwärtigen Brennpunkte dieses Sports, ob Staatsprämie oder nicht und ob die Medaillen auch nach Jedermanns Begriff richtig vertheilt waren, sie wenig interessire. Dabei fällt uns der treffende Bescheid eines Brieftaubenkenners ein, der auf die Frage, ob die Tauben von N. N. gut seien, antwortete: das weiß ich nicht, aber fett sind sie.

In den einfarbigen Perrückentauben waren wiederum die Herren E. Beck in Frankfurt und Th. Hesse in Köln diejenigen, welche sich in die Preise theilten. Es wäre nur zu wünschen, daß sich mehrere Züchter dieser edlen Taubenrasse widmeten, da selbe an unser Klima gewöhnt, fruchtbar ist und ihre Jungen den Egyptern weit an Sterblichkeit nachstehen. Weißbindige blaue hatten eben nur obige zwei Aussteller je ein Paar ausgestellt; daß beide Paare gleich gut, beweist schon, daß die gestrengen Herren Preisrichter beide mit erstem Preis bedachten. In Nr. 6 der „Blätter für Geflügelzucht" vom Jahre 1873 wird ein nicht näher bezeichneter Ehrenpreis u. A. auch für schwarze Perrücken mit weißen Binden ausgesetzt; — sehr liebenswürdig, aber errungen scheint ihn Niemand zu haben. Schmutzig-gelbe, mit Uebergang zum Blauen waren in früheren Jahren einmal in Köln, auch Isabellfarbene mit weißen Binden soll ein Züchter in Wien haben; aber Schwarze und Rothe, damit hat es noch keine Eile. Doppelkuppige weiße hatten die Herren Pinger und Wigand in Bautzen ausgestellt, doch läßt sich darüber wenig sagen; Glasaugen hatten die Thiere noch nicht.

Pfautauben in allen möglichen Verschiedenheiten wies unsere Ausstellung in ausgezeichneten Exemplaren auf. Es ist wol in keiner hiesigen Ausstellung eine Sammlung so prachtvoller Pfautauben zur Schau gestellt worden, als in diesem Jahre; war es auch anders möglich, wenn wir berichten, daß Herr O. Pausch in Berlin uns 12 Paar seiner ausgezeichneten Sammlung eingesandt hatte. Da seine weißschwänzigen, geschildeten und buntschwänzigen, doch auf dem Standpunkte stehen, wo jede Konkurrenz die Segel streichen muß, so wird wol Herr Pausch für die Zukunft obige Varietäten „hors Concours" stellen, um kleineren strebsamen Liebhabern auch etwas Aussicht auf Preise zu lassen. Brillant waren auch seine blauen und schwarzen zu nennen. Von weißen allerdings hatte Herr Baily in London drei Paare eingesandt, die unvergleichlich waren, doch auch diese Konkurrenz braucht Herr Pausch nicht mehr zu scheuen, da diese Thiere in seinen Besitz übergingen. Als am nächstbesten sind nur noch die blauen und schwarzen des Herrn A. Herbert in Wiesbaden hervorzuheben, die jeder Ausstellung zur Zierde gereichen.

Unter den Kropftauben heben wir vor allen das Sortiment echter Ballonbläser des Herrn F. J. Mertens von hier hervor, fünf Paar ausgewählt schöne Paare, besonders die gelben. Einen schöneren und imponirenderen als diesen Taubert dürfte man wol vergebens suchen. Woran liegt nur die schwache Verbreitung dieser Rasse? Ist deren Zucht wol eine sehr schwierige oder sind selbe in Holland so schwer zu haben? — Von den viel entarteten Englischen Kröpfern hatte Herr Baily in London sechs Paar echter Rasse ausgestellt. Den hohen Preis von 50 Thlr. waren diese Tauben doch ungleich eher werth, als manches Paar gleichbenannter den ihrigen mit 5 Thlr. Ging übrigens aus dem Wettstreite mit Herrn Baily bei Indianern, Egyptern u. a. auch Deutschland siegreich hervor, so ist doch als sicherstehend anzunehmen, daß ein Theil der Sieger von Herrn Baily bezogen hat, der jedem Liebhaber, welcher etwas wirklich Gutes wünscht, nebenbei auch etwas anlegen will, bestens empfohlen sei. — Böhmische Kröpfer waren außergewöhnlich schwach vertreten; das Paar blaue des Herrn W. H. Pepis und die isabellen des Herrn Heukeshofen waren die einzig guten Paare. — Die von Herren Wahlhammer und Ratzinger ausgestellten Maltheser und Hühnerschecken boten nichts Besonderes gegen früher als etwas höhere Preise, die in München nach dem neuesten Katalog etwas geringer geworden sind; 6 Thlr. für weiße Maltheser ist etwas viel, 5½ Gulden bis 7 Fl. scheint richtiger zu sein. Herr R. Geßner hatte ein Paar schöne schwarze, rein gescheitelte Hühnerschecken ausgestellt, welche die andern an Größe überragten.

Schließlich erwähnen wir noch die von unserem zoologischen Garten (Direktor R. Funk) ausgestellten Bucharen und Montaubans. Sämmtliche fünf Paare waren würdige Vertreter ihrer Arten. (Fortsetzung folgt.)

Bücher- und Schriftenschau.

(Fortsetzung.)

Die Federzeichnungen aus der Thierwelt von Aglaia von Enderes (angezeigt in Nr. 23) sind einem großen Leserkreise bereits seit Jahren als anmuthige Schilderungen bekannt. Der vorliegende Band (221 Seiten, gr. Oft., in elegantester Ausstattung) enthält achtundzwanzig Lebensbilder einheimischer Thiere, und zwar in einer Weise erzählt, welche wir eben von der Verfasserin erwarten durften. Es sind kleine poetische Gemälde, in gewandter, gebildeter Sprache geschrieben und mit der Gemüthlichkeit vor den Augen des Lesers aufgerollt, welche dem Herzen des wahren Naturfreundes so sehr wohlthuend ist, die aber auch den gebildeten Kenner der Natur befriedigt, indem sie trotz der harmlos-gemüthlichen Darstellung, doch durchaus treu dem betreffenden Zweige der Naturwissenschaft Rechnung trägt. Wir können dies Buch aus voller Ueberzeugung warm empfehlen, ebensowol als anregende und erheiternde Lektüre für jeden Gebildeten, als auch für die erwachsene Jugend als eine wichtige Belehrungsquelle über die uns am nächsten stehenden freien Bewohner der heimischen Natur.

Dr. Karl Ruß.

Der Schluß des Aufsatzes über den Axolotl folgt in der nächsten Nummer.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Geschäftsverkauf.

Eine seit mehreren Jahren schwunghaft betriebene Handlung exotischer Vögel in Süddeutschland, mit ganz neuem, schönem und zweckmäßigem Inventar, wird verkauft.
Näheres durch die Redaktion dieses Blattes. [374]

Eine singende Nachtigal zu verkaufen. Näheres bei **J. Kerp** in Euskirchen. [375]

Eine Schwarzplatte, ausgezeichnet singend, verkauft und wird ein Tag- und Nachtschläger, Nachtigal oder Sprotzer zu kaufen gesucht. **G. Miltenberger**, Zellingen. [376]

Vereinsmitglieder haben zu verkaufen:
Eier von schwedischen Enten à 4 Sgr., von Spaniern à 4 Sgr., von Italienern (Leghorns, gesperbert, braun) à 3 Sgr., Silberbrabantern mit Helmhaube à 3 Sgr., mit größerer Haube à 2½ Sgr., gelben Cochins à 5 Sgr., Zwerghühnern à 2½ Sgr., Brabanter Albinos 10 Sgr.; ferner französische Lapins in großer Auswahl von jedem Alter, hasengraue Normandiner und die zur Zucht so sehr empfehlenswerthen englischen Schecken; halbjährige zuchtfähige Schecken (schwarzbraun und weißschwarz), das Stück 2 Thaler; ein ¾jähriger Rammler (über acht Pfund schwer) zu 2½ Thlr.; weiter drei fehlerfreie Harzer Hohlroller zu 7, 10 und 12 Thlr. (vorjährige Zucht); 1 Häsin engl. Schecken, 7 Monat alt, kräftig, schön, 3 Thlr. 15 Sgr.; 1 Häsin hasengrau, von Normandiner und Schecken, 6 Monate alt, kräftig, 3 Thlr. 15 Sgr.; 1 prächtiges hasengraues Normandinermännchen, 5 Monate alt, 3 Thlr.; das Paar 11 Wochen alte Normandiner 3 Thlr. 15 Sgr. [377]
Usingen.
Der Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht.

[378] **Die Vogelhandlung**
von D. Dufour, Behrenstrasse 51,
Passage-Gebäude,
empfiehlt die schönsten Papageien, grau und grün, zahm und gut sprechend, alle ausländischen kleinen Vögel, gutpfeifende Dompfaffen, die schönsten Harzer Kanarienvögel, Lichtschläger, schlagende Nachtigalen, Affen, kleine Damen-Hunde und eine Auswahl von Vogelkäfigen zu soliden Preisen.

Allgemeine Geflügel-Ausstellung
verbunden mit
Verloosung, veranstaltet vom Verein für Geflügelzucht, Kreuznach
vom 19. bis 21. Juli 1874
in dem neuerbauten Ausstellungslokal in der Kurhausstraße.

Wir laden hierdurch höflichst ein, unsere erste Ausstellung allseitig beschicken zu wollen.

Anmeldungen sind spätestens bis zum 1. Juli unserm Schriftführer, Herrn Reinhard Schmithals, königl. Hofbuchhändler hier, mitzutheilen. — Die Einsendung der Thiere muß, bis 16. Juli eintreffend, an unsern Präsidenten Herrn Gutsbesitzer J. Baur hier geschehen.

Loose à 5 Sgr. zu der mit der Ausstellung verbundenen für die Mitspieler sehr günstig gestellten Verloosung sind gegen Einsendung des Betrages zu beziehen durch Herrn Reinhard Schmithals, königl. Hofbuchhändler, und Herrn Jakob Fels hier.
[379] **Der Vorstand.**

[380] Die
Großhandlung überseeischer Vögel etc.
von
Armin Kraeger, Leipzig, Zeitzerstr. Nr. 18.
offerirt zu den billigsten Preisen, unter Garantie des lebenden Ankommens:

Astrilds, Helenafasänchen, Cordonbleu, Orangebäckchen, Schönbürzel, Muskat-, Band-, Tiger-, Reis-, Diamant-, Zebra-, Safran- und Savannenfinken, Elsterchen, Silberbeks, Nonnen, Madagaskarweber, Mozambiques, Nonpareill's, japanesische Sonnenvögel, Kardinäle, rothe, graue, grüne und Dominikaner-, Sonnenvögel, amerikanische Goldzeisige, Sperlingspapageien, Wellensittiche, Nymphen, Rosella's, Pennantis, Königslori, Karolien- und Mönchsittiche, Jakos, Amazonen-, Portoriko- und Surinampapageien.

Außerdem 1 Portoriko-, 1 Jako-, 1 Grandilory-Papagei und Orangehäubigen großen Kakadu als Sprecher, sowie alle Futterarten und Nistgegenstände ꝛc.
Preislisten gratis. Händlern, Rabatt.

4 gesunde und fehlerfreie Rothkopfweber, Ploceus erythrops, (3 Männchen, 1 Weibchen) für 7 Thlr. inkl. Emballage, hat abzugeben **C. B. Madsen**
[381] in Tondern, Provinz Schleswig.

Dunkelkäfige.
Bekanntlich für junge Harzer Hähne unentbehrlich, in praktischer und eleganter Ausführung, verkauft das Stück für 2 Thlr. **Friedr. Fieser.**
[382] Kaufmann. Carlstadt a. M.

Das Etablissement von Chs. Jamrach,
Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180 St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen folgende Thiere erhalten: 1 Königstrupial (Regent-Bird), 210 Paar Diamantvögel, 40 Paar Bart- oder Pfaffenvögel, 10 Paar Ceresfinken, 18 Paar Schilffinken, 100 Paar Schönsittiche, 14 Paar Buntsittiche oder Rosellas, 20 Paar blaßköpfige Rosellas, 3 Jamrachs-Rosellas, 2 Rothflügelsittiche, 8 Paar Pennantsittiche, 15 Paar Vielfarbige Sittiche, 15 Paar Paradiessittiche, 20 Paar Königssittiche, 3 Paar Ziersittiche, 2 Mastenpapageien, 2 Glanzsittiche, 2 rosenrothe Kakadus, 1 Inka-Kakadu, 2 Leadbeater-Kakadus, 5 große und 5 kleine gelbhäubige Kakadus, 13 Müller-Amazonen, 7 Perterite-Amazonen, 2 gewöhnliche Amazonen, 1 Ganga-Kakadu, 10 Bronzeflügeltauben, 11 Paar australische Fruchttauben, 150 Nonpareils, 60 Paar Indigovögel, 24 Paar Orangebäckchen, 10 Flötenvögel; außerdem 1 Paar Talegalla-Hühner, 2 Paar schwarze Schwäne, 3 Paar Flammings, 1 Paar Pelekane, 1 kleine rothrückige australische Gans, 1 australische Rehrdommel, 1 Emu; ferner auch noch zahlreiche verschiedene Vierfüßler, wie Affen in mehreren Arten, 1 Aristoteles-Hirsch, 5 Fettschwanz-Schafe, verschiedene Känguruhs, unter denen eine neue Art, 1 Leopard,
[383] 1 Paar Wölfe.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 25. Juni 1874. Nr. 26.

Inhalt:

Ausflug der deutschen ornithologischen Gesellschaft zu Berlin. —
Stubenvogelzucht als Erwerb. (Fortsetzung.) —
Trauriges Mißgeschick einer Canarienvogelzucht. (Schluß.) —
Anderweitige Liebhabereien. (Schluß.)
Das Tauben-Preisfliegen auf der internationalen Ausstellung zu Bremen. —
Bücher- und Schriftenschau. (Fortsetzung.) —

Die Beilage enthält: Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Stettin. — Briefwechsel. — Anzeigen. —

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeignete Erinnerung gebracht.

Ausflug der deutschen ornithologischen Gesellschaft zu Berlin.

Einige zwanzig Mitglieder unternahmen kürzlich einen interessanten Ausflug nach der Dubrow, einem etwa eine Meile hinter Königs Wusterhausen befindlichen Forstbelauf. Der Zutritt zu demselben ist nur gegen besondere Erlaubniß seitens der königlichen Forstverwaltung gestattet, die jedoch jedem harmlosen Besucher auf das bereitwilligste ertheilt wird. Nachdem die Theilnehmer in Wusterhausen bei einem ornithologischen Frühstück — es gab nur Eier — nähere Bekanntschaft gemacht, fuhren sie in zwei Wagen von dannen, sofort ihr ornithologisches Handwerk beginnend. Jeder Vogel, der sich zeigte, wurde namentlich verzeichnet, natürlich jede Art nur einmal, und als man heimkehrte, hatte man nicht weniger als 44 Arten verschiedener Vögel gesehen. Das erste Ziel, Forsthaus Sauberg, wurde ohne erheblichen Unfall — der Zusammenbruch des Leiterwagens, der die Gesellschaft von 15 Personen durcheinander rüttelte, hatte nur lächerliche Folgen — erreicht. So wenig anziehend der Name dieser försterlichen Niederlassung, so reizend war die Lage derselben mitten im Walde. Von hier aus erreicht man in 10 Minuten das zweite, noch anmuthiger an einem ringsum bewaldeten See gelegene Forsthaus. Der Förster, ein strenger aber freundlicher Beamter überzeugte sich zunächst von der Richtigkeit der Legitimation und begleitete dann die Gesellschaft in den prachtvollen Eichenwald, für Ornithologen noch dadurch höchst interessant, daß in demselben der Fischadler (Pandion haliaëtos), der schwarze Storch (Ciconia nigra), und der Reiher (Ardea cinerea) nisten oder, ornithologischer ausgedrückt, horsten. Nach einer einstündigen Wanderung erreichte man einen Horst des Fischadlers, hoch oben auf dem höchsten Aste einer etwa 50 Fuß hohen Kiefer. Dem Nichtornithologen, und ein solcher ist der Schreiber dieses Berichtes, mußte es wunderbar erscheinen, als auf einmal einer der Theilnehmer sich rüstete, als ob er auf die Mensur gehen wolle, nur daß er nicht oben am Halse, sondern an den Füßen sich schützte. An diesen befestigte er ein Steigeisen, das mit einer scharfen Stahlspitze nach der inneren Seite des Fußes zu versehen war, dergestalt, daß er zunächst eine Filzbekleidung darunter legte und es dann mit Schnüren festzog. Um den Leib schnallte er einen Gurt, der mit einem Ring versehen war. Indem er um den Baum einen Strick legte, den er mit beiden Händen faßte, fing er an, die glatte Kiefer zu besteigen. Dies geschah mit solcher Sicherheit, daß er nach wenigen Minuten die Spitze des Baumes

und damit das Nest erreicht hatte. „Drei Junge" meldete er herab. Sein Rufen aber wurde noch übertönt von dem Geschrei der Alten, welche im großen Bogen das Nest umkreisten, sich aber nicht in die Nähe ihres beutelustigen Feindes wagten. Sorgfältig packte nun der Steiger die drei Jungen in ein Netz und ließ dies an einem Bindfaden herunter. Welche Freude für die Ornithologen! Ein Fischadler im Jugendkleide war den meisten unbekannt. „Mir fehlt das Kleid im Museum", meinte Dr. Cabanis, „ich muß ein Junges haben"; „ich würde gern im Aquarium den Pandion zeigen!" äußerte Dr. Hermes, „groß wollen wir ihn schon füttern! Und den dritten schenken wir dem zoologischen Garten", war Grunacks Meinung, dann ist für Alle gesorgt". Dagegen aber protestirte der Vorsitzende des Vereins Dr. Golz. „Wir legen sie alle wieder in's Nest, denn es wäre doch schade, wenn die Vögel, was bei ihrem großen Jugendzustande wahrscheinlich ist, zu Grunde gingen." „Das wäre mir lieb," warf Dr. Cabanis wieder dazwischen, „dann hätte ich drei". Man konnte sich nicht einigen und so nahm die Gesellschaft den Vorschlag von Dr. Golz an, eine allgemeine Volksabstimmung über die verschiedenen Vorschläge entscheiden zu lassen. Diese ergab, daß ein junger Pandion dem Dr. Hermes zuerkannt wurde, während die beiden jüngeren Geschwister wieder zu Muttern in's Nest gesetzt werden sollten. Und so geschah es. An derselben Strippe, an der vorher drei Junge herunter kamen, wurden jetzt zwei wieder in die Höhe gezogen. Ohne Unfall erreichte bald darauf auch der Steiger den sicheren Erdboden. Entlang an den Ufern herrlicher Seen, die von der Schmelde gebildet werden, ging es nun durch den schönen Eichenwald, dessen herrliches, saftiges Grün gar nicht genug bewundert werden konnte, zum Horst des schwarzen Storches. Wir fanden ihn auf seinem Nest, das er bei unserer Annäherung verließ, um sich etwa 30 Schritt davon auf einem Zweige niederzulassen, wo er genau beobachtet und bewundert werden konnte. Und in der That war es ein herrlicher Anblick, diesen schwarzen Vogel mit dem langen rothen Schnabel so mitten im grünen Walde sitzen zu sehen. Eine schönere Zierde des Waldes ist kaum denkbar. Der schwarze Storch ist ziemlich selten in Deutschland; es giebt nur wenig Orte, an denen er vorkommt. Daher die Freude der Ornithologen. In nicht allzu großer Entfernung von hier, an dem höchsten Punkte des Waldes liegt der Reiherhorst, oder vielmehr eine ganze Reiher-Ansiedelung, die, wenn auch aus der Ferne nicht sichtbar, doch durch das Geschrei der Reiher ziemlich weit vernehmbar ist. Diese Ansiedlung bot in der That einen sehr eigenartigen und im höchsten Grade interessanten Anblick dar. Hoch in den schönen Eichen, auf kahlen Zweigen liegen die Horste, Hunderte auf einem nur wenige Morgen großen Raume und oft ihrer sechs bis acht auf einem einzigen Baum. Die scheuen Reiher flogen bei unserer Annäherung von dannen, die ziemlich ausgewachsenen Jungen aber saßen auf den Zweigen oder den Rändern der Horste meist so unbeweglich, daß ein Photograph hier prächtige Aufnahmen hätte machen können. Dieser Anblick setzte die ganze Gesellschaft in vollstes Entzücken und der Maler Mützel hatte sofort den Bleistift in der Hand und in wenigen Minuten eine reizende Skizze, die einer späteren Zeichnung als Grundlage dienen soll, fertig. Einige Jungen versuchten, natürlich ohne jeden Erfolg, zu fliegen und eins hatte wahrscheinlich bei einem solchen Versuch sein junges Leben eingebüßt — wir fanden es, wol nur wenige Stunden nach seinem Ende unter einem Horst liegen. Nicht minder interessant war der Anblick der Eier selbst. Das grüne Kleid derselben hatte überall weiße Streifen und manchen Stellen fehlte das Grün bald ganz. Die Anstreicher waren hier die Vögel selber.

Das ganze Bild, welches sich uns hier darbot, erinnerte mich lebhaft an Viktor Scheffels Lied vom Guano:

„Sie sitzen in frommer Beschauung,
Kein einz'ger versäumt seine Pflicht;
Gesegnet ist ihre Verdauung
Und flüssig gleich wie ein Gedicht."

Die Reiher suchen sich zu ihren Ansiedelungen stets die höchsten Stellen eines an fischreichen See'n gelegenen Waldes aus; um von hier aus Umschau nach allen Richtungen halten zu können. Es sind der Fischerei höchst schädliche Vögel. Beim Fang der Fische stehen sie meist bis an den Leib im Wasser, auf Beute lauernd, die sie schnell stoßend sich holen. Noch jetzt dienen ihre schönen Halsfedern einigen Völkern, wie den Persern und Indianern, als Helmschmuck. Sie sind beim Fliegen leicht erkennbar an dem gekrümmten Hals und den gestreckten Füßen. Noch ärgere Räuber als diese sind aber die Fischadler, welche schon größere Fische fliegend zu fangen vermögen. Der Steiger warf aus dem Nest des Pandion die Reste von fünf Fischen, vier Barschen und einem Karpfen, die sämmtlich nur zur Hälfte verzehrt waren. Der Umstand, daß die Schwanzenden übrig gelassen, läßt wol darauf schließen, daß sie das Kopfende für schmackhafter finden.

Unterdessen war es drei Uhr geworden.

Die Gesellschaft befand sich in gehobener Stimmung, zu deren Erhaltung die in fürsorglicher Weise mitgenommenen drei Achtel nicht unwesentlich beitrugen. Man lagerte an einer reizenden Stelle des „hölzernen Sees" und genoß neben der Aussicht auf diesen das einfache Mittagsmahl, gewürzt durch ornithologische Scherze. Auf dem Rückwege wurden von den Herrn Schalow und Professor Hartmann Wasserkäfer und Pflanzen gesammelt und auch hier lohnte reiche Ausbeute.

So kehrte die ganze Gesellschaft außerordentlich befriedigt von diesem Ausfluge heim mit dem Vorhaben, eine ähnliche Partie baldigst zu wiederholen. Denn dieser war ein gar herrlicher Tag.

(Berl. Bürg.-Ztg.)

Stubenvogelzucht als Erwerb.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung.)

Für eine einträgliche und vor allen Dingen dauernde, d. h. im Laufe der Zeit immer möglichst gleichartige oder vielmehr zunehmende Erträge liefernde Zucht der Wellensittiche mußten namentlich von den Züchtern, welche nicht blos ein oder einige Pärchen zum Vergnügen halten, sondern im größeren Maßstabe Erfolge erreichen wollten, von vornherein umfassende, der Natur des Vogels entsprechende Maßregeln getroffen werden. Am eifrigsten und mannichfaltigsten hat man in dieser Hinsicht wol in Belgien experimentirt. Ob aber auch mit den entsprechenden Erfolgen, das ist noch eine offene Frage.

Der nächstliegende Uebelstand bei den meisten Thierzuchten überhaupt, ist die zu große, oder richtiger gesagt, übermäßig erregte Vermehrungskraft. Sie zu regeln und in wohlthätiger Weise zu beschränken — darin offenbart sich die größte Weisheit des Züchters. Denn in ihr und ihren Folgen liegen eben nur zu viele jener Uebelstände, welche die Zucht erschweren und nicht selten völlig in Frage stellen, begründet.

In den großen zoologischen Anstalten hat man mancherlei versucht. Zunächst trennte man, nachdem die Brutzeit vorüber war, beide Geschlechter, hielt die Weibchen und Männchen eine längere oder kürzere Zeit hindurch im gesonderten Raum. Dies schmälerte jedoch den Züchtungserfolg in auffallender Weise — durch Ursachen, auf welche wir späterhin zurückkommen werden.

Andere Züchter ließen den Vögeln ganz den Willen, fütterten sie reichlich und züchteten so lange fort, bis sie von selber aufhörten. Bei diesem Verfahren zeigten sich aber ebenfalls mancherlei und noch viel schlimmere Uebelstände, deren schwerwiegendster der ist, daß eine große Anzahl der Jungen als Ergebniß einer unnatürlichen Ueberproduktion nicht fortpflanzungs-, meistens sogar gar nicht lebensfähig waren.

Die Fülle der im Laufe der Zeit gemachten und auf das Sorgfältigste bewahrten allseitigen Erfahrungen hat bereits eine Reihe sicherer Anhaltspunkte geboten, mit Hülfe derer man die bedeutungsvollsten Nachtheile glücklich vermeiden und wenigstens die Aussicht regelmäßiger guter Erfolge erreichen kann. Wir wollen dieselben nun darlegen und dabei sowol die Wellensittichzucht im größten, als auch im kleinsten Maßstabe berücksichtigen.

Als allgemeine Regeln halte man die folgenden fest:

1. Man suche unter allen Umständen zu erfahren, ob man importirte oder hier gezüchtete, oder eingewöhnte, d. h. ursprünglich ebenfalls eingeführte, doch bereits seit Jahren in der Gefangenschaft gehaltene Vögel vor sich hat. Denn alle drei müssen für eine Ertrag versprechende Züchtung durchaus abweichend von einander behandelt werden.

2. Bevor man irgend eine Vogelzüchtung, gleichviel, sei es im kleinsten oder größten Umfange, beginnt, wappne man sich von vornherein mit den ersten und bedeutungsvollsten Tugenden des Züchters und Vogelliebhabers überhaupt: mit Ruhe, Geduld und Ausdauer. Ohne dieselben wird man schwerlich jemals Erfolge erreichen.

3. Man halte den Grundsatz unverrückbar fest, die Vögel zu jeder Zeit so naturgemäß als irgend möglich zu behandeln, ihnen nur das zur Fütterung anzubieten, was sie im natürlichen Zustande der Freiheit nachweislich fressen.

4. Man halte bei der Herstellung ihrer Brutherbergen vornehmlich die Nothwendigkeit im Auge, daß dieselben den Vögeln erstens das Gefühl der Sicherheit, zweitens ausreichende Ruhe und drittens doch gleichsam gewisse Anregungen gewähren müssen.

Um dies Alles zu erreichen, ist aber eine möglichst eingehende Kenntniß der zu züchtenden Vögel zweifellos das wichtigste Bedingniß und deshalb wollen wir den Wellensittich in allen seinen Eigenthümlichkeiten nun einmal recht eingehend betrachten.

Die importirten Wellensittiche nisten mit Vorliebe in unsern Herbstmonaten und halten meistens sehr zähe an dieser Zeit fest, so daß sie zu anderer unter den günstigsten Umständen nicht, zur ersteren Frist aber nicht blos mit bewundernswerthem Eifer, sondern auch zuweilen unter recht widrigen Verhältnissen zur Brut schreiten. Da wundert sich wol ein Liebhaber sehr über seine undankbaren Vögel, welche trotz aller Vorsorge ihn nicht durch Nisten erfreuen wollen. Er hält sie Monate, ja wol Jahr und Tag hindurch und giebt sie schließlich voller Verdruß fort — und bei dem nächsten Besitzer ist in wenigen Wochen die beste Brut im Gange.

Ferner fressen die importirten Wellensittiche zuweilen ganz entschieden nichts weiter, als trockenen Spitzsamen und gewöhnen sich auch durchaus nicht an gequellte Sämereien, Grünkraut oder Ameisenpuppen. Dennoch füttern sie nicht selten bei dieser Nahrung ihre Jungen gut groß. Keinenfalls würde ich aber dazu rathen, daß man bei dieser Fütterung züchtet. Die Jungen bleiben auffallend zurück, erlangen durchaus nicht die volle Größe und Kraft der Alten, und dann zeigen sie auch noch einen außerordentlich schlimmen Uebelstand. Sie fressen nämlich fast immer ohne ein sie sicher leitendes Gefühl Alles, was ihnen geboten wird. Ich habe gesehen, daß man solche Wellensittiche mit Kuchen und anderen Leckereien, rohem und gekochtem Fleisch, Kartoffeln u. dgl. fütterte und daß sie nichts verschmähten. Da muß dann selbstverständlich die bereits eingeleitete Degeneration in unheilvollster Weise zum Austrag kommen. Sie aber bringt eben die meisten der beregten unheilvollen Erscheinungen hervor. Da giebt es denn Eier- und Jungenfresser; da kommen die Jungen halb nackt aus den Nestern, oder auch

als Krüppel; oder die Pärchen bleiben durchaus unfruchtbar.

Dies Unheil zu vermeiden oder nach und nach wieder auszugleichen, ist die wichtige Aufgabe der verständigen Züchtung.

Hat man frisch importirte Vögel vor sich (sie werden gewöhnlich im Mai bis Juni importirt), so lasse man sie bis zum September mit jedem Züchtungsversuch unbehelligt, halte sie in möglichst geräumigen Käfigen oder noch besser freifliegend in einer Kammer und Tag und Nacht der freien Luft ausgesetzt. Sollten sie außer Spitzsamen durchaus nichts weiter, also Hafer, Grünkraut (nur Vogelmiere), und hin und wieder ein wenig Ameiseneier und eingequellte Sämereien nicht annehmen wollen, so ist es nach meiner Ueberzeugung nothwendig, daß man je nach der Anzahl mehr oder weniger andere, schon eingewöhnte und hier gezüchtete Junge oder Alte zu ihnen setzt, damit sie durch dieselben an die mannichfaltigere Nahrung gewöhnt werden.

Bei dieser Gelegenheit sei zugleich darauf hingewiesen und nochmals wiederholt, daß ich Spitz- oder Kanariensamen, ungespelzten Hafer, Grünkraut, Sepienschale u. a. Kalk, während des Nistens sodann dieselben Sämereien eingequellt und frische oder aufgeweichte Ameisenpuppen für die naturgemäße Ernährung dieser Vögel durchaus nothwendig erachte. In Ermangelung oder auch als Zusatz zu den Ameisenpuppen kann man auch wol in Wasser aufgeweichtes Eierbrot oder desgleichen gutes altbackenes Weißbrot geben. Alles Andere aber, namentlich Hanf und andere ölige Sämereien, Zucker u. a. Leckereien, reichliches Eigelb, Gemische, wie Nachtigalenfutter u. dgl., wolle man entschieden vermeiden. Sodann lasse man nicht außer Acht, daß in der Fütterung mit Grünkraut eine arge Gefahr für diese Vögel liegt. Ob Salatblätter an sich schädlich sind, wie mehrfach behauptet wird, wage ich noch nicht zu entscheiden. Durchaus schädlich kann aber Vogelmiere und jedes andere Grünkraut werden, wenn es naß dargereicht wird. Insbesondere wenn die kaum flüggen Wellensittiche dasselbe bekommen, sterben sie nicht selten in großer Anzahl am Durchfall und da dieser letztere überhaupt der Aufzucht sehr leicht gefährlich wird, so muß man selbst die eingequellten Sämereien sofort entziehen, wenn man die ersten Spuren von ihm entdeckt.

Ebenso gefahrdrohend wird zuweilen der Sand in der Wellensittichhecke. Als Regel halte man fest, ihn ebenfalls niemals im geringsten feucht zu geben. Am zuträglichsten ist etwas grobkörniger Grant, und sollte man solchen nicht beschaffen können, so nehme man immerhin ganz feinen staubtrockenen weißen Stubensand oder auch Seesand und vermische denselben etwa mit der Hälfte guter, reiner, schwarzer Gartenerde, indem man beide zusammen durch ein nicht zu grobes Sieb reibt.

(Fortsetzung folgt.)

Trauriges Mißgeschick einer Canarienvogelzucht.

(Schluß.)

Nun fragt es sich zuerst, ob die Krankheit der Jungen und Alten dieselbe gewesen sei. Ich muß mit „nein" antworten; denn noch zuletzt habe ich ein Weibchen ganz allein auf der Stube gehabt, welches vier Junge ausgebracht und von mir besonders aufmerksam behandelt wurde. Ich fütterte die Jungen alle zwei Stunden, mischte etwas Mohnsamen in das Futter, ließ die Fenster Tag und Nacht auf, so daß sie wie im Freien an frischer Luft waren. Aber obgleich sie anfangs rasch zunahmen und schon Federchen bekamen, starben auch sie eins nach dem andern. Das Weibchen aber ist gesund. Ferner sind die Krankheitserscheinungen ganz verschieden bei beiden. Die Jungen starben meist binnen ganz kurzer Zeit; nachdem sie noch Abends gefressen und auch verdaut hatten, lagen sie des Morgens todt da, die Alten dagegen machten sich längere Zeit hindurch rauh, schrumpften förmlich zusammen, wippten mit dem Schwanz bei den Ausleerungen und waren abgemagert. Die todten Jungen hatten alle schon nach zwei Stunden einen eigenthümlichen fauligen Geruch, die Alten nicht. Ferner fragt es sich, ob die Krankheit durchs Futter entstanden ist. Auch dies kann nicht sein, da ich voriges Jahr ebenso gefüttert und kein Weibchen oder Junges auf diese Weise verloren habe und da ferner die übrigen 15 Hähne, welche ich unten eben so füttere, ganz gesund sind. Auch würden ja dann die Jungen gleich anfangs gestorben sein und nicht, nachdem sie beim Füttern prächtig herangewachsen. Mir scheint vielmehr Folgendes die Veranlassung zu sein: Die Krankheit der Jungen ist eine besondere Seuche, welche durch das ausnahmsweise rauhe Wetter und die stete nordwestliche Windrichtung hervorgerufen wurde und wahrscheinlich durch die Bildung mikroskopischer Pilze (wie neuere Untersuchungen dies bei vielen Epidemien nachzuweisen unternehmen) fortgepflanzt wurde. Diese Pilzbildung ist befördert, vielleicht auch erzeugt worden dadurch, daß ich beide Stuben mit Schlämmkreide*) und Leimwasser hatte weißen lassen. Durch die kalte feuchte Luft sind die Leimtheilchen in Fäulniß übergegangen und haben das Uebel herbeigeführt. So nur kann ich mir erklären, daß in beiden Stuben zugleich dieselbe Krankheit aufgetreten ist. Die Krankheit der Weibchen ist dann, wie ich meine, zum Theil mit durch die eben bezeichnete Veranlassung, hauptsächlich aber durch Ansteckung gekommen, nachdem ein oder das andere Weibchen durch zu angestrengtes Eierlegen geschwächt und die Dürrsucht oder Schwindsucht bekommen hatte. Denn unten in meiner Stube ist dies doch mit einem frisch gekauften Weibchen der Fall gewesen.**) Freilich ist

*) Sollte auch vielleicht in der Schlämmkreide ein giftiger mineralischer Zusatz, etwa Bleiweiß, Zinkoxyd oder dgl. vorhanden gewesen und ein solcher die Ursache sein?

**) Dies würde freilich den Verdacht doch auch auf irgend einen Bestandtheil des Futters lenken. D. R.

dabei wieder merkwürdig, daß auf beiden Stuben die Krankheit zu gleicher Zeit aufgetreten. Die Ansteckung muß übrigens, nachdem die Krankheit epidemisch geworden, sehr nachhaltig sein, da von den Weibchen, die ich herunter genommen habe und in einzelnen Käfigen halte und die ganz munter aussehen, doch noch jetzt, nach drei Wochen, immer noch welche sterben. Wie ist nun aber solchen Kalamitäten vorzubeugen, die auch den eifrigsten Vogelfreund kopfscheu machen und ihm alle Lust rauben können? Ich bin so weit gewesen, daß ich schon alle Kanarienvögel wegzugeben und nie wieder einen Versuch mit ihrer Züchtung zu machen, beschlossen hatte. Aber wenn ich meine vom vorigen Jahre stammenden Hähne so sanft und lieblich schlagen höre, wenn ich beobachte, wie sie noch jetzt täglich sich vervollkommnen, dann scheint es mir wieder unklug zu sein, wegen eines einmaligen Unfalles „die Flinte ins Korn zu werfen". Vielmehr betrachte ich es nun als meine Hauptaufgabe, dies Vorkommniß völlig zu ergründen, um ihm aus dem Wege zu gehen, bezüglich Mittel gegen solche Uebel finden zu können. Da habe ich denn nun folgende Veranstaltung beschlossen und, soweit es geht, schon dieses Jahr auszuführen begonnen. In meiner Wohnstube habe ich bereits 20 Brutkasten hergestellt und kann deren noch 10 anbringen. Am 1. März setzte ich 10 gut beobachtete und geartete Weibchen mit 10 Hähnen in einzelne Käfige, nach 14 Tagen hatten sie Eier und ich steckte die 10 Hähne weiter zu 10 Weibchen und nach abermals 14 Tagen zu den letzten 10 Weibchen, so daß sie binnen sechs Wochen die Runde machten. Dann aber brachte ich auf die beiden Stuben oben unter dem Dache je 50 Weibchen mit je drei Hähnen zusammen, die Hähne hatte ich aber gut gezeichnet, und dies führte ich nicht früher als Mitte Mai, von welcher Zeit die Fenster Tag und Nacht geöffnet bleiben können, aus. Vorher hatte ich natürlich durch Chlorkalk und Schwefelsäure beide Räume wochenlang desinficirt, die Schlämmkreide durch Seifenwasser entfernt und zwei- oder dreimal mit Kalk und Milchwasser weißen lassen. Nistkästchen und Sprunghölzer wurden sämmtlich neu hergestellt. Sollte sich nun dennoch ein Anzeichen dieser heimtückischen Krankheit zeigen, dann fange ich sofort die Hähne heraus, nachdem ich auch jedes kranke Weibchen entfernt, und stecke sie nicht eher wieder hinein, als bis keine weitere Verbreitung eingetreten.

Nun aber ersuche ich alle Kanarien- und Vogelzüchter überhaupt, ihre Erfahrungen und Ansichten in dieser Angelegenheit erkennen geben zu wollen, um vielleicht noch andere Wege der Abhülfe und vorerst eine Erklärung des Uebels zu finden. Nachdem ich Jahre lang mich mit dem Aufziehen und dem Züchten ausländischer und inländischer Vögel beschäftigt habe, bin ich zu der Ueberzeugung gekommen, daß die Kanarienvogelzucht von allen die interessanteste und lohnendste ist. Deshalb ist es ja höchst wünschenswerth, daß sie immerfort durch gegenseitige Mittheilungen befördert und gegen solche Mißgeschicke, wie ich sie beschrieben, gesichert werde.

Dr. Meißner in Frankfurt a. O.

Anderweitige Liebhabereien.

Züchtungsversuche mit einem Aquarienbewohner, dem Axolotl (Ambystoma Axolotl).

(Schluß.)

Durch gute Kost hatte ich meine beim Empfang ziemlich abgemagerten Axolotls bald zu üppiger Fülle gebracht, und zu Anfang d. J. 1870 waren es kräftige und wol ausgewachsene Thiere. — Im Februar 1870 bemerkte ich eine auffallende Unruhe unter meinen Lurchen, das Weibchen schwamm lebhaft im Wasser auf und ab, vom Männchen eifrig verfolgt, und dabei konnte ich eine starke Anschwellung des Afterrandes beim Weibchen deutlich wahrnehmen. Dieselbe Erscheinung wiederholte sich den zweiten Tag, dann trat wie zuvor Ruhe ein, welche indeß nicht von langer Dauer war. Wenige Tage später zeigte das Weibchen minder große Unruhe, hing sich behend von Zeit zu Zeit an Pflanzenstiele oder Felskanten und heftete an dieselben, mit den Hinterfüßen den starken Leib sanft streichend, lange Ketten von weißlichen Eiern in der Größe eines Hirsenkornes und umgeben von einer durchsichtigen Schleimhülle.

Meine Freude war groß, täglich beobachtete ich und konnte schon nach 3 bis 4 Tagen einen Fortschritt in der Entwicklung deutlich wahrnehmen. Die äußere Schleimhülle dehnte sich mehr und mehr aus, und das eigentliche Ei nahm eine immer länglichere Form an, bis schließlich die des alten Thieres in kleinsten Verhältnissen erreicht und die Kiemenbüschel deutlich sichtbar waren. Von diesem Augenblicke an konnte man auch Leben bemerken, die Thierchen suchten die Hülle, welche sie noch umfing, zu sprengen, was ihnen auch nach 18 bis 20 Tagen, von dem Tage des Legens an gerechnet, gelang.

Ich hatte nun gleichzeitig weit über hundert junge Thiere, und jetzt galt es für dieselben zu sorgen.

Die Länge der ausgeschlüpften Axolotls betrug ungefähr $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{2}$ Zoll rheinisch, und das Köpfchen glich in der Größe dem Knopfe einer starken Stecknadel. Daß es unter solchen Umständen seine Schwierigkeiten hat, für zweckdienende lebende Nahrung zu sorgen ist wol nicht zu bestreiten. Ich überließ eine Anzahl der jungen Thiere bei den Alten sich selber, eine andere Anzahl brachte ich in ein gesondertes Becken und beschaffte mir aus einem Teiche, dessen Wasser ich in Anbetracht seines starken Pflanzenbestandes für reich an Infusorien und anderen kaum sichtbaren Thierleben halten durfte, Wasser sowol als auch Pflanzen zur Füllung desselben. Beide Becken beobachtete ich nun regelmäßig und nahm auch in den ersten Tagen einen, wenn auch nur unbedeutenden Fortschritt in der Entwicklung wahr. Bei aller Pflege und Aufmerksamkeit

gelang es mir indeß nicht, auch nur eins der Thierchen groß zu ziehen, vielmehr waren nach Verlauf von drei Wochen auch die Letzten abgestorben.

Einige Wochen später wiederholten sich mit meinen alten Axolotls dieselben Vorgänge, ich that abermals das Mögliche, um die Eier und später die jungen Thiere zweckmäßig zu versorgen, allein mit demselben Mißerfolg. Nachdem es mir auch in den nächsten zwei Jahren trotz aller Mühe nicht anders gelang, habe ich von weiteren Zuchtversuchen Abstand genommen. Dennoch glaube ich zuversichtlich, daß, wenn man nur in der Lage ist, die jungen Thierchen oder schon die Pflanzenstengel mit den Eiern in einen Wiesentümpel oder ein Gartenbassin versetzen zu können, wo Wasser und Thiere den Einwirkungen der freien Luft ausgesetzt sind, es höchst wahrscheinlich gelingen würde, günstige Ergebnisse zu erzielen. Daß unter Umständen die Zucht in Anbetracht der sich mehr und mehr Bahn brechenden Aquarien-Liebhaberei, auch einträglich sein kann, beweist schon der zur Zeit noch so hohe Preis von 2 bis 3 Thlrn. für das Stück. Sollten diese Zeilen dazu beitragen, einen oder den anderen der geehrten Leser zu erneuten Versuchen einzuladen, so würde der Zweck derselben, die Aquarien-Liebhaberei zu fördern, erreicht sein.

Ernst Dulitz, Kaufmann in Berlin.

Der Axolotl oder Kiemenmolch wurde von den Ureinwohnern Mexikos massenweise gefischt, weil er zu ihren beliebten Nahrungsmitteln gehörte. Alexander von Humboldt beschrieb ihn nach den Mittheilungen von Hernandez. Im Pariser Akklimatisationsgarten hat man die Axolotls zuerst aus Mexiko eingeführt; jetzt aber züchtet man sie dort bereits zu Tausenden und verkauft sie für die Zimmeraquarien, in denen sie sehr beliebt sind. Uebrigens hatte Herr Keitel sen. in Berlin ein Exemplar eine lange Reihe von Jahren am Leben erhalten und regelmäßig auf den Ausstellungen des Berliner Akklimatisationsvereins vorgezeigt. Jetzt glaube ich, ist dieser Ehrengast jener Ausstellungen aber endlich todt. D. R.

Das Tauben-Preisfliegen auf der internationalen Ausstellung zu Bremen.

Das Preisfliegen der Brieftauben von Bremen nach Elberfeld erregte die Aufmerksamkeit der Bremenser und aller Gäste, die hier verweilen, in einem ganz besonderen Grade. Die Leitung ging vom Elberfelder Brieftaubenverein aus. Den konkurrirenden Vereinen und deren Vertretern wurden vom leitenden Verein zwei genau geregelte Uhren übergeben, nach denen die Zeit des Abfliegens und der Ankunft der Tauben bestimmt werden sollte. Laut Telegramm des Delegirten des Elberfelder Brieftaubenvereins wurden die Tauben um 11 Uhr 5 Minuten hiesiger Zeit aufgelassen. Das Wetter war bei etwas Nordwind schön. Die zwei ersten Tauben trafen um 2 Uhr 10 Minuten ein. Diese Tauben, der Gesellschaft „Fauna und dem „Elberfelder Brieftaubenverein" angehörend, legten die Strecke von 34,5 geographischen Meilen oder 234 Kilometern in 3 Stunden 5 Minuten zurück, eine Geschwindigkeit, die hier noch nicht vorgekommen und selten in Belgien dagewesen ist. Zu verwundern ist es, daß die Taube des Herrn Schmerfeld (Elberfelder Brieftaubenverein), welche den II. Preis errang, in diesem Jahre geboren und kaum 4½ Monate alt, eine so weite Tour in so kurzer Zeit zurücklegen konnte.

Nach dem bekannt gemachten Erlebniß errangen die Tauben der Gesellschaften

„Fauna", Elberfeld	mit 225	Tauben	25	Preise
„Brieftaubenverein", Elberfeld	„ 119	„	14	„
„Columbia", Barmen	„ 248	„	14	„
„Columbia", Cöln	„ 75	„	7	„
„Union", Rheydt	„ 22	„	—	„
	689	Tauben	60	Preise

Um 2 Uhr 32 M. waren sämmtliche 60 Preise errungen und um diese Zeit wurde der Konkurs geschlossen. Gestern Abend gingen die Preistauben mit einem Begleiter nach Bremen zurück, woselbst sie zwei Tage ausgestellt werden.

Bücher- und Schriftenschau.

(Fortsetzung.)

Die Thierwelt im zoologischen Garten von Berlin, geschildert von Dr. **Bodinus,** Direktor. Wol dürfen wir behaupten, daß dies Büchelchen von den zahlreichen Freunden dieser großartigen Naturanstalt, von zahllosen Freunden der Thierwelt mit gewisser Ungeduld erwartet wurde. Der harmlose Besucher des Gartens, gleichviel ob er nur im Naturgenuß dieser herrlichen Anlagen schwelgen, die feinste Gesellschaft Berlins aufsuchen wollte oder als wirklicher Thierfreund hier einkehrte, bedurfte jedenfalls eines Führers; nicht minder aber erschien ein solcher auch für den, der Thierstudien hier treiben wollte, für den Naturhistoriker, den Thierzüchter, Geflügelfreund, Landwirth, darstellenden Künstler, bis zum Naturkundigen von Fach, dem Ornithologen oder Zoologen überhaupt, durchaus nothwendig. Denn einerseits, angesichts der so überaus großartigen Entwickelung dieser zoologischen Anstalt und andererseits der unendlich regsamen Fortschritte aller Wissenschaft überhaupt — wer wollte da behaupten, daß er nicht eines Führers bedürfe! In unserer so regsamen Zeit ist es dringend geboten, daß jeder Wissenschafter sich zur ersprießlichen Beackerung ein abgegrenztes, mehr oder minder verhältnißmäßig kleines Feld wähle, wenn er etwas Tüchtiges leisten will — und für alles übrige, bedarf er selber ebenfalls näher oder ferner Liegende zur eingehenderen Unterrichtung eines Führers. Bei dem heutigen Umfange aller Forschung und Wissenschaft wird wohl schwerlich Jemand auf allen Gebieten des Wissens, ja kaum auf allen einzelnen Feldern der von ihm zum Studium erwählten einzelnen Wissenschaft durchaus zu Hause sein können. Der Ornithologe oder Vogelkundige wird sich schwerlich im Reiche der Kriechthiere mit gleicher Gewandtheit zurechtfinden und derjenige, welcher die Erforschung einer Vogelgruppe, z. B. der Raubvögel, sich zur Aufgabe gestellt, wird nicht mit gleicher Kenntniß in einer andern, z. B. der Wasservögel, Bescheid wissen.

Daher ist also ein Führer, zumal in einem so großartigen Institut, für alle Besucher in gleicher Weise durchaus nothwendig, und es fragt sich nur, ob derselbe auch in solcher Darstellung uns entgegen tritt, daß er seiner wichtigen Aufgabe durchaus entspricht.

Wollte ich als Kritiker hierüber Betrachtungen anstellen, so würden dieselben ganz von vornherein als überflüssig erscheinen, einfach durch die Erwägung, daß der Schöpfer so großartig schöner, so allgemein bewunderter und in den Augen Sachverständiger so durchaus zweckmäßig befundener Anlagen doch ohne alle Frage nicht allein dazu berufen, sondern auch im vollsten Maße befähigt ist, uns einen solchen Führer durch den Garten zu bieten. Demnächst werden wir auf die gesammte Thier- insbesondere aber Vogelwelt des Gartens an der Hand dieses Führers zurückkommen und zunächst eine allgemeine Uebersicht des Ganzen geben. Dr. R. R.

C. Hagenbeck's Handels-Menagerie in Hamburg

[384]

hat vorräthig: Dunkelrothe Arara; kleine gelbhaubige Inka-, Rosa- und Nasen-Kakadu, Graupapageien, große und kleine schwarze Papageien (Psittacus vazaund Psittacus niger), Amazonen- und Brillenpapageien; Rosella, Pennantis, Barraband-Sittiche, Kookpeppler, vielfarbige Sittiche, Singsittiche, gelbstirnige Neuseeländische Sittiche, Turquisinen, Nymphensittiche, gelbwangige Sittiche, junge Conurus jendaya; grauköpfige Inseparables, Sperlings-Inseparables; graue und Dominikaner-Cardinäle, Papstfinken, Safranfinken, Hartlaubzeisige, Golddistelfinken, Graupfäffchen, Diamantvögel, Zebrafinken, Pfaffenvögel, kastanienbrüstige Schilffinken, schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen, Muskatvögel, bunte japanesische Mövchen, Silberfasanchen, Bandfinken, Reisvögel, kleinste Elsterchen, Tigerfinken, Astrilds, Orangebäckchen, Atlasvögel, Paradies- und Dominikaner-Witwen, gelbschultrige Witwen, Goldweber, Fuchsweber, große Orangeweber, Feuerfinken, Napoleonsvogel, Sammetweber, Rothkopfweber, indische Gelbkopfweber (Ploceus bengalensis), amerikanische Spottdrossel, Paperling, Rothflügelstaare, Kuhstaare, Seidenstaare, Jamaika-Trupiale, Sonnenvögel; kleine und große Bea, chinesische Mynah, gemeine Mynah, weißohrige indische Staare, rothohrige Mynah, schwarze Büll-Büll, chinesische Heherdrossel, chinesische Spottvögel, Toucane, Pinck-Pinck (ein kleiner grüner Vogel aus Indien), Castmen Bull-Bulls (sehr schöne Sänger), Cissa birds, Flötenvögel, Blauheher.

C. Hagenbeck's
Handelsmenagerie,
das größte derartige Geschäft der Welt,
jetzt
[385] **Hamburg,**
St. Pauli, Neuer Pferdemarkt Nr. 13.

Einem hochgeehrten hiesigen und fremden Publicum die ergebene Anzeige, daß, weil die bisher Spielbudenplatz Nr. 19, benutzten Räumlichkeiten sich als unzureichend erwiesen, seit dem 1. Mai cr. meine Handelsmenagerie nach dem **Neuen Pferdemarkt Nr. 13** verlegte, während das Vogelgeschäft nach wie vor in dem alten Etablissement, Spielbudenplatz Nr. 19 verbleibt.

In den fast sämmtlich neu aufgeführten freundlichen und geräumigen Gebäuden und Volièren, wie sie die ca. 80,000 Quadratfuß großen Parkanlagen des heutigen Etablissements zeigen, sind die Thiere ähnlich den zoologischen Gärten untergebracht und befinden sich außer **15 Löwen** augenblicklich dort:

Königstiger, Panther, Leoparden, Bären
und andere Raubthiere,
Elephanten, Rhinoceros, Giraffen, Antilopen, amerikan. Riesenhirsche, Büffel,
eine Anzahl
afrikanischer und amerikanischer Strauße, verschiedene Kraniche,
40 Riesenschlangen
bis zu 20 Fuß Länge
vorrähig.

Ende dieses Monats trifft auch der
dritte diesjährige Thiertransport
(diese drei Transporte bildeten ursprünglich einen einzigen, der unter andern Thieren **27 Giraffen** zählte, doch war es nicht möglich, diese colossale Anzahl wilder Thieer mitsammen durch die Wüste zu bringen und eine Theilung dringend geboten) hier ein, welcher außer **16 großen Giraffen, Antilopen, Elephanten, Löwen, Leoparden, Hyänen** und viele andere seltene Thiere und **Vögel** auf hier bringt.

Bei günstiger Witterung werden stets Giraffen, Elephanten, Rhinoceros, Strauße, Kraniche 2c. in dem eigens dazu umzäunten Raume ins Freie gelassen.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

III. Jahrgang. Berlin, den 25. Juni 1874. Nr. 26.

Briefliche Mittheilungen.

— Heute hat bei mir ein Pärchen Dompfaffen in einem gewöhnlichen Heckbauer ein Junges erbrütet. Näheres demnächst. Dr. H. Müller in Berlin.

(Bereits im vorigen Jahre erwähnten wir die eigenthümlichen Züchtungs-Versuche des Herrn Dr. Müller. Dieser Vogelfreund im wahrsten Sinne des Worts hält seine Vögelchen, und zwar hauptsächlich Dompfaffen und Zeisige, von jeder Art mehrere Pärchen, in gewöhnlichen Kanarienvogel-Heckbauern. Durch die allersorgsamste Verpflegung aber und durch möglichst naturgemäße Behandlung vermag er diese beiden Vogelarten alljährlich zu einer oder mehreren Bruten zu bringen. Hoffentlich erhalten wir von ihm demnächst einmal eine ausführliche Schilderung. D. R.).

Aus den Vereinen.

Der Ornithologische Verein in Stettin.

Sitzung vom 20. Mai. Der dritte Schriftführer Herr Kaufmann Lischke zeigt an, daß er zur Wiederherstellung seiner Gesundheit eine längere Reise angetreten und bis zum nächsten Sommer die Theilnahme an den Versammlungen aussetzen müsse. An seiner Stelle wird Hr. Kaufmann Reimer und als Beigeordneter Herr Postinspektor Wernich gewählt. — Ein Schreiben des Mitgliedes Stadtrath Herrn Becker, den Schutz der Nachtigalen betreffend, wird der Sektion für Vogelschutz überwiesen. Die in der vorigen Sitzung vertagte Besprechung einer Sommerfestfahrt wird heute wieder aufgenommen. Da neue Vorschläge nicht eingegangen waren, empfiehlt Herr Kommerzienrath Toepffer eine Fahrt nach Berlin zur Besichtigung des Zoologischen Gartens u. s. w. als den Vereinszwecken besonders entsprechend, und lohnend werde. Nach längerer Debatte werden beide Anträge mit großer Majorität angenommen, und wird beschlossen, die Fahrt mittels eines Extrazuges Mitte Juni anzutreten. — Die eingegangene Frage: „Wie ist der richtige Name des Vogels Bülow und wo hält er sich vorzugsweise auf?“ beantwortete Herr Hauptmann Bödecker dahin. Der richtige Name dieses Vogels ist Pirol, auch Goldamsel oder Pfingstvogel genannt (Oriolus galbula). Beim Männchen sind Zügel, Flügel und Schwanz der Hauptsache nach schwarz, die übrigen Theile prächtig hochgelb. Ein gelber Flecken ziert die Wurzeln der Schwungfedern und die Spitzen der Steuerfedern. Das Weibchen ist oben zeisig-grün, unten weißlich mit hellaschgrauem Vorderhalse und grauschwarzen Längsflecken. Das Auge ist karminroth, der Schnabel schmutzig roth, die Füße bleigrau. Der Name Pfingstvogel ist insofern passend gewählt, als der Pirol erst gegen Pfingsten hier bei uns eintrifft. Seinen Aufenthalt wählt er vorzugsweise in Laubwäldern; Eichen- und Birkenwaldungen sind seine Lieblingsplätze. Von hier aus kommt er gern in die Gärten an Dörfern und Städten, dagegen hält er sich in Nadelwäldern immer nur vorübergehend auf. Er ist ein scheuer, wilder und unstäter Vogel, welcher sich immer den Augen der Menschen zu entziehen sucht, ob er gleich in ihrer Nähe wohnt. Er kommt nur selten in niedriges Gebüsch und noch seltener auf die Erde herab. Kerbthiere der verschiedensten Art, namentlich aber Raupen und Schmetterlinge, Würmer und Beeren bilden die Nahrung des Pirols. Er gehört zu den fleißigsten Sängern des Waldes. Man hört ihn bereits vor Sonnenaufgang und mit wenig Unterbrechung bis gegen Mittag hin und vernimmt ihn von neuem, wenn die Sonne sich neigt. Ein einziges Pirolpaar ist fähig, einen ganzen Wald zu beleben und die Aufmerksamkeit zu erregen, wie wir es in unsern Anlagen alljährlich wahrnehmen können. Sein Nest, welches stets in der Gabel eines schlanken Zweiges aufgehängt wird, ist ein höchst künstliches und besteht aus halbtrockenen Grasblättern, Halmen, Ranken, Birkenschale, Moos, Spinngewebe, Raupengespinnst und ähnlichen Stoffen, ist tief napfförmig und wird inwendig mit feinen und stellt bei etwaiger Annahme seines Vorschlages gleichzeitig den Antrag, einen Zuschuß aus der Vereinskasse zu bewilligen, damit die Fahrt in jeder Beziehung interessant Grasrispen oder mit Wolle und Federn ausgepolstert. Fäden werden mehrere Male um eine Astgabel gewickelt, bis die schwebende Grundlage des Baues hergestellt ist, worauf das Uebrige dazwischen geflochten und gewebt wird. Eigenthümlich ist noch, daß ein Pirolpaar, wenn ihm die erste Brut zerstört wird, zum zweiten Male nistet, daß es dagegen zu keiner zweiten Brut schreitet, wenn ihm die Jungen geraubt werden. Eine zweite Frage: „Welche verschiedenen Arten fremdländischer Vögel eignen sich vorzugsweise für eine größere Voliere, zu der wenig Sonne gelangt und die im Winter nicht heizbar ist?“ wird dahin beantwortet, daß sich dazu nur Wellen-, Karolinen- Alexander- und Halsbandsittiche eignen, ferner Nymphen- und Portoriko-Papageien, Kardinäle, die großen Weber, Goldzeisige, Papstfinken, Kuhstaare u. a. m. — Ausgestellt waren vom Klempnermeister Rohnke, sogen. Satzkäfige in Größe der Gimpelbauer für junge Kanarienhähne eingerichtet. — Aufgenommen werden zehn Mitglieder, zur Aufnahme vorgeschlagen acht Personen.

Briefwechsel.

Herrn Dr. Seeger in Königsberg: Mit gutem Gewissen können wir Ihnen die Versicherung geben, daß die von Herrn Nill, Inhaber des Thiergartens in Stuttgart, versendeten Bruteier einerseits durchaus reell und zuverlässig abgegeben und andererseits in der zweckmäßigsten Weise versendet werden. - Herrn G. Altona in London: Ihren werthvollen Beitrag mit bestem Dank empfangen. — Herrn E. F. in N.: Warum denn anonym? Lesen Sie gefälligst den Aufsatz „Das italienische Huhn“ in den Nrn. 20—22 d. J. nach. Ebenso sind bereits zahlreiche Quellen zum Bezug des besten Sommerrübsens hier gegeben worden. Herr Reiche nannte Herrn Carl Capellen in Hannover und Herr Böcker hat im Laufe der Zeit mehrere zuverlässige Lieferanten empfohlen. — Herrn Fabrikant C. Korte in Herford: Beitrag mit Dank empfangen.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

[386]

Gesucht wird: 1 nistfähiges Pärchen Grauedelfinken. Männchen muß aber guter Sänger sein. Franco-Offerten sub S. N. 15 besorgt die Expedition.

Wegen bevorstehenden Umzugs sind abzugeben:

1 Pärchen Safranfinken, M. u. W., à 4 Thlr. 15 Sgr.,
1 „ Paradieswittwen „ à 4 „
1 „ Napoleonsvögel „ à 3 „ -15 „
1 „ Bandvögel „ à 2 „
1 „ Hartlaubszeisige „ à 6 „
2 Stück Graupfäffchen (Sp. intermedia) beide Männchen und vorzügliche Sänger 6 Thlr.,
1 „ Silberfasanchen, M., à 1 Thlr.,
1 „ Tigerfinkchen, M., ausgezeichneter Schläger, à 2 Thlr.,
1 „ Astrild, M., à 1 Thlr. 15 Sgr.

Sämmtliche Vögel sind gesund und im besten Gefieder. Offerten sub A. H. Nr. 100 besorgt die Expedition ds. Bl. [387]

Waidmann hab' Acht!

4 junge Möpse, 2 Hunde und 2 Hündinnen, habe zum Verkauf.

Dieselben sind von meiner preisgekrönten Hündin gefallen.

E. Genpel-White,
[388] Leipzig.

Das Etablissement von Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180 St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen folgende Thiere erhalten:

12 Paar Loris von den blauen Bergen,
40 Paar Inseparables,
20 Graupapageien,
9 Paar Port. Lincolnsittiche,
26 Paar Buntsittiche,
11 Paar Wellensittiche,
13 Paar rosa Kakadus,
20 Paar Astrilds,
40 Paar Orangebäckchen,
60 Paar Amarantvögel,
50 Paar Schmetterlingsfinken,
60 Paar Diamantvögel,
80 Paar Bronzemännchen,
10 Paar größte Elsterchen,
10 Paar Bandfinken,
20 Paar Atlasvögel,
40 Paar Paradieswittwen,
30 Paar Dominikanerwittwen,
45 Paar Feuerfinken,
12 Paar große Webervögel.

Außerdem: [389]

1 Paar Grunzochsen, 1 Axishirsch, verschiedene Affen und 3 Schnenmons.

Die Großhandlung exot. Vögel und Naturalien

von Karl Gudern,

[390] **Leipzig** und **Wien,**

empfiehlt Band-, Tiger-, Schmetterlings-, Zebra-, Diamant-, Pfaffen-, Muskat-, Schilf-, Reis-, Atlas-, Safran-, Edel- und Papstfinken, Astrilds, Schönbürzel, Orangebäcks, Goldbrüsteln, Amaranten, drei Arten Elsterchen, weiss- und schwarzköpfige Nonnen, weisse und gefleckte Mövchen, Silberbecks, weisse und gefleckte Reisfinken, Paradies- und Dominikaner-Witwen, Blutschnabel-, Rothkopf-, Feuer-, Napoleons-, Swainson-, Madagaskar-, Textor-, Larven-, dopp. Orange- und dottergelbe Kernbeisserweber, Hartlaub- und Magellanzeisige, kanarische Kanarien, Gaupfäffchen, Karmingimpel, rothe, graue und grüne Cardinäle, Kalanderlerchen, Kappenammern, Heuschrecken-, China-, Kuh- und jap. Staare, Jamaika-, gold- und schwefelgelbe Trupiale, Glanz-, Spott-, Waldroth-, Wander-, Katzen-, Stein- und Blaudrosseln, Büll-Bülls, Sonnenvögel, Scharlach- und siebenfarbige Tanagras, Kapp-, Ruf-, Perlhals-, Sperlings-, Rost-, Sperber-, Bronce-, Wander- und Nicobartauben, kalif. und virg. Wachteln, Francolinhühner, amerik. Blauheher, Flötenvögel, Wellen-, Gesellschafts- und Sperlingspapageien, Jakos, Amazonen-, Portoriko- und Surinampapageien, Nasen-, Rosa-, Inka-, gelb- und weisshäubige Kakadus, Zwerg-, blaue und rothe Araras, Karolina-, Alexander-, Pflaumenkopf-, Mönch- und Tirikapapageien, Bunt-, Pennants-, Schön-, Sing-, Neuseeländer-, Nymphen-, und vielfarbige Prachtsittiche, Edel- und blaue Gebirgslorys.

Ferner habe vorräthig: Eidechsenschlangen (Pseudopus Pallasii), Leopardenschlangen (Colap Leopardina), Katzenschlangen, vierstreifige Nattern, Smaragdeidechsen, grosse und kleine Schildkröten etc.

Ausserdem werden alle Arten Sämereien für exot. Vögel, besonders Hirse in Kolben, alger., Senegal- und indische Hirse, Nistgegenstände etc. empfohlen.

In meiner

Vogel- und Thierhandlung

sind jetzt vorräthig: **100 Paar rothe Kardinäle, rothe** und **graue Spottdrosseln, rothbrüstige Kernbeißer, virginische Wachteln** und **Morgenfinken.**

Rudolf Schöbel,
Vogel- und Thierhändler aus Amerika.

[391] Villa Schöbel, Grünau, bei Berlin.

---

[392] **Die Zoologische Handlung** von H. Hromada-Dresden, Schießstraße 10, Eckladen, versendet unter Garan, tie des guten Ankommens alle Sorten überseeischer Vögel, Papageien, zahme Affen, feine Harzer Kanarienvögel, feine ungarische David-Sprosser, blau und rothe Einsame Spatzen, feine Hühner und Tauben, sowie Goldfische in schöner rother Färbung, 100 Stück 16 Thlr., Schildkröten, Tuffsteine Ctr. 2½ Thlr., Ameisen und Vogelfutter bei billigen Preisen und reeller Bedienung. Preislisten gratis.

---

4 gesunde und fehlerfreie Rothkopfweber, Ploceus erythrops, (3 Männchen, 1 Weibchen) für 6 Thlr. inkl. Emballage, hat abzugeben **C. B. Madsen**
[393] in Tondern, Provinz Schleswig.

Fischottern, drei diesjährige junge lebende, zwei Weibchen, ein Männchen, sind à 4 Thlr. per Stück abzugeben bei Theodor Mayer in Streitberg, Bayern, Hausnummer 46. [394]

Ein junger, ziemlich ausgewachsener **Uhu** ist preiswürdig zu verkaufen durch

Apotheker **Borchardt**
[395] in Berent, Westpreußen.

Zu verkaufen:

ca. 30 junge Wellensittiche, meistens Nachkommen von direkt importirten Thieren à Paar 6 Thlr., bei Mehrabnahme billiger.

3 Paar Madagaskar-Weber in Pracht à 8 Thlr.,
3 „ Orange-Weber in Pracht à 4 Thlr.,
2 „ Napoleons-Weber in Pracht à 5 Thlr.,
1 „ Paradieswitwen à 4 Thlr.,
1 „ Dominikanerwitwen à 4 Thlr.,

eine Partie **neue** Schleusinger Nistkasten Nr. 2, 3 u. 4.

Oscar Vetter in Ludwigsburg,
[396] in Württemberg,

Gesucht werden richtige, nistfähige Paare (keine Geschwister) von Nymphen, Rothrumpf- oder Singsittichen, Goldweber (Pl. textor), Maskenweber (Pl abyssinicus), Goldgilbweber (Pl. aureoflavus), Scharlachweber (Pl. madagascarensis), Baya (Pl. Baya), Sammetvogel (Pl. capensis), ferner californische Wachteln. Offerten mit Preisangabe erbittet Wilckens, Stephanienstraße 44
[397] in Karlsruhe.

Ein sprechender, zahmer, weißstirniger Portoriko-Papagei wird um den billigen Preis von 9 Thlrn. abgegeben.
[398] Fr. Ohr, Ansbach (Bayern).

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 2 Juli 1874. Nr. 27.

Inhalt:

Aufzucht der amerikanischen Spottdrosseln. —
Ueber die Kennzeichen des Alters und des Geschlechts unserer einheimischen Stubenvögel. —
Deutsche Vögel in Amerika. —
Freifliegende Kanarien. —
Stubenvogelzucht als Erwerb. (Fortsetzung.) —
Weiteres über die Fruchtbarkeit der Bastarde. —
Noch Weiteres zur Bastardzucht. —
Das Geflügel auf der Internationalen Landwirthschaftlichen Ausstellung in Bremen.
Aus den Vereinen: Köln (Fortsetzung). —
Briefwechsel. —
Berichtigung. —
Anzeigen. —

Aufzucht der amerikanischen Spottdrosseln.

In den Südstaaten Nordamerikas werden diese Drosseln sehr zahlreich aus den Nestern genommen und von den Händlern aufgekauft und aufgefüttert. Als Aetznahrung erhalten dieselben gekochte Kartoffeln zu zweidrittel und hart gekochte Eier zu eindrittel Theilen. Beides wird vermittelst eines hölzernen Stopfels so lange gestampft, bis es eine zusammenhängende Masse bildet. Dieses Futter wird von den Vögeln gern gefressen und dabei gedeihen dieselben ganz vortrefflich. Sobald sie allein fressen können, werden sie entweder an Großhändler in Newyork gesandt oder auch selber von den Händlern nach den nördlichen Staaten gebracht und dort einzeln verkauft. Ich kam mehrmals mit diesen Leuten zusammen, die eine bedeutende Anzahl junger Vögel in großen, flachen Käfigen zusammengepfercht hatten. — Die Vögel waren jedoch in der Regel durchgehends gesund. Ich schreibe dies namentlich dem Atzfutter zu, welches leicht verdaut wird und sehr nahrhaft ist. Auch bekommen die Vögel dabei nicht so leicht Durchfall wie bei der in Deutschland vielfach zur Aufzucht verwandten Semmel und Milch. Später füttert man in Amerika die Spottdrosseln meistens mit einem dem in Nr. 3, Jahrg. 1873 der „Gefiederten Welt" beschriebenen rheinischen Nachtigalenfutter ähnlichen Gemenge; doch mischt man gewöhnlich einen starken Theil gemahlenen Hanf bei. Viele vereinfachen dies Futter mehr oder weniger, manche nehmen blos gestoßene Semmel, Hanf und Herz, und feuchten die Mischung anstatt mit Baumöl, mit ungesalzenem Schweinefett an. Zur Abwechselung mischt man zuweilen etwas geriebene Morrübe bei; auch Schoten vom rothen Pfeffer reicht man hin und wieder, welche angeblich zur Magenreinigung dienen sollen. Alle derartigen, mehr oder weniger ähnlichen Mischungen werden von den Vögeln gern gefressen, doch glaube ich kaum, daß sie ohne Weichfutter auf die Dauer dabei bestehen können. Soviel weiß ich, daß Vögel, denen man Kartoffeln und Ei als Zukost oder auch allein füttert, bedeutend fleißiger singen als diejenigen, die mit trockenem Futter allein ernährt werden. Da die Erlangung von Ameiseneiern für viele im Auslande lebende Liebhaber häufig unmöglich ist, so wäre es im Interesse derselben gewiß erwünscht, wenn recht zahlreiche Versuche angestellt würden, wie man die Insektenfresser auch ohne Ameiseneier erhalten kann. Vielleicht könnte man das oben angegebene Weichfutter dadurch verbessern, daß man Kartoffeln und Eier fein zerriebe und dann abwechselnd Eierbrot, Käsequark, gemahlenen Hanf, Morrübe, Fleisch u. dgl. zusetzte. Auch bei der von Herrn H. R. in diesem Blatte (Nr. 9 v. J.) angegebenen Kartoffelfütterung könnte man vielleicht die Ameiseneier durch Zusatz von Eierbrot und Käsequark ersetzen, und dann wäre dies Futter seiner Einfachheit und Billigkeit wegen sehr zu empfehlen.

Erlauben möchte ich mir noch die Anfrage, ob Herr H. R. unter Weizenkleie die in Thüringen vielfach gebrauchte Vogelkleie oder gewöhnliche beim Sieben des Mehls zurückbleibende Kleie versteht*).

G. Altona in London.

Ueber die Kennzeichen des Alters und des Geschlechts unserer einheimischen Stubenvögel.

Es ist eine gar nicht seltene Erscheinung, daß Liebhaber von Stubenvögeln, die jahrelang verschiedene Arten derselben besessen haben, über die Merkmale des Alters und des Geschlechts derselben sehr wenig unterrichtet sind. Manche sind nur im Stande, den männlichen Singvogel an seinem Gesange zu erkennen, andere rupfen den aus dem Neste entnommenen Vögeln an bestimmten Stellen die Federn aus, um aus der Farbe der nachwachsenden Federn auf das Geschlecht zu schließen. Diese Liebhaber sind denn auch nicht im Stande, wenn der Vogel sich nicht etwa bei ihnen im ersten Jugendkleide befunden hat, auf das muthmaßliche Alter zu schließen. Auch die meisten Lehrbücher geben bei aller sonstigen Reichhaltigkeit ihres Inhalts nicht immer die erforderliche Auskunft. Es heißt da bezüglich der Geschlechtsmerkmale nicht selten: „das Weibchen hat eine plumpere Gestalt", oder „das Weibchen hat blassere Farben", oder auch „das Weibchen ist etwas kleiner". Ich erlaube mir daher, das Kennzeichen des Alters und Geschlechts derjenigen Stubenvögel, die ich selbst zu untersuchen Gelegenheit hatte, nachstehend mitzutheilen.

Es ist bei den meisten unserer einheimischen Stubenvögel nicht schwer, zwischen dem jungen Vogel, der die erste Mauser noch nicht überstanden, und dem älteren derselben Art zu unterscheiden. Nach dieser Zeit hört der frühere bedeutende Farbenunterschied bei den meisten Arten unserer einheimischen Singvögel auf und das höhere oder geringere Alter läßt sich dann annähernd nur an den stärker oder schwächer beschuppten Füßen und an dem mehr oder weniger ausgebildeten Gesange erkennen. Jüngere Vögel haben im ersten Jahre einen fast glatten Fuß, die Schuppen sind nicht ausgebildet; selbst im zweiten Jahre noch sind die Schuppen klein, in späteren Jahren werden sie nicht allein größer, ihre Farbe ist auch dunkler, die Klauen sind länger und stärker geworden und bei sehr alten Körnerfressern findet sich wol an der Schnabelspitze ein Häkchen. An den Zehen älterer Vögel finden sich ferner viele kleine Schuppen. Der Gesang unserer einheimischen Singvögel beginnt bekanntlich im ersten Lebensjahre mit einem leisen Quirlen; vor dem nächsten Winter ist ein junger Vogel in der Regel zum lauten Gesange nicht befähigt. Im zweiten Lebensjahre singt der Vogel in der Regel noch ziemlich mittelmäßig, aber die einzelnen Strophen seines Liedes hängen besser zusammen, wie in späteren Jahren. Nach der zweiten Mauser muß er den Gesang von Neuem wieder eindichten; erst nach der dritten Mauser beginnt er in der Regel sein Lied ohne weiteres Studiren mit den gewöhnlichen Strophen seines Gesanges. Es gilt dies namentlich von Nachtigalen und von Kanarienvögeln, nicht aber von solchen Vögeln, die, wie die Sing- und die Schwarzdrossel, im Herbste regelmäßig nur einen leisen Gesang hören lassen.

Auch der Lockton ist bei jungen und alten Vögeln in der Regel verschieden. So lockt z. B. die junge Nachtigal auch noch nach der Mauser und bis nach Weihnachten hin nicht wied kra, sondern ciss kra.

Wo man im Freien einen vortrefflichen Sänger hört, da läßt sich in der Regel annehmen, daß man es mit einem mindestens dreijährigen Vogel zu thun hat. Derartige Vögel lassen sich denn auch meist schwer fangen; nicht selten ist alle Mühe, die man sich dieserhalb giebt, vergebens.

Ob ein Vogel viel älter als drei Jahre ist, läßt sich aus seinem Gesange und Aussehen wol nicht bestimmen; ich glaube indeß nicht, daß es in der Freiheit viel ältere Vögel giebt. Die Vermehrung müßte sonst eine stärkere sein und dann halten sich bekanntlich auch manche Stubenvögel, selbst wenn sie alt eingefangen, bei zweckmäßiger Pflege viele Jahre lang noch in der Gefangenschaft. So besitzt z. B. einer meiner Nachbarn eine alt eingefangene Schwarzdrossel seit 15—16 Jahren und der Vogel singt heute noch so fleißig und beinahe auch ebenso schön, wie vor 13 Jahren, als ich ihn zum ersten Male hörte.

Die Kennzeichen des Geschlechts anlangend, so läßt sich wol als Regel annehmen, daß die vorherrschende Farbe beim Männchen intensiver ist. Während der Brutzeit und bis zur Mauser hin ist außerdem fast jeder männliche Wildling an dem stärkeren rundlichen, nach vorne gerichteten Zapfen zu erkennen. Der Zapfen des Weibchens ist breiter, nach hinten gerichtet. Es gehört indeß einige Uebung dazu, diese Unterschiede zu erkennen. So viel im Allgemeinen; ich gehe nun zu den einzelnen Arten über.

Die Nachtigal. Junge, unvermauserte Nachtigalen lassen sich von älteren bekanntlich leicht unterscheiden; die zahlreichen weißgelben Flecken auf dem rostgrauen Oberkörper und die rostgelbe, dunkelbraun gesprenkelte Farbe der Unterseite verlieren sich schon in der ersten Mauser. Die Geschlechter vermag nur ein kundiges Auge mit Sicherheit zu unterscheiden. Ich habe mehrfach Gelegenheit gehabt, Männchen und Weibchen genau zu vergleichen. Im Jahre 1870 besaß ich zwei vermauserte Vögel, von denen der eine bestimmt ein Männchen, der andere ein Weibchen war. Die Haltung des Weibchens war eine mehr wagerechte, der Rücken grader, nicht so gewölbt, wie beim Männchen; Hals und Beine waren beim Weibchen dünner. In der Größe des Kopfes und des Schnabels war ein Unterschied nicht zu bemerken. Die Farbe des Männchens war am

*) Natürlich die letztere. D. R.

ganzen Oberkörper dunkler, bräunlicher, beim Weibchen fahler. Die Farbe des Weibchens spielte am Kopfe etwas in's Röthliche, beim Männchen war sie schön tief kaffebraun. Die Halsseiten des Weibchens hatten einen leicht erkennbaren grauen Anflug, der dem Männchen ganz fehlte. Die äußere Fahne der Flügelfedern war beim Männchen von einer schönen bräunlichen Farbe, beim Weibchen merklich fuchsiger, der innere längere Bart der Flügelfedern spielte beim Männchen in's Schwärzliche, beim Weibchen entschieden in's Graulichе. Die untere Seite namentlich der Brust war beim Weibchen etwas heller; die Farbe der Kehle aber und des Unterleibes war beim Weibchen trübweiß, weißgrau, beim Männchen fast weiß und namentlich war der Unterleib des Männchens fast rein weiß, die Unterschwanzdeckfedern waren beim Männchen lebhafter gelb gefärbt, wie beim Weibchen. Die kleinen Schuppen der Augenringe waren beim Männchen größer; in der Größe der Augen war kein Unterschied zu bemerken; der Ausdruck des Auges war aber bei beiden Vögeln ein anderer. Das Weibchen hatte einen träumerischen Blick, das Männchen ein feuriges Auge. Schwänzchen waren nicht mehr vorhanden; ich habe aber bei früheren Vergleichen gefunden, daß der Schwanz beim Männchen etwas länger und breiter, die Farbe desselben bei diesem schön rostbräunlich, beim Weibchen entschieden mehr rostroth ist. Der Zapfen war beim Weibchen ziemlich entwickelt, aber nach hinten gerichtet; beim Männchen war er wegen der Fettleibigkeit des Vogels kaum zu bemerken. Bei einer anderen männlichen Nachtigal habe ich aber den Zapfen doch stärker entwickelt, auch mit der normalen Neigung nach vorn, gefunden.

Von zwei unvermauserten Jungen verschiedenen Geschlechts, welche ich vor Jahren im Juli erhielt, weiß ich nur, daß das Männchen sich durch eine stolzere Haltung und die längeren Beine, sowie durch den breitern, dunkler gefärbten Schwanz von dem Weibchen unterschied. Im Uebrigen sollen im Neste die dunkleren und röthlicheren Vögel die Weibchen sein; ich habe aber keine eigene Erfahrung darüber, möchte übrigens auch gar Niemanden zu Nestlingen von dieser Art rathen, da sie, wie häufige Erfahrung gelehrt hat, durchweg sehr mittelmäßige Sänger werden. (Fortsetzung folgt)

Deutsche Vögel in Amerika.

In Cincinati wurden unlängst, wie man von dort berichtet, eine Anzahl aus Deutschland eingeführter Vögel in Freiheit gesetzt. Die Art und Weise, wie sich die Thierchen dabei benahmen, ist eigenthümlich. Die Lerchen hielten sich fast gar nicht in der Nähe auf, sondern schwangen sich meistens, sobald sie ins Freie gelangten, in die Höhe und verschwanden bald aus dem Gesichtskreise der Anwesenden. Die verschiedenen Finken- und Meisenarten hingegen vergnügten sich auf den in der Nähe stehenden Bäumen in der ungebundensten Weise und benahmen sich dabei, als hätten sie schon lange daselbst sich heimisch gefühlt. Auch die Drosseln, von denen ein Theil schon am Samstag in Freiheit gesetzt wurde, scheinen an dem ihnen angewiesenen Aufenthaltsorte Gefallen zu finden. Von den im letzten Frühlinge in Freiheit gesetzten Edelfinken haben dieser Tage die ersten wieder ihre letztjährige Brutstätte, auf Waltnut Hills, aufgesucht. Auch an anderen Orten sollen dieselben sich wieder gezeigt haben.

Freifliegende Kanarien.

Einer meiner Freunde hat mir ein Vergnügen bereitet, dessen Darstellung den Lesern vielleicht interessant sein möchte. Derselbe, Administrator des Ritterguts Benndorf bei Halle, ist bereits seit mehreren Jahren im Besitze von Kanarienvögeln, welche er in einem Zimmer herumfliegen ließ. Die Pflege dieser Vögel war augenscheinlich weniger auf die Erzielung hervorragender Schläger, als auf recht große Vermehrung insonderheit der grüngefärbten Vögel gerichtet. Zu Ende des verflossenen Sommers befanden sich in dem Zimmer etwa 50—60 Köpfe größtentheils dunkelgrüner Vögel vor, welche darin den allerdings gelinden Winter bei sehr einfachem Futter — Bruchhafer, Sommerrübsen und etwas Glanz — ohne Heizung vorzüglich gut überstanden haben. Zu diesen Vögeln waren im Laufe des Sommers die in einem besonderen Raume gezüchteten Bastarde von Hänflingshähnen und Kanarienweibern hinzugesetzt. Vor einigen Tagen führte mich eine Reise in die Nähe von Benndorf und zufällig traf ich bei Gröbers den Freund, welcher mich einlud, die neue Einrichtung seines Gartens zu beschauen. Mehrfachen auf dem Wege nach dem Garten an ihn gerichteten Fragen nach den Kanarien und seinen sonstigen Vögeln wich er geschickt aus. Wir betraten den Garten und nahmen in der nächsten Laube Platz, beschäftigt mit Erörterungen aus dem Gebiete der Landwirthschaft und des Gartenbaues. Plötzlich fällt es mir auf, daß sich andere Vogelstimmen in nächster Nähe vernehmen lassen, als solche sonst in unseren Gärten laut werden. Aufmerksamer zuschauend sehe ich eine bedeutende Anzahl der schöngrünen Kanarien im Grase, in den umstehenden Büschen, auf den nahen Bäumen und am Weinspalier. Fröhlich lassen die Hähne ihre Weisen erschallen, dazwischen ertönt das volle Lied der Nachtigal, ein Plattmönch singt auf einem über die nahe Mauer überhängenden Lindenzweige sitzend, im Röhrich des nahen Karpfenteichs hören wir einen Rohrsperling, kurz, ein ununterbrochenes Vogelkoncert so herrlich, wie ich es nie vernommen, umtönt uns; aus dem Gewirre der Stimmen von 50—60 Kanarienvögeln heben sich die Töne der anderen Sänger herrlich ab. Die Kanarien fliegen aus einer etwa einen halben Qua-

dratfuß großen Oeffnung des Zimmerfensters, hinter dessen Scheiben sie sich bis zum Frühling der einzelnen Sonnenstrahlen erfreut, fröhlich aus und ein. Besonders interessant sind die Hänflingsbastarde, steil schießen sie empor, stimmen ihren Gesang an und flattern, denselben fortsetzend, auf den nächsten Zweig.

Die Fütterung dieser Vögel, im Sommer durch geriebenes Ei verstärkt, findet in dem Vogelzimmer statt; daselbst sind auch Nistkästchen (Andreasberger) angebracht, in denen die Fortpflanzung stattfindet. Nur wenige Vögel, etwa 5—6, sind gleich Anfangs nach dem Herauslassen der Vögel entflogen und Abends nicht in die Stube zurückgekehrt, die übrigen halten sich vortrefflich. W. T.

Stubenvogelzucht als Erwerb.

vom Herausgeber.

(Fortsetzung.)

Hier gezüchtete, besonders schon von der zweiten oder dritten Generation abstammende Wellensittiche bedürfen eigentlich nicht großer Fürsorge, vorausgesetzt jedoch, daß sie naturgemäß gezogen und durchaus gesund sind. Man läßt sie nicht wie die importirten in den Herbstmonaten, sondern in unserm Frühlinge zur Brut gelangen. Eine Trennung der Geschlechter, um das Nisten zu unrechter Zeit zu vermeiden, ist ja keinenfalls nothwendig. Man braucht den Vögeln blos die Nistgelegenheiten vollständig zu entziehen und sie ausschließlich mit trockenem Kanariensamen zu füttern, so hört die Brütlust ganz von selber auf. Dabei hält man sie den Winter hindurch im völlig ungeheizten Raume, ja am besten ganz im Freien und nur mit einem Zufluchtsort gegen die rauheste Witterung versorgt. Dann, bereits im März, hängt man die Nistkasten ein und giebt allmählig mehr und mehr einen Zusatz von den übrigen vorhin genannten Futterstoffen, so daß sie sich wieder daran gewöhnen. Als eine der wohlthätigsten Gaben, übrigens für sämmtliche Papageien, am nothwendigsten aber für die in der Gefangenschaft gezüchteten, sind frische Baumzweige mit Knospen oder jungen Blättchen anzusehen und solche müssen die Wellensittiche jetzt beim Beginn der Hecke, wenn möglich, ganz regelmäßig erhalten. Auch muß jetzt Kalk von alten Wänden und Sepienbein in Stücken reichlich vorhanden sein. —

Als eine übele Folge der Entziehung der Nistgelegenheit zeigt sich, namentlich bei einzelnen Pärchen, die Erscheinung, daß sie dann gar nicht nisten. Im gemeinsamen Flugraum tritt dieser Uebelstand seltener ein, weil doch das eine oder andere Pärchen mit dem Nisten beginnt und die übrigen, dadurch angeregt, meistens bald dem Beispiele folgen. Wenn man nur wenige Pärchen oder jedes Paar abgesondert im Käfige für sich züchten will, so hat man es neuerdings für sehr zweckmäßig befunden, die Nistkäfige nebeneinander zu stellen oder so einzurichten, daß immer zwei Paar oder auch mehrere sich sehen können, oder am besten nur durch ein Dratgitter geschieden sind. Wer nur ein einzelnes Paar im Heckkäfige hält, muß entweder mit äußerster Geduld das Ergebniß abwarten oder, falls es ihm zu langweilig wird, kann er auch nach einem Zeitraum von etwa sechs bis acht Monaten mit dem Austausch des Männchens oder Weibchens es versuchen.

Die bereits mehrmals erwähnte Sonderung der Geschlechter, welche wol nur in den ganz großen Züchtereien vorgenommen wird, zeigt sich besonders schädlich bei den hier gezüchteten Wellensittichen. Die Vögel werden, selbst bei Fütterung mit bloßem trockenem Kanariensamen leicht zu fett und faul, so daß sie gar nicht mehr nisten oder daß die Weibchen beim Eierlegen zu Grunde gehen. Oder sie werden zu üppig, so daß sie die erste Brut vernachlässigen, wol gar tödten, weil sie die nächste zu früh beginnen.

Wenn man recht rationell züchten will, so sollte man die Wellensittiche, nachdem man sie, wie angegeben, in zweckmäßiger Weise, aber in einem nicht zu großen Raum überwintert hat, zum Beginn der Hecke in einen recht weiten Raum ausfliegen lassen, damit sie sich tüchtig austoben und für das Brutgeschäft die nöthige Elastizität und Lebendigkeit gewinnen können. Ein möglichst weiter Flugraum ist nicht allein zur ungehinderten Entfaltung des Familienlebens dieser Vögel erforderlich, sondern die in ihm gebotene Bewegung entspricht auch den Bedingungen ihrer Lebensweise im Freien. Ich habe in dieser Hinsicht wiederholt einen merkwürdigen Fall beobachtet. Ein Paar Wellensittiche, welche Jahr und Tag in einem entsprechend eingerichteten, doch nur verhältnißmäßig kleinen Käfige gehalten worden, ohne daß sie die geringste Neigung zum Nisten gezeigt, ließ man nur acht Tage hindurch in dem Zimmer frei fliegen, bot ihnen jedoch das Futter immer ausschließlich in dem Käfige. Dann wurde derselbe plötzlich geschlossen und nach kaum weiteren acht Tagen begann eine Brut, welche das beste Gedeihen zeigte. Die Erklärung ist sehr einfach darin zu finden, daß die Wellensittiche, wie alle andern Zug- und Strichvögel, das Bedürfniß einer zeitweisen lebhaften Bewegung haben.

Die eingewöhnten Wellensittiche, besonders wenn sie schon seit Jahren bei naturgemäßer Behandlung in der Gefangenschaft sich befinden, darf man im allgemeinen für die einträglichsten von allen erachten. Sie pflegen Jahr für Jahr mit immer gleichbleibenden guten Erträgen zu nisten, sie sind ungleich seltener Erkrankungen ausgesetzt und man hat solche Vögel bereits eine Reihe von 8 bis 10 Jahren hindurch sich gut erhalten gesehen. Bei ihrer Weiterzüchtung tritt aber gewöhnlich ein Uebelstand sehr störend auf. Wenn man nämlich eine solche Gesellschaft längere Zeit hindurch züchtet, so macht sich die Nothwendigkeit der Bluterneuerung geltend. Nachdem diese Vögel aber sich gegenseitig einmal genugsam ausgekämpft haben, dulden sie durchaus keine fremden; alle neuen Ankömmlinge, gleichviel in der Flughecke oder im Käfige, werden unbarmherzig über-

fallen und wüthend befehdet. Insbesondere zeichnen sich diese Weibchen durch eine fabelhafte Raufslust aus. Es kommt nicht allein vor, daß sie jeden neuen zugesetzten Wellensittich, gleichviel, Weibchen oder Männchen, angreifen, sondern man hat sogar beobachtet, daß ein solches einzelnes Weibchen nach dem Tode seines Männchens den zu ihm hineingesetzten neuen männlichen Vogel umgebracht hat.

(Fortsetzung folgt.)

Weiteres über die Fruchtbarkeit der Bastarde.

Zu dieser Frage bin auch ich in der Lage, mitzutheilen, daß nach meinen gemachten Erfahrungen solche Vögel allerdings fortpflanzungsfähig sind.

Ein hiesiger Schuhmacher, der sich auch mit dem Vogelhandel im Kleinen und der Zucht von Kanarien befaßt, besitzt ein Pärchen Bastarde (beide stammen vom Grünling-Männchen und Kanarien-Weibchen, welche gegenwärtig vier Junge haben, die vor einigen Tagen das Nest verließen, und schon bebrütet das Weibchen wieder vier Eier. Von diesen Jungen haben zwei die Farbe der Eltern (grün), die zwei anderen sind gelb mit kleinen grünen Flecken und vom Kanarienvogel kaum zu unterscheiden. Das benannte Elternpaar hat auch im verflossenen Jahre zwei Junge großgezogen; auch diese Brut habe ich gesehen.

H. Blumauer, k. k. Postoffizial
in Laibach.

Noch Weiteres zur Bastardzucht.

Ich habe früher viele Bastarde gezogen, von Kanarien-Weibchen, Stieglitz- und Hänfling-Männchen, und davon erzogene Bastard-Weibchen haben in der Hecke sehr häufig gelegt, jedoch waren die Eier immer viel kleiner, als sie sein müssen; Junge sind niemals ausgekommen. Im Heckkäfig habe ich Bastard-Männchen mit Kanarien-Weibchen zusammengesetzt, sie fütterten recht sorgsam das Weibchen, parten sich oft, haben aber ebenfalls niemals Junge gebracht. Hätte nun Jemand eine ganz besondere Passion, diese Frage zu ergründen, so rathe ich Folgendes: Man nehme ein Bastard-Männchen, bei dem die männliche Natur recht stark ausgeprägt ist, d. h. das recht laut und fleißig singt, und starke Triebe zum Paren zeigt. Auch nehme man ein solches, das recht viel von Farbe und Wesen des Kanarienvogels an sich hat, das also etwa 90 Prozent Kanarienvogel ist, wie man solche Bastarde ja oft hat, und setze ein solches Männchen mit einem Kanarien-Weibchen in die Hecke; ich glaube die werden Junge aufbringen, die in der Regel wol nur noch sehr wenig vom Bastard an sich haben würden. Bei den Bastarden sind gewiß die nöthigen Organe unvollständig entwickelt, was das Legen der kleinen Eier schon anzeigt, auch zeigen die Thiere nie das Feuer, sondern nur eine große Unruhe in der Hecke. Es ist wol ganz so, wie beim Maulesel. A. Roth.

Das Geflügel auf der Internationalen Landwirthschaftlichen Ausstellung in Bremen.

Eines ganz besonderen Beifalls beim Publikum scheint sich die III. Abtheilung: Geflügel, Sing- und Schmuckvögel zu erfreuen. Schon von Weitem hört man das vielstimmige Konzert der verschiedensten Hühnerrassen und dieses ist es, welches die Besucher auch ohne Wegweiser nach dem schönen Platze hinter der Gartenbauabtheilung führt. Ein geschlossener Mittelbau mit zwei luftigen Seitenflügeln von je 60 Fuß Länge enthält die gefiederte Welt, vom zarten Senegalfinken bis zum gewaltigen Kochinchinahuhn. Vor dem Hause erhebt sich eine imposante Volière aus Eisen, in der sich herrliche Gold- und Silberfasanen wohlbefinden und ihr prächtiges Gefieder sehr vortheilhaft zur Geltung bringen. Diese Volière, sowie eine zweite kleinere, welche sich weiter rechts im Schatten grüner Eichen befindet, dienen als Zeugniß bremischer Eisenindustrie; sie sind aus der Werkstatt des rühmlichst bekannten Schlossermeisters J. Asendorpf hervorgegangen und wurden mit dem ersten Preise und der bronzenen Medaille gekrönt. Unmittelbar hinter der großen Volière beherbergt ein luftiges Drahtgitter zwei seltene europäische Vögel, nämlich Kraniche. Sie stammen aus der Gegend von Rothenburg und wurden von Dr. Röhrs aufgezogen und ausgestellt. Im Halbkreise vor dem eigentlichen Geflügelhause sind ziemlich unansehnliche, aber zweckentsprechende Käfige aus Latten errichtet, in welchen Enten, Gänse, Trut- und Perlhühner und Pfauen untergebracht sind. Von den letzteren hat die Ausstellung allerdings nur ein Paar aufzuweisen, ausgestellt von Dr. Adami in Sebaldsbrück, desto besser sind aber die vorhergehenden Abtheilungen vertreten. Mit Bedauern vermissen wir die im Kataloge verzeichneten wilden Truthühner (wild Turkeys) von Reiche aus Alfeld, das stattliche Federwild der Vereinigten Staaten; aber die weißen Truthühner von Louis Eicke in Langenhagen, die schöne Reihe alter und junger von Smidt zur Dunge können wenigstens als würdige Glieder der zahmen Rasse dienen. Von Perlhühnern sind ganz weiße, von Bahia importirt, ausgestellt von Fritz Jürgens zu Vahr, bemerkenswerth, unter den Gänsen ein Stamm russischer Lockengänse, von J. v. Däckel in Rennhausen, mit sonderbar verschmälerten und gekrümmten Federn, die den Vögeln ein, wenn auch nicht schönes, so doch sonderbares Aussehen verleihen. Unsere Blockländer Gänsezucht hat Noltenius in Borgfeld durch alte und diesjährige Junge zur Darstellung gebracht, während Oekonomierath Peters in Siedenbollentin uns pommersche Gänse vorführt, die denn auch ihren alten Ruf würdig vertreten und mit einem zweiten Preise gekrönt wurden.

Die langen Seitenflügel des Hauses sind, mit Ausnahme der wenig reichhaltig vorhandenen Tauben, mit Hühnern besetzt, die jedenfalls den Glanzpunkt der Geflügelausstellung bilden und in der That alle Bewunderung verdienen. Wir haben allerdings anderwärts größere und bedeutungsvollere Hühnerausstellungen gesehen, aber alle Kenner werden mit uns darin übereinstimmen, daß unter Berücksichtigung der für eine derartige Ausstellung ungünstigen Zeitverhältnisse das Sektions-Komite sehr rührig und thätig gewesen ist, um derartiges zu ermöglichen. Eine Reihe der bedeutendsten Hühnerzüchter Deutschlands haben durch reiche Zusendungen diese schöne Sammlung geschaffen, die denn auch das vollste Interesse des Publikums findet. Durch eine besonders schöne Sammlung seltener Hühnerrassen, darunter ein unübertrefflicher Stamm Kochinchinas, welcher demnächst seinen Weg nach Rußland finden wird, hat sich J. G. Kunze in Charlottenburg die goldene Medaille errungen. Nicht minder ansehnlich sind die von Julius Volschau in Hamburg ausgestellten Hühner, die ihm vier Medaillen eintrugen, die des Baron v. Vely-Jungken auf Schloß Hüffe, darunter die seltenen japanesischen Nagasaki-Hühner, herrliche Bantams u. s. w. Ebenso haben sich die wohlbekannten Händler edler Hühnerrassen Louis Eicke in Langenhagen und H. Marten in Linden in hervorragender Weise betheiligt und die gebührende Anerkennung gefunden, nicht blos Sei-

tens der Herren Preisrichter, sondern auch Seitens des Publikums, bei welchem sich eine große Kauflust zu erkennen giebt. Unser Landhuhn ist von Striepling in Oldenburg, Heinken in Delmenhorst, Depken in Schwachhausen u. s. w. in schönen Exemplaren ausgestellt und findet ebenfalls Käufer, selbst bis in die neuen Reichslande, wo man auch das deutsche Huhn einzubürgern versucht. Vergessen wir unter den Hühnern auch nicht jene sonderbaren fremdartigen Gestalten aus Südamerika, wir meinen die Jakuhühner von W. Deiters, die in Kolumbien die Familie der Hühner vertreten.

Der Mittelbau nimmt eine reiche Sammlung von Sing- und Schmuckvögeln auf, zu denen Gersten in Hannover den größten Beitrag lieferte, in allen möglichen fremdländischen Finkenarten aus beiden Tropen, in buntfarbigen Kardinälen und Trupialen, grünen und grauen Papageien u. A. — Reiche aus Alfeld hat herrliche Nordamerikaner ausgestellt: Karolina-Sittiche, Blauhäher, Baltimorevögel, Kuhstare und herrliche Spottdrosseln, die trotz des Gewirrs und Geschwirrs von hunderten von Kehlen ihrem klangvollen und wunderbar abwechselnden Gesange Geltung zu verschaffen wissen. Schöne Papageien, darunter die kleine bescheidene, aber seltene Kalita aus Paraguay, sind von W. Deiters aus Bremen, ein sonderbarer Tukan oder Pfefferfresser aus Venezuela, der denn auch als das seltenste Exemplar unter den ausländischen Gästen den ersten Preis und die silberne Medaille erhielt, von Dr. Finsch in Bremen. C. F. Engelhard in Nürnberg bringt die interessantesten Alpenvögel der Schweiz, Alpendohlen, Schneefinken und die herrlich singenden Flüvögel zur Darstellung, denen der Kenner unbedingt den Vorzug vor ihren buntfarbigen Vettern aus den Tropen geben wird. Bald hätten wir die Tauben vergessen, welche, in zierlichen Käfigen, wie wir sie in Ausstellungen sonst nicht gewöhnt sind und welche das Komite der freundlichen Unterstützung des Berliner Geflügelvereins „Cypria" verdankt, die ganze Hinterwand des linken Flügels einnehmen. Die Sammlung läßt an Reichhaltigkeit allerdings zu wünschen übrig, enthält aber doch viel Gutes, die herrlichen Tauben der Frau Prinzessin Karl von Preußen, von Mehnert in Goslar, Walkammer in München, Hepernick in Stralsund. Von den Brieftauben machten sechs von Breuer in Verden ausgestellte Junge gestern ihre erste Reise und legten die Strecke von mehr als vier deutschen Meilen in etwa 32 Minuten zurück. Wenden wir uns von den Tauben nochmals zu den Schmuckvögeln und treten in die kleine Stube des Mittelbaues ein. Sie enthält die Kanarienvögel, welche auf Gesang prämiirt wurden, darunter die herrlichsten Roller. Am reichsten hat mit ihnen Klages in Hannover die Ausstellung beschickt und vier Preise, darunter zwei erste, wurden ihm zu Theil. Mehnert in Goslar hat ebenfalls ausgezeichnete Harzer Roller ausgestellt, und Wille jun. in Bremen erhielt für vier der besten Sänger die silberne Medaille als wohlverdiente Auszeichnung. Vergessen wir zum Schluß nicht den Dompfaffen von Schöllendreier in Sülbeck, der für seinen gelungenen Vortrag des Liedes: „Schier dreißig Jahre bist du alt", die bewundernswerthe Geduld seines Lehrers mit dem zweiten Preise belohnt hat.

(Ausstellungsblatt der „Weser-Zeitung.")

Aus den Vereinen.

Ausstellungsbericht der II. allgemeinen Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht in Köln.

(Fortsetzung.)

Für die Abtheilung der Hühner waren zu Preisrichtern die Herren Jak. Beckemans, Direktor des zoologischen Gartens in Antwerpen, Roberti, Direktor des zool. Gartens in Lüttich, van der Deickt, Direktor des zool. Gartens in Gent, W. Zeppenfeld in Mülheim a. d. Ruhr, Robert Klewitz in Styrum bei Mülheim a. d. Ruhr, gewählt. Die Hühner waren ebenfalls nach Rassen geordnet und den Anfang machten die kleinen Rassen.

Die Bantams waren durch 12 Nummern vertreten, in 6 Farbenvarietäten, unter denen besonders 1 Stamm Gold-B. des Herrn R. Klewitz als mustergültig hervorzuheben ist, denen jene des Herrn Hofgärtners Gernedt nur dadurch nachstanden, daß der Hahn keinen Rosenkamm zeigte. Dieser ist bei den Bantams nun einmal Bedingung. Die Silber-B. der Herren König und Klewitz waren in Zeichnung tadellos, aber zu groß, um als mustergültig angesehen zu werden. Allerliebst kleine muntere Hühner waren auch die schwarzen Bantams des Herrn Ch. Lothari in Mainz und W. Schwalm von hier.

Unter den Zwergkämpfern genügten den Anforderungen der Silberhalsstamm des Herrn J. J. Nießen, und die beiden Stämme des Herrn J. F. König von hier; zu rügen wäre nur der nicht „coupirte" Kamm des goldhalsigen Hahnes. Wir müssen gestehen, der Kämpfer mit vollem Kamm sieht lange nicht so muthig aus — und daher erscheint die Anforderung des „coupirten" auch wohlberechtigt.

Die gut beleumundeten Italiener waren in 6 Stämmen eingesandt, meistentheils in Gelb. Was ihre Leistungen im Eierlegen anbelangt, so mögen sie allerdings unsere feineren Rassen weit übertreffen; Schönheit kann ihnen jedoch durchaus nicht nachgerühmt werden — und das Auge will doch auch sich weiden. Wie sonst jedes schwarze Huhn ein Spanier genannt wurde, so werden wol sämmtliche Landhühner für die Folge nur Italiener sein, zumal die gelben Beine grade keine Bedingung sine qua non sind, und in Farbenvarietät unser Landhuhn Bedeutendes leistet. — Bergische Kräher, die nach den neuesten Forschungen eine Abart der Spanier sein sollen, veranstalteten ein tüchtiges Geschrei, große Virtuosen schienen nicht da zu sein, doch es waren die Melodien der von den Herrn Hoerster und Rennert ausgestellten Hähne die besten und langtönigsten; nicht das allerdings, was man vor fünf bis sechs Jahren zu hören bekam. Es scheint damit auch viel Exportgeschäft gemacht worden zu sein. — Die Hamburger, die in der Beliebtheit zu gewinnen scheinen, waren zahlreich vertreten, und in Silberlack waren es die Stämme der Herren F. J. Mertens, Neumann, und in Goldlack jene der Herren W. Haas und Klewitz, welche hervorzuheben wären, eben o darf ein obigen verwandter Stamm Kampiner des Herrn J. J. Classen nicht unerwähnt bleiben. Dorkings hatten die Herren W. H. Pepys und Baily in London ausgestellt, gleich gute Stämme, die durch Größe der einzelnen Thiere und gleichmäßige Zeichnung als Musterstämme in jeder Ausstellung gelten würden. —

Spanier waren uns dieses Jahr nur 10 Stämme beschieden, aber was die Beschaffenheit anbelangt, besser als 50 Stämme jener „Mußspanier" mit rothen Wangenflecken. In erster Reihe waren es die zwei Stämme blaue des Herrn Baily, welche hervorzuheben sind, nächst diesen die schwarzen des Herrn Neumann und Ditt in Wiesbaden, als eigene Zucht, ferner der Stamm des Cnoop Koopmanns in Amsterdam, ein Musterstamm von England importirt, wie die ganze Figur u. s. w. zeigte; er hatte nur den Fehler aller jener Stämme, das zu faltenreiche Gesicht nämlich, welches nur zu leicht zur Blindheit führt. Im vorjährigen Berichte erwähnten wir eines Stammes feiner Spanier aus dem zool. Garten in Antwerpen; auf einer benachbarten Ausstellung sahen wir die Nachzucht dieses Stammes; wir waren davon überrascht, das schneeweiße und glatte Gesicht des Hahnes übertraf noch das seines sich im besten Wohlstand befindenden Erzeugers.

Unsere diesjährigen Haubenhühner, soweit selbe in Konkurrenz kamen, waren sämmtlich „Paduaner"; weiße hatte Herr Chr. Krell in Wiesbaden, blaue und silbergraue Herr W. Haas in Nippes in tadelfreien Stämmen eingesandt, ebenso waren die Chamois-P. des Herrn Neumann und die Gold-P. der Herren Pepys und Baily Prachtstämme zu nennen. Wie weit die neuen Varietäten, Silbergraue und Blaue, an Beliebtheit gewinnen können, muß noch abgewartet werden, da vor allem erst zu entscheiden ist, ob die Varietät sich dauernd erhält. —

Crève-coeur hatten die Herren Krell in Wiesbaden und Witsch in Dülken in Schwarz und Herr Glum aus Blumenthal in Weiß ausgestellt; obwol die Hühner sonst tadellos, waren sie doch zu klein, um ernstlich bei Prämiirung berücksichtigt zu werden; ebenso war es mit La flèche, in welcher Rasse nur der Stamm des Herrn J. F. König allen Anforderungen genügte; jene des Herrn E. Mosler, obgleich Nachzucht von importirten, waren etwas klein. Herr E. Neschke in Kreuznach hatte einen Stamm Courtes pattes ausgestellt, die wol mit den Bakies eine und dieselbe Rasse sind; ob die niedrigen Beine schön sind, sei dahin gestellt, doch man gewöhnt sich bei neuen Rassen an Manches. — Die Houdans, deren buntes Gefieder nicht sehr schön genannt werden kann, sollen als Legehühner ausgezeichnet, auch die Aufzucht der Küchlein sehr leicht sein. Sie scheinen mehrere Liebhaber gefunden zu haben. Große und schwere Thiere hatten die Herren Neumann und J. F. König ausgestellt. — Brahmas und Kochins scheinen noch immer in der Beliebtheit zu steigen; was die ersteren in Hell anbelangt, so hatten die Herren J. Neumann und Baily Stämme ausgestellt, die sowol rein in Zeichnung, als auch von kolossaler Größe waren. Die Bedingung, als müßten alle ächten Brahmas sog. Erbsenkamm haben, scheint in England noch nicht in Geltung zu sein. Warum auch etwas beim Brahma verlangen, was der stammverwandte Kochin nicht haben darf! Dunkle Brahma hatten der Herr August Bennert und Herr Knoop Koopmanns in prachtvollen Stämmen ausgestellt. Daß unter den andern Stämmen noch manche guten Hühner waren, wollen wir nicht leugnen, allein gegen diese non plus ultra's war nicht aufzukommen. Wie in Brahmas, so machten sich auch in gelben Kochins die Herren Baily und Neumann den Preis streitig, doch hier siegte Baily und hätte ein zu spät angemeldeter Stamm noch mitkonkurrirt, die Wahl wäre wol noch schwieriger geworden; es waren übrigens 20 Stämme gelbe Kochins zur Ausstellung erschienen. In weißen und rebhuhnfarbigen war ebenfalls Herr Baily der Sieger, doch standen die weißen des Herrn Glum und die rebhuhnfarbigen des Herrn Ph. Ditt, den obigen am nächsten. In schwarzer Varietät konkurrirten nur die Herren E. Mosler von hier, Krell von Wiesbaden und unser zoologischer Garten; sämmtliche 3 Stämme genügten den Anforderungen, ohne dabei Außergewöhnliches zu bieten. Einen ziemlich guten Stamm gesperberter hatte Herr Jul. Völschau in Hamburg ausgestellt. — Unter den Malayen war es ein Stamm bunte des Herrn Ph. Ditt in Wiesbaden, der seine übrigen Stammesgenossen weit überragte; dem nahe kamen die von den Herren Klewitz und E. Berger ausgestellten Stämme.

Oettel's „Hühner- und Geflügelhof", dessen neueste 5. Auflage auch dem Werke würdige Illustrationen bringt, — allerdings dürften die Bantams Fig. 27 wol zu den frommen Wünschen gehören, — bringt uns eine Abbildung der Yokohama, wie sie sein sollen, und sagt in der Beschreibung: „Unbestritten ist dieses schöne Huhn eine der interessantesten Erscheinungen im Hühnerhof und kann man sich kaum etwas Reizenderes denken, als einen vollständig entwickelten Hahn mit seinem reichbewachsenen, bis auf die Erde reichenden Schweif, in der Mitte einiger seiner Gefährtinnen . . ." Die bei uns ausgestellten 10 Stämme gehörten sämmtlich den Herren Adler von hier und W. Haas in Nippes; wenn auch nicht alle genau der Schilderung des Herrn Oettel in jeder Beziehung entsprachen, so waren es doch nur reinrassige Thiere, ohne Beimischung von Malayen, was sich hauptsächlich an dem stärkeren Knochenbau erkennen läßt. Die weißen, bezüglich der weiße Hahn des Herrn Adler war wol der bessere, während von den bunten ein Hahn des Herrn Haas, was Zeichnung anbelangt, nicht schöner gedacht werden kann. Wie besteht entwickeln sich die Hähne erst im zweiten Jahre; da nun, wie wir wissen, die meisten Thiere vorjähriger Zucht sind, so hoffen wir im nächsten Jahre noch Vollkommneres zu sehen. Bekanntlich stammen ja beinahe alle unsere Yokohama direkt oder indirekt aus dem Jardin des Plantes in Paris. Die Veränderlichkeit der Farben, das Hinsterben der Küchel, öfters vorkommende Blindheit bei diesen, beweist, daß Beimischung neuen Blutes dringend geboten ist, soll uns dieses schöne Huhn nicht verloren gehen. In England soll in neuester Zeit auch eine schwarze Varietät aufgetaucht sein, angeblich zum Preise von 20 Pfd-St. — für unsere Verhältnisse doch wol noch zu kostspielig.

Unter den erwähnten Rassehühnern waren noch einige Stämme Kreuzungen ausgestellt, als Dorking-Malayen, Kochin-Yokohama; einen Werth für Geflügel-Ausstellungen haben Kreuzungen nicht, höchstens bei landwirthschaftlichen Ausstellungen dürften selbe am Platze sein, wo es sich nur um Nutzen, nicht um Schönheit u. s. w. der Thiere handelt. (Fortsetzung folgt)

Briefwechsel.

In Folge der zahlreichen Anfragen, welche in letzterer Zeit bei der Redaktion in Betreff des Bezuges von Rassehühnern eingegangen sind, weisen wir darauf hin, daß Herr H. Marten in Linden bei Hannover als ein anerkannt ehrenhafter und zuverlässiger Händler empfohlen werden kann. Das von ihm eingeführte Geflügel hat auf den verschiedenen Ausstellungen stets den größten Beifall der Kenner gefunden und immer die ersten Preise errungen. — Herrn Gymnasiallehrer Böhmer in Konitz: Allerdings ist es am besten, wenn Sie den Elsterchen die Nistgelegenheit völlig entziehen und im Spätherbst, jedoch erst, wenn regelmäßig geheizt wird, wieder bieten. Im Uebrigen verfahren Sie nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber." —

Berichtigung.

In der Bücher- und Schriftenschau der Nr. 26 ist in der Besprechung der Schrift von Dr. Bodinus „Die Thierwelt im Zoologischen Garten von Berlin" (Seite 210, Zeile 28 von unten) zu lesen: und für alles übrige, näher oder ferner Liegende bedarf er selber ebenfalls zur eingehenden Unterrichtung eines Führers. — Auch ist diese Besprechung fälschlich mit Dr. R. R. unterzeichnet, da sie der Herausgeber geschrieben hat.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Einige Schwarzköpfe, 1 Eule (Kauz), 1 Amsel, 2 Drosseln, 2 graue Grasmücken, 1 Grünlingsbastard (Hahn), 1 Hahn, 2 Hühner gelbe Haarhühner, 3 Enten gut legend, 1 Pfauhahn und 1 Henne, dreijährig, sowie frische Ameiseneier, ½ Liter 8 Sgr. empfiehlt

[399] **Rudolph Schmidt**, Erfurt.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: [400]

Gefiederte Welt.

I. II. Jahrgang, eleg. broch. . . . . à 2 Thlr.
1874, 1/2. Quartal „ . . . . à 1 Thlr.

Ein schöner, ganz zahmer Beo (Gracula religiosa) ist um 10 Thaler zu verkaufen. Mehlwürmer in beliebiger Menge, 2000 Stück um 20 Sgr. gegen Vorausbezahlung.

Johann Kuss,
[401] Raab, Ungarn.

1 **Wanderdrossel** (Hahn) sucht zu kaufen
[402] Apoth. **Lutz**, Winterthur.

2 Stück **feine ungarische** [403]

David-Sprosser

(überwintert),
à Stück 5 Thlr., beide zusammen 9 Thlr., zu verkaufen.
C. Koch, Wiesbaden.

Ein junger, ziemlich ausgewachsener **Uhu** ist preiswürdig zu verkaufen durch

Apotheker **Borchardt**
[404] in Berent, Westpreußen.

Suche einen Blutrumpfsittich-Hahn, mit welchem schon gezüchtet wurde, zu kaufen, eventuell verkaufe ich ein solches Weibchen. **K. Th. Hauser.**
[405] Nürnberg, Aeußere Laufergasse Nr. 8.

Smaragdgrüne Eidechsen
(Lacerta smaragdina),
für Terrarien und Treibhäuser eine Zierde, können bezogen werden durch [406]
Stauffer's Museum in Luzern (Schweiz).

Naturalienhandlung
von Wilh. Schlüter in Halle a. S.
Die Preisverzeichnisse Nr. 41 über **Fische**, gestopft und in Spiritus und Nr. 42 über sibirisch **Vogelbälge** und **Eier** sind erschienen und stehen auf Verlangen gratis zu Diensten. [407]

Frische kleine **Ameiseneier**, pr. Liter 30 Pf. incl. Verpackung und frankirte Zusendung bei 10 Liter. **Getrocknete** das Pfund zu 18 Sgr.
[408] **G. Weiglein**, Zellingen (Bayern).

Das Etablissement von Chs. Jamrach,
Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180 St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen folgende Thiere erhalten:

20 Graupapageien, 2 große grüne Araras, 1 rothköpfigen Keilschwanzsittich (Conourus erythrogenys), 280 Nonpareils, 20 Indigovögel, 80 Paar Zebrafinken, 30 Paar Japanesische Mövchen, 20 Paar Japanesische Bronzemännchen, 5 Japanesische Stare, 5 Japanesische Kernbeißer, 2 Indische Mynahs, 1 Indischer Bastardstar, 11 Wanderelstern, 3 Orientalische schwarze Kukuks, 7 Rothhäubige Bartkukuks, 26 Bobberlings, 20 Manyarweber, 10 Olivengelbe Weber, 8 Sonnenvögel, 1 Javanischer Singschmätzer (Copsychus saularis), 1 Kurzohriger Uhu aus Nordost-Afrika, 1 Rother Ibis, Hockohühner, Schopfwachteln und Kalifornische Wachteln.

Außerdem 1 Königstiger, zahlreiche verschiedene Affen, darunter 2 Mohrenaffen, 1 Schwarzer Pavian, 1 Schlanker Lori u. a., 2 Leoparden, 1 Ozelot, 1 Gestreifte Hyäne, 4 Zibetkatzen von Sumatra, 1 Rollmarder, 1 Flattereichhörnchen, 1 Gemeines Stachelschwein, 2 Axishirsche, 1 Pampashirsch, 1 Paar Stanley-Moschusthiere, 1 Paar echte Moschusthiere, 1 Armadill.

Außerdem auch **11 Indische Riesenschlangen.** [409]

C. Reiche in Alfeld
(Prov. Hannover)
erhielt neue Zufuhr von **Papstfinken, Paperlingen, Goldzeisigen,** rosenbrüst. **Kernbeißern, Glanzstaaren,** sowie **Pfeilschwanzkrebsen** und gelbgetupften **Sumpfschildkröten.**
[410]

Zur gefälligen Beachtung!

Zahlreiche Aufträge veranlassen mich zu einer abermaligen Reise nach England, zum Ankauf von Geflügel. Ich werde die Reise zu Anfang Juli antreten und bitte etwaige Wünsche oder Aufträge mir baldigst zukommen zu lassen. Ausdrücklich bemerke ich, daß die geehrten Auftraggeber in keiner Weise verpflichtet sind, das bestellte Geflügel zu nehmen, wenn solches ihren Erwartungen nicht entsprechend sein sollte. Angabe der etwaigen Preishöhe für die gewünschten Thiere ist im beiderseitigen Interesse sehr erwünscht. Hochachtungsvoll

Linden-Hannover im Juni 1874.

[411] **H. Marten.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 9. Juli 1874. Nr. 28.

Inhalt:

Sommer-Ausflug des Ornithologischen Vereins zu Stettin. —
Die Verlegung der Handelsmenagerie des Herrn C. Hagenbeck. —
Ueber die Kennzeichen des Alters und des Geschlechts unserer einheimischen Stubenvögel (Schluß). —
Vogelkrankheiten: zur Zucht der Pariser Kanarien. —
Vogelversendungen, ein Nothschrei. —
Mittheilungen zur Hebung der Hühnerzucht: Fütterung der Küken. —
Aus den Vereinen: Köln (Schluß). —
Bücher- und Schriftenschau. —
Anzeigen.

Sommer-Ausflug des Ornithologischen Vereins zu Stettin.

(Bericht in der Sitzung vom 17. Juni.)

Der Vorsitzende, Herr Creutz, giebt eine Beschreibung der diesjährigen Sommerfahrt, als deren Ziel Berlin gewählt war, und die, abweichend von den früheren Ausflügen, nur von Mitgliedern und ohne deren Damen ausgeführt wurde. Trotz dieses veränderten Programms war die Betheiligung eine über Erwarten rege, da einige 80 Mitglieder daran theilnahmen. Nach vierstündiger Fahrt um 10 Uhr Vormittags in Berlin angelangt und von dortigen Mitgliedern aufs Freundschaftlichste begrüßt, begab man sich in vorher bestellten Wagen nach dem eigentlichen Ziel, dem Zoologischen Garten, dessen Besichtigung unter Leitung seines ersten Sekretärs Herrn Wagenführ, sowie der Herren Dr. Karl Ruß, Konservator Schilling aus Hamburg und der Oberbeamten des Gartens von 11—2½ Uhr währte. Hauptsächlich interessirten dabei unsere Ornithologen jene zum Theil erst kürzlich eingeführten neuen Vogelarten, die Herr Dr. Bodinus (der zur Zeit als Preisrichter bei der internationalen Ausstellung in Bremen sich aufhielt und dadurch verhindert war, den Gästen als Führer zu dienen) von seinen letzten Reisen mitgebracht hatte. Nicht minder erregten die Aufmerksamkeit die Raubvogelkäfige mit ihren Adler-, Geier- und Eulenarten; ferner der Neptuns-Teich mit seiner zahlreichen Sammlung von Schwimmvögeln und an seinen Ufern umherwandernden Stelzvögeln, unter denen prachtvolle Flamingos, schwarze Störche, verschiedene Kraniche u. A. m.; die Stelzvogel-Häuser mit ihren hervorragenden seltenen Sumpfvögeln, als Marabuts und die interessanten Kranichgeier oder Sekretäre; das Vogelhaus mit seinen südamerikanischen Waldhühnern, Tukanen, Ibissen, fremdländischen Tauben und zahlreichen finkenartigen Vögeln. Ein gleiches Interesse erregten das Geflügelgehege, die kleineren Teiche, die Entenvolière, das Straußenhaus und die große Volière mit den so seltenen und kostbaren schwarzen Kakadus und vielen anderen Vögeln. Die Fasanen-Volière, das Hühner- und das Geflügelhaus fesselten namentlich unsere praktischen Ornithologen. Einen hohen Genuß gewährte den Mitgliedern die von oben genannten Herren bei fast jedem einzelnen Thiere gelieferte Beschreibung und die außerordentliche Liebenswürdigkeit, die dabei seitens der Verwaltung den Vereinsmitgliedern zu Theil wurde. Nicht allein, daß die sich in die hinteren Theile der Käfige zur Mittagsruhe zurückziehenden Thiere aus ihrem Schlummer gestört und vorgeführt wurden, sondern es wurden auch einzelne Schwimmvögel und Geflügelarten gefangen, die Besucher auf ihre Schönheiten aufmerksam gemacht und namentlich auch die Verkürzung des Handgelenks behufs Verhinderung des Fortfliegens eingehend unter Besichtigung der Flügel erklärt. Nachdem schließlich noch das große

Raubthier-, Känguruh-, Antilopen-, Lama-, Kameel-, die beiden Affen- und das prachtvolle Elephantenhaus besichtigt waren, begab sich die im höchsten Grade befriedigte Gesellschaft zu dem in der oberen Halle der Restauration veranstalteten gemeinschaftlichen Diner, das durch seine vorzüglichen und preiswerthen Speisen und Getränke den guten Ruf des Pächters, Hoflieferanten Schneider, vollständig rechtfertigte. Während des durch Toaste und zwanglose Plaudereien gewürzten Mahles wurde dem Direktor Herrn Dr. Bodinus telegraphisch der Dank des Vereins für das gewährte freundliche Entgegenkommen und die Hochachtung für die in so wenigen Jahren erzielten Ergebnisse hinsichtlich der Umgestaltung des Gartens ausgesprochen. — Ferner wurde während der Tafel den Berliner Freunden seitens des Herrn Prütz der Plan zu einer im nächsten Sommer in Stettin zu veranstaltenden internationalen Vogel- und Geflügel-Ausstellung mitgetheilt, und fand die vom Redner entwickelte Idee, mit dieser auf alle Gebiete der Ornithologie sich erstreckenden Ausstellung einen Ornithologen- und Geflügel-Züchter-Kongreß zu verbinden, allseitige Zustimmung und lebhaften Beifall. Dr. Ruß, der diesem Plane vor Allem das Wort redete, erbot sich, sein weitverbreitetes Blatt „Die gefiederte Welt" zu dem Zwecke zur Verfügung zu stellen und außerdem im Laufe des Winters das Gutachten der hauptsächlichsten deutschen Vereine behufs Berathung und Feststellung der auf dem Kongreß zur Verhandlung zu stellenden Themata, einzuholen. Nachdem nun noch der Kaffee eingenommen, kehrte man zum Brandenburger Thor zurück und fuhr von dort in Wagen, einer Einladung des Dr. Ruß zur Besichtigung seiner Vogelstube folgend, nach dem an der Bahnstrecke der Potsdam-Magdeburger Eisenbahn gelegenen Steglitz, dem Wohnorte desselben. War man im Vogelhause des Zoologischen Gartens überrascht durch die Mannigfaltigkeit der dortigen Fremdländer, so war dies hier in eben solchem Maße hinsichtlich der zahlreichen seltenen Arten derselben der Fall. Besonders erwähnenswerth sind die prachtvollen chinesischen Sonnenvögel, wovon 2 Paare in der Brut, zahlreiche schneeweiße, gelbbunte und braunbunte japanesische Mövchen, fast alle brütend oder Junge ätzend; Schönsittiche, Pflaumenkopfsittiche und verschiedene andere australische Sittiche, Zwergpapageien, brütende Rosenpapageien, Grauköpfchen, goldgelbe und rosenbrüstige Lerchenstaare, rein weiße Reisvögel, verschiedene Arten Büllbülls, prachtvolle Glanzdrosseln, kleine fremdländische Täubchen, ganz zahme ostindische Kampfwachteln und Prachtfinken in größter Mannigfaltigkeit, von denen Pfaffenvögel, Diamantvögel, grüne Astrilden u. A. in der Brut. Zwei Paare erst vor wenigen Tagen angekommene wundervoll farbenprächtige Paradiessittiche erregten vor Allem die Aufmerksamkeit, ebenso Bastarde vom Rothkopf und Bandfink, Helenafasänchen und Schmetterlingsfink, Stieglitz und Zeisig u. A. Den Beschluß machte die Besichtigung der in der Arbeitsstube aufgestellten ausgestopften herrlichen Vögel, die Dr. Ruß alle lebend besessen, sowie der naturgetreu in Farbendruck ausgeführten Tafeln zu dem im Herbst erscheinenden größeren Werke „Die fremdländischen Stubenvögel". Das Erscheinen dieses kostbaren Werkes, an welchem der Verfasser schon Jahre lang arbeitet, dürfte seiner Zeit gewiß Beifall finden, da ähnliche Abbildungen fremdländischer Vögel bis jetzt in der Ornithologie nur in wenigen, meistens streng wissenschaftlichen Werken vorhanden sind. Nachdem der Erklärer sich noch längere Zeit mit den Besuchern unterhalten, seine Erfahrungen in der Zucht ausländischer Vögel mitgetheilt und das Versprechen, zum Herbst im hiesigen Verein einen Vortrag zu halten, gegeben hatte, schritt man, da die Zeit ziemlich weit vorgerückt, zum Aufbruch, mit dem Bewußtsein, viel Neues gesehen und Nutzen daraus geschöpft zu haben. Nachdem darauf noch in kleineren Gruppen das Aquarium besichtigt war, versammelte in den Abendstunden das Kaffee Wilde die Mitglieder zu einem gemüthlichen Beisammensein, und traf man erst um Mitternacht mit den übrigen Extrazüglern auf dem Stettiner Bahnhofe wieder zusammen. Am Montag um 4 Uhr Morgens langte der Zug in Stettin mit den zwar ermüdeten, aber von dem Ausfluge überaus befriedigten Mitgliedern an. — Der Vorsitzende brachte schließlich auch der Direktion der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft Namens des Vereins Dank dar für die den Mitgliedern durch Ueberweisung besonderer Wagen erzeigte Aufmerksamkeit und das damit gleichzeitig für den ornithologischen Verein bekundete Interesse.

Die Verlegung der Handelsmenagerie des Herrn C. Hagenbeck.

Die Hagenbeck'sche Handelsmenagerie in Hamburg, deren freudigen Aufschwung zum bedeutendsten Handelsgeschäft dieser Art wir in Nr. 2 v. J. geschildert haben, ist durch ihre großartige Entwickelung gezwungen, die bisherige Heimstätte zu verlassen und eine neue zu gründen. Die alten Räume waren nicht mehr ausreichend zur Aufnahme der großen Anzahl wilder Thiere und Vögel, welche seine Abgesandten aus allen Welttheilen in ununterbrochener Reihenfolge dem Geschäft zuführten. Der rege Fleiß, eiserne Beharrlichkeit und sicherer Geschäftsblick, die vorherrschenden Charakterzüge der Familie Hagenbeck, haben dies Unternehmen gegründet und bis zu dieser Höhe geführt, und das Glück, welches trotz mancherlei Wechselfällen ihm doch immerhin treu geblieben, hat auch jetzt freundlich die Hand geboten zur Erwerbung eines etwa 80,000 Quadratfuß großen Terrains, nach welchem die Handelsmenagerie verlegt und räumlich ausgedehnt werden soll in der großartigen Weise, wie es dem Aufschwunge des Geschäfts angemessen ist. Nach der günstigen Lage und dem entsprechenden Umfange

dürfte ein solches Grundstück auf Hamburger Gebiet wol kaum wieder vorhanden sein.

An der einen Seite des parkartigen Gartens, in welchem auch nicht ein kleines Plätzchen unbenutzt gelassen, sind jetzt die Geschäftsgebäude errichtet, welche an Größe, Helle, Schönheit und Comfort selbst den höchsten Ansprüchen genügen. Zunächst das Raubthierhaus enthält in jeder Front zwölf Behälter für größere Thiere, wie Löwen, Tiger 2c. Dieselben sind einige Fuß über dem Boden erhöht und so belegen, daß Licht und Luft ihnen niemals fehlen können. Vor denselben befinden sich die ähnlich gestellten Behälter für kleinere Raubthiere und Affen, an welche sich die Kästen mit Schlangen u. dgl. reihen. Letztere ermöglichen durch eine im Deckel angebrachte größere Glasscheibe, den Inhalt ohne jede Gefahr zu beobachten, während das Thier ungehindert sich bewegen kann. An der Außenwand befinden sich die Volièren für Raub- und andere Menagerievögel, die in ihren ebenso praktischen als schönen Einrichtungen, bevölkert mit interessanten Bewohnern, einen sehr angenehmen Anblick gewähren. Dann folgt das Haus für Heufresser, und dasselbe ist nicht allein durchaus praktisch für seine Zwecke und naturgemäß für die Bewohner, sondern auch so hergestellt, daß die Thiere von den Besuchern fortwährend gut gesehen und beobachtet werden können. Zwischen diesen beiden Gebäuden befindet sich das Schlachthaus. An den Außenwänden dieses letzteren sind Käfige für solche Thiere angebracht, die mehr der Kälte ausgesetzt sein müssen, wie Bären, Wölfe u. dgl., und dieselben gestatten ihnen ein Leben vollständig in freier Luft, während sie doch hinlänglichen Schutz gegen jede ihnen nicht zusagende Witterung bieten. Vor diesen Käfigen befindet sich ein großer umzäunter Platz, der an der einen Seite offene Bretterbuden hat, in welchen die hier wohnenden Thiere bei plötzlich eintretendem Witterungswechsel Schutz finden können. In diesem freien Raume tummeln sich bei irgend gutem Wetter bunt durcheinander Elephanten, Giraffen, Strauße, Kraniche und zahlreiche andere verträgliche Thiere. So sieht man hier neben einander die wilden und reißenden Thiere in entsprechenden Behausungen, und die harmlosen und gutartigen Thiere in bedingter Freiheit und Entfaltung ihrer ganzen Natürlichkeit. Eine Anzahl anderer Gebäude für verschiedene Zwecke sind theils bereits im Bau begriffen oder doch in Plänen entworfen — und im Ganzen hat man hier also einen zoologischen Garten vor sich, der neben Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit durch die freie Bewegung der Thiere, so zu sagen den Verkehr derselben mit einander, viel Interesse gewährt und um so mehr Gelegenheit dazu bietet, manche seltenen und vorzugsweise interessanten Thiere so recht in ihrer Natürlichkeit zu beobachten, um so mehr, da dieselben noch nicht durch lange Gefangenschaft faul und stumpfsinnig geworden, wie dies in den zoologischen Gärten leider nicht selten zu geschehen pflegt. Dazu der schön angelegte Garten, mit vielen Obstbäumen, Blumenpartien, Strauch- und Staudengewächsen, Gemüsen u. dgl. — kurz und gut, eine Oertlichkeit, deren Besuch nicht allein Anregung und Belehrung bietet, sondern auch wohlthuend und erfrischend wirkt.

Auch in diesem Jahre hat das Hagenbeck'sche Geschäft bereits sehr zahlreiche Zufuhren erhalten, so die mehrfachen indischen Transporte, unter denen die des 15. Februar allein 15 Rhinoceros-Vögel, außer einer außerordentlich bedeutenden Anzahl größerer und kleinerer Thiere brachte; dann die amerikanischen und endlich der riesige afrikanische Transport, welcher letztere schon im Frühlinge hier eintreffen sollte, jedoch, weil er so überaus reich an Thieren aller Gattungen und in seinen Bewegungen zu schwerfällig war und zu sehr gehemmt wurde, nothwendigerweise getheilt werden mußte, wollte man keine empfindlichen Verluste wagen. Der erste größere Theil traf schon vor einiger Zeit und fast noch vollzählig in Hamburg ein; das zweite Drittheil kam mit nur drei Thieren an, weil die übrigen bereits unterwegs ihre Käufer gefunden hatten. Das letzte Drittel des Transports wird endlich als kleinster Rest in wenigen Tagen hier ankommen und, wenn es nicht wiederum unterwegs durch Verkäufe sehr verringert wird, folgende Thiere mitbringen: 16 Girafen, unter denen viele vollständig ausgewachsen sind. Da dieser einzige diesjährige Transport aus Afrika an Girafen 27 Köpfe mitgebracht, eine Anzahl, welche bisher noch unerreicht dasteht, außerdem noch Elephanten, Löwen, Tiger, Hyänen, Bubals, Leoparden, Strauße, in sehr stattlicher Anzahl, und kleinere Vierfüßler, nebst verschiedenartigen, theils sehr seltenen Vögeln, so erhellt aus ihm, daß das Hagenbeck'sche Geschäft von keinem andern der Welt übertroffen wird. Es hat während seines zwanzigjährigen Bestehens selbst die kühnsten Erwartungen einer großartigen Entwickelung weit hinter sich zurückgelassen. Da die Hagenbeck'sche Handelsmenagerie, sowol in ihrer Entwickelung am Platze selber, als auch in der Ausbreitung ihrer so weitreichenden Verbindungen noch immer im freudigsten Fortschreiten begriffen ist, so kann diese Schilderung natürlich durchaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen; es sollte eben nur ein allgemeiner Ueberblick gegeben werden. H. A . . .

Ueber die Kennzeichen des Alters und des Geschlechts unserer einheimischen Stubenvögel.

(Schluß.)

Der Sprosser. Von vier im Sommer 1870 zu gleicher Zeit untersuchten Sprossern hatten zwei sehr bemerkbare dunkle muschelförmige Flecken an der weißgrauen Kehle; bei zwei andern waren diese Flecken weniger erkennbar, fast verwaschen; der Zapfen dieser beiden Vögel war weniger entwickelt, nach hinten gerichtet, die Haltung, wie bei dem oben

beschriebenen Nachtigalen-Weibchen. Diese beiden Vögel erwiesen sich später als Weibchen, die beiden andern waren Männchen. In der Färbung des Oberkörpers war bei sämmtlichen 4 Vögeln kein Unterschied zu bemerken. Sie waren auf der Oberseite fast genau wie ein Nachtigalenweibchen gefärbt. Schwänzchen fehlten auch hier.

Das Jugendkleid des Sprossers ist mir aus eigener Anschauung nicht bekannt.

Das Schwarzplättchen. Es wird kaum nöthig sein, anzuführen, daß sich das ausgemauserte weibliche Schwarzplättchen leicht an seiner rostbraunen Kappe erkennen läßt, während die Kappe des Männchens bekanntlich tief schwarz ist.

Unter vier Jungen eines Nestes, die ich vor ein paar Jahren zu sehen Gelegenheit hatte, unterschieden sich zwei Männchen leicht von den beiden Weibchen. Jene hatten eine rostgraubraune Kappe, während die Kappe der Weibchen nur durch eine etwas dunklere Färbung des Scheitels angedeutet war.

Die Gartengrasmücke, graue Grasmücke. Junge und alte Vögel sind bezüglich des Geschlechts schwer zu unterscheiden. Ich weiß bei alten Vögeln kein anderes unterscheidendes Merkmal anzugeben, als daß das Weibchen kleiner ist, wie das Männchen.

Vier dem Neste entnommene Vögel zeigten in der Färbung des Gefieders, auch im Alter von 4 Wochen, in der Größe keinen Unterschied; es waren, wie der Gesang nachher ergab, zwei Pärchen.

Nach der Aussage eines mir bekannten Vogelkundigen, der die Gartengrasmücke allerdings genau kennen konnte, soll das vermauserte Weibchen am Oberkörper einfach grau, das Männchen olivengraubraun sein.

Das Rothkehlchen. Im ausgemauserten Zustande unterscheidet sich das Männchen unschwer von dem Weibchen durch seine schöne, lebhaft rostgelbe Färbung an Stirn, Kehle und Oberbrust; das Letztere hat hier ersichtlich eine blassere Farbe. Ob die Nestjungen geschlechtlich sich durch verschiedene Färbung des Gefieders unterscheiden, weiß ich nicht anzugeben; ich habe mich zuwenig für sie interessirt.

Das Blaukehlchen und die gelbbäuchige Grasmücke, Spottvogel, übergehe ich hier, da ich nur Allbekanntes über dieselben weiß und daher höchstens nur anführen könnte, daß im ausgemauserten Zustande die schöne lasurblaue Kehle des Blaukehlchenhahns beim Weibchen nur angedeutet ist und weiter, daß die fast schwefelgelbe Brust des Grasmückenmännchens beim Weibchen merklich blasser ist.

Die Schwarzdrossel. Die unterscheidenden Geschlechtsmerkmale beim alten Vogel sind bekannt. Weniger bekannt dürfte es sein, daß sich das junge Männchen im Neste leicht an der dunklern Färbung des Oberkörpers erkennen läßt. Es ist daher gar nicht nöthig, wie so häufig geschieht, ein ganzes Nest voll Jungen dieser Art wegzunehmen, um sich in Besitz eines Sängers zu setzen.

Die Graudrossel, Singdrossel. Viel weniger leicht, als die vorhergehende Art, läßt sich das Geschlecht dieser Sänger bestimmen; doch gelingt es einem kundigen Auge auch hier, bei jungen und alten Vögeln, die sich bekanntlich in der Farbe nicht sonderlich unterscheiden, das Männchen an den schwärzlichen, deutlicher ausgeprägten bartartigen Streifen an der Kehle, an der stärker gefleckten Brust, sowie an den orangefarbenen unteren Flügeldeckfedern, die beim Weibchen weißgelb sind, zu erkennen.

Der Blutfink. Die Farbe beider Geschlechter nach der ersten Mauser ist wol Jedem bekannt. Im Neste sind die jungen Männchen unschwer zu erkennen an der Brust, die einen röthlichen Anflug auf grauem Grunde hat. Das junge Weibchen ist an der Brust tiefgrau. Es ist hiernach auch nicht nöthig, obgleich es nicht selten geschieht, dem jungen Vogel einige Federn an der Brust auszurupfen. Ueberdies beginnt der männliche junge Blutfink auch seinen Gesang, bevor noch die Federn nachgewachsen sind.

Der Buchfink. Das Federkleid der alten Vögel ist bekannt. Im Neste erkennt man die jungen Männchen leicht an den rein weißen Querbinden der Flügel; bei den Weibchen sind diese Querbinden trübweiß, auch etwas schmäler als bei den Männchen.

Der Distelfink. Er gehört zu denjenigen Vögeln, deren Geschlecht sich im Jugendkleid, wie nach der ersten Mauser, nur von Kennern bestimmen läßt. Beim ausgemauserten Vogel sind als sicherstes, weil am meisten in die Augen fallendes Kennzeichen die schwarzen oberen Flügeldeckfedern zu beachten. Beim Weibchen sind dieselben dunkelgrau. Außerdem sind die kranzförmigen Bartfedern des Männchens von schwarzbrauner, fast schwarzer Farbe, beim Weibchen dagegen weißgrau oder hellbraun; das Roth des Männchens zieht sich bei diesem fast bis auf die Mitte des Scheitels hinauf, geht auch unter dem Schnabel fast ebenso tief herunter. Beim Weibchen hat dasselbe eine geringere Ausdehnung nach beiden Seiten hin, übrigens aber durchweg dieselbe intensive Farbe. Im Neste sind die jungen Männchen an den schwarzbraunen Bartfedern, die beim Weibchen hellgrau sind, sowie an der dunkleren Farbe überhaupt zu erkennen. Auch nach der ersten Mauser sind junge Vögel von älteren noch zu unterscheiden, da sie weniger Roth am Kopfe haben. Von einem besonders schön gefärbten Gefieder ist daher auf ein Alter von mindestens zwei Jahren zu schließen.

Der Hänfling. Das Gefieder der alten Vögel darf ich wol als bekannt voraussetzen, ebenso die verschiedene Färbung des ein-, zwei- und dreijährigen Männchens. Weniger bekannt dürfte es sein, daß die jungen Männchen im Nest an den weißlichen Halsringen und dem breiten Weiß am Schwanz zu erkennen sind. Der äußere Bart der Flügelfedern ist bei jungen Männchen ebenfalls breiter weiß — bis an den Kiel —, als bei den Weibchen.

Die Ackerlerche. Von ihr ist mir aus eigener Anschauung nur bekannt, daß sich das alte Männchen durch seinen besonders stark entwickelten, nach vorne gerichteten Zapfen vom Weibchen unterscheidet. Im Nest sollen die jungen Männchen an dem weißen Ringe um die Wangen und an den häufigeren schwarzen Flecken auf Brust und Rücken kenntlich sein. —

W. Böcker, Kontroleur in Wetzlar.

Vogelkrankheiten.

(Zur Zucht der Pariser Kanarien).

Seit dem 24. April hatte ich die Freude, in drei meiner Hecken 4, 3 und 3 Junge zu sehen. Alle gediehen vortrefflich, die Fütterung der Jungen fand in aller Ordnung statt, und in wenigen Tagen wäre die Brut von vier Jungen flügge geworden; doch o weh', welch' Anblick bot sich mir am 9. Mai des Morgens. Von den vier Jungen lagen drei todt im Nest. Das Einzige, was ich an denselben entdecken konnte, war, daß die Hinterleibchen ganz schwarz waren. Ich konnte mir nicht die Ursache dieses Todes enträthseln. Alle drei Hecken erhalten dasselbe Futter, Ei mit Weißbrot. Natürlich erneuerte ich für das übrig gebliebene vierte Junge das Nest; doch auch dieses sollte von diesem räthselvollen Tode nicht verschont bleiben. Im Laufe des Nachmittags fand ich es neben dem Nest schon halb todt. Ich suchte es durch Bettwärme zu erwärmen, bestrich ihm den Leib mit warmem Provenceröl und siehe da, es fand sofort eine Entleerung einer schwarzen Masse statt. Das Vögelchen bewegte sich wieder, die Aeuglein auch, aber das Zucken der Beinchen gefiel mir gar nicht. Damit das Thierchen mehr Wärme habe, that ich es in ein Nest zu noch andern drei Jungen. Alles umsonst. Am andern Morgen fand ich es todt am Boden, und wie schön wäre das Vögelchen geworden: am ganzen Körper hochgelb und nur die Schwanzfedern schwarz, mit einer gelben Feder in der Mitte. An diesem Mißgeschick sollte es aber noch nicht genug sein. Heute Morgen befand sich in der Hecke der Pariser wieder ein Todtes. Ein anderes Junge aus diesem Nest war am Boden und ist doch erst 15 Tage alt, muß also herausgestoßen worden oder gefallen sein. Mag wol die naßkalte Witterung, die wir hier hatten, schuld daran sein, dadurch, daß sich die Vögelchen erkälteten, in der ungeheizten Stube in der ich sie halte. An der Pflege hat gewiß nichts gemangelt. Der einzige Vorwurf, den ich mir machen könnte, wäre der, daß ich zu kleine Nestkörbchen gewählt habe und durch das stete Größerwerden der Jungen die Mutter dieselben nicht mehr bedecken konnte und die Jungen sich also erkälteten.

Nachdem ich soweit geschrieben, gehe ich zu meinen Hecken, sehe dieselben nach, finde zu meinem Erstaunen in dem noch unberührt gebliebenen Neste, nur noch zwei Junge, statt deren drei. Das andere lag im Nest daneben, ebenfalls schon halb todt. Ich begann nun mit diesem dieselbe Behandlung. Bestrich dasselbe mit warmem Provenceröl, um so mehr, da sich am After eine schwarze Kruste gesammelt hatte. Mit Hülfe eines Pinsels konnte ich dieselbe lösen und es erfolgte aus dem Leibe wieder derselbe schwarze Unrath von gestern. Ich legte das Vögelchen darauf in warme Tücher, gab ihm zu trinken und habe es nun wieder zu den beiden anderen Jungen gethan. Ehe der Brief abgeht, werde ich noch sagen können, ob es am Leben bleibt.

Dies ist doch gewiß arges Pech. Von 10 jungen Vögelchen in Zeit von zwei bis drei Tagen deren fünf bis sechs zu verlieren.

Nachschrift. Soeben habe ich nochmals nachgesehen und hoffe das Vögelchen retten zu können. Wenn nur das alte Weibchen mehr auf dem Neste sitzen möchte! W. Kling in Basel.

Vogel-Versendungen.

Ein Nothschrei.

In letzterer Zeit haben sich die Unglücksfälle bei den Sendungen lebender Vögel in wirklich beunruhigender Weise gehäuft, und wir sehen uns daher gezwungen, der obersten Kaiserlich Deutschen Postbehörde folgende Vorstellungen zu machen.

Durch Zahlen können wir nachweisen, daß der Vogel- und Geflügelhandel gegenwärtig viele Tausende von Thalern alljährlich umsetzt, und daher haben die Betheiligten jedenfalls das Recht zu der Frage: weshalb denn gerade dieser Geschäftszweig unter ganz abnormen Einrichtungen leiden soll?

Nach Paragraph 13 des Post-Reglements dürfen (brauchen) lebende Thiere nur bedingungsweise zur Versendung mit der Post, „und zwar nur insoweit angenommen werden, als die Versendung solcher Thiere überhaupt mit dem postmäßigen Betriebe vereinbar ist." Hiernach also wäre die gesammte Vogel- und Geflügel-Versendung ja nahezu dem willkürlichen Ermessen des jedesmaligen betreffenden Annahme-Beamten anheimgestellt. Von kleinen, den Verkehrsstraßen fern gelegenen Post-Expeditionen wollen wir vorläufig schweigen; bei ihnen hängt die Annahme jeder derartigen Sendung in der That größtentheils, wenn nicht durchaus, von der persönlichen Meinung des Beamten ab. Aber auch an den größten, vom regsten Weltverkehr durchbrausten Orten leidet man unter der Unsicherheit der Post- und gesetzlichen Bestimmungen. Für die Richtigkeit dieser Behauptung sei vorläufig nur ein Fall mitgetheilt.

Vor Kurzem verunglückte eine Sendung mit Vögeln, von Berlin aus an Herrn Emil Linden in Radolfzell in Baden, im Werthe von 62 Thalern. Die im tadellosen Zustande aufgegebenen zwei Käfige waren durch Heraufwerfen einer Kiste oder durch eine ähnliche fahrlässige Beschädigung zerbrochen, die Vögel theils getödtet, theils entflogen. Die Untersuchung ergab dies Alles ganz genau.

Trotzdem, so lautete der Bescheid der obersten Postbehörde, könne kein Ersatz geleistet werden, weil dies in dem bezüglichen Reglement nicht vorgesehen sei. Das ist denn aber doch offenbar eine Rechtsschädigung, wie solche im Betriebe der Kaiserlich Deutschen Post keinenfalls vorkommen sollte! Verglichen mit der englischen Postverwaltung erscheint solch Verfahren weder den großartigen Verkehrsverhältnissen unserer Zeit im Allgemeinen, noch dem Rufe der deutschen Post im Besondern angemessen.

Mit Freude hat jeder Vogel- und Geflügel-Liebhaber die nicht unbeträchtliche Erhöhung des Portos für Sendungen mit lebenden Vögeln begrüßt. Denn, sagte man sich, jetzt wird doch endlich die leidige Unsicherheit solcher Sendungen ein Ende haben. Diese Hoffnung ist leider keineswegs in Erfüllung gegangen. Im Gegentheil haben sich, wie bereits Eingangs erwähnt, gerade in der letzteren Zeit die derartigen Unglücksfälle nur noch vermehrt.

Immerhin möge die Postverwaltung das Porto für die Versendungen lebender Thiere noch weiter erhöhen, billigerweise muß sie aber auch Sicherheit bieten — soweit solche eben im Bereich der Möglichkeit liegt — und ganz entschieden muß sie einen Ersatz gewähren, im Falle des Verunglückens durch die Schuld der Postbeamten. Dies ist eine durchaus angemessene Forderung, welche wir hiermit im Namen aller Geflügel- und Vogelliebhaber mit allem Nachdruck geltend machen wollen. Einer zeitgemäßen Regelung dieser Angelegenheit dürfen wir wol um so zuversichtlicher entgegensehen, da die Kaiserlich Deutsche Postverwaltung in anerkennenswerther Weise es sich angelegen sein läßt, billigen und gerechten Wünschen Rechnung zu tragen.

Wir haben diese Vorstellung bereits an die Ober-Postdirektion zu Berlin gerichtet und werden den Lesern den eingehenden Bescheid seiner Zeit ebenfalls mittheilen. Die Redaktion.

Mittheilungen zur Hebung der Hühnerzucht.

Kurze Andeutung über Fütterung der Küken.

Bekanntlich bringen die Küchlein so viel Nahrung aus dem Ei vom Eidotter mit zur Welt, daß sie keinerlei Nahrung in den ersten 18 bis 24 Stunden bedürfen. Man lasse daher am besten in dieser Zeit die Glucke ungeschoren und nehme keine Jungen weg, da man dadurch die Glucke leicht leidenschaftlich und wild macht und auch dazu bringen kann, daß sie die Eier verläßt, welche noch ausschlüpfen sollen.

Nach Verlauf der obenerwähnten Zeit reiche man in einem sehr flachen, breiten Gefäß den Jungen in süße Milch eingeweichte Hirse, welche eine Stunde vorher mit warmer oder kochender Milch übergossen worden; frische Ameiseneier sind noch dienlicher und werden noch gieriger von den kleinen Geschöpfen verschlungen. So füttere man 3—4 Tage, dann reiche man daneben auch abwechselnd altbackenes Milchbrot mit warmer Milch übergossen, und vom 8. Tage an reiche man täglich zweimal außerdem trockene Hirse, oder feine geschälte Gerstenkerne, oder Brotkrümchen von altbackenem, nicht zu saurem Brot. So füttere man die Thierchen bis zur vierten Woche täglich sechsmal und reiche stets nur so viel Futter, daß die Küchel rein auffressen, sich aber nicht überfressen. Frisches Trinkwasser darf selbstverständlich vom ersten Tage an nicht mangeln, aber stets im flachen Gefäß aus bekannten, leicht zu errathenden Gründen. Wo die Ameiseneier fehlen, da ersetze man dieselben durch fein gehacktes gekochtes Fleisch, Rindfleisch oder Rinderherz; doch vermische ich dasselbe fast stets mit Käsematten, welche scharf ausgepreßt sind. Von der vierten Woche an reiche ich täglich sechsmal abwechselnd altbackenes Schwarzbrot mit Milch übergossen, Gerstenkörner, Käsematten und mehlige Kartoffelstückchen. Meine Küchlein können in Grasgärten und ich brauche daher kein Grünzeug außerdem zu reichen, welches aber unbedingt da geschehen muß, wo die Thierchen in Behältern und Höfen stecken, und wo sie dasselbe nicht finden. Wöchentlich lege ich ins Trinkwasser recht rostige Eisenstücke, welches die Gedärme stärkt und vor Verstopfung hütet.*) Im Allgemeinen halte jeder Hühnerzüchter folgende Regel fest, daß man stets den Kücken und auch den Hühnern Morgens als erste Gabe weiches sehr nahrhaftes Futter reiche, welches rasch verdaut wird und den Thieren dadurch Stärkung giebt, und Abends gebe man spätestens gegen 6 Uhr, besser schon um 5 Uhr die letzte Gabe in festerem Futter, damit die Nacht über dem Thierchen der Schlaf nicht durch Hunger und Sorgen vergällt wird.

Fr. Wiegand,
Lehrer in Anspach, Amt Usingen,
Prov. Hessen-Nassau.

Aus den Vereinen.

Ausstellungsbericht der II. allgemeinen Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht in Köln.

(Schluß).

In der Abtheilung für Vögel waren Preisrichter die Herren Dr. O. Dumont, Ferd. Melchior und W. A. Schmitz in Köln. Eine eigenthümliche Erscheinung wird es immer sein, daß die glühendsten Singvögel-Liebhaber so ungern ihre Sänger u. s. w. zu Ausstellungen schicken. Die Bedenken derselben schweben mir alle vor und jeder wahre Liebhaber wird dieselben billigen müssen. Dennoch ist es wirklich schade und dies Verhalten dient keineswegs zur Hebung und zum Aufblühen der Liebhaberei für Singvögel. Die Liebhaber lieben ihre Thierchen mehr als Preise und Medaillen der Ausstellungen. Wir wollen es ihnen nicht verargen. Dadurch allein ist es gekommen, daß jetzt die Ausstellungen fast nur von Händlern beschickt werden. Die Bestellung bei diesen kostet oft kaum gute Worte. So macht man in Vereinen eine große Ausstellung von Vögeln, um den Besuchern zu imponiren. Wir werden uns mit die-

*) Dies ist wenigstens ein allverbreiteter, wenn auch freilich nicht begründeter guter Glaube. D. R.

sem einfachen Vogelmarkte nie einverstanden erklären können. Die Abtheilung für Vögel war entschieden am schwächsten von den drei Abtheilungen beschickt. Eine Art stiefmütterliche Behandlung der „Vogelabtheilung" findet man in fast allen Vereinen. Die Zahl der Hühner- und Taubenliebhaber ist überall meist größer, als die der Singvögelliebhaber.*) So mag wol daher nur obige Erscheinung kommen.

Die Harzer Kanarienvögel waren in großer Auswahl vertreten. Herr Zuckerkandel aus Dresden verdient vor allen Anderen mit seiner großen Sammlung hier erwähnt zu werden. Einzelne Liebhaber lauschten seinen vortrefflichen Sängern oft halbe Stunden zu, bis sie ihre Wahl getroffen und ihren neuen, theuer erkauften Liebling mit nach Hause nahmen. Man hatte in dieser Abtheilung die große Freude, die verschiedensten Schlagarten der Kanarienvögel zu hören. Herr L. Köhler aus Hannover hatte auch zwei der Roller mit Glucke eingesandt, denen sich die Schläger gute Herren R. Hironymi in Braunschweig, Melchior und J. J. Classen hier würdig anschlossen.

Aus der Abtheilung inländische Samenfresser verdient die reizende Voliere des Herrn P. Derkum hier Erwähnung. Die ausländischen Samenfresser waren sehr reichlich in sehr guten Vögeln vertreten. Es scheint die Liebhaberei für diese Vögel immer zuzunehmen, was wir der größeren Ausdehnung und Hebung aller zoologischen Gärten verdanken. Es ist Geschmacksache. Unsere heimischen Sänger stehen doch bei weniger schönem Gefieder unübertrefflich da und werden immerfort ihre guten Freunde finden. Man sah da Päpste mit und ohne Frauen, rothe und graue Kardinäle, schwarze Nonnen, Astrilds, Silberfasänchen, Elstervögel, Orangenbäckchen, Goldbrüstchen u. s. w. Die Zebrafinken des Herrn A. Boekmann in Groß-Gerau hatten ihre Weiber zu Hause gelassen. Die Herren Korhold in Solingen, J. Liebelt in Köln und J. Reinhardt in Hannover waren hier die Sieger. Die Schwarzamseln des Herrn A. Bennert hier, aus der Abtheilung der Weichfresser, hatten sich wegen Heiserkeit entschuldigen lassen. Der hier noch ziemlich unbekannte Jamaika-Trupial des Herrn J. Reinhardt aus Hannover wurde wegen seiner schönen Farbenpracht viel bewundert, doch nicht verkauft. — Unter den Papageien wurde schnell der Liebling der Damenwelt der Papagei des Herrn R. Baumann aus Ehrenfeld. Herr H. Korhold aus Solingen hatte prachtvolle Amazonen und Singpapageien ausgestellt, J. Liebelt von hier sprechende graue Papageien. Wellenpapageien waren in großer Anzahl vorhanden und fanden bald Käufer in Menge. Die Zuneigung zu dieser Vogelart nimmt ebenfalls immer mehr zu. Wenn man übrigens glaubte, daß die Zeit nicht fern läge, in der die Wellenpapageien gleichwie die Kanarienvögel im Harze, in Deutschland gezüchtet werden würden und so diese Zucht mit Sicherheit ein wichtiger Erwerbszweig für gewisse Klassen werden müsse, so erlauben wir uns doch anderer Ansicht zu sein. Wer darüber belehrt sein will, erkundige sich doch bei den Direktoren der zoologischen Gärten und wird bald eines Besseren belehrt sein.**) Die Nymphen des Herrn W. A. Schmitz von hier waren tadellos. Die Gruppen ausgestopfter Vögel desselben Herrn fanden allgemeine Bewunderung und waren stets von Zuschauern umzingelt.

Herr Chr. A. Kircher hier, Besitzer einer Drahtflechterei, hatte eine wirklich geschmackvolle Voliere für Vögel eingesandt. Es tagten in ihr die rothen Kardinäle. In einer zweiten Voliere, ebenso praktisch und geschmackvoll von demselben Herrn, für Tauben, Hühner und Singvögel eingerichtet, hatte der Vorstand des Vereins sein Bureau und Kasse eingerichtet, weshalb der Kassirer manchen Scherz zu hören bekam. Weizen, Wicken oder Sämereien haben wir die Herren in dieser Voliere nicht mit frischem Wasser verzehren sehen.

Die auf der Ausstellung gemachten Verkäufe betrugen 2160 Thlr., wozu die feineren Hühner die größte Summe lieferten. Der Besuch der Ausstellung war sehr zahlreich, und es war nur zu bedauern, daß es unmöglich gewesen, dieselbe um ein bis zwei Tage zu verlängern.

*) ? Die Redaktion.

**) Wir bitten die Mittheilungen in „Vogelzucht als Erwerb" zu vergleichen. D. R.

Bücher- und Schriftenschau.

Der Hühner- oder Geflügelhof von Robert Oettel (Weimar, Bernhard Friedrich Voigt). Der Verleger dieses Werkes sandte uns die neue Auflage mit dem freundlichen Hinweise, daß es das erste überhaupt in die Oeffentlichkeit hinausgehende Exemplar sei. Gern hätten wir nun auch die allererste Besprechung gebracht — allein Krankheit, Ueberlast an dringenden Arbeiten u. dgl. tragen die Schuld, daß Monate darüber hingegangen sind.

Die bereits in Nr. 22 angezeigte fünfte, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage dieses vortrefflichen Werkes besprechen wir jetzt mit ganz besonderer Freudigkeit. Schon in der äußeren Ausstattung finden wir eine bedeutsame Verbesserung darin, daß die Hühnerrassen in Gruppen dargestellt sind und zwar in einer Weise, die, mit Herrn Köhne zu reden, jetzt auch dem werthvollen Inhalt des Buches entsprechend erscheint.

Wie sehr die Liebhaberei für das Geflügel im engern Sinne, also die Bewohnerschaft des Hühnerhofes, zugenommen, dafür sprechen am deutlichsten die immer zahlreicher und großartiger sich zeigenden Geflügelausstellungen nebst dem überraschend regsamen Geschäftsverkehr, welchen sie mit sich bringen. In dem Maße aber, in welchem die Liebhaberei steigt, muß naturgemäß auch das Bedürfniß nach einer Belehrungsquelle zunehmen und als die beste aller in deutscher Sprache vorhandenen Belehrungsquellen auf diesem Gebiete, dürfen wir ganz entschieden Oettel's Buch ansehen. Als Stifter und Präsident des „Hühnerologischen Vereins" zu Görlitz ist er auf diesem Gebiete weltbekannt und ganz sachgemäß fließen ihm daher im Laufe der Jahre die reichsten und werthvollsten Erfahrungen von allen Seiten zu. Wer aber dies Buch noch von Gauß her kennt, wird zu ermessen wissen, mit welchem Verständniß und welcher umfassenden Kenntniß des Gegenstandes Robert Oettel dasselbe immer weiter vermehrt und verbessert hat.

Dr. K. R.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Gesucht wird: 1 nistfähiges Pärchen Grauedelfinken. Männchen muß aber guter Sänger sein. Franco-Offerten sub S. N. 15 besorgt die Expedition. [412]

Zu kaufen suche ich: je **1 Weibchen** Schönsittich, kleines Elsterchen, Amarant, Goldbrüstchen, Kapuzenzeisig (Chrysomitris cucullata) und **1 Männchen** Angolahänfling (Fr. atrogularis).

Baden-Baden, Schloßberg 10.

[413] Dr. **F. Franken.**

Wegen bevorstehenden Umzugs sind abzugeben:

1	Pärchen	Safranfinken,	M. u. W.,	à 4 Thlr.	15 Sgr.,
1	„	Paradieswittwen	„	à 4 „	
1	„	Napoleonsvögel	„	à 3 „	15 „
1	„	Bandvögel	„	à 2 „	
1	„	Hartlaubszeisige	„	à 6 „	

2 Stück Graupfäffchen (Sp. intermedia), beide Männchen und vorzügliche Sänger, 6 Thlr.

1 „ Silberfasänchen, M., à 1 Thlr.,

1 „ Tigerfinkchen, M., ausgezeichneter Schläger, à 2 Thlr.,

1 „ Astrild, M., à 1 Thlr. 15 Sgr.

Sämmtliche Vögel sind gesund und im besten Gefieder. Offerten sub A. H. Nr. 100 besorgt die Expedition ds. Bl. [414]

Jako oder Portoriko-Papagei
sucht zu kaufen
[415] F. Schöne in Plauen.

Diesjährige schöne, gutgetrocknete Ameiseneier à Pfund 17½ Sgr. empfiehlt
Mirow in Mecklenburg.
[416] Friedr. Mahnfeldt.

[417] In der
Grosshandlung überseeischer Vögel etc.
von
Arnim Kraeger, Leipzig, Zeitzerstr.,
sind alle in Nr. 25 der „Gefiederten Welt" offerirten Vogelarten ꝛc. zu den billigsten Preisen vorhanden.

Smaragdgrüne Eidechsen
(Lacerta smaragdina),
für Terrarien und Treibhäuser eine Zierde, können bezogen werden durch [418]
Stauffer's Museum in **Luzern** (Schweiz).

Gesucht werden: ein Mch. Ringelastrild, ein Wbch. Dornastrild; abzugeben für 15 Thaler: ein Paar schöne Sonnenvögel (import.) durch
[419] Louis Krüger in Gr. Mühlingen.

Naturalienhandlung
von Wilh. Schlüter in Halle a. S.
Die Preisverzeichnisse Nr. 41 über **Fische**, gestopft und in Spiritus und Nr. 42 über sibirisch' **Vogelbälge** und **Eier** sind erschienen und stehen auf Verlangen gratis zu Diensten. [420]

R. Ritter.

Naturalien- und Thierhandlung.

[421]

Hamburg, St. Pauly, Spielbudenplatz Nr. 21.

hat vorräthig:

1 großen und 1 kleinen sprechenden gelbhaubigen Kakadu, 1 sprechenden doppelten Gelbkopf, graue Surinam-, Amazonen- und Portoriko-Papageien, Rosa- und Nasenkakadu, blaue Gebirgslory, Königslory, chinesische Sonnenvögel, Halsband-, Ring-, Carolina-, Quäker- und Goldkopfsittiche, Pynauti-, Rosella-, Mely-Rosella-, echt importirte Wellensittiche, Dom. Cardinals, Diamantvögel, Astrills, Orange-Fasänchen, Inseparable, Turkisinen-, Edwards-, Tigerfinken, Sperlingspapageien, Safranfinken, Paradiesweber, Madagascarweber, 1 Leopard, Silber-Schakals, Zibeth-Katzen, Waschbären, Rüsselbären, Packas, Ichneumons, 6 Stück Seehunde u. s. w.

[422]

Das Etablissement

von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180 St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen folgende Thiere erhalten:

20 Graupapageien, 2 Leadbeaterkakadus, 28 Vielfarbige Sittiche, 7 Paar Rothrümpfe oder Singsittiche, 8 Große Alexandersittiche, 11 Paar Nymphensittiche, 24 Paar Wellensittiche, 90 Paar Zebrafinken, 29 Paar Diamantvögel, 23 Paar St. Helenafasänchen, 40 Paar Nonpareils.

Außerdem verschiedene Affen, 10 Fliegende Hunde, 1 Zweifarbiges und 9 Graue Eichhörnchen, sowie auch 1 Paar Yak-Büffel oder Grunzochsen.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 16. Juli 1874. Nr. 29.

Inhalt:

Festrede. —
Das Zweiggeschäft des Herrn Gudera in Wien. —
Züchtungen einheimischer Vögel. —
Stubenvogelzucht als Erwerb (Fortsetzung). —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. Rothschwänzchennest. —
Zur Fütterung: Für Insektenfresser. —
Briefliche Mittheilungen: Bastardbrut. —
Anfragen und Auskunft: Kanarienweibchen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.

Festrede,

gehalten auf dem ersten Stiftungsfeste des Ornithologischen Vereins in Stettin von dem Vorsitzenden Herrn Adolf Crentz.

Ornithologischen Gruß und herzliches Willkommen rufe ich Ihnen Allen zu, die Sie sich zur Feier dieses Tages hier eingefunden haben. Es war vor einem Jahre um diese Stunde, als eine kleine Anzahl Männer sich versammelten und den Ornithologischen Verein in Stettin stifteten. Die Kenntniß, die Pflege, die Zucht und den Schutz der Vogelwelt und des Geflügels zu fördern und den Verkehr der Liebhaber und Züchter hier und außerhalb zu gegenseitiger Freude und zum Nutzen zu vermitteln, wurde als der Zweck des Vereins aufgestellt. War die Bildung eines solchen Vereins berechtigt, nützlich, nothwendig, und hat er in dem abgelaufenen Vereinsjahr seinem Ziele nachgestrebt? Das sind Fragen, die einer eingehenden Betrachtung werth erscheinen dürften, die ich aber in der für eine Tischrede knapp gemessenen Zeit wol nur unvollständig zu erörtern im Stande sein werde.

Wir leben in einer Zeit mächtiger Entwicklung, wie kein Zeitalter vor uns eine gleiche Entfaltung des menschlichen Schaffens aufzuweisen hat. Diese Thatsache verdanken wir zum größten Theil der Verbindung gleicher Kräfte zum Streben nach einem gemeinsamen Ziele. Auf allen Gebieten menschlicher Thätigkeit, seien sie geistiger oder materieller Natur, auf den Gebieten der Wissenschaft und Kunst, wie des Gewerbefleißes, sehen wir nur da wahren Fortschritt, Gründliches und Gediegenes sich gestalten, wo die Forschung und Arbeit auf einen besonderen Gegenstand gerichtet, wo die Thätigkeit einem besondern, begrenzten Ziele zugewendet ist. Aus dieser Erkenntniß und diesem Bedürfniß der Menschheit ist auch das Vereinsleben entstanden. Unserm Jahrhundert war es vorbehalten, ihm gebührt das Verdienst, das Vereinsleben zur Blüte und Macht entfaltet zu haben, so daß es kaum noch einen gebildeten Menschen giebt, der nicht wenigstens einem Verein als Glied angehörte.

So verschieden die Bestrebungen der Menschen sind, so mannigfaltig sind die Vereine, Gesellschaften und Genossenschaften, die sich zur Erreichung ihrer Zwecke verbinden. Die Zeit aber ist längst vorüber, in der das Interesse und die Liebe für die Vogelwelt nur als eine bloße Spielerei betrachtet wurde.

Mit unabweisbarer Nothwendigkeit tritt heute die Forderung an Jeden heran, der sich noch ein Gefühl für das allgemeine Wohl bewahrt hat, mitzuarbeiten an der Förderung des nationalen Wohlstandes, der auch zum Theil aus der Kenntniß, Pflege und Züchtung der Vögel und des Geflügels wächst, und einzutreten in den Schutz unserer einheimischen Sänger in Wald und Flur, mit der Erkenntniß ihrer Unentbehrlichkeit im Haushalte der Natur. Daß hierzu die Bildung eines Vereins eine wohlberechtigte, nothwendige und nützliche war, dürfte nicht mehr fraglich erscheinen, und in diesem Bewußtsein fühlen wir uns zur heutigen Feststimmung gehoben. Bevor aber Jemand die soeben angedeuteten, wichtigen und hochherzigen Ziele in ihrem vollen Maße zu würdigen vermag, und noch mehr, während er an der Ausübung derselben arbeitet, muß er vor Allem ein Vogelliebhaber sein, und damit meine ich nicht nur die Liebe zu Sing- und Schmuckvögeln, sondern zur ganzen gefiederten Welt.

Wenn wir die Ereignisse betrachten, wie sie sich im täglichen Leben vor unseren Augen vollziehen, dann gewahren wir sehr oft eine Erbitterung und Grausamkeit des Menschen gegen den Menschen, die uns mit tiefem Schmerz erfüllt; blicken wir dann noch auf die große Zahl Derer, die im unablässigen Jagen nach sogenannten Lebensgenüssen sich entnerven und aufreiben, und doch nie zu Zufriedenheit und wahrem Lebensglück gelangen, und fragen wir uns, worin solche Mißverhältnisse ihren tieferen inneren Grund haben, dann werden wir zu der Erkenntniß gelangen, daß solchen Menschen die Natur entfremdet ist, die Natur mit ihrem unermeßlichen Reichthum, mit ihren stets neuen wunderbaren Schöpfungen, mit ihrer Mannigfaltigkeit und Pracht, mit ihren hohen Lebensfreuden und Genüssen.

Wol dem, der sich da noch Gemüth und Verständniß genug bewahrt hat für die schönere, reinere, edlere Lebensfreude, dessen Herz noch warm schlägt für alle Mitgeschöpfe der lebendigen Natur! Was könnte da wohl berechtigter und mehr zu beherzigen sein, als die Liebhaberei an den lieblichen Wesen, die Jeden, der noch nicht ganz für die Reize der Natur abgestorben ist, mit ihrem Gesang so hoch erfreuen oder durch ihr fröhliches, munteres Wesen und ihre Farbenpracht ergötzen. Wer dürfte den tadeln, der in Feld und Wald, in der freien Natur an dem Vogelgesang sein Herz labt, wer den, der durch seinen Beruf an's Haus gefesselt, sich darin, sei es in der Vogelstube, auf dem Taubenschlag oder auf dem Hühnerhof, ein Stück Natur zu schaffen weiß und daran Erholung, Zufriedenheit und Glück findet, wie kein Anderer, der den vorhin angedeuteten Leidenschaften ergeben, dies jemals zu empfinden im Stande ist. Aber nicht nur aus dem bisher Gesagten geht die Berechtigung, die Nothwendigkeit und Nützlichkeit unseres Bestrebens hervor, ich will nur noch das Eine in aller Kürze anführen und zeigen, daß es auch noch in höherem Grade empfehlenswerth ist, denn es wirkt veredelnd auf das Gemüth. Wer sich seiner hülfsbedürftigen Lieblinge mit sorgsamer Pflege und Wartung annimmt, wer ihnen Behaglichkeit und Wohlbefinden schafft, der wird nicht blos durch ihre Zutraulichkeit oder durch ihren Gesang belohnt, sondern er übt sich dabei, für Manchen vielleicht unbewußt, in einer Pflicht, die ihn überhaupt zum Wohlthun geneigt macht, die sein ganzes Wesen immer mehr zur Milde stimmt, ja, die ihn vor Allem an's Haus und die Familie gefesselt hält, und welch' hoher Werth hierin für das Familienglück liegt, brauche ich wol nicht auseinanderzusetzen.

Nicht minder aber empfiehlt sich unser Bestreben in Betreff des Vogelschutzes. Kein Land der Erde hat solche edle Sänger als unser schönes deutsches Vaterland sie in seinen Insektenvertilgern besitzt — aber leider müssen wir auch hinzufügen, daß dieselben mit jedem Jahre sich vermindern und einzelne Arten schon fast auszusterben drohen und noch schmerzlicher ist es, bekennen zu müssen, daß die eigene Unkenntniß und Gewinnsucht auch der Deutschen dies zum Theil mitverschuldet hat. Die Forst- und Landwirthschaft, wie sie jetzt betrieben wird, hat unsere Sänger der Zufluchtsorte und Niststätten durch Entwaldung ganzer Landstrecken beraubt, und schon rächt sich dieser Frevel in der erschreckendsten Weise durch Vernichtung ganzer Wälder und Gärten, die am Käfer- und Raupenfraß zu Grunde gehen. Immer lichter werden unsere Wälder und Haine und mit ihnen unsere Sänger seltener und es droht die Zeit zu kommen, von der ein Schriftsteller mit Recht befürchtet, daß man das Wort „Waldkonzert" für eine Erfindung älterer Dichter halten wird. Während diese Wahrheit aber bereits von den Dächern gepredigt wird, sehen wir es noch immer geschehen, daß im Thüringer Harz, bei Halle und Leipzig alljährlich viele Tausende kleiner nützlicher Singvögel gefangen, getödtet und als Leipziger Lerchen in alle Welt versandt werden, und ebenso bringen unsere Ostseeprovinzen jährlich Tausende von erwürgten Drosseln als Krammetsvögeln auf den deutschen Markt, um als vermeintliche Delikatesse verspeist zu werden. Da ist Belehrung und Abhülfe dringend geboten und es kann nicht oft und laut genug gemahnt werden, alle Kräfte aufzubieten, um noch zu retten, was zu zetten ist. Wo das Naturwüchsige vernichtet ist, da muß der Mensch nun versuchen, durch die Kunst Ersatz zu bieten, durch Fütterung unserer freien Sänger im Winter und Aufhängen von Nistkästen für die nützlichsten Arten. (Schluß folgt.)

Das Zweiggeschäft des Herrn Karl Gudera in Wien.

Das Geschäftslokal befindet sich in der besten Gegend der Kaiserstadt an der Donau und ist eben so praktisch als schön eingerichtet. Ein großer Etagenkäfig, in fünf Räume getheilt, enthält erstens drosselartige Vögel, zweitens kleinere Schmuckvögel, drittens

Tauben- und Sittichearten, viertens Kakadus und andere kurzschwänzige Papageien, fünftens Kanarienvögel. Diesem Käfige gegenüber befinden sich zwei große elegante Glasschränke, mit allerlei Naturalien, wie Schmuckmuscheln, Korallen, Käfer- und Schmetterlingssammlungen, Vogelbälge, ausgestopfte Vögel und Säugethiere, Vogelgruppen unter Glas, Reptilien in Spiritus u. dgl.; ferner Proben von allen Vogelfutterarten, die es giebt, Nistgegenstände, Trink- und Futtergefäße und alle möglichen andern Apparate für die Vogelpflege und -Zucht; sodann auch Aquarien, Terrarien, nebst allem Zubehör. Alles ist in vorzüglichstem Zustande und reichlichster Anzahl vorhanden. Um die Vögel in Ruhe zu besichtigen, fehlt es nicht an feinen Fauteuils, welche vor den Käfigen stehen. Selbstverständlich ist der Laden außer dem prachtvollen Schaufenster auch mit vielen, durchgängig nur eleganten Käfigen ausgestattet, in welchen sich eine große Mannichfaltigkeit verschiedener Schmuckvögel befinden.

Mit Bezug auf die Klage in Nr. 16 d. J. „Aus Oesterreich" glaubte ich die obige Mittheilung über das hiesige Geschäft des Herrn Karl Gudera machen zu dürfen. Die daran geknüpfte Hoffnung, daß die Vogelliebhaberei und Züchtung hier jetzt ebenfalls einen großartigen Aufschwung gewinnen werde — wie in ganz Deutschland und andern Ländern — dürfte sich um so eher erfüllen, da es hier bisher keineswegs blos an der Lust und Neigung zur Vogelzucht, sondern vielmehr an einer reellen und zuverlässigen Quelle zum Einkauf gefehlt hat. Möge Herr Gudera daher die dringende Mahnung beherzigen, daß er stets eine solche zu bieten strebe — dann wird sein mit großen Kosten eingerichtetes Geschäft auch zweifellos als ein sehr einträgliches sich zeigen. Ein Verein der Vogelliebhaber, Züchter und Freunde überhaupt wird dann ganz von selber ins Leben treten.

Dr. F. B. in Wien.

Züchtungen einheimischer Vögel.

Seit dem 24. und 28. Juni, 5. und 6. Juli brüten ein Zeisig-, Stieglitz-, zweites Zeisig- und Dompfaffenpaar auf 4, 5, 4 und 4 (4 sind bereits weggenommen) Eiern. Hoffentlich tritt bei den letzteren die frühere Legesucht nicht wieder ein, weil sonst durch fortwährendes Hinzulegen die Brut verdorben wird. Liebhabern solcher Züchtung sind die Vögel täglich von 3 bis 6 Uhr bereitwilligst zur Besichtigung gestellt, doch wäre vorherige Anmeldung des Besuches erwünscht.

Dr. H. Müller in Berlin,
Schumannstr. 15a. I.

Stubenvogelzucht als Erwerb.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung aus Nr. 27.)

Für jede Wellensittichzucht wird aber im Laufe der Zeit Bluterneuerung durchaus nothwendig. Dr. Neubert in Stuttgart und Baron von Freyberg in Regensburg haben haarsträubende Erfahrungen in Betreff fortgesetzter Inzucht veröffentlicht. Um nun solche und viele andere Uebelstände zu vermeiden, sollte man es umgekehrt wie die Kanarienzüchter machen.

Diese behalten bekanntlich Jahr für Jahr dieselben Männchen und schaffen für jede Hecke neue Weibchen an. Wie wir bereits darauf hingewiesen, sind alte gute Wellensittichweibchen aber von geradezu unschätzbarem Werth und man sollte daher alljährlich oder doch mindestens alle zwei Jahre mit den Männchen wechseln. Durch Erfahrungen ist es, wie schon erwähnt, festgestellt, daß gute Weibchen sehr lange Zeit aushalten; für einen Zeitraum von fünf Jahren hintereinander wird man ohne allen Zweifel auf eine gleichmäßige gute Zucht rechnen dürfen. Nach Verlauf einer solchen Frist wird man doch jedenfalls daran gut thun, den ganzen Bestand zu erneuern.

Bei der Weiterzüchtung mit selbstgezogenen Jungen achte man namentlich sorgfältig darauf, daß man zum Austausch ebenfalls hier gezogene Männchen, aber nur aus solchen Hecken entnehme, in denen die Vögel auch sach- und naturgemäß verpflegt sind. Selbstgezogene Vögel, gleichviel Weibchen oder Männchen, mit frisch importirten zusammen zu paaren, ist nicht rathsam, weil die Erfahrung vielfach gelehrt hat, daß solche Pärchen schlecht oder gar nicht nisten. Dagegen hat man mehrfach sehr gute Erfolge erzielt, wenn man selbstgezogene, aber durchaus nistreife Junge mit solchen importirten zusammen paarte, welche bereits seit Jahren eingewöhnt waren. Sehr gute Erträge gewähren immer die etwa im gleichen Alter stehenden, kräftigen, mit Sorgfalt und Verständniß gezüchteten Vögel, welche aus verschiedenen Hecken zusammengebracht sind.

Nun noch einige allgemeine Betrachtungen und Erfahrungen, welche von verschiedenen Seiten übereinstimmend gemacht worden sind.

In jeder größeren Wellensittichhecke bemerkt man eine beträchtliche Anzahl von faulen Pärchen, welche gar nicht zur Brut schreiten. Herr Naacke, der unstreitig der besten Erfolge unter allen deutschen Züchtern sich erfreut hat, klagte, wie schon erwähnt, ebenfalls über diesen Uebelstand.

Unschwer ist derselbe abzustellen, wenn man die faulen Weibchen zu erkennen vermag und sie herausfangen kann. Die Männchen bleiben dann vorläufig allein darinnen und zeigen sich keineswegs schädlich, sondern vielmehr nützlich, wie dies schon gesagt ist. Nach beendeter Nistzeit kann man nach

Ermessen auch wiederum andere Weibchen hinzubringen.*)

Der größte Uebelstand in einer Wellensittichzucht ist die ebenfalls schon erwähnte Unverträglichkeit der Weibchen, welche durch gegenseitiges wüthendes Beißen leider nicht selten jeden Erfolg unmöglich macht. In der großen Hecke oder im Flugkäfige helfen zuweilen folgende Maßregeln. Man biete alle Fütterung recht reichlich und auf zahlreichen Stätten, ebenso hänge man mindestens zwei oder noch besser drei Nistkasten für jedes Weibchen hinein. Schließlich aber schaffe man eine größere Anzahl von Männchen, besonders jüngeren hinzu. Ist jedoch die Beißerei der Weiber bereits in förmlichen Haß ausgeartet, so helfen diese Maßnahmen auch nicht mehr; man muß dann die Raufboldinnen durchaus zu entfernen suchen. Ebenso giebt es bei der Züchtung im Käfige keinen anderen Rath, als daß man die unverträglichen Pärchen von einander absondert oder die Weibchen umtauscht.

In letzterer Zeit habe ich noch zahlreiche Anfragen in Betreff der Fütterung erhalten. Herr Baron von Freyberg in Regensburg, welcher die Wellensittiche jahrelang aufmerksam beobachtet und mit ihnen zahllose Versuche angestellt, fand, daß sie eigentlich alle möglichen genießbaren Stoffe, und zwar nicht etwa aus Noth, sondern gleichsam aus Leckerei verzehrten. Er bot ihnen die verschiedensten mehligen und öligen Sämereien, allerlei getrocknetes Obst, frische und getrocknete Beeren und andere Früchte, gekochtes Hühnerei, Ochsenherz und anderes gekochtes und rohes Fleisch und Hirn, Baumrinde und viel dergleichen — und Alles wurde gefressen.

Die Hauptnahrung seiner Wellensittiche war weiße Hirse und ihre Lieblingsleckerei die Stengel der Kopfsalatblätter. Leider ist weder von Herrn von Freyberg noch von anderen aufmerksamen Züchtern bis jetzt durchaus unumstößlich festgestellt worden, welche Nahrungsstoffe für die Vögel zuträglich sind oder nicht. Nach meinen eigenen, ebenfalls viel jahrelangen Erfahrungen, muß ich rathen, den Wellensittichen ganz entschieden weiter keinerlei Nahrungsstoffe zu bieten, als die in Nr. 26 bereits aufgezählten, welche hier noch einmal wiederholt seien und zwar: Kanariensamen, ungespelzter Hafer, Vogelmiere und grüne Zweige mit Knospen oder kleinen Blättchen, besonders von Weiden, sowie Sepienschale und anderer Kalk, dazu in der Nistzeit dieselben Sämereien eingequellt, ferner aufgeweichte oder frische Ameisenpuppen und in Wasser geweichtes und wieder gut ausgedrücktes oder auch trocken feingeriebenes, bestes altbackenes Weißbrot oder noch vortheilhafter desgleichen Eierbrot. Oelige Sämereien vermeide man entschieden.

Zu den gequellten Sämereien kann man allenfalls auch noch Gerste oder Reis geben, den letzteren besser in heißem Wasser weich gebrüht. Alle möglichen Gras- und anderen mehligen Sämereien halbreif, wenn sie, wie man zu sagen pflegt, in der Milch stehen, sind für die Wellensittiche eine wahre Leckerei und können wohl nichts schaden. Besonders gern verzehren sie Hafer noch in Aehren und junge zarte Maiskörner noch in den Kolben. Völlig reifen harten Mais können sie natürlich nicht fressen. Frische und getrocknete Früchte und Beeren würde ich niemals geben, und für durchaus schädlich — weil der Natur dieser Vögel zuwider — erachte ich rohes und gekochtes Fleisch oder Hirn und dergl. In Ermangelung und zur Ersparung der theueren Ameisenpuppen kann man immerhin hart gekochtes Hühnerei bieten, ich selber gebe es nicht, doch habe ich zahlreiche Zuschriften mit der Versicherung erhalten, daß ein solches Hühnerei, blos in der Mitte durchgeschnitten, nicht allein von den Vögeln begierig gefressen wird, sondern daß dabei auch die Jungen vortrefflich gedeihen. Die Gewöhnung an ein derartiges Ersatzmittel der den Vögeln in der Freiheit mit zur Nahrung dienenden Kerbthiere erscheint ja nach den Jahrhunderte langen Erfahrungen mit dem Kanarienvogel als unschädlich und zweckentsprechend, während doch die zu sehr naturwidrige Beigabe des Fleisches höherer Thiere mindestens aller Wahrscheinlichkeit nach die üblen Folgen hervorbringt, welche leider nur zu vielfach bei der Züchtung sich zeigen.

Mehrfach hat man festgestellt, daß junge Wellensittiche, die von kräftigen Eltern abstammen und gut gefüttert werden, bereits im Alter von 3 Monaten ihrerseits wieder zu nisten begannen. Ich halte dies für durchaus schädlich und rathe vielmehr Folgendes: In der freien Hecke sowol, als auch im Käfige fange man die Jungen, sobald sie selbstständig fressen können, heraus. Wenn man ein für allemal ein Fangbauer über dem Wasser zu stehen hat mit einer Sitzstange im oberen Theile, so macht sich dies in bequemster Weise von selber. Sobald die Vögelchen völlig flügge sind, baden sie ungemein gern und klettern dann auf die obere Stange, von wo aus sie nicht leicht herausfinden, dagegen bequem gegriffen werden können. Im großen Flugkäfige pflegen die Jungen zur Nacht sich an das Gitter anzuklammern, wo sie bei möglichster Vermeidung von Störung in der Dunkelheit unschwer fortzunehmen sind. Alle Jungen läßt man in einem recht großen Flugraume oder doch Flugbauer frei fliegen, bis sie vollkommen kräftig geworden und zur Hecke oder zum Verkauf tauglich sind.

Als Käfig zur Züchtung für einzelne Pärchen hat sich nach vielseitigen Erfahrungen als durchaus zweckmäßig ein solcher von der Gestalt und Größe

*) Wer nicht die Muße hat, seine Vögel so aufmerksam zu beobachten, daß er die einzelnen Individuen unterscheiden und kennen lernt, achte wenigstens sorgsam darauf, daß er kein Weibchen herausfange, welches krumm gebogene Schwanzfedern hat. Denn solche bekommen die Weibchen beim Brüten selbst in geräumigen Nistkäfigen. Wer übrigens mit den Männchen alljährlich wechselt, hat das Herausfangen der Weibchen überhaupt nicht nöthig, denn wenn diese in einem Jahre auch nicht nisten, so thun sie es gewöhnlich im nächsten desto reichlicher.

gezeigt, welche ich im „Handbuch für Vogelliebhaber" angegeben, und er wird desto größer gewählt, je nachdem man mehrere Pärchen hineinbringen will. Er muß fest an der Wand hängen, so daß er weder beim Füttern noch Reinigen gerückt werden kann. Keinenfalls aber glaube man, daß die Wellensittiche in diesem Käfige oder im großen Heckbauer oder in einer Vogelstube unbedingt ungestört sein wollen; könnte man dies vollständig ermöglichen, so wäre es allerdings am besten. Da es jedoch sich nicht erzielen läßt, ohne daß die Vögel bei der Fütterung, Reinigung u. s. w. beängstigt und aufgeregt werden, so ist der umgekehrte Weg entschieden der bessere. Viele Pärchen nisten in den Wohnstuben u. s. w. einfach nur deshalb nicht, weil sie sich keinen Augenblick sicher fühlen. Vor dem Beginn jeder Hecke sollte man die Vögel daher immer erst einige Wochen oder Monate hindurch im kleinen Käfige halten, sich viel mit ihnen beschäftigen und sie zahm und dreist zu machen suchen. Ebenso ist es gut, wenn man in der Vogelstube sich recht viel und oft aufhält und die Vögel an menschliche Anwesenheit gewöhnt. (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Als Gegenstück zu der eigenthümlichen Nistliebhaberei mancher Vögel, ungewöhnliche Brutorte zu suchen, wie Meisen in Briefkasten u. drgl., diene Folgendes:

Seit mehreren Jahren nistet hier ein Feldrothschwänzchenpaar auf dem von zwei Brettchen überdachten oberen Ende einer hölzernen Pumpe mit gutem Erfolg. Das Plätzchen ist so klein, daß die wenig ruhige Stange dem brütenden Vogel unmittelbar vor dem Schnabel auf- und abgeht. Auffallend erscheint dabei, daß die Anwesenheit des Nestes erst dann bemerkt wurde, als häufig Bartmoos auf dem ausgepumpten Wasser gesehen und in Folge dessen das eine Brettchen losgemacht wurde, wobei sich ein Nest mit 5 halbflüggen Jungen, die später auch glücklich ausflogen, zeigte. Mit der Zeit sind die Alten ganz zutraulich geworden, so daß sie z. B. im vorigen Jahr einen hingelegten Mehlwurm sofort holten u. s. w. Georg Hilsz in Ortenberg.

Zur Fütterung.

Ein ausgezeichnet sich bewährendes Futter für Insektenfresser mische ich aus Eierbrot mit Fleischextrakt (auf 1 Pfund 2 Loth), besten Ameiseneiern und Mören. Dies braucht nur alle zwei bis drei Tage erneuert zu werden und ich füttere dabei nur wenig Mehlwürmer. Mein Schwarzkopf und die Spottdrosseln bekommen außerdem noch gewaschene Korinthen. Letztere tödteten mir fünf Kanarienvögel und einen Schwarzkopf in einem Tage, scheinen also mit anderen Vögeln ganz unverträglich zu sein.

Neuß, Apotheker in Essen.

Vogelkrankheiten.

Dieser Tage verlor ich, vermuthlich durch das anhaltend kalte Wetter, eine Gartengrasmücke, deren Krankheitserscheinung manchen Leser interessiren dürfte. Dieselbe ließ bei völlig naturgemäßem Aussehen vor etwa 14 Tagen im Gesange nach. Da ich dieses der Kälte zuschrieb, so nahm ich sie ins Zimmer, in welchem eine mittlere Temperatur von etwa 12° gehalten wird. Der sonst sehr zutrauliche Vogel sträubte zeitweise die Rückenfedern, saß entweder mit halbgeschlossenen Augen ganz theilnahmlos auf einer Stange oder flatterte, wenn sich Jemand dem Käfig näherte, wie unsinnig in demselben herum, was er früher nicht gethan. Später kam das Flattern häufiger, wenn auch Niemand in der Nähe des Käfigs war, und nahm zuletzt folgenden Verlauf: Nachdem der Vogel nach mehreren Fehlversuchen die oberste Sprungstange erreicht, streckte er sich ruckweise, ähnlich einer schlagenden Wachtel, den Schnabel senkrecht nach oben in die Höhe, so lange es ging, flatterte dann mehrmals, ohne sich zu erheben, mit sehr raschem Flügelschlag und stieß dann plötzlich mit aller Gewalt gegen die Decke, fiel wie betäubt herunter, erneuerte aber sofort die Versuche, bis er anscheinend ganz erschöpft war. Nachdem er eine Zeit lang mit gesträubtem Gefieder in einer Ecke gestanden und dann eine gehörige Portion frischer Ameiseneier oder lebender Mücken u. dgl. zu sich genommen, ging das Geflatter wieder an, bis er ausgeflattert hatte. Schon am ersten Tage verschmähte er das gewöhnliche Mengfutter und sonstige Delikatessen (gebratener Apfel, Rahm 2c.), nahm dagegen die sonst nicht sehr begehrten Mehlwürmer mit großer Gier. Außer lebenden Insekten (Spinnen, Fliegen, kleinen Würmchen 2c.) nahm er nur noch frische Ameiseneier, von denen er seinem bisherigen Heishunger entsprechend vertilgte. Anfangs glaubte ich, daß das unsinnige Flattern von einem Fehler an den Augen herrühre und ließ, als er anscheinend ganz apathisch in einer Ecke stand, einen Mehlwurm in den Käfig kriechen. Mit zwei langen Sätzen war derselbe erreicht und sofort verschlungen. Die Leiche war nicht besonders fett, der Bauch schwarz, die Fettdrüse über dem Schwanze etwa von der Dicke eines Hanfsamenkornes, das Gefieder nicht beschmutzt. Was mag die Todesursache gewesen sein und woher dieses wunderliche Benehmen? Georg Hilß in Ortenberg.

Briefliche Mittheilungen.

In einem großen Käfige, den verschiedene kleine Pracht- und andere Finken bewohnten, befand sich auch ein Männchen Hartlaubs-Zeisig (Fr. Hartlaubi) und zwei Weibchen Sängerfink (Fr. musica). Der Hartlaubs-Zeisig schien mir mit beiden ein Verhältniß angeknüpft zu haben und ich brachte ihn daher mit einem der beiden Weibchen in einen besondern Käfig, in dem genügende Nist-Gelegenheiten gegeben waren. Das Weibchen baute in ein Korbnestchen, das in einem vorn offenen Harzerbauer sich befand, aus Wundfäden

und Wolle ein zierliches Nest. Bald brütete es sehr eifrig und wurde, wenn es auf kurze Zeit das Nest verließ, vom Männchen abgelöst. In das Nest selbst konnte ich nicht hineinsehen, doch fand ich eines Tages ein todtes Junge, dem noch ein Stück Eierschale anklebte, im Käfig liegen. Das Weibchen brütete inzwischen mit gleichem Eifer fort. Als ich, nachdem es etwa 3 Wochen lang dies Geschäft fortgesetzt hatte, endlich nachsah, fand ich nichts als — ein unbefruchtetes Ei. Es that mir nun doppelt Leid, daß das erzielte einzige Junge von den Eltern aus dem Nest geworfen worden war. v. Schlechtendal.

Anfrage und Auskunft.

Beantwortung der Frage: Weshalb taugen so viele Kanarienweibchen nichts?

Eine vollständige Lösung dieser Frage ist gewiß ungemein schwierig; sie ist es für mich um so mehr, als mir in meiner Flughecke Mißerfolge, wie sie Seite 155 d. Bl. mitgetheilt wurden, mit nur einer Ausnahme nicht vorgekommen sind. Eine Käfighecke habe ich nur in den 1840ger Jahren während zweier Jahre unterhalten und demnächst zehn Jahre später Eine Brut in einem Heckgebauer machen lassen; auch bei diesen Versuchen hatte ich von jenen Uebelständen nicht zu leiden. Dagegen sind mir dieselben Mißerfolge von andern Züchtern mitgetheilt und mit verschiedenen sonstigen ärgerlichen Vorkommnissen, die auf die Untauglichkeit der Weibchen zurückzuführen waren, bin ich auch nicht verschont geblieben.

Ich will es daher versuchen, soweit es mir möglich ist, einige der Haupt-Uebelstände und deren wahrscheinliche Ursachen hervorzuheben, glaube aber kaum, für den erfahrenen Züchter etwas Neues bringen zu können.

Der Kanarienvogel ist im wilden, wie im gezähmten Zustande ein munterer, ja ein unruhiger Vogel, der zur Paarungszeit für sich und seine Nachkommen einen eignen kleinen Bezirk verlangt. Seine Nahrung besteht, nach Bolle, im Freien größtentheils, wenn nicht ausschließlich, aus Pflanzenstoffen, aus kleinem Gesäme, zartem Grün und saftigen Früchten, namentlich aus Feigen. „Eine durchbrochene reife Feige bietet ihm in der innigen Durchdringung von Fleisch, süßem Saft und sehr kleinen Kernen einen süßlichen Leckerbissen dar, welchen er gleichsam ausschlürft, zu welchem er im Freien jedoch nur gelangen kann, sobald die Frucht vor Ueberreife ihren violettblauen oder gelbgrünen Mantel sprengt". Die Hauptnahrung aber besteht in Gesäme, Kohl und Salat, Mohn u. dergl., sowie in Grünzeug mancherlei Art. „Wasser ist für den Kanarienvogel ein gebieterisches Bedürfniß. Er fliegt oft, meist gesellig, zur Tränke und liebt das Baden, bei welchem er sich sehr naß macht, im wilden Zustande eben so sehr als im zahmen".

Sehen wir nun einmal, wie die Zucht der Kanarienvögel im gezähmten Zustande meist betrieben wird.

Der Gesang des gemeinen deutschen Kanarienvogels ist nicht der Art, daß man sonderliches Vergnügen daran finden könnte, man wählt daher zur Zucht Vögel, die sich durch ihre schöne hochgelbe, oder, was schon seltener ist, durch ihre hochgrüne Farbe auszeichnen, und sucht sich, damit die Jungen desto schöner ausfallen, Hahn und Henne von einerlei hochgelber oder hochgrüner Farbe zu verschaffen. Ob die Vögel vollkommen gesund sind, dies beim Einkauf zu untersuchen, ist nicht Jedermanns Sache; wäre der Ankäufer aber dazu auch im Stande, so sind hochgelbe und hochgrüne Vögel, namentlich aber die erstern doch mit wenigen Ausnahmen kleine und schwächliche Vögel, von denen an und für sich eine ausgiebige Zucht nicht zu erwarten ist. Wer sich hiervon überzeugen will, nehme seinen hochgelben Vogel einmal in die Hand, blase ihm die Federn auseinander und besichtige ihn genau, untersuche dann auf ähnliche Weise einen gesunden Vogel der strohgelben oder blaßgrünen oder grauen Rasse. Das dünne Gefieder des Hochgelben und seine zartere Leibesbeschaffenheit wird ihm gewiß auffallen.

Die Züchtung derartiger Farbenvögel geschieht gar zu häufig in zu kleinen Heckkäfigen, in schlecht gelüfteten Stuben, an einem dunkeln oder gar an einem, der Zugluft ausgesetzten Platze.

Das Futter besteht gewöhnlich aus gemischtem Körnerfutter, welches, wenn es nicht gar aus alten muffigen Sämereien besteht, doch von einer Härte ist, wie sie bei dem natürlichen Futter der Vögel im Freien gewiß nicht oft vorkommt. Das Wasser wird häufig nicht eher erneuert, als bis das Trinkgefäß fast leer ist. Wie wenig Gewicht besonders auf diesen Umstand gelegt wird, mag eine Aeußerung eines Züchters meiner Bekanntschaft beweisen, der als besonders rühmenswerth hervorhob, daß er seinen Vögeln jeden Morgen frisches Wasser gebe, als wenn sich das nicht von selbst verstehen sollte. Ein anderer Züchter ging sogar so weit, seinen Vögeln in der Hecke absichtlich nur wöchentlich einige Male Wasser zu reichen, damit „das schleimige Naß ihnen die Kehle naß erhalte".

Neben dem trocknen Körnerfutter wird den Vögeln in der Hecke in der Regel noch ein angeschnittenes hartgekochtes Hühnerei mit der Schale gereicht, sonst erhalten sie weiter keinen Kalk, keine Eierschale; auch Sand wird meist nicht gegeben; die Stelle desselben vertritt mitunter ein Bogen Papier, oder auch Stubensand. Beides hält zwar, öfter erneuert, den Boden des Käfigs rein, nützt den Vögeln aber fast gar nichts.

Vor der Heckzeit müssen die Weibchen nur allzu häufig mit dem Abfall der Sämereien, der sich bei der Fütterung der Hähne ergiebt, vorlieb nehmen; ist doch der Preis der Weibchen so gering, daß man sie mit gutem Futter ohne Schaden nicht überwintern kann. Vor zwei Jahren habe ich wahrgenommen, wie auf diese Weise ein hiesiger Züchter seine 6 Weibchen verpflegte. Dieselben saßen überdies noch in nicht allzu großen, seit Monden nicht gereinigten Käfigen in kalter, schlecht gelüfteter Stube, in der ich selbst es nicht auszuhalten vermochte. Kein Weibchen schien mir ganz gesund zu sein, und im folgenden Jahre starben dem Züchter denn auch fast alle seine jungen Vögel, nachdem sie schon ausgeflogen waren.

Grünzeug in der Käfighecke zu reichen, fällt gewöhnlich nur dem umsichtigern Züchter ein, der die Zucht nicht blos zum Vergnügen betreibt. Bei dem trockenen gemischten Körnerfutter haben die Vögel kein großes Bedürfniß für Kalk, und wenn sie es auch hätten, sie würden denselben beim Mangel frischen Wassers nicht auflösen können. Man lese in dieser Beziehung den trefflichen Bericht des Herrn Auktions-Kommissars Auleb Seite 193 der vorjährigen „Gefiederten Welt". Daher rühren die sogenannten Windeier, die Eier ohne Schale, daher auch die zartschaligen Eier der Weibchen; sie können meines Erachtens sogar bei Weibchen vorkommen, die vor und während der Hecke zweckmäßig gefüttert wurden; denn was ursprünglich bei einzelnen Weibchen als eine Folge fehlerhafter Fütterung Ungehöriges zu Tage trat, kann sich leicht in Folge des Gesetzes der Erblichkeit auf seine Nachkommen als ererbte Abnormität übertragen, und dies wird um so eher geschehen, wenn Innzucht hinzutritt. Diese wird aber bei kleinen Käfighecken, die nur zum Vergnügen unterhalten werden, häufig betrieben.

Um die Windeier und die zartschaligen Eier zu verhüten, wolle man die Rathschläge des Herrn Auleb an angegebener Stelle berücksichtigen, also täglich und wo nöthig öfters täglich frisches Wasser, ausreichend Grünzeug, als Salat, Kreuzkraut und Vogelmiere, ferner Eierschale in Menge, und diese namentlich zerknittert oder gestoßen, reichen. Endlich gebe man in einem besonderen Gefäße guten vollkörnigen Sommersamen, welcher frei von Samen des Hederich und eine halbe Stunde lang angeweicht, oder besser noch mit heißem Wasser abgebrüht und dann auf entsprechender Unterlage ausgebreitet und getrocknet ist. Letzteres geschieht in der Regel in zehn Minuten. Dieser sehr wohlschmeckende, etwas weichere Samen wird von den Vögeln gern genommen, und er bekömmt ihnen auch gut. Ebenso ist es mit dem eingeweichten Samen; er darf aber nicht so lange eingequellt werden, bis er seinen ursprünglichen mildgewürzigen Geschmack verliert.

Vor allen Dingen aber möchte ich anrathen, selbst wenn man Farbenvögel züchten will, nur den Hahn aus der hochgelben oder hochgrauen Rasse zu wählen und dem hochgelben ein blaßgrünes oder graues Weibchen, dem hochgrünen Hahn aber ein strohgelbes Weibchen zu geben. Beim Ankauf der Zuchtvögel sehe man darauf, daß dieselben womöglich aus Flugbecken stammen, jedenfalls aber durchaus gesund sind. In letzterer Beziehung sehe man auf ein klares Auge, auf glatt anliegendes Gefieder und auf Munterkeit der Vögel, ferner darauf, ob der Unterleib von naturgemäßer Beschaffenheit ist.

Weitere Kennzeichen eines guten Weibchens giebt es meines Wissens nicht.

Man behält diejenigen Weibchen gerne zur Zucht, die sich bereits als gute Heckvögel bewährt haben. Es ist aber ein großer Irrthum, wenn man glaubt, daß dieselben im nächsten Jahre unter den gleichen Umständen, mit demselben Hahn und bei derselben Verpflegung sich ebenso fruchtbar erweisen müßten. Herr Dr. von Glöden hat dem entsprechende Erfahrungen S. 219 der „Gefiederten Welt" vom vorigen Jahre veröffentlicht und ähnliche mißliebige Wahrnehmungen hat gewiß ein jeder Züchter von einiger Bedeutung gemacht.

Und sind es denn in der That auch dieselben Umstände, unter denen die Zucht des folgenden Jahres stattfindet oder stattgefunden hat? Wol schwerlich. Zunächst ist der Eierstock des Weibchens in diesem Jahre um die ganze Anzahl Eier ärmer, die es in allen vorhergegangenen Jahren gelegt. Es ist nämlich nicht minder ein Irrthum, und ich glaube dies, obwol es schon von anderer Seite in diesen Blättern ausgesprochen ist, hier besonders hervorheben zu müssen, da die Züchter vielfach anderer Meinung sind, — es ist ein Irrthum, wenn man glaubt, jedes Weibchen setze im Spätherbst oder im Winter seinen Eierstock für die nächste Hecke von Neuem an. — Dann liegt zwischen beiden Brutjahren die Mauser, bei welcher beide Geschlechter mehr oder weniger krank sind und mancher Hahn und manche Henne dauernd kränklich werden, vielleicht Anfangs so unmerklich, daß es unserer Aufmerksamkeit entgeht und erst die nachtheiligen Einwirkungen eines strengen Winters oder schlechter Sämereien hinzukommen müssen, bevor wir die Unpäßlichkeit der Zuchtvögel bei fortgesetzter Aufmerksamkeit wahrnehmen können. Auch die Sämereien können, obgleich anscheinend äußerlich so schön, wie die des vorigen Jahres, doch von geringerem Nahrungswerthe sein. Der Sommerrübsen z. B., das Hauptnahrungsmittel der Harzer Vögel, kann, obgleich er stark mit dem Samen des Hederich versetzt ist, schön von Farbe, vollkörnig, frei von Staub und muffigem Geruch sein. In dieser Hinsicht muß ich wieder auf die verdienstlichen Mittheilungen des Herrn Aulch Seite 45 der vorjährigen „Gefiederten Welt" hinweisen. Ich unterscheide den Hederich an seinem ranzigen Nachgeschmack, und ein Auge, welches in der Nähe gut sieht, vermag ihn auch an seiner glatten, glänzenden und narbenlosen Schale zu erkennen. —

(Fortsetzung folgt.)

Briefwechsel.

Hiermit erklären wir, daß wir alle Berichte über Ausstellungen und Vereins-Angelegenheiten jeglicher Art sehr gern in den Textheil und daher selbstverständlich kostenlos aufnehmen. Wir bitten immer um möglichst baldige Zusendung, damit das Interesse der Betheiligten noch volles Genüge finde. Auch werden wir künftig wieder eine kurze Mittheilung über jede bevorstehende Ausstellung bringen, weil dieselben doch in besonders hohem Grade zur Hebung der Liebhaberei nach allen Seiten hin beitragen. Doch erwarten wir von den geehrten Vorständen jedesmal gefällige direkte Angaben.

Die Redaktion.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

In meiner Vogel- und Thierhandlung sind jetzt vorräthig: Rothe Kardinäle, Karolina- oder Florida-Sittiche, rothe Spottdrosseln und Morgenfinken.

Villa Schöbel, Grünau, bei Berlin.

Rudolf Schöbel,

[423] Vogel- und Thierhändler aus Amerika.

Diesjährige schöne, gutgetrocknete Ameiseneier à Pfund 17½ Sgr. empfiehlt

Mirow in Mecklenburg.

[424] **Friedr. Mahnfeldt.**

Ein schöner, ganz zahmer Beo (Gracula religiosa) ist um **20** Thaler zu verkaufen. Mehlwürmer in beliebiger Menge, **1000** Stück um 20 Sgr. gegen Vorausbezahlung.

Johann Kuss,

[425] Raab, Ungarn.

Frische kleine **Ameiseneier,** pr. Liter **30 Kr.** incl. Verpackung und frankirte Zusendung bei 10 Liter. **Getrocknete** das Pfund zu 18 Sgr.

[426] **G. Weiglein,** Zellingen (Bayern).

Smaragdgrüne Eidechsen

(Lacerta smaragdina),

für Terrarien und Treibhäuser eine Zierde, können bezogen werden durch [427]

Stauffer's Museum in **Luzern** (Schweiz).

3—4 Stamm diesjährige Crève-Coeur-Hühner, je ein Hahn und zwei Hennen, werden unter Nachnahme à Stamm mit 3½ Thlr. incl. Verpackung abgegeben. Die Hühner sind 4 Monat alt und sehr kräftig.

Marschallshagen bei Lichtenau in Westfalen.

[428] **Julius Schüch.**

Vier Amazonenpapageien (blaustirnig), junge und gesunde Exemplare, welche vor einigen Wochen importirt wurden, sind zu verkaufen, sowie

ein junger Steinmarder, bereits ausgewachsen, sehr zahm, sammt Transportkäfig zu 4 Thaler bei

R. Hauzer,

[429] Oehringen (Württemberg).

Mops,

Hündin, 1½ Jahr alt, von seltener Schönheit, hat abzugeben

F. Schröder,

[430] in Parchim (Mecklenburg), Berlinerstraße 161.

Abzugeben sind zu beigefügten Preisen:

1 große wilde Taube 12½ Sgr., Schleiereule 10 Sgr. noch jung, rothköpfige und rothrückige Würger, gut singend, Stück 10 Sgr., gutschlagende Wachteln à Stück 7½ Sgr., Rothkehlchen Stück 10 Sgr., Goldammern Stück 4 Sgr., zahme Staare Stück 10 Sgr. Am liebsten würde ich obige Vögel gegen ein Paar ausländische im Käfig nistende Vögel umtauschen. Näheres durch die Expedition dieses Blattes. [431]

2000

sehr schöne **Nonpareils** (Papstfinken), **Indigovögel, Goldzeisige, Paperlinge, Baltimorevögel, rosenbrüstige Kernbeißer, Tanagras, Karolinensittiche, Halbmondsittiche, Zwergpapagaien, Toucans** ꝛc. ꝛc. zu civilen Preisen, bei

[432] **C. Reiche, Alfeld,**

Prov. Hannover.

C. Hagenbeck's
Handlung
exotischer Vögel
in Hamburg

hat vorräthig: Dunkel- und hellrothe Araras; große gelbhaubige, Inka-, rosenrothe und Nasen-Kakadus, große und kleine schwarze Papageien (Psittacus vaza und Psittacus niger), Graupapageien, Amazonen-, Doppel-Gelbkopf-, kleine Gelbkopf-, rothhalsige Portoriko- und Brillenpapageien; Königs-Sittiche, Rosella-, Pennanti-, Barrabands-Sittiche, Rockpeppler, Paradies-Sittiche, Sing-Sittiche, Spring-Sittiche, Schön-Sittiche, Nymphen-Sittiche, große und kleine Alexander-Sittiche, Gras-Sittiche, Inseparables, grauköpfige Inseparables, Sperlings-Papageien, graue und Dominikaner-Kardinäle, Safran-, graue Edelfinken und Gold-Distelfinken, Graupfäffchen, Silberschnäbel (Pico plata), Diamantvögel, Zebrafinken, Pfaffenvögel, kastanienbrüstige Schilffinken, schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen, Muskatvögel, Broncemännchen, weiße und bunte japanesische Mövchen, Silberfasänchen, Bandfinken, gewöhnliche, weißgescheckte und weiße Reisvögel, kleinste Elsterchen, Goldbrüstchen, Astrilds, Amaranthvögel (kleine), Atlasvögel, Paradieswittwen-Männchen, große Weber oder Goldweber, Fuchsweber, große Orangeweber, Napoleonsvögel, Sammetweber, Blutschnabelweber oder Diochs, Rothkopfweber, indische Gelbkopfweber, amerikanische Spottdrosseln, Paperlinge, Seidenstaare, Jamaika-Trupiale, Sonnenvögel, Flötenvögel, Blauheher, kleine und große Beo, gemeine und chinesische Mynah, schwarze und Kaschmir-Büll-Bülls, chinesische Heherdrossel, chinesische Spottvögel, Toukane, Pit-Pits, (Dacnis cayana), Cissabirds oder Kitta's (Cissa talassina). [433]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt von Herrn **Karl Gudera** in Leipzig „den Verkauf einer großen Voliere betreffend" bei.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 23. Juli 1874. Nr. 30.

Inhalt:

Festrede (Schluß). —
Züchtungen in Käfigen. —
Der zoologische Garten in Basel. —
Stubenvogelzucht als Erwerb (Schluß). —
Ausstellung des Akklimatisationsvereins in Berlin. —
Anfragen und Auskunft: Kanarienweibchen (Forts.). —
Bücher- und Schriftenschau. —
Ausstellungen: Hamburg-Altona. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.

Festrede,

gehalten auf dem ersten Stiftungsfeste des Ornithologischen Vereins in Stettin von dem Vorsitzenden Herrn **Adolf Creutz**.

(Schluß.)

Wenn ich nun hiermit den allgemeinen Nutzen, der in unseren Bestrebungen liegt, zu erklären versuchte, so lassen Sie mich jetzt auch noch Einiges über den persönlichen Gewinn anführen, der aus der Züchtung ausländischer Vögel entspringt. So wie vor 300 Jahren der Kanarienvogel in Deutschland eingebürgert wurde und sich allmählich durch Kreuzung und Kultur zum besten und fleißigsten Sänger der Erde entwickelt hat, sowie Hunderte von Familien, ja ganze Ortschaften im Harz und anderwärts durch Züchtung desselben sich ernähren, und die Nachfrage doch nie vollständig zu befriedigen vermögen, weil der Kanarienvogel von uns wieder nach allen Ländern der Erde ausgeführt wird, so sind im letzten Jahrzehnt Hunderte von Arten ausländischer Vögel aus Australien, Amerika, Afrika und Asien bei uns eingeführt worden, von denen einzelne Arten bereits als ebenso eingebürgert betrachtet werden können. Ich nenne hier nur beispielsweise die Wellensittiche und die Zebrafinken, von welchen beiden Arten bereits fast ebensoviel in Europa gezüchtet, als aus Australien eingeführt werden. Daß hierdurch der persönliche wie der National-Wohlstand gehoben wird, bedarf keines weiteren Beweises.

In noch weit höherem Maße aber tritt diese Thatsache hervor, wenn wir unser Augenmerk auf die Hühnerzucht und das Geflügel im Allgemeinen richten. Damit gerade liegt es besonders in unserer Gegend noch sehr im Argen. Wie sehr aber hierin eine Verbesserung geboten und namentlich für den Landbewohner von Nutzen ist, sehen wir an dem Wohlstand einzelner Gegenden in Sachsen und Frankreich, wo die Hühnerzucht bereits zu einer Vollkommenheit gelangt ist, wovon man hier zu Lande keine Vorstellung hat.

Habe ich somit versucht, die Berechtigung, Nothwendigkeit und Nützlichkeit unseres Vereins und seiner Bestrebungen nachzuweisen, so bitte ich mir nun nur noch mit wenigen Worten zu gestatten, auf seine Entwickelung und Wirksamkeit im vergangenen Jahre hinzuweisen. Begonnen mit 17 Mitgliedern, hat der Verein in einem Jahre die ansehnliche Zahl von 233 wirklichen Mitgliedern erreicht. Jede Sitzung brachte eine ganze Liste neuer Mitglieder hinzu, und wir dürfen erwarten, daß er noch fortgesetzt an Mitgliederzahl wachsen wird. Er zählt bereits weit über die Provinz hinaus, bis zur russischen Grenze und

selbst bis Wien schlossen sich Freunde der Sache unserem Verein an. Mehrere hundert Briefe, welche aus Nah und Fern an den Vorstand gerichtet wurden, sprachen ihre Freude über den Verein aus und ebenso oft wurde uns die Versicherung von Diesem und Jenem, wie er mit Verlangen den jedesmaligen Zeitungsberichten entgegensehe. Das sind Thatsachen, die ein beredtes Zeugniß dafür ablegen, daß wir mit der Bildung eines Ornithologischen Vereins einen Zug aus dem vollen Strome des Lebens gethan haben!

Ueber unsere Wirksamkeit während des abgelaufenen ersten Vereinsjahres, bringt der gedruckte Jahresbericht, welcher den Mitgliedern heute eingehändigt wird, Ausführliches. Die Mitglieder, welche unseren Vereinssitzungen regelmäßig beigewohnt haben, werden meine Worte bestätigen, wenn ich sage: wir haben auf allen Gebieten unseres Strebens eine reiche, für unsere geringen Kräfte fast überreiche Thätigkeit entwickelt.

Wenn ich nun mit allem Diesem nur Schönes und Gutes über unsern Verein zu sagen vermochte, so geschah dies einestheils um den verehrlichen Damen und Gästen, die durch ihre Gegenwart unser heutiges Fest verherrlichen helfen, ein flüchtiges Bild von unserm Wollen und Thun zu entwerfen und uns ihrer Anerkennung zu versichern, anderntheils um die Bahn zu bezeichnen, auf der wir festen Schrittes, in Eintracht und voll Muth und Vertrauen weiter gehen wollen!

Möge der Ornithologische Verein auch ferner wachsen, blühen und gedeihen, möge er den anderen Vereinen unserer Stadt die gleichfalls edle und nützliche Ziele verfolgen, stets ebenbürtig zur Seite stehen und gleich ihnen segensreich wirken. Das ist der Wunsch, den ich an dem heutigen Ehrentage des Vereins aus der Fülle meines Herzens ausspreche, indem ich Sie bitte, Alle mit mir einzustimmen in den Ruf: Der Ornithologische Verein lebe hoch!

Züchtungen in Käfigen.

Als ich Frau Proschels im Jahre 1868 kennen lernte, waren recht viele Kanarienvögel und ein Paar Elsterchen, die eben ein Junges großgezogen hatten, ihr Stolz, und ich hatte viel zu thun, bis ich ihr meine Ansicht beibrachte, daß sie nur dann eine wirkliche Vogelwirthin werden kann, wenn sie sich dazu entschließen würde, das Ueberflüssige auszumerzen, und Neues anzuschaffen. Frau Proschels zeigte damals schon große Lust, ausländische Vögel zu züchten, doch setzte sie in sich selbst nicht viel Vertrauen. Im Dezember 1869 begann bei ihr ein ganz neu erworbenes Paar Bandfinken zu brüten, und schon die erste Zucht gelang insofern, als ein junges Männchen großgezogen wurde. Das zweite Nest brachte fünf kräftige Junge, und so ging es fort durch 3 Jahre ohne Unterbrechung. — Ich sah während dieser ganzen Zeit keine Mauser bei den Eltern, die hintereinander 45 Bruten machten, über 240 Eier legten, und nicht weniger als Einhundert siebzig und sechs (176) Junge aufgezogen haben. Erst beim Beginn der 46. Brut ist das Weibchen der Legenoth erlegen, und ich bemerke nur, daß es auch früher öfters daran litt, daß jedoch jedes Ei glücklich gelegt wurde, sobald Frau Proschels mit einer Nadel, welche einen Glasknopf hatte, Oel in die Legeöffnung einführte.

Ein kaum 2 Monate altes Weibchen hat mit einem eingeführten Männchen ebenfalls bereits mit Erfolg gebrütet; es wurden alle möglichen Kreuzungen vorgenommen, die fast sämmtlich von gutem Erfolge waren.

Nebenbei kann ich nicht unerwähnt lassen, daß der Gesang der vielen jungen Bandfinken-Männchen, die alle ganz außerordentlich zahm sind, in keiner Hinsicht dem Gesange der eingeführten Vögel ähnelt, so daß ein noch so geübtes Ohr nie im Stande sein wird, aus diesen Tönen auf den Vogel zu schließen. Der Gesang ist bedeutend lauter, und doch trotzdem umflort, so daß man einen Bauchsänger vor sich zu haben wähnt.

Dieser Fall von Fruchtbarkeit ist jedoch nicht vereinzelt geblieben, und gar viele merkwürdige Beispiele könnte ich anführen, so unter andern, daß diese Dame noch vor Herrn Fiedler kastanienbrüstige Schilffinken (11 Stück in 2 Nestern) aufgezogen hat, ebenso Gitterflügel, sehr viele Goldbrüstchen, dann, daß sie eben jetzt mehrere Nester von bunten und gelben japanesischen Mövchen besitzt (von einem einzigen Paar bereits 26 Junge und wieder ein ganzes Nest voll noch ungezählter Jungen). Als Merkwürdigkeit will ich noch hervorheben, daß diese Dame ohne Zweifel am meisten Pfaffenvögel (Bartfinken) aufgezogen hat, so daß sie einen ganzen Stamm dieser Vögel besitzt. Ueber 2 Jahre hat bei ihr ein Bartfinken-Weibchen ununterbrochen fortgebrütet, und dieses Weibchen hat mit 2 Männchen (das erste ist eingegangen) die erstaunliche Anzahl von 92 Jungen großgezogen.

Diese Fälle stehen wol vereinzelt da, und ist mir wenigstens von den vielen, so ausgezeichneten Züchtern Deutschlands etwas Aehnliches nicht bekannt geworden.

Ich kann mir nicht denken, daß solche Ergebnisse nur einer besonderen Gunst des Glückes zuzuschreiben wären, glaube daher vielmehr, daß doch auch neben dem Glücke noch etwas Anderes maßgebend war, das Verständniß.

Diese Dame hält die Vögel nur paarweise in eleganten Käfigen, welche so eingerichtet sind, daß die Vögel das Futter und Wasser nicht verunreinigen können. Beide Seitenflächen sind links und rechts mit Thüren versehen, so daß ein Nisterker, in welchem das geschlossene Körbchen angebracht wird, leicht befestigt werden kann. Diese Vorrichtung ist namentlich aus dem Grunde sehr zu empfehlen, weil das

Nest leicht gereinigt werden kann und Leichen und Ungeziefer ohne Störung zu entfernen sind.

Ich habe solche Käfige schon im Jahre 1867 nach meiner Idee anfertigen lassen, und ich muß sagen, dieselben haben sich so außerordentlich bewährt, daß ich auch heute noch dieselbe Form, und immer wieder mit denselben günstigen Erfolgen verwende. — Auch Papageien haben darin schon oft mit Glück genistet, so z. B. ein Paar Tovi-Sittiche, welche in einem Jahr zwei, im anderen drei Junge fast nur mit Milchgries glücklich großgezogen haben. Gegenwärtig brüten darin soeben Grauköpfchen, die, wie mir scheint, vier Junge haben. Auch Tirika-Papageien scheinen sich sehr wohl darin zu fühlen, ebenso ein Paar Maitakka-Papageien und ein Paar Arara-Perekiten. Vom letzteren Paar scheint das Weibchen bereits Eier gelegt zu haben, da es nicht mehr zum Vorschein kommt. Aus diesen nur kurzen und oberflächlichen Mittheilungen wollen die Leser entnehmen, daß es auch in Wien Leute giebt, die ernstlich bestrebt sind, im Interesse der Zucht ausländischer Vögel zu wirken.

Eduard Schmalz,
K. K. Ministerial-Sekretär in Wien.

Der zoologische Garten in Basel.

Basel, Anfang Juli.

In diesen Tagen feierten wir in bescheidener Weise die Vollendung eines Unternehmens, das auch in weiteren Kreisen bekannt zu werden verdient — und dies zu erreichen, gewährt die weitverbreitete „Gefiederte Welt" wol die beste Hülfe. Dies ist nämlich die Eröffnung unseres Baseler zoologischen Gartens. In unserer so vergnügungssüchtigen Zeit macht das Zustandekommen einer solchen Naturanstalt, wenigstens auf uns, einen sehr wohlthuenden Eindruck, da durch dieselbe einer großen Zahl von Menschen, die ihre Erholung sonst an anderen Orten suchen und ihr Vergnügen anders befriedigen mußten, Gelegenheit geboten wird, zurückzukehren zu jenem alten und reinen Urquell des Vergnügens, zur Beobachtung der Natur und ihrer Geschöpfe, welches letztere in unseren kulturbeleckten Gegenden auf andere Weise zu erreichen, dem Städter wenigstens, nur selten mehr möglich ist.

Bevor wir nun zur Beschreibung des Gartens selbst übergehen, sei hier nur kurz bemerkt, daß wir nicht im geringsten in kritischer, wissenschaftlicher oder fachmännischer Hinsicht diese Zeilen schreiben, sondern nur als „Stimme aus dem Publikum" den Eindruck wiederzugeben suchen, den der Garten auf uns gemacht hat. Zu hochgespannte Erwartungen darf der Besucher des Gartens nicht hegen, da derselbe in erster Linie nur unsere schweizerische Fauna berücksichtigt, die aber doch bei ihrer Mannichfaltigkeit des Interessanten genug bietet; jedoch sind auch fremde, leicht zu pflegende Thiere aus dem Garten nicht im mindesten ausgeschlossen.

Wenn wir den im Südwesten der Stadt in hübscher Umgebung gelegenen Garten erreicht haben, wenden wir uns von dem schmucken Direktorialgebäude links einen Abhang hinab in die geheimnißvollen Schatten eines Wäldchens, wo uns der zierlich gewundene Spazierweg zunächst zum Rehpark führt, dessen behende, schmucke Bewohner aus allen Theilen der geräumigen Einfriedigung auf uns zutraben, in Erwartung irgend einer Gabe. Nachdem wir sodann einige Zeit dem munteren Treiben einer gegenüber in einer geräumigen Volière angesiedelten Eichhörnchenkolonie zugesehen, steigen wir immer noch im Schatten alter Waldbäume noch einmal einen sanften Abhang hinab und stehen vor dem Bärenzwinger, dessen Bewohner, zwei große braune Bären bei der jetzigen Wohnungsnoth wenigstens nicht über unangenehme Lage und Einrichtung ihrer Wohnung klagen dürfen; können sie ja doch stündlich im Rauschen der vor ihrem Gitter stehenden Bäume mit einiger Phantasie das Säuseln der heimathlichen Engadiner oder Bergeller Gebirgswälder zu hören glauben! Wir sehen einige Zeit dem Treiben der muntern Bursche zu, die sich gerade zum Ergötzen der Zuschauer auf ihrem Baume herumbalgen und wenden uns weiter zum Wildschweingehege, dessen Insasse in seinem Weiher liegend, uns behaglich anglotzt. Nachdem wir bei Anlaß der Betrachtung dieser in der Schweiz nun schon ziemlich seltenen Thierformen wie Bären und Wildschweine, stillschweigend einige Vergleiche gezogen haben zwischen den Zeiten, wo unsere Altvordern auf Schritt und Tritt eines Kampfes mit solchen Bestien gewärtig sein mußten, und der jetzigen Zeit, wo wir dieselben, die Cigarre im Munde und das Bierglas in der Hand, bequem hinter Schloß und Riegel betrachten können, steigen wir eine Erhöhung hinan zu einer allerliebst angelegten kleinen Ruine, der Eulenburg. Unwillkürlich fallen uns dabei die Verse des Studentenliedes ein:

„Zwar die Mauern sind gefallen,
Nimmer tönet Speer und Schild,
Doch dem Wandersmann erscheinen
Aus bemoosten, alten Steinen
Nachtgestalten zart und mild."

Die Steine der Eulenburg sind zwar noch nicht sehr bemoost, hingegen zeigen sich doch dem Wandersmann die „Nachtgestalten zart und mild" in Form von mehreren Uhus und andern Eulen, und daß doch die Poesie der weißen, schwebenden Gespenster nicht ganz in dieser modernen Ruine verschwinde, sehen wir im Dunkel eines Behälters eine Schneeeule, die uns mit ihren schönen Augen im Takte anblinzelt. Der nächste höchst geschmackvoll errichtete und mit starken Eisengittern versehene Bau zeigt sich schon von weitem als Raubthierhaus an, hinter dessen Eisenstäben wir, wie schon gesagt, nicht brüllende Löwen und Tiger, sondern unsere bescheideneren, schweizerischen Raubthiere zu gewärtigen haben. Wir sehen aber nichtsdestoweniger mit Ver-

gnügen dem Treiben der verschiedenen Bewohner der geräumigen Behälter zu, als da sind Füchse, Iltise, Wiesel, Marder, im geschmackvollen mit einer Steingrotte und Baum versehenen Mittelkäfig zwei gewichtige Luchse, sodann eine Wildkatze, dann einen Bewohner Amerikas, nämlich einen Waschbär, und endlich Dachse und einen Wolf. — Das gegenüberliegende höchst geschmackvolle Hirschhaus mit seinen sechs geräumigen Einfriedigungen ist einstweilen, da überhaupt manche Thiere noch nicht im Garten untergebracht sind, noch ziemlich leer, wird hingegen in einiger Zeit schon durch mehr Bewohner die Zuschauer anziehen (einstweilen finden sich hier nur Dam- und Axishirsche). Wir schreiten nun weiter zum großen Raubvogelhaus, das mit seinen hohen, geräumigen Volièren den darin wohnenden Raubvögeln möglichst viel Spielraum gewährt. Wir sehen hier in nächster Nähe die gewaltigen Stein-, Fisch- und See-Adler, sowie das große Geschlecht der Falken ihr Wesen treiben. Wir gelangen nun zu einer Hauptzierde, zum Steinbock- und Gemsberg. Malerisch auf dem grünen Rasen unter Tannen halb versteckt, lehnen sich die Alpenhütten der Bewohner an den künstlichen Fels. In der geräumigsten Abtheilung der weiten Einfriedigung überraschen und ergötzen uns durch ihre Seltenheit und merkwürdige Behendigkeit zwei zwar erst halbgewachsene, echte Steinböcke, die fast unaufhörlich auf ihrem Felsen so sicher wie auf ebenen Boden herumhüpfen. In der nächsten Abtheilung grasen einige Gemsen und geben dem Beobachter die beste Gelegenheit, sie einmal nicht nur in Bild und Wort, sondern in natura mit den in der Schweiz so selten gewordenen Steinböcken zu vergleichen. In der großen gegenüberliegenden Fasanenvolière haben verschiedene Arten dieser Vögel ihre Wohnung aufgeschlagen, Gold-, Silber- und Kupferfasanen und auch ein Exemplar des schönen Königsfasans. Auch ihre Wohnungsräume, Schlaf- und Empfangszimmer sind sehr hübsch eingerichtet, letztere erhalten durch eine Fontaine das nöthige Wasser und sind sogar noch mit kleinen Tannen und anderen immergrünen Bäumen und Sträuchern bepflanzt. Nachdem wir in der elegant eingerichteten und mit ihren malerischen Thürmchen und Erkern eine wahre Zierde des Gartens bildenden Restauration, von wo aus man den schönsten Ueberblick über die anmuthigen Parkanlagen hat, eine Erfrischung zu uns genommen haben, weil sonderbarerweise das viele Beobachten ganz eigenthümlich auf unseren Magen gewirkt hat, besichtigen wir noch die beiden großen Weiher mit ihrer zahlreichen Bevölkerung an Reihern, Kormoranen, Enten und Gänsen aller Art, deren Namen wir Laien nur zum geringsten Theil kennen, und von denen uns besonders die Kormorane durch ihr geschicktes Tauchen ergötzen. Indem wir uns wieder dem Eingang nähern, passiren wir noch das weitläufige Hühnerhaus mit seinen oft sehr drolligen Bewohnern von verschiedenen Rassen, sowie den Murmelthierfelsen mit seinen munteren Bewohnern, verlassen sodann den Garten mit dem Gefühle hoher Befriedigung, indem wir ein Unternehmen vollendet sahen, das unserer Stadt zur wahren Zierde gereicht und ihren Bewohnern eine fast nie versiegende Quelle des Vergnügens, der Erholung und der Belehrung bietet. Es ist zwar wahr, daß noch viele Lücken im Thierbestand auszufüllen sind, jedoch ist zu hoffen, daß durch Geschenke oder durch Ankauf im Verlaufe der Zeit diese zur allgemeinen Befriedigung ausgefüllt werden. Wenn man alle Verhältnisse berücksichtigt, unter denen das Unternehmen steht, so kann man nicht umhin zu sagen, daß dasselbe bis jetzt, so weit möglich, die Aufgabe, die es sich gestellt, durch hübsche, geschmackvolle Anlagen ꝛc. gelöst hat, und man Grund hat, allen denen, die zum Gelingen des Unternehmens beigetragen haben oder noch beitragen werden, dankbar zu sein.

Eine Stimme aus dem Baseler Publikum.

Stubenvogelzucht als Erwerb.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung und Schluß aus Nr. 27).

Sehr ungünstig für die Zucht ist der Umstand, daß viele Pärchen in eine förmliche Nistwuth gerathen. Man kann immer beobachten, daß recht kräftige Weibchen bereits von neuem zu legen beginnen, wenn die Jungen der vorigen Brut noch gar nicht flügge sind. Die Eier werden dann von den Jungen mit erbrütet und so hat man manchmal in den Nestern eine ganze Stufenfolge von jungen Wellensittichen in der verschiedensten Entwickelung gefunden, und solche Bruten gedeihen nicht selten in ganz guter Weise. Aber ein sehr arger Mißstand tritt dabei doch störend auf, die immer zunehmende Verunreinigung des Nistkastens nämlich, welchen die Vögel für zahlreiche Bruten hintereinander benutzen. Da gibt es denn verkrüppelte Füße, mangelhaftes Gefieder, kurz und gut junge Vögel werden hervorgebracht, welche den vorhin erwähnten degenerirten gleichen, obwol sie von den besten Eltern herstammen und bei zweckmäßiger Ernährung gezüchtet sind.

Zur Abstellung eines solchen Uebelstandes schlage ich folgenden Weg vor. Sobald eine Brut ausgeflogen ist, nimmt man den Nistkasten herab, entleert ihn recht vorsichtig seines Inhalts, gleichviel ob derselbe in Eiern oder noch nicht flüggen Jungen bestehe, reinigt ihn sorgfältig, stäubt ihn mit gutem Insektenpulver aus, schüttet wieder eine ganz dünne Schicht grobe, scharf ausgetrocknete Sägespähne hinein, sammelt aus dem alten Müll die einzelnen immer vorhandenen Federn und bettet auf diese die Eier oder Jungen. Dann wird der Kasten an dieselbe Stelle gehängt. Diese Reinigung darf man ohne Bedenken vornehmen, denn gerade die Wellensittiche verlassen ihr Nest keineswegs leicht. —

Unsere Vögel nisten an den verschiedensten

Orten und Gelegenheiten; man hat gesehen, daß sie auf dem Boden des Käfigs im Sande, ferner in Mauerlöchern an den Wänden ebenso gut ihre Jungen groß gezogen, als in hohlen Aesten und den zweckmäßigsten Nistkästen, und selbst in den Nestern der Webervögel oder Prachtfinken haben sie mit Erfolg gebrütet. Ebenso wie bei der Ernährung ist es jedoch auch bei den Nistgelegenheiten nothwendig, daß man den natürlichen Verhältnissen Rechnung trage. Dies hat man durch die Herstellung von mannichfaltigen Nistkästen zu erreichen gesucht. Wir geben die Abbildung von drei solchen, welche wenigstens als Vorbilder für die Herstellung immer vollkommenerer gelten können. Figur A. ist ein



natürlicher Holzstamm, von Birke oder Buche, welcher in der Mitte ausgehöhlt, oben mit einem Deckel geschlossen und seitwärts mit dem Schlupfloch versehen ist. Er bietet den Vortheil, daß er naturgemäß aussieht und wenn die Nisthöhle innen glatt und gleichmäßig gebohrt und geräumig genug ist, daß dann die Vögel auch gern in ihm nisten. Als Uebelstände zeigt er, daß er sich schwierig fest genug anbringen läßt, und daß man den Deckel entweder gar nicht oder doch nur mit Mühe und Störung abnehmen kann, um nachzusehen. Der Schleusinger Nistkasten (Figur B.) ist allbekannt. Außer Herrn

Naacke und mir haben auch viele andere Züchter in denselben guter Erfolge sich erfreut. Neuerdings hat Herr Frühauf sie etwa um ein Drittel in der Höhe verkürzt, und dies erscheint allerdings zweckmäßig. Auch läßt Herr Frühauf nach Verlangen den leicht zu öffnenden Schieber vorn, hinten oder von einer Seite anbringen. Ueberhaupt führt jene Fabrik alle gewünschten Abänderungen in der bereitwilligsten Weise aus, und dies ist für die Züchtung sehr vortheilhaft, weil es ja wünschenswerth und nothwendig erscheint, daß nach immer neuen Erfahrungen immer bessere und vollkommnere Mittel und Wege zur Züchtung eingeführt werden.

Einen eigenthümlichen Nistkasten hat Herr Ministerial-Sekretär Schmalz in Wien eingeführt. Dieser (Figur C.) ist in zwei Räume geschieden, in deren vorderen das Flugloch (m.) führt, während ein zweites Flugloch (k.) in den eigentlichen Nistraum (l.) mündet. Der vordere Raum hat den Zweck, daß das Männchen darin zur Nacht sitzt, während das Weibchen in dem hinteren Raume durchaus ungestört und unbehelligt von allen andern Vögeln brüten kann. Eigene Erfahrungen stehen mir nicht zu Gebote, doch ist dieser Nistkasten von verschiedenen Seiten sehr gerühmt worden.

Zum Schluß noch einige neuere Beobachtungen über den Werth der Weibchen. Recht kräftige junge weibliche Wellensittiche haben bald nach dem Flüggewerden eine hellblaue Nasenhaut, welche sich je nach der Ernährung des Vogels längere oder kürzere Zeit erhält. Nichtkenner halten solche Vögel wol ganz entschieden für Männchen. Mit der vollständigen Entwickelung des Vogels geht die Färbung der Nasenhaut in die Farbe einer rohen Kaffeebohne über, in der Weise, daß in der Mitte diese Farbe erscheint und sich nach beiden Seiten hin ausbreitet. Bleibt die Nasenhaut nun grünlichgrau und glatt, so soll das Weibchen ein vorzüglicher Nistvogel sein; je mehr sie dagegen gelbgrau und runzlig wird, desto geringer ist die Aussicht auf gutes Nisten. Neuerdings habe ich auch die Beobachtung bestätigt gefunden, daß die alten starken Weibchen, mit sehr runzliger gelbgrauer Nasenhaut vorzugsweise leicht an Legenoth zu Grunde gehen. Eine Erklärung habe ich freilich für diese Erscheinung nicht.

Zu bemerken ist noch, daß der Boden in jedem Nistraum ganz entschieden flach ausgehöhlt sein muß, damit die Eier nicht auseinander rollen. Neuere Beobachtungen haben ergeben, daß es nicht durchaus nothwendig ist, daß alle Ritzen und Spalten dicht geschlossen seien. Dagegen hüte man sich vor den sogenannten Naturnistkasten, welche ähnlich wie Figur

A., aber bloß aus Rinde hergestellt sind, die von den Vögeln nur zu leicht zernagt wird.

Die Holzwaarenfabrik von Frühauf in Schleusingen hat neuerdings auch solche Nistbäume für Wellensittiche u. a. kleinen Papageien eingeführt. Einen solchen habe ich in Nr. 8 d. J. beschrieben und kann hier nur hinzufügen, daß er sich in meiner Vogelstube für Wellensittiche und Grauköpfchen vortrefflich bewährt hat.

Aus den Vereinen.

Fünfte große Ausstellung des Akklimatisations-Vereins in Berlin.

Auszug aus dem Programm.

1) Die Ausstellung soll die Zweige, in denen der Verein bisher vorzugsweise thätig war, nämlich: Acker- und Gartenbau, Anzucht von Nutzpflanzen, Forstkultur, Seidenbau, Bienenzucht u. s. w. umfassen.

2) Die Ausstellung findet im Hotel Imperial (früher Arnim's Hotel) Unter den Linden Nr. 44 statt. Sie wird am Freitag, den 26. September d. J., Vormittags 11 Uhr eröffnet und am Montag, den 29. September, Abends 6 Uhr geschlossen.

3) Die Anmeldung der auszustellenden Gegenstände muß unter Beifügung eines doppelt ausgefertigten speziellen Verzeichnisses

bis zum 16. September d. J.

erfolgen. Diejenigen Aussteller, welche dieser Bestimmung nicht nachkommen, haben zu gewärtigen, daß die von ihnen eingelieferten Gegenstände einen minder günstigen Platz erhalten und nicht in den Ausstellungs-Katalog aufgenommen, unter Umständen sogar zurückgewiesen werden können.

4) Um die Anfertigung des Katalogs zu beschleunigen und den Preisrichtern die Ausübung ihrer Funktionen zu erleichtern, wird dringend gebeten, daß jeder Einsender erklärt, in welcher Sektion er seine Produkte aufgestellt zu haben wünscht, und für den Fall, daß er in mehreren Sektionen konkurrirt, für jede einzelne ein doppeltes Verzeichniß einsendet.

5) Die Anmeldungen sind frankirt an das Bureau des Akklimatisations-Vereins in Berlin — Adlerstraße Nr. 12 — zu richten.

6) Die Sendungen müssen gleichfalls frankirt am Donnerstag den 25. September bis Nachmittags 2 Uhr im Ausstellungs-Lokale — Unter den Linden Nr. 44 — eintreffen.

7) Die Rücksendung der eingesandten Gegenstände findet im Allgemeinen nur auf Wunsch und dann auf Kosten der Einsender statt.

8) Der Verein verpflichtet sich, die ihm anvertrauten Gegenstände auf Wunsch der Interessenten auf Höhe des angegebenen Werthes gegen Feuersgefahr zu versichern. Zur Verhütung von sonstigen Beschädigungen und Verlusten wird der Verein durch Stellung von Aufsichtsbeamten nach Möglichkeit zu wirken suchen.

9) Die einzusendenden Gegenstände müssen ordnungsmäßig hergerichtet und deutlich bezeichnet sein.

10) Die eingelieferten Gegenstände dürfen vor dem Schluß der Ausstellung ohne besondere Genehmigung des General-Sekretairs nicht zurückgezogen werden.

11) Wer geneigt ist, die ausgestellten Gegenstände zu verkaufen, hat den Preis beizufügen; der Käufer kann die betreffenden Gegenstände aber erst nach dem Schluß der Ausstellung in Empfang nehmen.

12) Das Bureau liefert im Interesse der Gleichmäßigkeit den Ausstellern die Firmenschilder à 10 Sgr. das Stück, wenn von denselben nicht vorher erklärt wird, selbst dafür Sorge tragen zu wollen.

13) Der Eintrittspreis beträgt 5 Sgr. pro Person. Die Mitglieder des Akklimatisations-Vereins haben persönlich gegen Vorzeigung ihrer Mitgliedskarte freien Eintritt. Den Ausstellern werden gleichfalls für ihre Person durch das General-Sekretariat Einlaß-Karten gratis eingehändigt.

Die Ausstellung wird nach zwanzig Sektionen geordnet.

I. Kaninchen und verwandte Thiere.
II. **Ausländische Schmuckvögel.**
III. Amphibien und Fische in Terrarien und Aquarien.
IV. Seiden- und Bienenzucht. In gesonderten Sammlungen nützliche und schädliche Insekten.
V. Sämereien. Trockene Früchte, womöglich in ihren Umhüllungen. Getreidearten, Hülsenfrüchte, Nutzpflanzen u. s. w.
VI. Knollen.
VII. Zwiebeln.
VIII. Wurzeln.
IX. Frische Gemüse.
X. Heimische eßbare und schädliche Pilze, aber in gesonderten Kollektionen nach diesen Eigenschaften.
XI. Getreide- und Nutzpflanzen mit dem Halm und Wurzeln.
XII. Im Freien ausdauernde, offizinelle und wohlriechende Pflanzen.
XIII. Gespinnstpflanzen.
XIV. Laub- und Nadelhölzer, vorzugsweise ausländische.
XV. Importirte Ziergewächse in Gefäßen.
XVI. Früchte: Obst, Nüsse, Trauben und ausländische Früchte.
XVII. Eingemachtes und getrocknetes Obst. Fruchtsäfte. Konservirte Gemüse.
XVIII. Fabrikate und zur Fabrikation dienende Produkte Thierhaare, Wolle, Seide, Honig, Wachs, Weiden, vegetabilische Gespinnstfasern, Tabak, Opium und andere Pflanzenprodukte.
XIX. Apparate und Geräthschaften: **Zuchtkäfige, Brutmaschinen,** Haspelmaschinen, Spinnhütten u. s. w.
XX. Literarische Hülfsmittel zum Natur- und Kulturstudium: Bücher, Abbildungen und Karten.

1) Die Preise bestehen:
a. aus solchen, welche für die einzelnen Sektionen bestimmt sind.
b. aus solchen, welche als Hauptpreise für besonders hervorragende Gesammtleistungen ertheilt werden sollen, und verzichtet alsdann der Ausst ller selbstverständlich auf jeden anderen oder Sektions-Preis.

2) Die für jede der vorstehenden Sektionen, sowie für allgemeine oder speziell bestimmte zur Konkurrenz ausgesetzten Preise werden in einem Nachtrage veröffentlicht werden.

3) Die Preisrichter ernennt der Vorstand des Akklimatisations-Vereins in Berlin.

4) Die Preisrichter jeder Sektion wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden, der die Abstimmungen über die Preiszuerkennungen innerhalb seiner Sektion zu leiten hat. — Nach genommener Information treten sämmtliche Preisrichter zusammen und beschließen über die Zuerkennung der Hauptpreise. Alsdann haben die einzelnen Sektionen über die ihnen zur Verfügung gestellten und disponibeln Preise zu erkennen. Sind in einer Sektion preiswürdige Gegenstände überhaupt nicht ausgestellt, so bleiben die für diese Sektion bestimmten Preise zur Disposition der Preisrichter.

5) Die Preisvertheilung findet Sonntag, den 28. September, Mittags statt, und soll derselben um 3 Uhr ein Akklimatisations-Diner folgen, an welchem die Herren Aussteller, sowie die Mitglieder des Vereins und deren Gäste theilnehmen. Anmeldungen hierzu werden bis Sonnabend, den 27. September, Mittags, im Bureau des Ausstellungs-Lokals entgegengenommen.

Der Ausschuß.

Berend, Ritterguts-Bes. E. Brebeck, Kaufmann. Dr. C. Bolle, Gutsbes. C. Bouché, Garten-Insp. R. Bier, Partikulier. E. Boese, Samenhändler. W. König, Obergärtner. L. Spaeth, Baumschulen-Besitzer. Prinz Handjery, Präsident. Dr. L. Buvry, General-Sekretär des Akklimatisations-Vereins in Berlin.

Anfragen und Auskunft.

Beantwortung der Frage: Weshalb taugen so viele Kanarienweibchen nichts?

(Fortsetzung.)

Eine Züchtung der Vögel in Käfigen hat gewiß manche Aehnlichkeit mit einer Treibhauseinrichtung; bei der sorgfältigsten Pflege sind wir nicht im Stande, denselben alle Bedingungen eines glücklichen Daseins vollauf zu gewähren. Man bedenke nur einmal den störenden Einfluß der mangelnden unbedingt freien Bewegung, der fehlenden nothwendigen Abwechselung von Sonnenlicht und Schatten und vor Allem des Abgangs der reichbesetzten Tafel, deren sich die Vögel im Freien zur Brutzeit zu erfreuen haben. Wenn bei der Züchtung der Kanarienvögel etwas zu verwundern ist, so ist es nicht das, daß im Laufe von Jahrhunderten bei vielfach fortgesetzter Inzucht einzelne weibliche Vögel fast oder ganz unfruchtbar geworden sind, daß andern der Trieb zum eignen Nestbau, wieder andern der Instinkt des Brütens abhanden gekommen ist und eine nicht geringe Anzahl ihre Jungen entweder gar nicht, oder nur zum Theil, schlecht oder auch nur einige derselben füttern und andere kläglich verhungern lassen, daß viele männliche und weibliche Vögel die Jungen rupfen; viel mehr Verwunderung muß es erregen, daß die Zucht im großen Ganzen aller beengenden Einflüsse ungeachtet noch so glücklich von Statten geht. Ich möchte bezweifeln, daß mit den fruchtbarsten unserer einheimischen Körnerfresser, die vor dem Kanarienvogel doch eine kräftigere Körperbeschaffenheit voraus haben, ähnliche Züchtungsergebnisse in der Gefangenschaft erzielt werden könnten.

Alle vorhin erwähnten Uebelstände sind in meiner Hecke vorgekommen und ich glaube hier darüber noch Einiges bemerken zu sollen.

Vorher möchte ich noch bemerken, um auf die gestellte Frage noch einmal zurückzukommen, daß es nur natürlich ist, wenn ein Weibchen, das in Zwischenräumen von mehreren Tagen Eier ohne Schale legt, die es also nicht bebrüten kann, sich viel mit dem Männchen beschäftigt; es ist ja beständig in der Lage, seiner zu bedürfen. Dieses innige Verhältniß des Pärchens wird aber den Hahn sicher nicht abhalten, andere Weibchen zu begatten, so oft er dazu eingeladen wird, und zur Befruchtung eines ganzen Geleges genügt es, wenn diese Paarung nur einige wenige Male, vielleicht nur ein einziges Mal, vor sich geht. In dieser Hinsicht befindet sich, wie mir scheint, der weibliche Kanarienvogel in gleicher Lage mit den Schwänen und den Scharrvögeln. Bezüglich des Huhns können wir aus Büffons Naturgeschichte der Vögel ersehen und bezüglich der Gänse und der Puten haben wir es in diesen Blättern gelesen, daß eine einzige Paarung ausreicht, das ganze Gelege zu befruchten.

Wenn einzelne Weibchen, wie das vor vier Jahren einmal in meiner Zimmerhecke bei einem von einem andern Züchter angekauften graugrünen Weibchen vorkam, das ganze Frühjahr hindurch bauen und brüten, ohne ein einziges Ei gelegt zu haben, so ließe sich der Versuch machen, ob es nicht die Eier anderer Kanarien ausbrütet und die Jungen groß zieht; indeß ist damit immer noch nichts gewonnen; das seiner Eier beraubte Kanarien-Weibchen wird während der Brutzeit eines Jahres ein Gelege mehr machen, dafür aber in der Folge desto weniger legen. Man thut daher am besten, das unfruchtbare Weibchen aus der Hecke zu entfernen, zumal es eine Frage ist, was es in der Fütterung der Jungen leisten wird.

Die Unlust am eigenen Nestbau ist meist nicht die Folge mangelnden Baustoffes; sie beschränkt sich auch sehr häufig nur auf Ein Gelege, dieses ist aber immer etwas in Gefahr; denn es geschieht nicht immer, daß beide Weibchen, wie uns seiner Zeit von Herrn Postdirektor Wulff in Hörde mitgetheilt ist, sich an der Aufzucht der Jungen betheiligen, häufig wird das eine derselben des gemeinschaftlichen Brütens überdrüssig und verläßt das Nest. Wie ich in derartigen Fällen verfahren habe, habe ich S. 118 der „Gefiederten Welt" vom vorigen Jahre erwähnt.

Es ist nicht gerade sehr selten, daß junge Weibchen ihre Eier verlassen, bevor die Jungen ausgeschlüpft sind, oder diese selbst, nachdem sie kaum einige Tage alt sind, nicht mehr füttern; vielmehr eiligst zur ferneren Brut schreiten. Die Ursache ist bekanntlich ein allzu nahrhaftes reichliches Weichfutter; die verlassenen Eier kann man, wenn man das Uebel zeitig genug entdeckt, in größeren Hecken in andere Nester vertheilen, in kleinen ist das Gelege verloren, da sich angebrütete Eier nicht aufbewahren lassen. Die verlassenen Jungen, wenn man sie nicht andern Weibchen ins Nest legen kann, sind leicht aufzufüttern; es geschieht dies bei ganz jungen Vögeln mit verdünntem Eigelb, bei halbflüggen und ältern mit einer Mischung von zerdrücktem, vorher etwas eingeweichtem Sommerrübsen und dem in der Hecke verabreichten Eifutter. Auch Ameisenpuppen leisten hier, wie überhaupt zur Fütterung der Jungen in der Hecke, vortreffliche Dienste.

(Fortsetzung folgt.)

Bücher- und Schriftenschau.

Die Fasanenzucht vom Oberförster **August Gödde.** (Berlin, Wiegandt, Hempel u. Parey). Es bedarf wol keiner Erörterung, daß der Fasan, gleichviel als Geflügel oder Wildbret, also einerseits für die Liebhaberei und Jagd und andererseits für die Küche, von großem Werth ist. Ein Handbuch für die zweckmäßige Zucht erscheint daher in der That von nicht geringer Wichtigkeit. Die vorliegende Schrift hat folgenden Inhalt: 1. Ueber die Anlage einer Fasanerie; 2. Deren technische Einrichtung; 3. Die Aufzucht der Fasanen bis zu ihrem vierwöchentlichen Lebensalter; 4. Erziehung und Behandlung der jungen Fasanen weiterhin; 5. Behandlung der jungen Fasanen auf der Weide; 6. Behandlung der erwachsenen Fasanen; 7. Kosten und Benutzung einer Fasanerie. Die Darstellung dieses Inhalts ist klar und verständlich und der Fachmann muß anerkennen, daß das Buch von einem durchaus erfahrenen Sachverständigen geschrieben ist. Wir empfehlen dasselbe daher den betreffenden Liebhabern auf das beste.

Deutscher Garten-Kalender für das Jahr 1874, herausgegeben von **Th. Rümpler.** (Berlin, Wiegandt, Hempel u. Parey). Man wollte behaupten, daß die Zeit der Kalender vorüber sei. Dies war indessen durchaus unrichtig, denn im Gegentheil, in der neuesten Gegenwart sind wir in Deutschland auf dem besten Wege dazu, daß jeder Stand, jede Berufsklasse, jeder Kunstzweig, jedes Handwerk, jede gesellschaftliche Vereinigung und jede verbreitete Liebhaberei ihr literarisches Organ haben muß, ihre Zeitschrift, ihren Kalender oder wenigstens einen Jahresbericht. Und gerade hierin zeigt sich am interessantesten und wohlthuendsten der Werth der gemeinsamen Thätigkeit, der Vereinigung und Selbsthülfe. Bescheiden wir uns bei diesen Hindeutungen, zu welchen uns eine solche literarische Spezial-Erscheinung, der oben genannte Kalender, die Veranlassung gegeben. Es ist zu spät, denselben hier für das laufende Jahr noch erst zu empfehlen. Dagegen möchten wir die Aufmerksamkeit aller betheiligten Leser zunächst nur überhaupt auf ihn lenken, denn in Anbetracht seines überaus reichen Inhalts bei bester Ausstattung und sehr billigem Preise dürfen wir ihm wol eine sehr große Verbreitung profezeihen. Der erste Theil bildet ein gärtnerisches Notizbuch, mit zahlreichen wichtigen Tabellen, während der zweite Theil eine bedeutende Mannichfaltigkeit von praktisch-nützlichen Mittheilungen bietet. Dieser Garten-Kalender hat für den Gärtner von Fach, wie für jeden gebildeten Landwirth daher einen gleichen Werth.

Dr. K. R.

Ausstellungen.

Die erste allgemeine Ausstellung des **Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügel-Zucht** von Hühnern, Fasa-

nen, Schwimm-, Sing-, Schmuck- und Ziervögeln, verbunden mit einer Ausstellung von Kaninchen, Volièren, Vogelkäfigen u. dgl., findet vom 14. bis 17. August in den Räumlichkeiten des Konvent-Gartens in Hamburg statt. Anmeldung bis spätestens zum 1. August bei dem Präsidenten des Vereins, Herrn Julius Völschau, Reimerstwiete Nr. 12, von welchem auch Anmelde-Programme und nähere Auskunft zu beziehen sind.

Briefwechsel.

Herrn Dr. **Stölker** in St. Fiden, Herrn Präparator **L. Martin** in Stuttgart, Herrn Diakonus **Göller** in Waldenburg: Ihre Beiträge mit bestem Dank empfangen. — Herrn **E. Hünermund** in Köln: Die „Anderweitigen Liebhabereien" haben freilich bei manchen Lesern Beifall, bei andern aber auch Unwillen erregt und wir werden uns daher wol bescheiden müssen, von denselben künftig abzusehen. Dann erhalten Sie Ihr Ms. mit bestem Dank zurück.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

[434] In der

Grosshandlung überseeischer Vögel etc.

von

Arnim Kraeger, Leipzig, Zeitzerstr.,

sind alle in Nr. 25 der „Gefiederten Welt" offerirten Vogelarten, Schildkröten sowie alle Arten von Amphibien zu den billigsten Preisen vorhanden.

Goldfasanen und Scherkessenhühner kauft **Leopold Kollmann** in Frankenhausen. Offerten nebst Preisangaben sind franco einzusenden. [335]

Ein züchtungsfähiges Singsittichweib 5 Thlr.
Ein Paar Textor-Weber in Pracht 7 Thlr.
Ein Paar Rothkopf-Weber in Pracht 4 Thlr. zu verkaufen.
F. Th. Hanser.
[436] Nürnberg, äußere Laufergasse Nr. 8.

Ich habe zu vergeben: 1 Paar einjährige Rehe, 1 einjährige Geiß und 1 zweijährigen Bock und mehrere Kitzen, sämmtlich zahm und gut ans Futter gewöhnt.
2 Stück schöne dalmatinische Blauspatzen, gute Sänger.
2 Stück Sprosser (Doppelschläger) vorzügliche Sänger, beide Tag und Nachtschläger und bereits überwinterte Vögel.
3 Stück sprechende Staare.
Türkische Tauben in jeder Farbe und in beliebiger Anzahl. 8 Stück Pfauen, aber lauter Hähne.
[437] **F. Zivsa,** Vogelhandlung, Troppau (Oesterreich).

Geschäftsverkauf.

Eine seit mehreren Jahren schwunghaft betriebene Handlung exotischer Vögel in Süddeutschland, mit ganz neuem, schönem und zweckmäßigem Inventar, wird verkauft.

Näheres durch die Redaktion dieses Blattes. [438]

Sommerrübsen Ctr. 6¼ Thlr. Kanariensaat 7¼ Thlr. Hanf 5¼ Thlr. Ameiseneier Pfd. 20 Sgr. Mehlwürmer ½ Liter 1⅓ Thlr. Bruteier von Goldpaduanern und Brabanter Hühnern à 2½ Sgr., junge franz. Lapins à Paar 1½ Thlr., halbwüchsige Paar 3—4 Thlr. empfiehlt
[439] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

3 Schweißhunde, 15 Wochen alt, echte Race, verkauft billig **W. Eichentopf,** Detmold. [440]

Abzugeben:
Zebrafinken 1 Paar à 4 Thlr., 8 Männchen à 1¾ Thlr.
Wellensittiche 3 Paar à 5½ Thlr., 1 Männchen à 2½ Thlr. Die Vögel aus eigener Zucht, gesund, brutfähig und im besten Zustande. Alle zusammen für 100 Mark.
[441] **Frantz** in Cassel. Göllnische Allee. Nr. 28½.

1 Paar Brahma-, dito Spanier-, dito Kochinchina-, dito Viktoria-, dito Zwerg-, dito Polandhühner, 1 Paar Pfauen, dito Silberfasanen, dito Perlhühner, 3 Königsweihen, 1 Mäusebussard, sowie eine Sammlung ausgestopfter Thiere von 250 Stück hat zu verkaufen **Dr. Röper**
[442] Villa Hullertvik b. Feldberg.

1 Paar graue Dominikaner 7 Thlr., 1 Paar sing nde Kernbeißer pro 2 Thlr. 15 Sgr., 2 Paar Grauedelfinken à 4 Thlr., 2 Paar Hartlaubzeisige à 4 Thlr., 1 Paar weißköpfige Nonnen 4 Thlr., 1 Paar rothschwänzige Bengalisten 3 Thlr. 15 Sgr., 1 Paar Zebrafinken 5 Thlr. 15 Sgr., 1 Papageischnäbelchen 3 Thlr. hat abzugeben **C. Koch,** Wiesbaden. [443]

Kanarienweibchen
Andreasberger, vorjährige, à 10 Sgr. (Emb. für 1—2 Vögel 8 Sgr.) kommen zum Versandt bei
[444] **Rudolf Maschke** in St. Andreasberg.

Hannover 13. Juli 1874. Der erste hannoversche Kaninchenzüchter-Verein wird vom 7. bis 9. September eine große Ausstellung ausschließlich von großen Kaninchen veranstalten. Das Programm wird nächstens in diesen Blättern publizirt. 443

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierbei das Programm der Hamburg-Altonaer Ausstellung.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 30. Juli 1874. Nr. 31.

Inhalt:

Trauerbotschaft. —
Uebersicht des Thierbestandes in C. Hagenbeck's Handelsmenagerie. —
Freie Raubvögel innerhalb der Stadt Berlin. —
Zur Aufzucht der Kanarien. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Schnabelverkrüppelung; Kormorane. —
Vogelkrankheiten: Wellensittich. —
Flugtauben. —
Zur Versendung von Bruteiern. —
Briefliche Mittheilungen: Schwarzköpfige Zeisige, Ceresfinken, Gebirgslori, Honigsauger; Züchtungen, Spottdrosselzucht. —
Anfragen und Auskunft: Vogelschutz; Schönsittiche; Sterblichkeit der Kanarien; Kanarienweibchen (Schluß).
Briefwechsel. — Anzeigen.

Trauerbotschaft.

Soeben geht uns die Mittheilung zu, daß Herr **Ferdinand Freiherr von Droste** in Münster, Präsident der „Deutschen Ornithologen-Gesellschaft" u. s. w. seinem langjährigen Brustleiden erlegen ist. Tief betrübt geben wir allen Freunden und Verehrern des Verstorbenen diese vorläufige Nachricht. D. R.

Uebersicht des Thierbestandes in C. Hagenbeck's Handelsmenagerie.

Seitdem Herr Hagenbeck seine neue, geräumige mit schönem und großem Garten versehene Wohnung bezogen hat, sind die Thiere beiweitem zweckmäßiger in ihren Ställen und Käfigen untergebracht; sie haben hinreichend Licht, um ihre schönen Farben und Formen beobachten zu lassen, geräumige Käfige, um ihre Kraft und Gewandtheit in ausgiebigen Bewegungen zu zeigen. Das neue, seit wenigen Wochen fertige Raubthierhaus zeigt in einer langen Reihe von Käfigen eine beträchtliche Anzahl von Löwen verschiedenen Alters, die kleinsten wie junge Hauskatzen und so drollig in ihren Bewegungen wie diese, ferner Leoparden, Panther, Hyänen, Jaguare, Tiger, Zibethkatzen, indische und amerikanische Bären, Luchse, von denen ein aus Afrika stammender so zahm ist, daß man ihn wie ein Hündchen auf den Arm nehmen kann. In demselben Hause befinden sich in andern Käfigen eine große Anzahl von Affen, Gürtelthieren, Känguruhs, Wombats, Prairiehunden und, besonders zu erwähnen von riesigen Schlangen aus Indien und Südamerika. An der Außenseite des Raubthierhauses giebt es in neuen und großen Volièren mehrere der größten abessinischen Nashornvögel und zwei Pärchen der seltenen Amherstfasane, welche durch ihre merkwürdig frischen und lebhaften Farben für schöner gehalten werden, als die glänzenden Gold- und Königsfasane. In andern, hier und da zerstreut stehenden Käfigen u. s. w. sind die seltenen afrikanischen Schopfperlhühner, riesige Raubvögel, zahme sprechende Kolkraben, 1 weiblicher Muntjakhirsch, 6 Wapitihirsche, 2 weiße Wasserbüffel, Zebus u. s. w. Der großartigste Anblick aber, der den Besuchern in diesen Tagen geboten wird, ist die Mannichfaltigkeit der verschiedensten großen und kleinen Thiere, welche auf einem weiten eingezäunten Platze frei bei einander umherlaufen. Am letzten Freitag sah man dort vereinigt: 14 Girafen, von denen

einige nahezu ihre volle Größe erreicht hatten, 6 Sömmerings-Antilopen, 2 Kuh-Antilopen, 1 Säbel-Antilope, 1 Elephant, 5 Antigonekraniche, 1 amerikanischer und 2 afrikanische Strauße, 1 Marabu, 1 Adjutant oder indischer Riesenmarabu, 5 egyptische Ziegen und 1 Haidschnucke, zusammen 40 große Thiere, die in ihren verschiedenen Stellungen und Bewegungen einen so ausgezeichneten, malerischen Anblick darboten, daß ein anwesender bekannter Thiermaler (Leutemann) Studien zu einem „Das Hagenbeck'sche Paradies" betitelten Bilde machen konnte. Wir wollen unsern Hinweis mit der Bemerkung schließen, daß der angeführte Thierbestand ein sehr wechselnder ist und daß möglicher Weise in 14 Tagen die Menagerie schon ein ganz anderes Aussehen erhalten hat. Hamburger Reform.

Freie Raubvögel innerhalb der Stadt Berlin.

Die Zeitungen berichten, daß an einem Pfeilerbau des Berliner Rathhausthurms ein Hühnerhabicht sein Nest erbaut hatte. Der Techniker, welchem die Untersuchung der Baulichkeiten obliegt, hatte das Nest gefunden und die Eier an die Rathhaus-Verwaltung abgegeben.

Uebrigens habe ich in meinem Buche „Deutsche Heimathsbilder" (Berlin 1872, Fr. Schulze) alle innerhalb des Weichbildes der Stadt Berlin vorkommenden freilebenden Thiere aufgezählt und auch darauf hingewiesen, daß zahlreiche Raubvögel von verschiedenen Arten hier auf hohen Gebäuden nisten.

Dr. R.

Zur Aufzucht der Kanarien.

Bei mir bekommen die Kanarien-Weibchen, welche während des Brütens blos mit Sommersamen, der selbstverständlich von bester Beschaffenheit sein muß, gefüttert werden, sobald die Jungen da sind, anstatt des sonst üblichen Weißbrotes ein Weichfutter aus Mazze (jüdisches Osterbrot) mit hartgekochtem Ei. Da Mazze aus bestem Weizenmehl und Wasser besteht und als dünngewalzter Teig scharf gebacken ist, in Folge dessen keinerlei fremde Bestandtheile enthält, so ist sie jedenfalls dem leicht säuernden Weißbrot, aus dem die Hefe trotz mehrmaligen Auswaschens doch niemals ganz entfernt werden kann, abgesehen noch von der Billigkeit, vorzuziehen. Sobald die Jungen allein fressen, werden sie von den Alten fortgenommen und in einen besondern großen, der Sonne theilweise ausgesetzten Käfig gebracht, in welchem sie sich recht ausfliegen können. In demselben befindet sich außer einem Blumentopfuntersatz, als Trink- und Badenapf, ein Gefäß mit Sommersamen, ein desgleichen mit verschiedenem Vogelfutter, von dem sie so viel bekommen, als sie nur fressen wollen; ferner ein Gefäß mit Salz, Eierschalen und Sepia und sodann ein in einen Blumentopf eingesetzter Salatbusch, welcher, sobald er abgefressen ist, durch einen neuen ersetzt wird. Später gebe ich auch etwas geschälten Hafer.

Die Mazze wird nicht wie Weißbrot eingeweicht, sondern nur, vorerst in kleine Stückchen mit der Hand zerdrückt, mit einigen Tropfen Wasser befeuchtet, bis das Ganze anfängt weich zu werden, und dann das übrige Wasser abgeschüttet. Das so zubereitete Weichfutter ist naturgemäß sehr zart, wird durchaus nicht schmierig und von den Vögeln jedem andern Weichfutter vorgezogen. Die Samenstengel des sog. breiten Wegerichs (Plantago major) können nicht oft genug verabreicht werden. Hanfsamen gebe ich blos bei Beginn der Paarung bis das Weibchen legt, sonst nicht. Den im Einzelkäfig steckenden Kanarienvögeln gebe ich außer Sommersamen etwas Kanariensamen, Grünzeug und wenn möglich Wegerichstengel. Bei dieser gewiß naturgemäßen Behandlung ist Sterben der jungen Vögel ein mir unbekanntes Vorkommniß seit vielen Jahren. Die Vermeidung der Inzucht kann ich nicht dringend genug anrathen, da ich im Anfang meiner Zucht hierin schlimme Erfahrungen gemacht.

Georg Hilsz in Ortenburg.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Dieser Tage starb mir ein alter Kanarienvogel (Harzer), dessen Oberschnabel sich zeitweise (meistens im Frühjahr) derart verlängerte, daß die Spitze manchmal 3 Linien (etwas über ½ Centimeter) über den Unterschnabel herabhing. Dabei war der Vogel munter, sang u. s. w. In den ersten Jahren schnitt ich ihm öfters das Ueberhängende ab, zuletzt ließ ich es stehen, abwartend, was daraus werde, bis der Vogel durch Traurigkeit, Nachlassen im Singen u. s. w. sein Unbehagen zu erkennen geben sollte. Voriges Jahr wollte ihn als Kuriosum zur Frankfurter Ausstellung mitnehmen, hatte aber plötzlich beim Ausfangen die Schnabelspitze in der Hand. Seither ist sie nicht wieder gewachsen. G. H. in O.

Die Kormorane, welche im vorigen Jahre bereits der Fischerei in unseren Gewässern so sehr bedeutenden Schaden zufügten, sind auch in diesem Jahre auf ihre alten Nistplätze zurückgekehrt. Im Bodenberger Bruch (Kratzwieker Revier) halten sich freilich erheblich weniger als im vorigen Jahre, aber doch noch gegen 500 Kormorane und Fischreiher auf. Durch die vielfachen Störungen haben die Kormorane freilich jetzt auch weniger genistet und viele sind güst geblieben, doch sind die Nester mit bereits halb erwachsenen Jungen noch sehr zahlreich. Während die Thiere früher sehr wenig scheu waren, ist ihnen jetzt nur schwer beizukommen, da sie in Folge ihres scharfen Gesichts den Jäger bald bemerken und dann hoch außer Schußweite dem Damm'schen See zuziehen. Die Reiher, welche im Verhältniß zu den Kormoranen mehr genistet haben, sind dagegen weniger scheu. Ein zweiter kleinerer Horstplatz der

Kormorane findet sich bei Kurow, wo sich ein paar Hundert dieser Fischfresser aufhalten. Man kann, wahrscheinlich noch zu niedrig, den Schaden, welchen ein Kormoran täglich der Fischerei zufügt, auf 1 Thlr. veranschlagen, da von ihnen nur große Fische und Aale gefangen werden. Unter den Nestern liegt eine Menge halbangefressener großer Fische, welche herausgefallen sind und vom Boden von den Thieren nicht wieder aufgenommen werden. Seitens des Magistrats wird für ein paar Fänge der Kormorane 2½ Sgr. Schußprämie bezahlt, was gewiß viel zu wenig ist, um, abgesehen von Jagdliebhabern, eine gründliche Verfolgung und Ausrottung herbeizuführen. — Der Stettiner Ornithologische Verein hat am Bettage, einer Einladung des Besitzers folgend, einen Ausflug nach Kurow gemacht, wobei zahlreiche Nester zerstört und denselben gegen 10 Schock Eier entnommen wurden. Der Verein wird auch ferner sein Augenmerk auf die Vernichtung dieser Fischräuber richten, jedoch muß, wie oben gesagt, wenn nicht die Fischerei noch weiter leiden soll, bald die Schußprämie erheblich erhöht und auch auf die ihr ebenso gefährlichen Reiher ausgedehnt werden.

Stettin. G. Prütz.

Vogelkrankheiten.

Vor einiger Zeit bemerkte ich an einem meiner Wellensittiche, daß derselbe, wenn er auf einer Stange saß, den einen Fuß immer eingezogen hatte und zwar theils den rechten, theils den linken. Ich beachtete dies wenig, da ich sah, daß der Vogel nicht trauerte und regelmäßig seine Nahrung zu sich nahm. Eines Tages jedoch fand ich den Sittich auf dem Boden des Käfigs liegen und an beiden Füßen derart gelähmt, daß er keine Zehe mehr bewegen konnte und nur durch Flattern der Flügel, ohne Beihülfe seiner Füße sich fortbewegen konnte. Dieser Zustand war mir um so auffallender, als ich keine Ursache der Erkrankung auffinden konnte, denn meine Vögel erhalten stets nur trockenen Sand, gutes Futter (Kanariensamen, weiße Hirse, ungeschälten Hafer und Sepia und etwas Grünes) und sind an einem trockenen Orte, wo keine Zugluft vorhanden sein kann. Ich nahm Ihr „Handbuch für Vogelliebhaber" I und habe Seite 340 über die Krankheiten der Vögel nachgelesen und meinen Wellensittich darnach behandelt.

Vor allem setzte ich denselben in einen Käfig allein, fern von jeder Störung, that in die Schublade des Käfigs warmen Sand, den ich mit einem erwärmten Tuchlappen überdeckte, machte über dem Feuer Rosmarinsalbe warm und rieb jeden Tag drei Mal die Füße damit ein. Nach drei Tagen, während welcher Zeit ich jeden Tag auf dieselbe Weise verfuhr, konnte der Sittich schon in dem Käfig zu dem Freßgeschirr rutschen, aber die Zehen noch nicht bewegen; nach weiteren drei Tagen versuchte er schon auf die Sitzstange zu gelangen, ich setzte die Einreibungen immer fort, da ich von Tag zu Tag bemerkte, wie immer mehr Leben in die Zehen kam, und sah nach zehn Tagen meine Bemühungen mit dem besten Erfolge gekrönt, denn heute ist derselbe wieder ganz munter und kann seine Füße wieder vollkommen zum Sitzen und Klettern gebrauchen. Um demselben noch Ruhe zu gönnen, lasse ich ihn noch einige Tage allein, obgleich der Vogel soweit hergestellt ist, daß ich die Kur als gelungen betrachten darf.

J. B. Kilian,
Hauptkassirer der Hessischen Ludwigsbahn.

Flugtauben.

Die Liebhaber der Tauben haben von jeher ein besonderes Vergnügen gefunden, an dem schönen, ausdauernden Fluge dieser anmuthigen Vögel, und diejenigen Arten unter ihnen, die sich durch besondere Flugfähigkeit auszeichnen, durch regelrechte Dressur zu oft staunenswerthen Leistungen herangebildet. Auch Schreiber dieses war Jahr und Tag im Besitze einer prächtig dressirten Flucht von Tümmlern, die Hervorragendes im Fluge leistete, und oft 5—6 Stunden ohne Unterbrechung in hohen Luftschichten kreiste. Dabei hatte er denn mannichfache Gelegenheit, auch das Leben anderer gefiederten Geschöpfe kennen zu lernen.

Es war im Herbste vor einigen Jahren, als ich meine Taubenflucht (an 80 Köpfe stark) des Morgens steigen ließ. Ein prächtiger, klarer Tag war angebrochen und, froh des goldenen Lichts, stiegen meine Tümmler in zierlichen Schwenkungen gar schnell der Sonne entgegen. Solche Herbstfluchten haben für mich immer einen besonderen Reiz gehabt. Abgesehen davon, daß man zu dieser Zeit die besten Flieger an den bereits vermauserten Jungen der ersten Hecke hat, gewährt Einem auch die Beobachtung der Natur in diesen Monaten das größte Vergnügen. Die klare, durchsichtige Bläue der Luft, die uns immer wieder treibt, den Blick in die Höhe oder Ferne zu versenken, die reine Beschaffenheit der Atmosphäre und vor allen Dingen die Beobachtung der Wandervögel, deren Ruf von allen Seiten an unser Ohr tönt — haben für den Freund der Natur etwas ungemein Anziehendes. Da hört man das wohlklingende „tier", „tier" der ziehenden Lerchen, die Lockrufe wandernder Drosseln, das „zit, zit" streichender Meisen, die etwas rauhen Töne der Zeisigschwärme u. v. a. Und dazu überall dieser wunderbare Frieden und Farbenschmelz in der Natur, der ihr geradezu etwas Verklärendes giebt. Prächtig spielt das Sonnenlicht auf den weißen Schwingen der elsterfarbigen Tümmler und zeigt die Taubenflucht in wahrhaft malerischer Schönheit. Da, siehe, plötzlich giebt der alte schwarzbunte Tümmler, der nun schon 18 Jahre die Flucht mitmacht und stets als Zugführer an der Spitze ist, durch hastigere Flügelschläge zu erkennen, daß etwas Verdächtiges nahe.

„Wich, wich, wich" tönt es durch die klare Luft, ein starker Flug Wildgänse zieht seitlich in Keilordnung vorüber. Langjährige Erfahrung hat die Tauben ihre Feinde und Freunde aber genau kennen gelehrt; bald beruhigt sich die Flucht, und kreist unbekümmert um die Wandergäste, wieder in alter Ordnung. „Hiäh, hiäh", tönt es jetzt von ferne, eine Schar von Milanen ist im Anzuge. Bei ihrem ersten Anblicke schwenkt die Taubenflucht wol in etwas kürzeren Windungen, aber bald ist sie wieder beruhigt und weicht nur gerade soviel bei Seite, daß die trägen Gesellen vorbeiziehen können. So geht es weiter — Wildenten, Bussarde und andere ziehen an dem Taubenschwarme vorüber, ohne ihn mehr, als auf einen Augenblick zu beunruhigen. Aber siehe da, jetzt muß wirklich etwas Verdächtiges nahen; der alte, ruhige Tauber an der Spitze, peitscht die Luft mit hastigen Flügelschlägen, und der ganze Schwarm läßt ein weithin hörbares Knacken mit den Flügeln vernehmen. Noch kann ich nichts sehen — aber richtig, vom Walde her naht ein Wanderfalk, weithin kenntlich an den langen spitzen Flügeln, und dort noch einer, und noch einer, und noch einer, bis ich ihrer fünfe zähle. Kaum kann ich glauben, daß es einen Angriff auf die Flucht gelte, aber jetzt fangen sie an zu kreisen, in immer bedenklichere Nähe der Flucht kommen die Raubvögel und richtig haben sie einen Schlachtplan gemacht. Oben kreist mit drei flüggen Jungen das alte Weibchen und das Männchen sucht von unten die Tauben seinen Jungen zum Stoße zu bringen. Es ist ein herrliches Schauspiel! Die äußerst fluggewandten Tauben suchen auf alle mögliche Weise sich den Räubern zu entziehen; es hilft ihnen aber nichts. Nach einer Viertelstunde sind sie in die Nähe der oben kreisenden Falken gekommen, es erfolgt ein weithin hörbares machtvolles Sausen, und die fünf Edelfalken stoßen zugleich unter meine Lieblinge. Als der zersprengte Schwarm sich wieder sammelt, sehe ich zwei Falken, jeden mit einer Taube in den Fängen, davonfliegen, die übrigen ohne Beute gemacht zu haben, ihnen nach. Vermuthlich waren die glücklichen Fänger die Alten, welche nun aber von ihren Jungen geplündert wurden. Das Ende entzog sich meiner Beobachtung, aber als sich am Abend meine Tümmler sammelten, fehlten zwölf Köpfe, von denen zehn sich wahrscheinlich verflogen hatten. R. Gensichen, Pfarrer.

Zur Versendung von Bruteiern.

Bei einem bedeutenden Hühnerzüchter in Stuttgart traf aus der Pfalz eine Bestellung auf Bruteier von einer feinen Hühnerrasse ein. Die Eier wurden — ich kenne den Mann, seine Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit von der vortheilhaftesten Seite — frisch und gut abgesendet. Nach drei Wochen schreibt der Empfänger, er habe die Eier mikroskopisch untersuchen lassen, und es habe sich herausgestellt, daß die Embryo's absichtlich mittelst feiner Nadelstiche zerstört waren, weshalb die Brut erfolglos gewesen.

Ich lasse die Berechtigung dieser Behauptung dahingestellt, so wunderlich dieselbe auch erscheint und so sonderbar es jedem Denkenden vorkommen mag, daß der Empfänger doch die „nadelgestochenen" verdorbenen Eier unterlegt, anstatt sie sogleich zurückzugeben. Dagegen möchte ich nur im allgemeinen Interesse die Frage anregen, ob unsere Hühnerfreunde vielleicht schon ähnliche Erfahrungen bei Bruteiern, die eine Fahrt von etwa 24 Stunden machten, bemerkt haben.

Stuttgart. M.

Briefliche Mittheilungen.

Hiermit freue ich mich, Ihnen die Nachricht geben zu können, daß die schwarzköpfigen Zeisige (Fringilla — Astragalinus — cucullata) in meiner Vogelstube geheckt haben. Leider hatten sie nur 2 Eier gelegt, aber beide ausgebrütet. Ein Junges, Weibchen, fliegt munter in der Vogelstube umher und ist fast ebenso stark und groß als die alten Vögel. Das junge Männchen ist durch einen unglücklichen Zufall ums Leben gekommen. Die Vögel hatten ein Pärchen Zebrafinken aus einem Nistkäfig getrieben, auf die in deren Nest befindlichen fünf Eier ein neues Nest gebaut und dann die beiden Jungen erbrütet. Ich fand dies, nachdem die Jungen ausgeflogen waren, bei Besichtigung des Nestes.

Meine Ceresfinken haben auch in diesem Jahre, wie früher, eine Menge Nester gebaut, auch Eier gelegt, aber niemals gebrütet. Bei einem Weibchen, welches vor einigen Wochen so durch die Legenoth zu leiden hatte, daß es sich machtlos ergreifen ließ, versuchte ich die in Nr. 16 von E. Vogler vorgeschlagene Wasserkur und habe sie ganz vorzüglich gefunden; ich kann dieselbe daher empfehlen.

Ich besitze ein Paar blaue Gebirgslori von Gudera in Leipzig, finde aber nicht, daß sie so arg schreien, als dies einmal hier angegeben wurde. Die schlechte Eigenschaft des Schreiens scheint demnach wol individuell zu sein.

Mein Honigsauger erfreut sich noch voller Gesundheit und selbst neben den Loris, des Beifalls aller Beschauer. Das Vögelchen ist so zahm und zutraulich geworden, daß es mir jede Fliege, die ich ihm reiche, aus den Fingern nimmt. Heer, Kreisgerichtsrath in Striegau.

Außer den Hüttensängern, die 4 Junge bis zum sechsten Tage groß zogen, worauf die Jungen eines Morgens in unerklärlicher Weise verschwunden waren, brüten bei mir Gimpel, und außerdem habe ich von Nachtigalen Eier gehabt, die jedoch nicht ins Nest gelegt wurden und daher verdarben.

Ich besitze unter andern auch die Grachtnersche Spottdrossel, die das Lob über die Golzsche wol vertragen dürfte. Unerschöpflich sind ihre Weisen und sie singt zu jeder Stunde, bei Nacht oft eben so fleißig als am Tage.

Ein Spottdrossel-Weibchen war nichts werth, es war zu flüchtig, und trotzdem es sich endlich gepart, war es nicht zum Nisten zu bringen. Aergerlich hierüber, habe ich es fliegen lassen, damit kein Anderer vergebliche Versuche mit ihm machte.*) Es ist eigenthümlich, daß bei jetzt drei-

*) Dann hätten Sie doch auch ein Männchen dazu fliegen lassen sollen! D. R.

maligen Versuchen alle Weibchen, welche kleiner waren als das Männchen, wozu auch das erwähnte gehörte, nicht nisteten, sich auch nur ungern paarten. Zwei wurden von dem Männchen hierüber todt gebissen.

Die Spottdrosselzucht werde ich demnächst noch mehr ins Auge fassen, denn eine wirklich gute Spottdrossel zu besitzen, ist ein Kleinod in unserer Liebhaberei; eine gewöhnliche nicht abgehörte hat dagegen nicht den Werth einer Singdrossel und steht viel zu hoch im Preise bei den Kleinhändlern. Neuß, Apotheker in Essen.

Anfragen und Auskunft.

Frage: In dem jedes Frühjahr bekanntgemachten landräthlichen Erlaß, betreffend die zu schützenden Vögel, deren Fangen, Tödten u. s. w. mit Strafe bedroht wird, befinden sich auch die Würger. Nun ist beispielsweise der rothrückige Würger ein zwar drolliger, immer gesangesfertiger Bursche, nach Karl Vogt, Müller, Nuß und Anderen, sowie nach meiner eigenen Beobachtung aber ein abscheulicher Nesterplünderer. Wenn ich nun in meinem Garten alljährlich das sich ansiedelnde Würgerpaar, so leid es mir thut, unerbittlich wegschieße, und ich auf Grund obigen Erlasses denunzirt werde, wie habe ich mich zu verhalten? W. H.

Frage. Ich besitze ein Pärchen der reizenden Schönsittiche (P. pulchellus), von denen das Männchen im Jahre 1872 in der Vogelstube des Herrn Stadtrath Riemann zu Nordhausen gezüchtet worden ist. Das Weibchen ist ein bis zwei Jahre älter. Im Monat Mai v. J. brachte ich diese allerliebsten Sittiche in einen großen zum Nisten eingerichteten Käfig. Nach wenigen Wochen fing das Weibchen an, das Männchen zur Paarung anzutreiben und nach kurzer Zeit gewahrte ich denn auch, daß sie auf fünf Eiern brütete. Von Neugierde getrieben, nahm ich nach etwa 24 Tagen, als sich das Weibchen am Futternapf befand, schnell den Brutkasten herunter, wurde jedoch leider gewahr, daß es unbefruchtete Eier waren. Um das Thierchen nicht längere Zeit vergebens brüten zu lassen, entfernte ich die Eier aus dem Nistkasten. Schon nach wenigen Wochen brütete das Weibchen wieder auf drei Eiern mit demselben Mißerfolg. Nachdem ich die Eier wiederum entfernt hatte, nahm ich mir vor, der Begattungsweise dieser Vögel mehr Aufmerksamkeit zu widmen, und so wurde ich denn gewahr, sobald das Weibchen zur Begattung aufforderte, welches sie auf der Sitzstange durch ein fortwährendes Locken zu erkennen gab, daß das Männchen sich eiligst zu ihr gesellte, anstatt alles Weiteren jedoch nur neben ihr sitzen blieb und mit dem Schnabel die Federn von ihrem Rücken auszupfte. Nun wurde mir auch nach dieser Wahrnehmung klar, wodurch das Weibchen einen kahlen Fleck auf dem Rücken hatte. Es entstand wiederum ein Gelege von fünf Eiern unter demselben Mißerfolg wie früher. Unter diesen, für jeden Vogelfreund so widerwärtigen Umständen, trennte ich für dieses Jahr die beiden Ehegatten, da ich den Grund der Nichtbegattung in dem noch zu jugendlichen Alter des Männchens zu finden glaubte. Meine Hoffnung, Junge zu erzielen, war für das Jahr also dahin und mußte bis zum nächsten Jahre verschoben werden. Vor etwa vier Wochen wurden die Vögel wieder zusammen in den Käfig gesetzt, und ich war sehr gespannt, ob das Männchen in dem verflossenen Zeitraum von acht Monaten sich nun die Eigenschaft eines guten Nistvogels angeeignet habe. Leider jedoch schon nach kurzer Zeit mußte ich die Wahrnehmung machen, daß das Männchen derselbe Dummkopf geblieben war als im vorigen Jahre. Er biß ihr wieder blos die Federn vom Rücken aus. Das Weibchen hat wiederum ein Gelege von vier Eiern, jedoch sind dieselben durchsichtig und folglich unbefruchtet, dabei füttert das Männchen häufig das Weibchen im Nistkasten.

Es würde nun zunächst die Frage über den Grund der Nichtbegattung seitens des Männchens aufzustellen sein, ob diese Gattung von Papageien vielleicht ein noch höheres Alter erreichen müsse, ehe sie zur Begattung reif sind?

Oder ist dieses Männchen als überhaupt untauglich in dieser Beziehung zu betrachten und vielleicht auch für alle Zukunft zur Zucht unbrauchbar?

Oder verlangt diese Gattung zum Nisten einen größeren Raum, als einen großen Heckbauer, vielleicht eine Vogelstube? Fr. Krause in Sondershausen..

Antwort. Bis jetzt sind in der Züchtung der Papageien, insbesondere der australischen Plattschweifsittiche, erst so geringe Erfahrungen festgestellt worden, daß sich sichere Auskunft wol kaum geben läßt. Ich habe allerdings gerade die Schönsittiche auch in der zweiten Generation gezüchtet und zwar noch dazu von einem Nestpärchen. Der Erfolg waren drei gut ausgekommene und flügge gewordene Junge von sieben Eiern eines Geleges. Die Vögel waren aber über drei Jahre alt; ich hatte sie jung abgegeben und im dritten Jahre zufällig zurückgekauft. Ferner habe ich von einem Weibchen (Wildling) mit einem, ebenfalls von Herrn Stadtrath Riemann gezogenen jungen Männchen auch vier Junge gezogen; doch waren damals zwei Pärchen in der Vogelstube vorhanden und die Möglichkeit wäre daher nicht ausgeschlossen, daß dies Weibchen auch mit dem anderen Männchen geheckt haben könnte. Die Hauptsache bleibt also immer, daß wir allseitig möglichst mannigfaltige Erfahrungen feststellen. Dr. R.

Frage: Unter meinen Vögeln herrscht eine fürchterliche Sterblichkeit in diesem Jahre. Von zwanzig alten Weibchen habe ich nur noch zehn am Leben, auch sind mir ganze Nester mit jungen Vögeln eingegangen. Meine Fütterung besteht schon seit Jahren in gequetschtem Hanf, Kanariensamen und Magdeburger Sommer-Rübsen, hartgekochtem Ei und in Wasser aufgeweichter Semmel, sowie ab und zu sehr schönem Kopfsalat. Letzteren habe ich jetzt gar nicht mehr gegeben, da ich fast der Meinung bin, daß ich mir in der Fütterung etwas habe zu schulden kommen lassen. Müller, Revierjäger.

Antwort: Die Untersuchung der übersandten Vögel war nicht möglich, da dieselben schon bei ihrer Ankunft in Steglitz bereits völlig in Fäulniß übergegangen waren. Aus dem Umstande jedoch, daß diese so rasch eingetreten ist und die Krankheit seuchenartig sich verbreitet zu haben scheint, möchte ich auf Eingeweide-, Darm-Entzündung, auch Brand oder Bruch genannt, schließen. Diese verheerende Krankheit ist leicht zu erkennen. Bei jungen Vögeln tritt sie meist im halbflüggen Zustande, mitunter etwas früher, auch wol um einige Tage später auf; selten bleibt Ein Junges desselben Geleges davon verschont, sobald das erste daran erkrankt ist; selten ist es aber auch, daß die fütternden Weibchen daran zu Grunde gehen, wenn man die Krankheit in ihren ersten Anfängen erkennt und Maßregeln dagegen ergreift.

Die erkrankten jungen Vögel haben einen mageren, aufgetriebenen Unterleib; die Eingeweide sind theils entzündlich roth, theils schwärzlich anzusehen; sie sind ebenfalls stark angeschwollen, anscheinend verwickelt und lassen sich mit dem Auge leicht bis ans Ende des Körpers verfolgen. Die Vögel haben Anfangs großen Hunger, magern aber dabei rasch ab und gehen nach wenigen Tagen unter heftigen Krämpfen ein. Bei der beobachteten Fütterung kann die Ursache nur in dem aufgeweichten Weißbrot gelegen haben. Dasselbe ist entweder zu frisch oder nicht gehörig ausgedrückt gewesen, oder es ist auch in übermäßiger Menge gereicht worden; vielleicht war auch beides zugleich der Fall. Auch auf die Lage der Vogelstube kommt dabei viel an. Ist dieselbe des Morgens lange kühl, so wurde die Krankheit dadurch um so mehr begünstigt.

In dem Aufsatz über die Untauglichkeit der Kanarienweibchen zur Hecke habe ich mich darüber ausgesprochen, wie der Krankheit zu steuern; zur Vermeidung von Wieder-

holungen muß ich darauf Bezug nehmen. Ich möchte hier nur noch bemerken, daß wenn die eingesetzten Heckvögel von Harzer Rasse sind, die Fütterung mit Hanf und Kanariensamen gar nicht am Platze war.

Solche Vögel erhalten neben einer geringen Quantität Mohn unter dem Eifutter weiter keine Sämereien, als guten reinen Sommerrübsen. An anderm Körnerfutter erkranken dieselben fast regelmäßig, und nicht wenige derselben gehen ein. Derartig zu Tode gefütterte Vögel zeigen ebenfalls eine starke Abmagerung, aber keinen aufgetriebenen Leib. Derselbe ist im Gegentheil bemerkbar eingefallen; er hat eine eigenthümlich aschgraue Farbe, und bei verschiedenen Vögeln gewahrt man noch die ausgetretenen gleichmäßig tiefgrauen klebrigen Exkremente. Eine derartige Krankheit tritt ebenfalls seuchenartig auf, legt sich aber allmählich, sobald man zu der früher gewohnten Fütterung mit reinen Sommerrübsen — ohne Beigabe von Grünzeug — zurückkehrt.

Die an der Darmentzündung eingegangenen Vögel gehen sehr schnell in Fäulniß über und verbreiten dabei einen starken üblen Geruch.

Verstopfung tritt in der Hecke auch bei vorherrschend trockner Fütterung oder bei zu großen Beigaben von Mohn ein; sie kann alte und junge Vögel in einigen Tagen tödten. Es ist ihr übrigens leicht durch Grünzeug und eingeweichten Samen abzuhelfen. Die eingegangenen Vögel sind sehr gut genährt, aber ihre Eingeweide stecken voll von unverdautem, meist aus Ei bestehendem Futter. Am lebenden Vogel erkennt man die Krankheit leicht an dem vergeblichen Bemühen, der Exkremente sich zu entledigen, wobei der Unterleib stark gebeugt wird. W. B.

Beantwortung der Frage: Weshalb laugen so viele Kanarienweibchen nichts?

(Schluß).

Sehr selten ist es, daß ein Weibchen stets ein volles Gelege und in einem Jahre deren vier bis sechs macht, aber die Eier niemals bebrütet. Mir ist überhaupt nur ein Fall dieser Art vorgekommen; ich habe das betreffende Weibchen im nächstfolgenden Jahre verschenkt und auch in diesem Jahre hatte es wiederum sehr fleißig gelegt, aber sich mit dem Brüten ebensowenig befaßt, wie früher. Ursache dieses Uebelstandes scheint mir eine gar zu rasche Aufeinanderfolge der verschiedenen Gelege, demnach ein organischer Fehler des Weibchens gewesen zu sein.

Einige Weibchen haben die Unart, daß sie nur einige ihrer Jungen, vielleicht diejenigen, die zuerst ausgeschlüpft und daher kräftiger sind, ausreichend, ja mehr als ausreichend füttern, die übrigen aber häufig übersehen. Erstere gerathen dann in Gefahr, an zu vollem Kropfe zu ersticken und dies geschieht auch garnicht selten bei trocknem Eifutter, das heißt bei einem Gemenge von Ei und geriebenem Weißbrot, sehr selten oder nie dagegen, wenn dieses vorher eingeweicht war. Letztere dagegen bleiben im Wachsthum von vornherein zurück und gehen nach einigen Tagen ein. Will man dieses verhüten, so wird man sehr wohl thun, der mangelhaften Fütterung bei Zeiten selbst nachzuhelfen und dieserhalb die Nester solcher Weibchen Mittags und namentlich Abends zu untersuchen.

Einzelne Züchter brauchen die Vorsicht, die Eier bis zur Vollständigkeit des Geleges wegzunehmen und durch andere besonders gezeichnete bis dahin zu ersetzen, denn selten wartet das Weibchen mit dem Brüten, bis es alle Eier gelegt hat — mir ist der Fall nur ein Mal vorgekommen —; meistens beginnt das Brutgeschäft schon beim zweiten Ei.

Man erreicht bei solchem Verfahren, daß alle Jungen eines Nestes von vornherein von gleicher Stärke sind und deshalb kann bei kleineren Hecken die damit verbundene geringe Mühe immerhin sehr lohnend werden.

Jedenfalls erscheint es aber geboten, die Nistvorrichtungen so zu treffen, daß das Weibchen beim Füttern volles Tageslicht hat.

Nach dem Ausfliegen der Jungen kommt mitunter der sonderbare Fall vor, daß das eine oder andere Junge von dem Weibchen garnicht beachtet wird, während es die übrigen fleißig füttert. Mitunter nimmt sich dieses verlassenen Jungen ein anderer alter Vogel oder auch ein junger aus früherer Brut an, dies ist indeß immer eine Ausnahme und zu allermeist ist dasselbe auf seine eigene Ernährung angewiesen und, wenn das Eifutter an einem ihm leicht zugänglichen Orte, in fliegenden Hecken auf dem Boden des Zimmers, steht, so lernt es auch in der Regel gar bald, von seinen eignen Fähigkeiten Gebrauch zu machen; ich habe noch in diesem Jahre junge Vögel sich über das Eifutter hermachen sehen, denen die Flaumfedern noch nicht ausgefallen waren.

Es ist indeß sehr gerathen, auf die eben ausgeflogenen Jungen sorgfältig zu achten und sobald es Noth thut, mit der Fütterung in der oben angegebenen Weise alle zwei Stunden selbst nachzuhelfen.

Mitunter, vielleicht nicht sehr häufig tritt der Fall ein, daß junge Vögel einige Tage nach dem Ausschlüpfen eingehen, obgleich sie häufig genug vom Weibchen gefüttert werden. Derartige Vögel haben einen aufgetriebenen Leib mit großen gelblichen Flecken. Diese Stelle fühlt sich sehr hart an und wenn man sie aufschneidet, so erkennt man, daß es der Magen ist, der bis zum Uebermaß angefüllt ist mit den innern Schalen des Sommerrübsens. Das Vögelchen ist bei vollem Magen verhungert: es hat den Samen selbst in mäßig eingeweichtem Zustande nicht verdauen können.

Bei andern Vögeln, die halbflügge geworden waren, habe ich im Magen eine zähe klebrige Masse, die von eingeweichtem Weißbrot herrührte, vorgefunden.

Derartige Mißstände sind meines Erachtens nicht ganz zu vermeiden; alles was sich dagegen thun läßt, beschränkt sich darauf, das Eifutter nicht stundenlang in der Hecke fehlen zu lassen und zum Einquellen oder Reiben nur altbackenes Weißbrot und dieses nicht in übermäßiger Menge zu verwenden.

Wenn die Nestjungen in den ersten sechs bis acht Tagen gedeihen und demnächst einer nach dem andern eingeht, so ist das nicht die Schuld der Weibchen; mit dem Füttern derartiger Jungen haben diese ihre Noth. Die jungen Vögel sind beständig hungrig, sie werden immerzu reichlich mit Nahrung versehen, können dieselbe aber nicht verdauen, weil sie zu naß, zu sehr eingequellt ist. Die jungen Vögel gehen dabei schließlich an Darmentzündung zu Grunde und die Zuchtvögel befinden sich dabei auch nicht ganz wohl.

Die Darmentzündung, wenn sie einmal in der Hecke zum Ausbruche gekommen ist, wirkt epidemisch, theils wegen der fortdauernden schädlichen Ursache, theils, weil die Vögel bekanntlich die Gewohnheit haben, die Exkremente anderer zu verzehren.

Zu reichlich gereichtes eingeweichtes Weißbrot, namentlich, wenn dasselbe nicht scharf genug ausgedrückt, oder in Milch getaucht ist, ferner stark eingeweichter, reichlich genossener Sommerrübsen sind meines Erachtens die Ursachen dieser verderblichen Krankheit; bei der Fütterung mit trockenem, oder eine halbe Stunde lang eingeweichtem oder mit heißem Wasser abgebrühten und dann getrocknetem Samen, verbunden mit trockner Eifütterung — Ei und geriebenes Weißbrot — kommt sie nicht vor; dagegen scheinen mir bei dieser letztern Fütterung mehrere Junge in den ersten Tagen ihres Daseins einzugehen, vielleicht, weil das Eifutter namentlich an heißen Tagen leicht zu trocken wird; in diesem Zustande fressen es die Zuchtvögel nicht sehr gern; sie werden lässig im Füttern oder füttern mit bloßem Samen. Ei und eingeweichtes und gut ausgedrücktes Weißbrot, jedes in einem besondern Gefäße verabreicht, ist nach meinen Erfahrungen leichter verdaulich, als wenn man beides untereinander mischt und auf diese Weise habe ich selbst noch in der dritten Hecke einige Erfolge erzielt, als die Jungen der vorhergehenden Bruten zum großen Theile an Darmentzündung eingegangen waren.

Manche Zuchtvögel beiderlei Geschlechts haben die

Gewohnheit, die Jungen zu rupfen. Wenn es sich auf das Ausziehen der Schwänzchen beschränkt, so geht darüber zwar kein junger Vogel zu Grunde, selbst wenn er dabei blutet; allein er wird dadurch vorübergehend doch entstellt und der Gesang beginnt, wie mir scheint, auch etwas später. Werden aber die Nestjungen rückenkahl gerupft, wie das auch wol vorkommt, so bleiben sie in der Regel um so viel länger im Neste und werden um so später selbstständig. Eine derartige mißliche Neigung ist erblich; man verwende daher solche Vögel für die folgenden Jahre nicht wieder zur Hecke. Um dem Uebel sofort zu steuern, wußte ich kein anderes Mittel, als den Vögeln reichlich Federn von kleinen Wildlingen zu geben, wenn sich Gelegenheit dazu darbietet.

Männliche und weibliche Eierfresser sind wenigstens in der Harzer Rasse selten; solche Vögel eignen sich zur Hecke nicht, doch kann man zur Noth in der Käfighecke den männlichen Vogel noch verwenden, man muß ihn aber von dem Weibchen trennen, bevor dieses das erste Ei gelegt hat. Es schadet das der Befruchtung des Geleges nicht. Uebrigens ist aus dem Umstande, daß in der fliegenden Hecke aus einem Neste ein oder auch alle Eier verschwinden, noch nicht auf einen Eierfresser zu schließen; häufig werden aus reinem Zufall Eier aus den Nestern geworfen und man kann dann oft lange suchen, bevor man kleine Reste derselben am Boden entdeckt. Einige Weibchen haben auch die Gewohnheit, so oft sie ein Ei gelegt haben, das Nest weiter zu überbauen; man gewahrt dann Morgens stets nur ein Ei und Abends gar ein leeres Nest. So habe ich aus einem solchen Neste noch in diesem Frühjahre vier Eier herausgenommen, von denen das eine immer um eine Lage Charpie tiefer saß, als das andere. Alle Eier waren merkwürdigerweise unverletzt.

Wenn einzelne kleine Junge oder auch nach und nach alle eben ausgeschlüpften Jungen desselben Geleges aus einem Neste verschwinden, so sind sie entweder zufällig oder von den spielenden Jungen einer früheren Brut herausgeworfen. Selten geschieht es von den alten Vögeln absichtlich und von dem betreffenden Weibchen wol niemals, höchstens in der Käfighecke von dem Hahne, dem die Zeit bis zur folgenden Brut etwas zu lange dünken mag; derartige Fälle habe ich selbst nicht erlebt, aber von Andern darüber klagen hören. Es ist daher anzurathen, während des ersten Geleges wenig und sobald dasselbe vollständig ist, bis zum Ausschlüpfen der Jungen gar kein Eifutter zu reichen.

Ein aus dem Neste geworfener noch nackter Vogel wird fast regelmäßig an Schnabel, Flügeln und Beinen von den übrigen Vögeln, die sich in dem Brutraum befinden, benagt; daß es aber Zuchtvögel gebe, die ihre eigenen Jungen verzehren, möchte ich sehr bezweifeln.

Wenn junge, d. h. nackte junge Vögel aus dem Neste spurlos verschwinden, so ist auf das Vorhandensein von Mäusen zu schließen, vor deren Kletterkünsten, wenn sie sich einmal im Heckzimmer eingenistet haben, kaum ein Nest sicher ist.

Weibchen, die mit verschiedenen Männchen gepart, stets klare, d. h. unbefruchtete Eier legen, sind gewiß selten; sie leiden wol unzweifelhaft an fehlerhafter Beschaffenheit der Geschlechtsorgane, aber äußerlich ist dies sicherlich nicht zu erkennen. In größeren Hecken lassen sich solche Fälle andauernder Unfruchtbarkeit fast gar nicht feststellen, deshalb habe ich auch keine eigenen Erfahrungen darüber machen können.

Wenn das erste Gelege unbefruchtet geblieben ist, was recht häufig vorkommt, so liegt das meiner Ansicht nach daran, daß das Zuchtpärchen vorher oder auch beim Beginn der Hecke zu sehr mit Ei gefüttert wurde.

Ueberhaupt schadet in dieser Hinsicht ein reichliches Eifutter viel. Als ich in diesem Frühjahr mit 65 Köpfen, darunter Anfangs 14, später 15 Hähnen, die Hecke eröffnete, habe ich täglich zwei Eier, selten etwas mehr, verfüttert und fast alle Gelege waren befruchtet; ich hatte die Weibchen vorher nur mit Sommerrübsen, die Männchen aber, des Gesanges wegen, außerdem noch mit einer kleinen Gabe Eifutter versehen. Gegenwärtig füttere ich auf 183 Köpfe alter und junger Vögel täglich neun bis zehn Eier und habe seit 3 Wochen so viele klare Eier, daß ein befruchtetes Gelege fast zur Ausnahme gehört. Die Hähne sind, wie mir scheint, durch die fortgesetzte stärkere Eifütterung zu hitzig geworden.

Solchem Uebelstande läßt sich meines Erachtens nur vorbeugen, indem man bei der trockenen Eifütterung auf einen Hahn nicht unter 4, besser vielleicht 5—6 Weibchen einwirft oder auch statt der trockenen Eifütterung Ei mit eingeweichtem Weißbrot verabreicht, denn hierbei läßt sich mehr Weißbrot zusetzen, als im andern Falle.

Uebrigens ist mir auch der Fall vorgekommen, daß bei bloßer Samenfütterung die Eier sämmtlicher Weibchen in allen Bruten eines Jahrgangs unbefruchtet blieben. Ich hatte damals drei Käfighecken auf einem sehr geräumigen und hellen Korridor eingerichtet, konnte aber hier nicht vermeiden, daß die Vögel zeitweise der Zugluft ausgesetzt waren, und diesem Umstande hatte ich denn auch das ungünstige Ergebniß zuzuschreiben. Die alten Vögel blieben übrigens dabei gesund und die Männchen namentlich gut auf dem Gesange.

Die fliegende Hecke ist im Allgemeinen weniger unangenehmen Zufällen unterworfen, als die Käfighecke, weil diese in der Regel in zu kleinen Käfigen betrieben wird. Wo für eine recht geräumige Größe derselben gesorgt ist, kann aber auch diese sehr lohnend sein; sie hat vor der fliegenden Hecke das voraus, daß man die einzelnen Pärchen besser überwachen kann, dieselben überhaupt bezüglich ihrer guten und schlechten Eigenschaften besser kennen lernt, als in einer größeren Flughecke, in welcher namentlich die Weibchen von einerlei Farbe nicht von einander zu unterscheiden sind. Auch kann bei der Käfighecke leichter Inzucht vermieden werden.

Die Legenoth der Weibchen wird in dieser dagegen eher auftreten, als in der fliegenden Hecke, weil in engen Käfigen dieselben gar leicht zu fett werden. Als Mittel gegen die Legenoth möchte ich empfehlen, die Zuchtweibchen vor der Hecke nicht allzu gut zu füttern und es ihnen während der Hecke nie an frischem oder geräuchertem Speck fehlen zu lassen. In der fliegenden Hecke kommt Legenoth nach meinen Erfahrungen selbst in ungeheizten Zimmern bei Beobachtung der oben erwähnten Vorsichtsmaßregeln fast gar nicht vor; ich wenigstens habe daran im Laufe vieler Jahre nur ein einziges sehr fettes Weibchen verloren. Es geschah dies an einem sehr kalten Morgen in meiner damals nicht heizbaren Vogelstube; ich möchte daher anrathen, zur fliegenden Hecke möglichst ein heizbares oder doch nach Osten belegenes Zimmer zu wählen, so daß die Vögel früh Morgens gleich Sonnenlicht haben. In nicht heizbaren Räumen empfiehlt sich auch die Anwendung der kürzlich von Herrn Huisgen in Frankfurt a. M. in der „Gefiederten Welt" besprochenen Preßkohle, namentlich dann, wenn man in der Lage ist, durch ein kleines Abzugsrohr etwa sich entwickelnde Gase nach außen hin abzuleiten, und eine solche Einrichtung wird sich ja wol in jedem Raume leicht treffen lassen. Die Zuchtvögel können zwar an und für sich einen ziemlich hohen Grad von Kälte ertragen; aber unzweifelhaft wird die oben erwähnte Darmentzündung — Unterleibsentzündung — bei alten und jungen Vögeln durch einen niedrigen Temperaturstand sehr begünstigt, und letztere bedürfen zu ihrer raschen Entwickelung überhaupt sehr der Wärme; halbflügge Junge sind mir auch in verschiedenen Jahren in einer kalten Nacht erfroren.

Weibchen aus fliegenden Hecken oder aus großen Fluggebauern, wie sie im Harz gebräuchlich sind, eignen sich meiner Ansicht nach besser zur Zucht, als die aus kleinen Käfighecken hervorgegangenen, und unter jenen wieder die jüngeren vor den vierjährigen und älteren Weibchen; da aber nicht vorausgesetzt werden kann, daß gerade jedes wenn auch noch so sorgfältig ausgewählte Weibchen in jeder Beziehung sich als tauglich erweisen werde, so ist immerhin anzurathen, sich bei Zeiten einige Ersatz-Zuchtweibchen anzuschaffen.

W. Böcker.

Briefwechsel.

Herrn Dr. H. Müller in Berlin, Schumannstr. 15a: Bereits in Nr. 11 haben wir auf Ihre Züchtungen einheimischer Vögel hingewiesen und die Bemerkung daran geknüpft, daß Sie in liebenswürdiger Weise allen Besuchern Ihre Vögelchen gern zeigen wollen. Ihre Schilderung der Zeisig- und Dompfaffenbrut werden wir in die nächste Nummer aufnehmen. — Herrn J. F. Engelhard in Nürnberg: Sehr erfreut hat es uns, daß Sie in Bremen für Ihre ausgestellte Sammlung von Alpenvögeln die silberne Medaille erhielten. Ihren Berichten aus der Vogelstube sehen wir gern entgegen. Der gesandte todte Weber war das Männchen. Sie können Ersatz von A. Hendschel in München beziehen. — Herrn Dr. von Glöden in Anholt: Ihren Beitrag mit bestem Dank empfangen und zur baldigsten Aufnahme bestimmt. — Herrn Georg Hilsz in Ortenberg, Herrn Ministerial-Sekretär E. Schmalz in Wien: Desgleichen. Näheres brieflich.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Geschäftsverkauf.

Eine seit mehreren Jahren schwunghaft betriebene Handlung exotischer Vögel in Süddeutschland, mit ganz neuem, schönem und zweckmäßigem Inventar, wird verkauft.

Näheres durch die Redaktion dieses Blattes. [444]

1 Paar Brahma-, dito Spanier-, dito Kochinchina-, dito Viktoria-, dito Zwerg-, dito Polandhühner, 1 Paar Pfauen, dito Silberfasanen, dito Perlhühner, 3 Königsweihen, 1 Mäusebussard, sowie eine Sammlung ausgestopfter Thiere von 250 Stück hat zu verkaufen **Dr. Röper**
[445] Villa Hullerwik b. Feldberg.

Zu verkaufen [446]

oder zu vertauschen gegen Nymphen oder Wellensittiche:
Astrilds, Bandfinken, Goldbrüstchen, Silberschnäbelchen, Tigerfinken, je ein Heckpärchen; 1 Amarant, 1 Bandfink, 1 Drossel, 1 Rothkehlchen, diverse Kanarienhähne und 2 Pärchen Dompfaffen. Auskunft ertheilt die Exped. d. Bl.

Ich habe aus Rußland mitgebracht:
Bucharische Trommeltauben 40 Thlr. pr. Paar, **Sprosser** 4 Thlr. pr. Stck., **Hakengimpel** 4 Thlr. pr. Stck., **Steppenlerchen** 3 Thlr. pr. Stck., **Karmingimpel, große Dompfaffen, Weiden-** und **Schneeammer** und **rothe Kreuzschnäbel** pr. Stck. 2 Thlr.

A. Brune, Vogelhändler,
Berlin, Gartenstraße 62. [447]

In der Zoologischen Handlung
von R. Hieronymi
in Braunschweig
befinden sich im Augenblicke nachstehend verzeichnete Arten:
Astrilds, St. Helena-Fasänchen, Orangebäckchen, Goldbrüstchen, Amarantvögel, Elsterchen, Silberfasänchen, Malabarfasänchen, Muskatfinken, Bandfinken, Atlasfinken, Dominikaner- und Paradieswitwen, Graue Edelfinken, Safranfinken, Hartlaubszeisige, Papstfinken oder Nonpareilles, Rothe Kardinäle, Paperlinge, Wellen-Papageien, Karolina-Sittiche, Grau-Papageien, Amazonen-Papageien, Lachtäubchen, Westindische Zwergtäubchen, Virginische und Helmwachteln, Schwarzdrosseln, Zeisige, Dompfaffen. Ferner Französische Kaninchen, Amerikanische Schildkröten, allerlei hiesige Amphibien, **Gold-** und **Silberfische**, Muscheln, Futtersämereien 2c. 2c. [448]

Naturalienhandlung
von
Wilh. Schlüter
in Halle a. d. Saale.
Die Preisverzeichnisse Nr. 43, 44 u. 45 über **Skelette, Schädel, Gehörne, Nester** und **Instrumente** zur Präparation und zum Fang naturhist. Gegenstände sind erschienen und stehen gratis zu Diensten. [449]

1 Paar graue Dominikaner 7 Thlr., 1 Paar fingirte Kernbeißer pro 2 Thlr. 15 Sgr., 2 Paar Grauedelfinken à 4 Thlr., 2 Paar Hartlaubzeisige à 4 Thlr., 1 Paar weißköpfige Nonnen 4 Thlr., 1 Paar rothschwänzige Bengalisten 3 Thlr. 15 Sgr., 1 Paar Zebrafinken 5 Thlr. 15 Sgr., 1 Papageischnäbelchen 3 Thlr. hat abzugeben **C. Koch**, Wiesbaden. [450]

Christiane Hagenbeck's
Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

hat vorräthig:

Sehr schöne und starke Graupapageien, Segelschiffvögel,
à Stück Thlr. 12.

[451] und außerdem alle in voriger Nummer annoncirten Vögel.

Louis Cerfchel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 6. August 1874. Nr. 32.

Inhalt:

Dr. Finsch's Museums-Ausstellung in Bremen. —
Die Singvögel Amerika's. —
Der Nill'sche Thiergarten in Stuttgart. —
Zeisig- und Dompfaffenbrut. —
Brieftauben-Liebhaberei. —
Auffallend rasche Entwickelung eines italienischen Landhuhns. —
Anzeigen.

Dr. O. Finsch's Museums-Ausstellung in Bremen.

Neben all' dem Vieh, das sich im Bürgerpark durch Wiehern, Brüllen, Blöken, Meckern, Grunzen, Krähen und unzählige andere Aeußerungen thierischen Lautes in vieltönigem Naturkonzert als seines Lebens roh bewußt, breit und bemerklich machte, fesselte eine lautlos bescheidene Gruppe die Aufmerksamkeit der Besucher, welcher von Künstlerhand wenigstens der Schein des Lebens verliehen worden, und welche die volle Würdigung aller Derer finden mußte, denen neben der „Wirthschaft" auch die Wissenschaft ein wenig am Herzen liegt. Der Konservator der naturgeschichtlichen Sammlungen der Gesellschaft „Museum" (oder vielmehr hoffentlich bald unserer guten Stadt Bremen), Herr Dr. Otto Finsch, hatte sich der nicht geringen Mühe unterzogen, aus den Schätzen der ornithologischen Abtheilung dieser Sammlungen 1. das edle Federwild, die Wald- und Feldhühner Europas, Asiens und Amerikas, 2. die schädlichen Vögel Deutschlands, 3. die nützlichen Vögel Deutschlands und 4. die Vögel, welchen die Hauptrolle bei der Erzeugung des Guano zufällt, in gesonderten, ebenso geschmackvoll als lebendig gruppirten Zusammenstellungen den Forst- und Landwirthen zur Anschauung zu bringen. Gewiß ein glücklicher Gedanke, dessen Verwirklichung gerade bei dieser Gelegenheit ihre eigentliche Berechtigung hatte.

Betrachteten wir die einzelnen Gruppen genauer, so forderte die prachtvolle Reihe der Wald- und Feldhühner zuerst unsere Bewunderung heraus. Da prangte neben dem riesigen Auerhahn vom Solling, dessen waldige Schlünde er mit der Wildkatze theilt, die nahe verwandte und doch auf den ersten Blick verschiedene Form Sibiriens und Kamtschatkas. Auch der Rackelhahn fehlte nicht, jene seltsame, im wilden Zustande aus der Vermischung von Auerhahn und Birkhenne entsprungene Blendlingsgestalt, die den in der thierischen Oekonomie herrschenden Gesetzen Hohn zu sprechen scheint, und das um so mehr, als sie in manchen Gegenden, namentlich in Skandinavien, zu den ziemlich gewöhnlichen Vorkommnissen zählt. Die völlig alleinstehende, uns zuerst durch Pallas bekannt gewordene Gattung Felsenhuhn (Tetraogallus) ist durch die am meisten bekannte Art vom Himalaja, den „Snow pheasant" (Schneefasan) der englischen Jagdfreunde Hinterindiens, vertreten. Von den Höhen des silicischen Taurus, wo der Botaniker Kotschy ihren wundervollen Stimmlaut ertönen hörte, bis zu den Schneegipfeln der chinesischen Tartarei fehlt diese Form keiner der hohen Gebirgsketten Asiens. Auch Radde erwähnt ihrer

in seinen Vorträgen über den Kaukasus. Aus der glänzenden Reihe der Gallinaceen (Hühnervögel) Nordamerikas, die nahezu vollständig vorhanden, wird ein stattlicher und in seiner ganzen Erscheinung höchst ungewöhnlicher Vogel der Aufmerksamkeit des Beschauers nicht entgehen. Es ist der die Purshia- und Artemisia-Bestände der Wildniß westlich von den Rocky-Mountains bewohnende Coq of the plains angloamerikanischer Kolonisten: das Präriehuhn (Centrocercus urophasianus). Unter den kleinen Gliedern dieser Gruppe wollen die reizend und phantastisch gefiederten, zum Theil in unseren zoologischen Gärten bereits heimisch gewordenen Ortyginen (Wachtelarten) Nordamerikas nicht übersehen werden. Noch sei hier bemerkt, daß das schöne Frankolinhuhn, erst kürzlich der Gegenstand eifrigsten Nachforschens Seitens englischer Jagdfreunde, kaum noch als europäischer Vogel anzusprechen ist.

Bei der hervorragenden Bedeutung, welche dem Vogelschutz neuerdings von den Forst- und Landwirthen zuerkannt ist, könnte man die Schaustellung der schädlichen und nützlichen Vögel Deutschlands als noch eigentlicher im Sinne einer Gelegenheit wie diese betrachten. Man ist bekanntlich aller Orten zu der Erkenntniß gelangt, daß die Rolle, welche die Vögel und namentlich auch die kleinen, im Haushalt der Natur zu spielen berufen sind, unsere volle Beachtung verdient, daß unvernünftiges Vertilgen durch Zerstören der Bruten oder durch Wegschießen zu Küchenzwecken oder gar lediglich zum Vergnügen ein unverzeihlicher Eingriff ist in die Bedingungen, auf welchen die höhere Harmonie des Naturhaushaltes beruht. Daß es aber neben solchen Arten, die als entschieden nützlich zu bezeichnen sind, andere giebt, bei welchen durch Wegfangen eßbarer Fische, durch Zerstörung der Saaten, durch Plündern der Nester kleinerer Vögel u. s. w. die Schädlichkeit überwiegt, unterliegt keinem Zweifel. Bei einer derartigen Zusammenstellung beider Abtheilungen, wie Dr. Finsch sie bewerkstelligt hat, ist nun allerdings die Grenze zwischen „nützlich" und „schädlich" nicht immer scharf zu ziehen und wir wollen uns hüten, die sogenannten schädlichen Arten nicht unbedingt als Gegenstand unserer berechtigten Verfolgung anzusehen. Jedenfalls ist es für den praktischen Landwirth wie für den Wissenschafter von Interesse, die in Frage stehenden Vögel hier einmal nach bestem Abwägen ihrer bezüglichen Nützlichkeit oder Schädlichkeit nebeneinander vereint zu sehen. Unter den am meisten verhaßten Arten stehen die großen Raubvögel obenan. In Prachtexemplaren, wie solche überhaupt nur denkbar, sehen wir da den als gelegentlichen Kinderräuber übel verschrienen Lämmergeier, die großen Adler, die Schneeeule des hohen Nordens, den Uhu unserer deutschen Wälder.

Was die Gruppe der schmucklos gefärbten Guanovögel anbetrifft, so ist der ästhetische Eindruck derselben ein wenig bestechender. Aber wenn man erwägt, daß das seit Jahrtausenden angesammelte Erzeugniß dieser oceanischen Grand-Voiliers eine kostbare Reichthumsquelle ganzer Länder bildet, so wird man dieselbe immerhin einer flüchtigen Besichtigung werth erachten. Am verschiedenartigsten in ihrer äußeren Erscheinung zeigt sich die Inkasee-schwalbe der Küsten Peru's.

Was nun diesem Theile der landwirthschaftlichen Ausstellung wirklichen Nutzen und einen besonderen Reiz verleiht, das ist einmal die tadellos schöne und naturtreue, ja zum Theil technisch vollendete Behandlung der aufgestellten Vögel, ein Verdienst des Herrn Schwertfeger, dann aber, und zwar hauptsächlich die Art und Weise, wie dieselben durch die jedem einzelnen Exemplare beigefügte, alles Wichtigere verzeichnende Etiquette für Jedermann anschaulich und belehrend gemacht worden sind. Dies erlangt zu haben, darf Herrn Dr. Finsch zur vollen Befriedigung gereichen. (Ausstellungs-Ztg.).

Die Singvögel Amerika's.

Nach Dr. Cabanis gäbe es in Nordamerika 297 Arten Singvögel. Dazu rechnet er freilich sehr viele Vögel, welche in der Wirklichkeit nicht singen, sondern nur nach ihrem Körperbau zu denselben gehören. Wir wollen nicht so weit gehen. Wir wollen nur unsere beliebtesten Sänger aufzeichnen, und damit zeigen, daß uns die Natur freundlich mit Gesang beschenkt hat, und daß es der Mensch ist, der durch seine unverständige Ausrottung der Thiere die Wälder und Felder arm an Gesang macht.

Wir haben eine Lerche[1]), genannt Sprague's Skylark. Sie lebt von Dakotah bis in die britischen Besitzungen hinein, und hat an Gesang und Lebensart viel Aehnlichkeit mit der deutschen Lerche. Wenn sie vom Felde aufsteigen, schwanken sie in immer weiteren Kreisen empor, bis sie etwa hundert Yard hoch gestiegen sind, dann fangen sie an zu singen. Nach einiger Zeit schwingen sie sich wieder auf die Prairie herunter. Wenn sie auch so hoch geflogen sind, daß man sie nicht mehr sieht, sind ihre Triller noch so deutlich, daß man die Lerche noch ganz in der Nähe glaubt.

Unsere ersten Sänger im Frühling sind die Bluebirds und Robins. Von den Bluebirds giebt es hier drei Arten. Der allbekannte Bluebird[2]) wird überall vom Osten bis zum Mississippi gefunden. Er erscheint in Massachusetts Ende Februar oder Anfangs März. Sein Gesang ist sehr angenehm, doch nicht stark, da er sich blos in der Nähe seines Kameraden hören läßt. Er ist nicht nur der erste, sondern auch der letzte Sänger; er läßt sich noch hören, wenn die andern Vögel längst stumm

[1]) Alauda cornuta, Wilson, auch Shore Lark genannt. Sie war im vorigen Jahre von Herrn Schoebel in einem Pärchen als Indianer- oder Mok-Lerche eingeführt.

[2]) Sialia sialis, Baird, Red-breasted Bluebird, der Hüttensänger wird alljährlich in sehr großer Anzahl besonders von Herrn Reiche eingeführt und ist in den deutschen Vogelstuben bereits mehrfach gezüchtet worden.

sind. Er hat in Größe und Gesang viele Aehnlichkeit mit dem deutschen Rothbrüstchen. Er lebt von Insekten und scheint im Winter wie verschwunden.

Das Blaukehlchen[3] des Westens soll einen süßeren, mehr Abwechselung zeigenden Gesang haben. Schwächer ist der Gesang des arktischen Blaukehlchens.[4]

Der Robin oder die amerikanische Rothbrust[5] ist der Lieblingsvogel des Yankees. Er ist einer unserer ersten und letzten Sänger. Er erscheint mit dem Frühling und seine Ankunft wird sogar in den Zeitungen angezeigt. Er frißt gern Kirschen, allerlei Beeren, Trauben u. dgl. Er ist kein guter Solosänger, aber wenn ihrer Hundert zusammen singen, ist die Luft voll Freude und Heiterkeit. Er hält sich am liebsten in Baum- und Obstgärten auf. Sein Gesang ist ähnlich dem der europäischen Amsel und beginnt mit der Dämmerung. Er singt bis in die Nacht, also im Sommer 16 bis 17 Stunden lang. Wenn er über die Kirschen geht, singt er nur matt und schwach pip, pip, pop. Er wird auch Wanderdrossel genannt, indeß trifft man ihn auch im Winter in den kalten Gegenden Neu-Englands an.

Alle unsere Drosseln sind gute Sänger. Am beliebtesten ist die Wood-Thrush oder amerikanische Walddrossel.[6] Sie hält sich versteckt im einsamen Waldesdunkel auf und lebt mehr in den südlichen und mittleren, als nördlichen Staaten. Ihr Gesang ist ebenso süß und angenehm, wie eigenthümlich, und kann mit dem Ton einer Flöte oder eines Silberglöckchens verglichen werden. Ihre Melodie besteht aus 5 bis 6 Theilen, wovon der Schluß öfter wiederholt und immer süßer und süßer wird.

Die Hermit Thrush oder Eremiten-Drossel[7] lebt in sumpfigen Wäldern und ist nicht viel bekannt.

Wilsons-Thrush[8] ist sehr verbreitet in Neu-England.

Alice's Thrush[9] wird gefunden von Chicago bis in den fernen Westen.

Pacific Thrush[10] lebt in Oregon.

Swainson's Thrush[11] und den bekannteren Swamp Robin[12] findet man bei warmem Wetter von Massachusetts bis Labrador.

Aehnlich den Drosseln ist der braune Dreścher[13] (Brown Thrasher), der in sechs verschiedenen Arten durch ganz Nordamerika lebt. Er singt oft stundenlang und so laut, daß man ihn auf weite Ferne hört. Sein Gesang ist originell und voll Ausdruck. Der Dreścher von Kalifornien[14] soll einer der besten Singvögel sein. Von Texas bis Mexiko leben zwei andere Arten von Dreschern, der Krummschnabel[15] und der Langschnabel[16], welche sich schon im Februar paaren.

Zu den Spottdrosseln gehören drei Arten, der gewöhnliche Mocking-bird[17], der Mountain Mocking-bird[18] und der Cat-bird[19]. Alle drei sind fähig, die Stimmen anderer Vögel und gewisser Thiere nachzuahmen. Der Mocking-bird wird nur selten in Neu-England angetroffen, dagegen häufig im Süden, in Kuba und Mexiko. Er liebt ein warmes Klima und Niederungen in der Nähe des Meeres. In unsern südlichen Staaten kann man ihn das ganze Jahr sehen; er kommt im Winter zu den Farmhäusern und sucht Obdach und Nahrung. Er ist immer voll Leben und Lust und zeichnet sich durch die Anmuth und Schnelligkeit seiner Bewegungen aus. Seine Stimme ist stark und mächtig und so biegsam, daß er das Pfeifen der Lokomotive, wie das Knarren des Wagens, das Geschrei der Menschen, wie den feinsten Gesang eines Vogels täuschend nachmachen kann. Sein eigener Gesang, wie man ihn z. B. in den Alleghanies hören kann, ist süß und reich an Melodien. Bei hellem Mondschein singt er manchmal die ganze Nacht durch. Von allen Singvögeln sieht man ihn am meisten. Man holt ihn aus dem Nest, verkauft ihn an Liebhaber, und diese ziehen ihn auf. Er wird so zahm, daß er auf den Ruf herbei kommt, sich auf den Finger setzt und Künste macht wie ein Pudel.

(Fortsetzung folgt.)

---

[3]) Sialia mexicana, Swainson, Western Bluebird.

[4]) Sialia artica, Sw., Rocky-Mountain Bluebird, sind beide wol noch nicht lebend bei uns eingeführt worden.

[5]) Turdus migratorius, Linné, die sehr bekannte Wanderdrossel.

[6]) Turdus mustelinus, Gmelin, auch Mäusedrossel oder mäusegraue Drossel genannt, ist bereits öfter eingeführt und war mehrfach im Berliner Aquarium vorhanden.

[7]) Turdus pallasii, auch Pallas- oder Einsiedlerdrossel genannt, war meines Wissens nur einmal von Herrn Schoebel eingeführt.

[8]) Turdus fuscescens, Stephens, Wilsonsdrossel, ist erst in einem einzigen Exemplare von Herrn Reiche eingeführt und soll eine ganz vorzügliche Sängerin sein.

[9]) Turdus Aliciae, Alicendrossel, auch Gray-cheeked Thrush, von Herrn Schoebel eingeführt.

[10]) ?

[11]) Turdus Swainsonii, Cabanis, auch Olive-Backed Thrush, deutsch Swainsonsdrossel, sehr selten eingeführt.

[12]) Oriolus — Agelaius — phoeniceus, Linné, Swamp Blackbird oder Red-wing Blackbird, der allbekannte, viel eingeführte Rothflügelstar, der freilich nicht zu den Drosseln gehört.

[13]) Turdus rufus, Linné, auch Brown Thrush, Sandy-Mocker oder French-Mocking bird genannt, die meines Wissens erst einmal von Herrn Reiche eingeführte ganz braune Drossel, welche eine vorzügliche Sängerin sein soll.

[14]) ?

[15]) ?

[16]) ?

[17]) Turdus polyglottus, Linné, die allbekannte Königin aller Sänger, welche in sehr großer Zahl alljährlich herübergebracht wird.

[18]) Turdus montanus, Audubon, also Berg-Spottdrossel, wird sehr selten einmal herübergebracht, doch war sie im Berliner Zoologischen Garten und Aquarium vorhanden.

[19]) Turdus carolinensis, Lichtenstein, der bekannte Katzenvogel, welcher wiederum alljährlich ziemlich zahlreich eingeführt wird.

Der Nill'sche Thiergarten in Stuttgart.

Unter den Sehenswürdigkeiten der schönen schwäbischen Residenz spielt der Nill'sche Thiergarten bereits eine große Rolle. — In Stuttgart gewesen zu sein und diesen Garten nicht gesehen zu haben, gilt in der Provinz bereits so viel, als in Rom den Pabst nicht gesehen zu haben. Das Interesse für diese schöne Anlage wird aber dadurch ganz besonders erhöht, daß dieser Garten nicht auf den breiten Schultern einer vielköpfigen Gesellschaft aufgebaut worden, sondern der umsichtigen Energie eines bescheidenen einfachen Mannes sein Dasein verdankt. Herr Nill betrieb in früheren Jahren das ehrsame und geheiligte Handwerk eines Zimmermeisters und legte sich später dieses Bethlehem mit allmälig wachsenden Mitteln an, bis zuletzt Stein an Stein, Grundstück an Grundstück sich reihte, ein nettes freundliches Wohnhaus entstand und wegen seiner dominirenden Lage, oberhalb der Stadt, viele Spaziergänger anlockte. Aus den anfänglichen Freundschaftsbesuchen wurden andere des Vergnügens; — die Besucher empfanden Durst und brachten Hunger mit, deren heftige Qualen das weiche Herz der Madame Nill in stille Mitleidenschaft versetzten und — so entstand bald eine sehr frequente und großartige Gastwirthschaft, die an manchen Sonntagen oft mehreren Tausenden ersehntes Labsal gewährt. Theils aus spezieller Neigung, denn Herr Nill ist selbst passionirter Jagdliebhaber, theils zur Unterhaltung seiner Gäste wurden kleine Käfige angelegt, in welchen Bussarde, Eulen, Uhus, Eichhörnchen, Marder, Hühner und andere Vögel gehalten und gut gepflegt wurden. Natürlich fanden diese Anlagen für einen beginnenden zoologischen Garten vielen Beifall und waren stets von einer bunten Menge Schaulustiger umlagert, was zu einem regen Fortschritt ermunterte. Unter diesen Beifallsrufen eines für die Natur empfindlichen Publikums, stand Herr Nill eine Zeitlang in ernsten Betrachtungen still, denn die Frage über Sein oder nicht Sein eines erweiterten zoologischen Gartens machte viele Bedenken bei ihm rege, wozu das Abzählen aller Rock- und Westenknöpfe doch nichts geholfen haben würde, bis zuletzt der wohlgemeinte Rath guter Freunde viel zum Weiterbau beitrug. Zu diesen letzteren gehörte auch, wenigstens dem Namen nach, ein Mitglied der gefiederten Welt, ein Specht, welcher mit dem spitzigen Schnabel seines Griffels, nach und nach alle Thiere des Nillschen Etablissements in größter Lebenstreue meisterhaft abzeichnete, und welchem wir bereits so viele schöne Thierbilder zu verdanken haben.

Seit etwa 4 Jahren besteht der Thiergarten in seinem gegenwärtigen Umfang und steht eine ansehnliche Erweiterung noch in diesem Jahre bevor, über welche ich am Schluß noch eingehend berichten werde. Nach dieser einleitenden Betrachtung möge der freundliche Leser mich zu einem Spaziergang durch den Garten begleiten und werde ich mich bemühen, demselben die wichtigsten Gegenstände etwas näher vorzuführen.

Gleich dem Eingang gegenüber begrüßen uns die Komiker jedes zoologischen Gartens, die Affen, mit ihren drolligen Geberden und fesseln natürlich auch hier die Mehrheit des besuchenden Publikums. Es ist gegenwärtig ein junger Husarenaffe, seines artigen Benehmens wegen, der Liebling der Besucher; ihm reihen sich an mehrere Hutaffen und Meerkatzen, so wie ein junger Babuin und einige Kapuziner. Große Bestürzung erregte vor zwei Jahren der Ausbruch eines alten Hutaffen, welcher mit bestialischer Frivolität davon sprang und jeden Annäherungsversuch mit Berserkerwuth zurückwies. Selbst den kühnen Angriff eines scharf bewaffneten Nimrods schlug er kaltblütig zurück und zwang denselben, sein Heil in der sicheren „Retirade" eiligst zu suchen. Unser trefflicher Thiermaler Specht hat diese romantische Scene in einer höchst komischen Skizze dem Andenken aufbewahrt.

Mehrere Araras, Kakadus und ein äußerst zahmer Nasenkakadu umgeben die anstoßenden Käfige in bekannter Farbenpracht und Stimmenäußerung.

Wenden wir uns rechts, so finden wir Uhus, Schleiereulen und Käuze, in stillen Betrachtungen den kommenden Abend erwartend. Dicht neben diesen befindet sich der Gemsenpark mit 4 Köpfen dieser Alpenbewohner und ist dessen zweckmäßige Anlage, unter dem kühlenden Schatten eines kolossalen Nußbaums, sehr zu loben, eine Vorsicht, die in vielen anderen Gärten unbeachtet geblieben ist. Von hier treten wir an den Zwinger eines Marabut oder Riesenstorches, dem eine Angoraziege beigesellt ist. Nicht mit Unrecht hat der Volkswitz der Orientalen diesen Vogel mit einer besonderen Kaste verglichen, deren Anklänge auch bei uns zu finden sein würden, denn seine apathische Ruhe, stundenlang mit eingezogenem Halse dastehen zu können, sein kahler Kopf, sein aufgeblasener Luftsack und endlich seine gemessenen automatischen Bewegungen, das sind alles Erscheinungen, die unwillkürliches Lachen erregen. Von diesem gefiederten Sonderling uns abwendend, treten wir an eine große Volière mit geräumigem Bassin, Häuschen und Bäumen, wo Mandarin-, Braut- und andere Enten, Wasserhühner, Rebhühner, Drosseln, Amseln, Staare und andere Vögel sich fröhlich herumtummeln und Brautenten, Amseln und Staare schon mehrfach Junge gezogen haben.

Zur linken Hand befinden sich Eichhörnchen und Fischottern und weitergehend finden wir Volièren mit Zwerg- und Strupphühnern, Lach-, Turtel- und Ringeltauben, welche schon mehrmals gebrütet. Wir treten jetzt an die Bärengruben, welche sehr geräumig angelegt worden und mit einem zweistöckigen Hause verbunden sind, in dessen oberem Stock die Schmuckvögel und Papageien sich befinden. Ein Paar braune Bären mit ihren beiden wohlgerathenen Sprößlingen, hatte bisher die eine der beiden Gruben inne; seit einigen Wochen aber hat Herr Nill den einen dieser jungen Petze zu einer jungen Eisbärin gelassen, mit welcher er sich, wenn auch gerade nicht

häuslich, so doch ganz verträglich eingerichtet hat. Allerdings befindet sich dieses seltsame Paar noch in den sogenannten Flegeljahren und Flitterwochen zugleich, und da die Manieren dieser beiden Strolche sehr verschieden sind, so ist es oft äußerst ergötzlich, dem plumpen Spiel derselben zusehen zu können. Von vielem Interesse würde es sein, wenn dies kindische Spiel sich in Jahr und Tag zu solcher Zuneigung steigern würde, daß ein zarter Sprößling einst zu erwarten wäre, was natürlich noch abzuwarten ist. (Fortsetzung folgt.)

Zeisig- und Dompfaffenbrut.

Am 17. und 18. Juli sind zwei Zeisige ausgekommen; sie werden ausgezeichnet gefüttert. —

Am 19. Juli um 9 Uhr ließ ich ein vierjähriges, einsames Zeisigweibchen zu seiner Belustigung in die Stube fliegen. Es paarte sich augenblicklich mit einem einjährigen selbstgezogenen Hahne und baute gegen 12 Uhr unter Umständen, welche ich später im Zusammenhange mittheilen werde. Das Nest befindet sich in einem Blumentopfe und dieser in einem Cigarrenkistchen. Letzteres stand zuerst in der Mitte eines Tisches und wurde später der größeren Sicherheit wegen auf ein Bauer gestellt. Höchstwahrscheinlich hat der Vogel schon am andern Morgen (20. Juli) das erste Ei gelegt, welches bei der Vollendung des Nestes zerstört worden ist. Am 21. Juli erfolgte ein zweites Ei. Seit dem 20. Juli sitzt der Vogel fest im Neste. Durch seine unübertreffliche Zahmheit oder vielmehr Zutraulichkeit erscheint dies Vögelchen geradezu wunderbar. Es hat im Jahre 1871 zwei Dompfaffen ausgebrütet und sie zuerst allein und dann unter menschlicher Beihülfe aufgebracht. Seitdem hat es alljährlich genistet und zwei Riesengelege von 8 und 15 Eiern gebracht. Da das Vögelchen seit Sonntag frei in der Stube sitzt, so darf das Fenster nur unter vorsichtigster Beobachtung von Zeit zu Zeit ein wenig geöffnet und der nothwendige Luftwechsel muß hauptsächlich durch die Thüren vermittelt werden. Ein nicht beneidenswerthes ornithologisches Juli-Vergnügen! —

Soeben ist ein junger Dompfaffe ausgekommen; zwei Eier sind angebrütet, das vierte äußerst spitz gestaltete ist klar. Die Vögel befinden sich in einem Bauer von 16 Zoll Länge.

Dr. H. Müller in Berlin,
Schumannstraße 15a.

Zur Brieftauben-Liebhaberei.

Die Brieftauben des Herrn Färbereibesitzer G. Barnewitz in Berlin. Am Montag den 13. Juli Abends wurden die Tauben, 33 Köpfe, abgeschickt und am Dienstag früh 1/2 5 Uhr in Dresden am Berliner Bahnhof in Freiheit gesetzt. Die ersten 4 Tauben trafen: die erste 8 Uhr 13 M., die zweite 8 Uhr 17 M., die dritte 8 Uhr 20 M., die vierte 8 Uhr 35 M. in Berlin ein. Darunter befand sich, Nummer drei, ein weißer Mövchentäuberich, welcher bereits alle Vortouren mit der größten Sicherheit mitgemacht und stets als zweiter oder dritter Ankömmling gesiegt hatte. Gegen Mittag und im Laufe des Tages langten noch Nachzügler an, so daß im Ganzen bis 8 Uhr Abends 16 Köpfe wieder zurückgekehrt waren. Bedenkt man nun, daß die Tauben in Berlin mit ganz besondern Schwierigkeiten in Hinsicht der Orientirung sowol, als auch der Verfolgung zu kämpfen haben, so wird man das Ergebniß der Rückkehr von 50 pCt. der ausgesandten Köpfe immerhin als ein sehr günstiges erachten müssen.

Auch in Waldenburg in Schlesien, hat das Kriegsministerium eine Brieftauben-Station zur Verwendung für militärische Zwecke errichtet. Einer der geachtetsten Bürger daselbst, der die Brieftaubenliebhaberei schon seit längerer Zeit betreibt, hat die Leitung des Instituts übernommen und sollen unter seiner Direktion binnen Kurzem größere Ausflüge nach Leipzig, Berlin, Breslau und Wien stattfinden.

Auffallend rasche Entwickelung eines italienischen Landhuhns.

Am 20. Juni d. J. erhielt ich von Hrn. A. Rumpf in Zürich für mich und zwei Gehöftenachbarn 3 Stämme Italiener Hühner verschiedener Farben, wovon die Schwarzen mir durchs Loos zufielen. Bei Ankunft derselben piepsten sämmtliche, selbst die mit auffallend großen Kämmen versehenen Hähnchen noch; bei dem größeren meiner Hühnchen sah ein kleines, schwach gelbroth gefärbtes Kämmchen aus den Kopffedern, so daß ich es Anfangs für ein etwas zurückgebliebenes Hähnchen hielt. Aus diesem Kämmchen hat sich seither ein ganz respektabler grellrother Schlotterkamm, der jedesmal die ganze Kopfseite, auf welcher er gerade liegt, bedeckt, gebildet. Auch wurde seit etwa 14 Tagen bei diesem, seit etwa 3—4 Tagen bei dem Kleineren das Hintertheil auffallend dicker, so daß es bei Ersterem schon unter dem Kniegelenke hängt.

Gestern (19. Juli) Mittag geht Ersteres vom Fressen und der ganzen Gesellschaft weg ins Hühnerhaus und macht sichs in einem Neste bequem. Nach etwa 1/2 Stunde erschien es, auf ganz eigenthümliche, wie ängstliche, Weise gackernd, wieder und geht sofort zur Tränke. Bei sogleich vorgenommenem Nachsehen fand sich ein ganz warmes, also frisch gelegtes, auffallend spitzes, kleines Ei, ganz anders geformt, als die der meiner andern (gewöhnlichen) Hühner. In demselben Neste fanden sich noch 2 ebenso geformte Eier, von denen das kleinste an einem Ende Blut-

flecken hat (Erstlingsei). Bemerken muß ich noch, daß das Hühnerhaus während des Legens unausgesetzt beobachtet wurde und kein anderes Huhn während dieser Zeit in demselben war. Es ist demnach schon das dritte Ei, welches dieses Hühnchen (vor 4 Wochen noch ein piepsendes Küchlein mit fingerlangem Schwanze) legte. Das Ei wiegt 44 Gran. So frühes Eierlegen, überhaupt solche rasche Entwickelung hatte ich doch nicht erwartet.

Das Legen des heutigen Eies habe ich selber, da ich um die Mittagszeit nicht zu Hause war, nicht beobachten können. Als ich später nachsah, lag aber in demselben Neste ein frischgelegtes, um eine Kleinigkeit dickeres, doch von derselben auffallend spitzen Form unter den dickeren, runderen meiner anderen Hühner.

Trotzdem die 3 Hähnchen noch keine glänzende Feder im Gefieder, weder Sichelfedern im Schwanze noch Anfang von Sporen haben und noch sehr jugendlich ihr: „Zick de Nock an", aber um so emsiger ertönen lassen, halten sie doch gegenseitig streng ihre Grenzen ein, wagen sich, natürlich ohne Erfolg, sogar schon an ältere Hähne, die ihr Gebiet betreten. Spaßig ist es, wenn Einer über die Grenze des Andern geht. Mit größter Wuth wird er fortgetrieben, macht aber auf der Grenze sofort Front und verjagt, falls der Gegner ein paar Schritte zu weit geht, diesen mit demselben Eifer, mit welchem er von der fremden Grenze vertrieben wurde.

Das auffallend frühe Eierlegen meines Hühnchens veranlaßte mich, den sonst unbedeutenden Vorfall der Oeffentlichkeit zu übergeben und Hühnerfreunde, denen es mehr auf Eierproduktion, als brillantes Gefieder oder sonstige Schönheiten (mitunter auch Monströsitäten) ankommt, auf diese mehr nützliche, als durch besondere Schönheit bestechende Rasse aufmerksam zu machen. Georg Hilsz.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Andreasberger Kanarienweibchen.

Versendet nach Wunsch diesjährige oder vorjährige (eigne Züchtung) à St. 10 Sgr.) (Emb. für 1—2 Vögel 8 Sgr.) gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags.

Desgleichen sog. Gimpelbauer zum Einzelsetzen junger Kanarienvögel, à Dtz. 2 Thlr. Die Bauer sind mit Thürchen und Trinktöpfchen versehen. [452]

C. Lange, St. Andreasberg a. Harz.

Zu verkaufen [453]

oder zu vertauschen gegen Nymphen oder Wellensittiche:

Astrilds, Bandfinken, Goldbrüstchen, Silberschnäbelchen, Tigerfinken, je ein Heckpärchen; 1 Amarant, 1 Bandfink, 1 Drossel, 1 Rothkehlchen, diverse Kanarienhähne und 2 Pärchen Dompfaffen. Auskunft ertheilt die Exped. d. Bl.

Abzugeben: 1 Paar Nymphensittiche 9 Thlr., 1 Paar Tertorweber 7 Thlr., 1 Paar Rothkopfweber 3 Thlr., beide M. im Putz, 1 P. Silberfasänchen 2½ Thlr., 1 P. Tigerfinken 2½ Thlr., Zebrafinken à P. 4 Thlr., Wellensittiche, jung, à P. 4½ Thlr. Auskunft durch die Expedition Wilhelmstraße 32 S. W. [454]

Eine zerlegbare Zimmervolière aus 86 Quadratf. Gewebe und 21 Quadratf. Lambris, fast neu, für eine Zimmerecke gerichtet, zwei Abtheilungen enthaltend, ist zum Halbkostenpreis von 18 fl. zu verkaufen. Ferner werden nach neuesten Erfahrungen verfertigte Nistkasten für Rosella's à 15 Sgr., für Nymphen und Singsittiche à 12 Sgr. und für Wellensittiche zu 10 Sgr. abgegeben.

Nürnberg, äußere Laufergasse Nr. 8.

[455] **K. Th. Hauser.**

Geschäftsverkauf.

Eine seit mehreren Jahren schwunghaft betriebene Handlung exotischer Vögel in Süddeutschland, mit ganz neuem, schönem und zweckmäßigem Inventar, wird verkauft.

Näheres durch die Redaktion dieses Blattes. [456]

Geflügelverkauf.

1 Hahn, 4 Hennen, gelbe Bastard-Cochins. Preis 10 Thaler.

2 Hennen, gelbe Cochins, 4 Monat alt. Preis 3 Thlr.

1 Henne, helle Brahma. Preis 2 Thaler.

1 Hahn, 3 Hennen. Kreuzung von La Flèche u. Breda, schwarz. Preis 8 Thaler.

1 Hahn, 3 Hennen. Kreuzung von La Flèche u. Breda, schwarz. Preis 7 Thaler.

1 Hahn, 2 Hennen, weiße Zwerghühner. Preis 3½ Thlr.

1 Hahn, 3 Hennen. Kreuzung von Gold- u. Silber-Paduanern, Hahn wie Hennen haben prachtvolle, fast ganz weiße Vollhauben. Schöne Bärte; Farbe blaßgelb mit schwarzer Zeichnung. Preis 9 Thlr. 10 Sgr.

1 Hahn, 4 Hennen. Stahlgraue Perlhühner. NB. Man kann auch Hennen einzeln bekommen. per St. 1½ Thlr.

1 Hahn, Gold-Bantams mit Rosenkamm und Hennenschwanz. Farbe desselben sehr lebhaft. Preis 2 Thlr.

Achtungsvoll empfiehlt sich **K. Zirnapst jun.**

[457] An bei München (Bayern).

1 rothbrüstiger Kernbeißer	. . . . .	Thlr.	10. —.
1 rothköpfiger Würger, guter Sänger	. .	„	1. 15.
1 Paar Dominikaner	. . . . . à	„	7. —.

C. Koch, Hoflieferant

[458] Wiesbaden.

Die Großhandlung exot. Vögel und Naturalien ꝛc.

von **Karl Gudera**

Leipzig, Markt 3, II, und **Wien**, Kolowratring 9, P.

empfing vorige Woche eine Sendung von über 1000 amerik. u. a. Vögel, die zu den beigesetzten billigen Preisen, alle in schönstem Gefieder und bester Gesundheit abgegeben werden.

Rothe Spottdrosseln à Stck. 12 Thlr., graue Spottdrosseln à Stck. 15 Thlr., Blaudrosseln, Männchen 4 Thlr., Weibchen 3 Thlr., Wanderdrosseln, M. 4 Thlr., W. 3 Thlr., Katzendrosseln, M. 4 Thlr., W. 3 Thlr., Alicendrosseln à Stck. 4½ Thlr., Kuhstaare, M. 2 Thlr., W. 1½ Thlr., Epaulettenstaare à Stck. 2⅓ Thlr., Bobberlinge à Stck. 2½ Thlr., Goldzeisige, M. 3 Thlr., W. 1½ Thlr., Nonpareille, M. 3 Thlr., W. 2½ Thlr., Indigovögel à Stck. 3 Thlr., braune, grüne und gelbbunte Baltimorvögel à Stck. 4½ Thlr., Morgenfinken à Paar 6 Thlr., amerik. Spresser à Stck. 6 Thlr., Nachtigallen à Stck. 6 Thlr., Rothkehlchen à Stck. 10 Thlr.

Preisverbindlichkeit nur 14 Tage.

Außerdem sind vorhanden:

Astrilds, Band-, Tiger-, Schmetterlings-, Zebra-, Diamant-, Muskat-, Schilf-, Reis-, Atlas- und Safranfinken, grüne Bengalisten, Orangebäcks, Eisterchen, 3 Arten Nonnen, weiße und gescheckte Reisvögel und Mövchen, Paradies- und Dominikanerwitwen, Napoleon-, Feuer und Rothkopfweber, Graupfäffchen, Karmingimpel, Kalanderlerchen, Kappenammern, roth-, graue und grüne Kardinäle, rosenbrüstige Kernbeißer, Heuschrecken-, China-, Seiden- und jap. Staare, Jamaikatrupiale, afrik. Blau-, Stein und Blaudrosseln, Büll-Bülls, amerik. Grundröthel, Sonnenvögel, Scharlachtanagras, Ruf-, Perlhals-, Sperlings-, Rest-, Sperber-, Bronce- und Wandertauben, Blauheher, Flötenvögel, Meinos, Wellen-, Gesellschafts- und Sperlingspapageien, Jakos, Amazonen, Perterito- und Surinampapageien, Nasen-, Roja-, Inka-, gelb und weißhäubige Kakadus, Zwerg-, blaue und rothe Araras, Karolina-, Goldmasken-, Alexander-, Mönchs-, Blumenau-, Bunt-, Pennants-, Paradies-, Schön-, Sing-, Nymphen und gradschnäblige Sittiche.

NB. Sämmtliche angeführte Vögel sind in beiden Geschäften zu haben. [459]

C. Reiche, Ahlfeld,

Provinz Hannover,

offerirt zu civilen Preisen, um damit zu räumen: Nonpareils (Pabstfinken), Paperlinge, rosenbrüst. Kernbeißer, Baltimorevögel, Indigovögel, roststeiteliche Baumsperlinge. Ferner: Halbmondsittiche, Tovissittiche, Karolinasittiche, Sperlingpapageien, Tukane (Temminki), amerik. graue Eichhörnchen, Adler, Sumpfbiber ꝛc. Eine große Partie sehr schöner Portorikopapageien, Kubafinken und diesjährige Spottdrosseln trifft in den nächsten Tagen ein.

Stieglitze, Hänflinge, Dompfaffen, Mönche ꝛc. (Männchen) werden, sobald solche in Farbe sind, in beliebiger Anzahl zum Export angekauft. [460]

Lapins.

Wegen Mangel an Raum gebe ich ab: 1 Häsin, engl. Schecken, 8 Monat alt, trächtig zu 2½ Thlr. — 1 dito 10 Monat alt, trächtig, 2½ Thlr. — 1 Häsin, hasengrau, Kreuzung von Normand. u. engl. Schecken, 8 Monat alt, trächtig, 2½ Thlr. — 1 prächtiges hasengrau-Normand. Männchen, 6 Monat alt, 2½ Thlr. — Engl. Schecken, 10 Wochen alt, das Stück 20 Sgr. — Hasengr. reine Normand. Zuchtthiere aus Elsaß erhalten, Prachtthiere 6 bis 8 Wochen alt, das Stück zu 1 Thlr. — Alles inkl. Verpackung.

[461] **J. Becker**, Lehrer.
Wernborn, Post Usingen.

Einen halbgewachsenen, ganz zahmen Baummarder hat um 8 Thlr. inkl. Verpackung zu verkaufen

[462] **Sig. Büchsele**, Kürschner.
Memmingen, Bayern.

2 junge Nymphen (Weibchen, kräftige Exemplare) sind pro Stück 4 Thlr. abzugeben. [463]
Näheres in der Expedition d. Bl.

Zu kaufen gesucht: 3 Paar Römertauben, rothe, gelbe und getigerte, müssen aber sehr groß sein.

[464] **Wilh. Schmidbauer.** Stuttgart.
Alzenbergstr. 13.

Soeben erschien:

Der Harzer Kanarienvogel.

Beitrag zu seiner Kenntniss, Pflege und Zucht von

Rudolf Maschke,

Kanarienzüchter in St. Andreasberg.

[465] eleg. geheftet, Preis 5 Gr.

C. H. Reclam sen., in Leipzig.

Ich habe aus Rußland mitgebracht:

Bucharische Trommeltauben 40 Thlr. pr. Paar, **Sprosser** 4 Thlr. pr. Stck., **Hakengimpel** 4 Thlr. pr. Stck., **Steppenlerchen** 3 Thlr. pr. Stck, **Karmingimpel, große Dompfaffen, Weiden- und Schneeammer** und **rothe Kreuzschnäbel** pr. Stck. 2 Thlr.

A. Brune, Vogelhändler,

Berlin, Gartenstraße 62. [466]

Ein circa drei Jahre alter männlicher Affe, sehr zahm, Meerkatzengeschlecht, mit weißen Augenlidern und kupferbraunem Gesicht, ist für den billigen Preis von 12 Thlrn. zu verkaufen bei **W. Löblich**, Parchim i. Mecklenb. [467]

2 Wellensittich-Männchen.

3 Silberschnäbel 1 Paar alte mit 1 Junges verkauft

[468] **Albert Schmidt**, Saalfeld i. Th.

Auch sind daselbst junge weiße Truthühner gegen schwarze zu vertauschen.

Christiane Hagenbeck's

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

hat vorräthig: dunkel- und hellrothe Araras, große gelbhaubige, Inka-, Rosa- und Nasen-Kakadus; große und kleine Schwarzpapageien von Madagaskar (Psittacus vaza und Psittacus niger), Graupapageien, Amazonen- und Schwarzohr-Papageien (Pionias menstruus), Weißstirnige Amazonen (Chrysotus albifrons); Rosellas, Pennantis, Greenleeks, Rockpeppler, Paradiessittiche, Singsittiche, Springsittiche (Platycercus auriceps), Schönsittiche, (Euphema pulchella), Halbmond- und gelbwangige Sittiche, (Trichoglossus Novae Hollandiae), Inseparables (Psittacula pullaria), Grauköpfchen von Madagaskar (Psittacula cana), Sperlingspapageien, Schopf-Kardinäle (Cardinalis cucullata), Dominikaner Kardinäle (Cardinalis dominicanus), Bläßchen (Sporophila lineola), Papstfinken oder Nonpareils, Indigovögel (Fringilla cyanea), Safranfinken, Hartlaubs- oder Mozambique-Zeisige, Diamantvögel, Zebrafinken, Gürtelgrasfinken, Schilffinken; weißköpfige, schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen, auch schwarzstreifige Nonnen; Muskatvögel, Bronzemännchen, weiße japanesische Mövchen (Amadina striata var. alba), bunte japanesische Mövchen (Amadina striata var. gris. et flav. maculata), Silberfasänchen, Bandfinken; Reisvögel (Padda oryzivora), weiße Reisvögel (Padda oryz. var. alba), gescheckte Reisvögel (Padda oryzivora var. maculata), kleinste Elsterchen, Goldbrüstchen, Tigerfinken, Schmetterlingsfinken, graue Ashilds, Grisbleu, Orangebäckchen, Amaranth, Ceresfinken, Ringelastilds, Atlasvogel, Paradies- und Dominikaner-Witwen, Goldweber (Ploceus textor), Fuchsweber, Büffelweber (Textor alecto), Orangeweber, Feuerfinken, Napoleonsvögel, Scharlachweber (Ploceus madagascariensis), Blutschnabelweber, Gelbkopfweber; Chinesische Heherdrosseln (Garrulax chinensis), — Glanzstaare (Molothrus sericeus), Trupiale (Icterus vulgaris), Feuervögel (Icterus baltimore), Katzenvögel (Galeoscoptes carolinensis), Schopfmeina (Acridotheres cristatellus), schwarze Büll-Büll (Pycnonotus pygaeus), weißohrige Büll-Büll (Pycnonotus leucotis), Ganges-Brillenvögel, Sonnenvögel, Haubenheher, Papageifinken (Saltator magnus), Garten-Trupiale, Beutelstaare, Blauraben, Rapweber, dreifarbige Tangaren, Violette Organisten, Krontangaren, Schwarze Tangaren, Olivengrüne Tangaren, Ziertangaren, Braunköpfige Tangaren, Rothe Tangaren, Zuckervögel (Daenis cayana), Tukane (Ramphastos Temminckii), kielschnäbeliger Tukan (Ramphastos discolor), Edelsänger, gelbschnäblige Elstern.

Auch trafen wieder ein die so sehr beliebten Grasperequiten (Brotogerys tirica).

[469]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 13. August 1874. Nr. 33.

Inhalt:

Mittheilungen des Herrn Dr. Stölker. —
Die Singvögel Amerika's (Fortsetzung). —
Der Nill'sche Thiergarten in Stuttgart (Schluß.) —
Zur Wellensittich-Zucht. —
Kanarienvögel im Freien. —
Zur Brieftauben-Liebhaberei, —
Zum Eierhandel. —
Die diesjährige Thierversteigerung in Antwerpen. —
Aus den Vereinen: Ausstellung der „Fauna" in Düsseldorf. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Anzeigen.

Mittheilungen des Hrn. Dr. Stölker in St. Fiden.

Unverträglichkeit einzelner Vogelarten.

Die Ansichten über die Verträglichkeit der einen und anderen Vogelart unter sich oder mit anderen Arten sind sehr verschieden, obschon sich alle auf aufmerksame Beobachtungen stützen, was wol mit dem verschiedenen individuellen Charakter jedes einzelnen Vogels zusammenhängen mag. Es dürfte jedoch von Interesse sein, die Namen einiger Missethäter kennen zu lernen, welche unter Umständen argen Schaden anrichten können, und deren geselliger Verkehr sehr zu überwachen ist. Ich kann in dieser Beziehung folgende Fälle erzählen:

Letztes Frühjahr tödteten mir die grauen gehaubten Kardinäle (vielleicht nur der eine des Paares?) zwei männliche Schneefinken (Fr. nivalis). Bei dem Morde des zweiten wurde der Thäter in flagranti ertappt: er hatte den Schneefinken in's Wassergeschirr gedrückt, stand auf seinem Rücken und hieb auf ihn ein. Beiden Schneefinken war nicht der Kopf, sondern Rücken, Schultern und Flügel verletzt.

Bei einem früheren Versuche, zu diesen Kardinälen ein Paar rothe zu bringen, mußte ich das zuerst hineingeschobene Weibchen der letzteren wieder herausnehmen, bevor ich das Männchen beigeben konnte; so heftig wurde es von den grauen Kardinälen angegriffen.

Vor einiger Zeit sandte mir ein Freund einen todten Textorweber zu, dem ein Bein fehlte: solches war ihm noch lebend vom Leibe abgerissen oder gebissen und außerdem zeigte er auch andere Verletzungen. Laut Bericht war er nur in Gesellschaft — Seinesgleichen.

Der Safranfink (Fringilla-Sycalis-brasiliensis) wird im Allgemeinen als verträglich angesehen. Doch hat mir ein solches Männchen ein Paar Hartlaubzeisige ganz zerzaust und getödtet.

Als sehr heftigen Burschen lernte ich den Unzertrennlichen (Ps. pullaria) kennen. Sie duldeten in ihrem Käfig weder ein zweites Paar Ihresgleichen, noch Sperlingspapageien oder Wellensittiche; nicht nur daß sie diesen Hiebe austheilten, wenn sie in ihre Nähe kamen, sie verfolgten sie sogar heftig.

In letzter Zeit sperrte ich junge Wendehälse (Yunx torquilla) zu zwei aufgezogenen Wiedehopfen. Nach wenigen Tagen fand ich einen der ersteren todt am Boden, den Unterrücken mit einer tiefen runden Wunde. Die Wiedehopfe waren sofort der That verdächtig, da mir solche früher schon einmal einen Wiesenschwätzer (Pratincola rubetra) getödtet hatten.*)

*) Siehe Verhandl. d. St. Gall. naturw. Gesellsch. 1868—69.

Es mahnen solche Fälle zu großer Vorsicht beim Zusammenbringen mehrerer Vögel in ein gemeinschaftliches Bauer.

Epidemisches Auftreten der Lungenentzündung bei gefangenen Vögeln.

Unter den Stubenvögeln unterliegen bei gewissen Witterungseinflüssen namentlich ausländische sehr häufig der akuten Lungenentzündung. Noch nie ist mir jedoch das epidemische Auftreten dieser Krankheit unter den gefangenen Vögeln so aufgefallen, als im letzten Frühjahr.

Ich erhielt nämlich gegen Ende März und Anfangs April von drei verschiedenen Seiten eine größere Anzahl todter Fremdlinge, namentlich Wellensittiche, alle mit Pneumonie (Lungenentzündung) behaftet. Dies war zu einer Zeit, als die Lungenentzündung auch unter den Menschen so häufig vorkam.

Ich zweifle gar nicht, daß die genannten Todesfälle keiner direkten Erkältung zuzuschreiben waren, sondern eben einer bestimmten Beschaffenheit der Luft, die die Lungenentzündung und deren zahlreiches Auftreten bedingte.

Um die Vögel möglichst vor dieser Schädlichkeit zu schützen, bringe man sie im Frühling nicht allzubald in die Volièren im Freien; diejenigen, welche das ganze Jahr draußen bleiben, sind äußeren schädlichen Einflüssen viel weniger zugänglich. In geschlossenen Räumen mag Heizung sehr zweckmäßig sein, nicht, um an und für sich einen höheren Wärmegrad zu erzielen, sondern, um durch denselben die Luft zu verbessern. Durch die Heizung entsteht eine lebhaftere Luftströmung in dem Raum nach außen und die neu eintretende Luft wird durch die Erwärmung unschädlich gemacht. Während jener genannten Zeit hielt ich meine Vögel noch beständig im geheizten Zimmer und verlor von gegen funfzig Köpfen nicht einen.

Es wäre interessant, zu erfahren, ob eine solche Pneumonie-Epidemie auch anderwärts beobachtet wurde und ob sie häufiger in ungeheiztem Raume vorkam?*)

Es sei schließlich nur noch erwähnt, daß gegen akute Lungenentzündung kein direktes Mittel angewandt werden kann, da der Vogel derselben erliegt, bevor man ihn krank glaubt. Bei der Section zeigten sich die Lungen dunkelroth und geschwellt, gewöhnlich bei guter Ernährung des Körpers.

Wiedehopf und Goldhähnchen.

Zu der letzten Vogelausstellung in Basel im Anfang März cr. konnte ich nebst anderen zwei Arten, Vögel senden, die bei solchen Anlässen gewiß selten zu sehen sein dürften. Dies waren ein Paar Wiedehopfe und ein gelbköpfiges Goldhähnchen-Männchen (Regulus flavicapillus).

Ueber meine Wiedehopfe habe ich mich einläßlicher ausgesprochen im „Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft St. Gallens", 1868—69 und 1871—72.

Hier erwähne ich nur noch, daß das Weibchen besagten Paares nun schon auf vier Ausstellungen in verschiedenen Jahren sich gezeigt hat. Im Jahre 1869 erhielt ich es als jung, alsdann es gleich auf unserer St. Gallener Ausstellung einheimischer Vögel glänzte.*) Im Jahre 1871 sandte ich es nach Basel, 1872 nach Lichtensteig, und dies Frühjahr also wieder nach Basel. Das Männchen ist erst zweijährig und hat Basel und Lichtensteig bereist. Beide sind jetzt Mitte Juli so gesund wie je.

Ich glaube in oben genannten Schriften bewiesen zu haben, daß bei achtsamer Pflege die Haltung des Wiedehopfes keine Schwierigkeiten hat und selbst eine Fortpflanzung in Gefangenschaft möglich scheint.

Zu anderem Ergebniß bin ich beim Goldhähnchen gekommen. Zu dessen Pflege lassen sich keine einigermaßen mit Sicherheit zum Ziele führenden Verhaltungsmaßregeln geben. Selbst bei sorgfältiger Wartung gehen viele ein, während andere wiederum unter sehr ungünstigen Verhältnissen ihr Leben fristen können, oder sich wenigstens eingewöhnen, und welche, einmal eingewöhnt, sehr leicht und längere Zeit die Gefangenschaft ertragen; aber eben diese letzteren betrachte ich als Ausnahme, als ganz besondere Individuen.

Als ein solches sehe ich auch mein Goldhähnchen an. Ich erhielt dasselbe im letzten September von einem Vogelsteller, mit der Versicherung, daß es eingewöhnt sei, indem es mit dem Meisenfutter vorlieb nehme, was für mich so viel bedeutete, als daß es gequetschten Hanfsamen und Brot fresse, nebst einer spärlichen Beigabe von Mehlwürmern. Daß es bei dieser Nahrung nicht sehr üppig wurde, ist selbstverständlich, auffallend aber, daß es überhaupt noch lebte. Freilich war es beim Empfange sehr schwach, es konnte nicht fliegen, blähte das Gefieder und nahm Mehlwürmer mit großer Gier aus den Fingern. Ich gab ihm anfangs einige Blumentöpfe, mit Blattläusen besetzt, in den Käfig und als es durch diese seine Lieblingsspeise soweit an Kraft gewonnen hatte, daß es etwas fliegen konnte, ließ ich es in einem Zimmer, das eine größere Pflanzengruppe enthielt, frei. Letztere wurde nun gründlich nach Insekten durchsucht und gesäubert. Zwischen die Blumentöpfe stellte ich ein Wassergeschirr und das Futternäpfchen; als Nahrung erhielt es dürre

*) In meiner Vogelstube tritt sie ziemlich regelmäßig im Herbst und Frühlinge, jedoch glücklicherweise immer nur bei einzelnen Vögeln, also wol in Folge direkter Einflüsse (den häufigsten freilich Zugluft) auf. Gerade im letzten Frühjahr hatte ich aber keinen einzigen Fall zu beklagen, wahrscheinlich, weil meine Vogelstube jetzt vorzugsweise günstige Verhältnisse in Hinsicht reiner Luft, gleichmäßiger Temperatur, guten Trinkwassers und einer geschützten Lage hat.
Dr. K. R.

*) Siehe: „Bericht d. St. Gallisch. naturw. Gesellsch." 1868—69.

Ameisenpuppen und Brot mit gelben Rüben durchfeuchtet, gut gequetschten Hanfsamen und Quark, Nachmittags 6 bis 8 Mehlwürmer. Quark verzehrt es in bedeutender Masse. In Beziehung auf die Größe der Mehlwürmer, die man einem Goldhähnchen reicht, braucht man nicht ängstlich zu sein; sie verschlingen auch wol große, bis zu dreiviertel ausgewachsene, verhältnißmäßig leicht und gern. Selbstverständlich erhält das meinige jetzt zur Sommerszeit frische Ameisenpuppen zur Genüge, von denen es auch die zuerst im Frühjahr zu habenden großen hinunterwürgte. Im Zimmer frei fliegend gewann es bald seine volle Gesundheit wieder, machte viele Flugübungen in eine benachbarte Stube. Den Winter durch sang es Vormittags sehr munter sein zartes Liedchen und wurde sehr zahm. Es hatte offenbar Vergnügen, wenn Jemand im Zimmer war, und kam in dessen nächste Nähe.

Wurde an den Pflanzen etwas gemacht, oder der Boden gescheuert u. s. w., so war es gleich auch dabei, als ob es helfen wollte. Es war die Freude aller, die es sahen! So klein aber auch das Vögelchen war, so hinterließ es namentlich an den Gardinen, in deren Höhe es sein Standquartier hatte, sehr unangenehme Ueberreste. Dieserwegen und um die Fenster ungenirt öffnen zu können, brachte ich es im Frühjahr mit Schwanzmeisen (Parus caudatus) in einen größeren Käfig, was seinen Humor nicht im Geringsten störte, und es sang nach wie vor. Es wanderte denn also, wie gesagt, von St. Gallen nach Basel in Gesellschaft von Schwanzmeisen an die Vogelausstellung, allwo es nach dortigen Berichten sich durch sein zutrauliches Wesen die Zuneigung des Publikums gewann. Wohlbehalten nach Hause, zurückgekehrt, sang es gleich anderen Tages wieder, als ob nichts geschehen sei, es ist jetzt Mitte Juli kerngesund.

Dieses Frühjahr kam mir auch ein Weibchen des feuerköpfigen Goldhähnchens (Regulus ignicapillus) zu Händen, das ich mit dem andern zusammenbrachte, um es besser einzugewöhnen, und gab mir alle Mühe, es zu erhalten. Aber trotzdem es Mehlwürmer zur Genüge erhielt, ging es nach etwa zehn Tagen zu Grunde.

Ich halte, wie gesagt, die in Gefangenschaft ausdauernden Goldhähnchen für eine Ausnahme, und es lassen sich keine bestimmten Maßregeln angeben, um ihre Haltung zu sichern.

(Schluß folgt.)

Die Singvögel Amerika's.

(Fortsetzung.)

Der Mountain Mocking-bird hält sich in den Bergthälern der Pacificküste von Mexiko bis Oregon auf. Wenn er singen will, setzt er sich auf einen Baum oder Busch. Kommt Jemand, so fliegt er auf den Boden und springt davon.

Der Cat-bird ist überall bekannt und hält sich lieber in bewohnten, als wilden Gegenden auf. Er lebt immer im Krieg mit unsern schädlichsten Insekten und nascht weniger von unserm Obst. Er ist sehr scheu und vorsichtig. Wenn sich aber Jemand seinem Neste nähert, so macht er einen großen Lärm, als wolle er keine Annäherung dulden. Auch gegen andere Vögel ist er kein guter Nachbar. Sein Gesang ist ein Gemisch von angeborenen und nachgeahmten Tönen. Er singt vom Frühjahr bis zum Spätsommer, wo er uns verläßt. Man kann ihn oft noch spät Abends hören. Im Spätsommer schreit er oft wie eine Katze.

Der Singsperling[20]), Song Sparrow, ist einer der ersten Frühlingsvögel, und läßt von der Spitze eines oberen Zweiges seine Stimme erschallen, welche der eines Kanarienvogels ähnlich ist. Er wird auch an Flüssen angetroffen und schwimmt gut.

In Amerika giebt es 27 Arten von Finken. Der Goldfink[21]), Gold finch oder Yellow bird, ist dem Kanarienvogel sehr ähnlich.

Der Schneefink[22]), Snow bird, kommt erst im Oktober vom hohen Norden zu uns.

Der Clip Sparrow[23]), durch die ganze Union verbreitet.

Der Hänfling[24]), Linnet oder Purple finch, singt besser als der Kanarienvogel und vertieft sich oft so in seinen Gesang, daß er nicht hört, wenn Jemand kommt. Er kehrt im Spätherbst nach den südlichen Staaten zurück.

Der Dompfaff oder Gimpel[25]), Dullfinch, ist hier etwas selten. Eine Art davon wird in den Ebenen von Arkansas, eine andere Art nördlich von Kanada gefunden.

Der Kardinal[26]) oder die virginische Nachtigal ist ebenso durch herrliche Farbenpracht, als lebhaften Gesang ausgezeichnet. Man hält ihn viel in Käfigen. Man weiß von einem solchen Vogel, daß er 21 Jahre im Käfig zubrachte. Nicht nur die Männchen, auch die Weibchen singen. Sein Gesang ist laut und klar, wie der Ton einer Flöte; dann nimmt er ab, wird sanft und weich und

---

[20]) Fringilla melodia, Baird, nur selten einmal von Herrn Reiche mit herübergebracht.

[21]) Fringilla — Chrysomitris — tristis, Bonaparte, auch Thistle Bird, der allbekannte amerikanische Stieglitz oder auch Trauerzeisig.

[22]) Fringilla hyemalis, Linné (Junco hyemalis, Sclater), wird nur selten eingeführt. Ich erhielt ihn zuerst von Herrn Karl Hagenbeck, dann von Herrn Reiche.

[23]) Fringilla socialis, Wilson, Gesellschaftsfink genannt, ein kleiner unansehnlicher Sperling, der zuweilen von Herrn Reiche eingeführt wird.

[24]) Fringilla purpuria, Gmelin, auch Hemp-bird. Es ist der bekannte, leider aber nur selten von Hagenbeck, Reiche oder Schoebel eingeführte Purpurfink.

[25]) Ob hier der Rose-breasted Grosbeak (Fringilla ludovitiana, Audubon) also der bekannte Rosenbrüstige Kernbeißer gemeint ist, weiß ich nicht, denn einen Bullfinch kann ich nicht finden.

[26]) Cardinalis virginianus, Bonaparte, der allbekannte Red-Bird, wird alljährlich zu vielen Hunderten, insbesondere von Herrn Reiche eingeführt.

schwillt dann wieder so stark an, daß er manchmal beläſtigt. Er hält sich im Süden und Westen auf.

Der Bodenfink, Ground-finch, auch Chewink[27]), macht sein Nest in den Boden. Wird er im Brüten gestört, so wälzt er sich auf dem Boden herum und stellt sich krank, um die Leute wegzubringen. Will man ihn fangen, so fliegt er fort.

Der Pewee[28]) heißt so nach seinem Geschrei, wenn er ein Insekt erschnappt hat. Manchmal schreit er auch phebee, phebee, daher man ihn auch Phöbe nennt. Wenn er bei uns erscheint, darf man den Garten anpflanzen. Manchmal brütet er dreimal hintereinander. Er verläßt uns im Oktober.

Der Reisvogel[29]) Bobolink, ist im Sommer zu Millionen über unsere Staaten verbreitet. In den Reisfeldern Karolina's erscheinen sie in solch großer Anzahl, daß auf einen Schuß oft ein Dutzend Vögel fallen. Im Herbst werden sie fett und glucken nur noch wie eine Henne. Er singt so schnell, daß man meint, es fahre Jemand auf einem Piano hurtig auf und ab. Manche Töne sind süß und angenehm, doch halten sie zu wenig an. Wenn 10 bis 12 zusammen singen, so giebt es ein prächtiges Konzert.

Die Amsel, Black bird[30]), ist nur in einer Abart, Crow black bird[31]) oder Purple grakle, hier bekannt. Sie lärmt wie ein ferner Wasserfall.

(Fortsetzung folgt.)

Der Nill'sche Thiergarten in Stuttgart.

(Schluß).

An die Bärengruben stoßen die Käfige der chinesischen Maskenschweine und hiesigen Wildschweine, welch erstere immer den Eindruck machen, als wäre der Zuschnitt ihrer Haut gegen den Körper viel zu groß ausgefallen und in Folge davon die Haut in so viele Falten gelegt. Sie erinnern deshalb lebhaft an die Konfirmationskleider mancher Bauerbuben, deren Zuschnitt in der Regel um ein halbes Jahrzehnt vorausgeeilt ist. — Es folgen Dachse, Wölfe und Füchse, über deren Naturell uns die Jagd mehr zu erzählen weiß, als sie selbst im eingesperrten Zustand uns verrathen. — Wir kommen jetzt an eine über hundert Fuß lange und vielfach abgetheilte Volière oder besser gesagt, Gallerie, welche sämmtliche bekannte zahme Hühnerrassen und Tauben in ausgezeichneten Exemplaren enthält, die Herr Nill mit besonderer Vorliebe pflegt und züchtet. Wir sehen darin Spanier, Crève Coeur, La Flèche, Paduaner, Yokohama, Brama-Putra, Kochinchina und noch viele andere vertreten.

Die Mitte des Gartens wird von größeren und kleineren umzäunten Plätzen und Wasserbassins ausgefüllt, welche Störche, Reiher, Kormorane, schwarze und weiße Schwäne, viele Enten, kanadische Schwan- und Sporngänse, Wasserhühner und Möven beherbergen.

Noch haben wir der kreisförmigen Gehege für Roth-, Damm- und Axishirsche, für Rehe und Angoraziegen zu gedenken, und ist eine völlig hornlose Kuh besonders zu bemerken, welcher Zustand sich auf ihre Nachkommen nicht fortgepflanzt hat. Nahe dem Ausgang finden wir noch Waschbären, weißköpfige Geier, Steinadler, und einen Raubadler aus Afrika, Gabelweihen und Bussarde.

Es kann somit dem Nillschen Unternehmen nicht fehlen, daß der Dank des großen Publikums sich in einem recht lebhaften Besuch seines Gartens zu erkennen giebt und steht dieser regsame Mann eben im Begriff, seinen Thiergarten um ein Bedeutendes zu erweitern. Mit dieser Vergrößerung ist aber auch die Entwickelung einer Sehenswürdigkeit anderer Art verbunden, über welche zu berichten es insofern etwas Delikates für mich wird, als ich dadurch in die unangenehme Lage versetzt werde, über meine eigenen Bestrebungen schreiben zu müssen, was der geneigte Leser hoffentlich mit Rücksicht auf die Neuheit des Gegenstandes entschuldigen wird.

Einem Theil der gebildeten Leser wird es nicht unbekannt geblieben sein, daß ich schon seit einem Dezennium damit beschäftigt bin, die Thiere und einen Theil der Pflanzen früherer Erdperioden nach ihren vorhandenen Ueberresten und nach Analogieen in der Jetztwelt plastisch darzustellen. Dieser Gedanke ist bisher nur im Sydenhampalast in London praktisch zur Ausführung gebracht worden. Da aber dort die urweltlichen Thiere aus Cement gebaut, inmitten einer Umgebung stehen, die ihren damaligen Lebensverhältnissen nicht entspricht, so habe ich mich entschlossen, eine Aufstellung derselben in geschlossenen Räumen und mit entsprechender vorweltlichen Scenerie zu ermöglichen und somit eine fortlaufende bildliche Darstellung früherer Perioden zur Anschauung zu bringen.

Die Ausführung dieses Vorhabens wurde mir aber durch die Kriegsjahre von 1866 und 70 verzögert und gelang es mir erst in letzter Zeit, einige Kapitalisten für dieselbe zu gewinnen Mit ihrer Hülfe ist es mir möglich geworden, meinen längst ausgearbeiteten Plan zur Ausführung zu bringen und ist bereits in dem oben erwähnten Anbau des Nillschen Thiergartens, ein Gebäude von hinreichendem Umfang aufgestellt worden, auf dessen einer Seite die Perioden der Trias, des Jura und der Tertiäre bis zur Pfahlbautenzeit, plastisch und bildlich dargestellt werden sollen. An diese letzte Periode der Urwelt sol-

---

27) Fringilla — Pipilio — erythrophthalma, Linné, Grundröthel, Ground Robin oder Towhee, wird von Herrn Reiche öfter eingeführt.

28) Tyrannus fuscus, Nuttal (Muscicapa fusca, Gmelin), auch Phoebe Bird genannt, ist meines Wissens bis jetzt noch nicht eingeführt worden.

29) Dolichonyx oryzivora, Swainson, richtiger Boblink, auch Reed Bird oder Rize Bird genannt, ist allbekannt und wird alljährlich in sehr bedeutender Anzahl eingeführt.

30) Als Schwarzvögel (Blackbirds) werden eine beträchtliche Anzahl Vögel von verschiedenen Arten bezeichnet. Da Amerika keine schwarze Drossel besitzt, so ist hier wahrscheinlich eine von den Icterus- (Gilbvogel-) Arten gemeint.

31) Der Crow blackbird dagegen ist die Gracula — Quiscalus — versicolor, Linné, Schiller-Trupial genannt, der nur selten einmal von Reiche eingeführt wird.

len sich Zonenbilder aus der Gegenwart anschließen, wodurch also ein möglichst getreues Bild von „Sonst und Jetzt" zur Anschauung gebracht werden soll. In diesem Augenblick bin ich damit beschäftigt, ein kolossales Mammuth von 25 Fuß Höhe plastisch darzustellen, welches noch vor Herbst dieses Jahres fertig werden soll. Sobald dieses Ungeheuer fertig ist, werde ich auch der Ornithologie Rechnung tragen und alsdann nicht verabsäumen, den Freunden der „Gefiederten Welt" die nöthigen Mittheilungen zu machen.

Stuttgart, den 5. Juli 1874. L. Martin.

Zur Wellensittich-Zucht.

Schon längst habe ich bei meiner Wellensittich-Zucht die Erfahrung gemacht, daß die Unterlage von Sägespänen in den Nistkästen der Wellensittiche von mancherlei Mißständen begleitet ist, insbesondere, wenn die Vögel die Gewohnheit haben, vor dem Nisten sämmtliche Sägespäne aus dem Nistkasten zu werfen, so daß die Eier, wenn vollends der Boden nicht muldenförmig sich wölbt, bei den Bewegungen des Weibchens gar leicht aus ihrer Brütlage kommen. Sehr dankbar war ich deßhalb, als ein Freund vor einiger Zeit mir erzählte, daß nach langem, vergeblichen Harren unerwartet rasch seine Wellensittiche zur Zucht gelangt seien, nachdem er den Boden der Nistkästen mit Biberpelz ausgefüttert habe. Alsbald suchte auch ich von einem Makler Abfälle von Biberpelz zu bekommen, mit welchen ich die Böden meiner sämmtlichen Nistkästen überzog. Ich durfte sofort die Wahrnehmung machen, daß ein junges Weibchen, welches sich noch nicht einmal vollständig verfärbt hatte, häufiger als sonst ihren Nistkasten aufsuchte und, nachdem es kaum ein halbes Jahr alt war, mich mit einer Brut überraschte.

Hat man an seinen Nistkästen eine Vorrichtung zur Beobachtung der Brut angebracht, so wird man finden, daß sich die Eier auf ihrer weichen Unterlage eindrücken und so sich ein festes Lager bilden; und lange Zeit, nachdem die Eier schon erbrütet sind, kann man die ehemalige Lage derselben noch wahrnehmen.

Es sollte mich freuen, später in diesen Blättern von günstigen Erfahrungen zu hören, die auch andere Züchter von Wellensittichen bei Unterlagen von Biberpelz anstatt der Sägespäne machen dürften.

Diakonus Goeller,
in Waldenburg (Württemberg).

Kanarienvögel im Freien.

Hildesheim. Im Garten des Restaurateurs Schmidt in der Gr.-Venedig hierselbst hat sich auf einem Apfelbaume ein Kanarienvogel-Pärchen eingefunden, daselbst auch ein Nestchen gebaut, worin das Weibchen jetzt über fünf Eiern brütet, während das Männchen durch schmetternden Gesang ihm die Langeweile vertreibt. Daß Kanarienvögel ihren Besitzern entfliehen, kommt nicht selten vor, daß aber solche Vögelchen hier im Freien bauen und brüten, dürfte wol auf Rechnung der anhaltenden tropischen Hitze zu setzen und zu den Seltenheiten zu rechnen sein. Zu bedauern ist, daß die kleine Sängerfamilie beim Eintritt der rauhen Jahreszeit ein Opfer ihrer Freizügigkeit werden wird.*)

Zur Brieftauben-Liebhaberei.

Berlin. Das Auffliegen der 150 vom Elberfelder Verein „Fauna" nach Berlin gesandten Brieftauben erfolgte am Sonntag, den 12. v. M., 5 Uhr 7 Min. Morgens, am äußersten Ende des Perrons des Potsdamer Bahnhofs zu Berlin in Gegenwart mehrerer Mitglieder des Vereins „Berolina". Die Tauben verließen gut ihre 6 Körbe, hielten sich aber am Platze ungewöhnlich lange (30—45 Minuten) auf, welcher Umstand sofort die Befürchtungen der anwesenden Kenner erregte. Welchen Einflüssen diese Thatsache zuzuschreiben, läßt sich indeß schwer bestimmen, jedoch war die Beschaffenheit der Atmosphäre wol die zumeist in Betracht kommende Ursache, die aber noch gar nicht oder nicht gebührend berücksichtigt worden. Wahrscheinlich hat dieses längere Verweilen auch veranlaßt, daß die erste Taube in Elberfeld erst am Montag 6 Uhr früh eintraf, welcher bis 9 Uhr weitere 15 Köpfe folgten. Die vorzügliche Tüchtigkeit der Tauben beweist aber der Umstand, daß bis zum anderen Tage volle zwei Drittel die nahezu 80 Meilen entfernte Heimat aufgefunden hatten. — Gleichzeitig mag hierbei erwähnt werden, daß auch die „Berolina" am 5. d. M. in Hannover Tauben fliegen ließ, und zwar um 4½ Uhr Vormittags, und daß die erste Taube 4 Uhr Nachmittags hier ankam, während aber überhaupt nur 4 Stück Tauben zurückgekehrt sind. Die letztgenannte Gesellschaft wird nichtsdestoweniger ihr Ziel mit Ausdauer weiter verfolgen. —

Zum Eierhandel.

Von C. Rasch.

Während man in neuerer Zeit immer mehr bestrebt gewesen ist, im Handel mit Nahrungsmitteln das Gewicht zur Bestimmung des Werthes anzunehmen und sich dadurch, wie z. B. beim Schlachtvieh, das Geschäft ungemein vereinfacht und eine feste Basis gewonnen hat, ist man bis jetzt nicht darauf gekommen, sich auch bei Eiern desselben zu bedienen, sondern man handelt sie bekanntlich nach Stückzahl, ohne in der Regel die größere oder geringere Schwere zu berücksichtigen, sei es bei Bestimmung des Werthes, sei es bei der Benutzung zu Speisen. Letzteres anlangend, finden wir denn auch in allen Kochbüchern: Nimm so und so viel Eier, oder von so und so vielen das Gelbe oder Weiße, und weder Henriette Davidis, noch Marie Rosnack, Haupt-

*) Vergl. die Schilderung über freifliegende Kanarien in Nr. 27 dieses Blattes.

ner und wie die schätzbaren Mitglieder der hochachtbaren Zunft der Kochkünstler von der Feder sonst heißen mögen, haben daran gedacht, in ihren unsterblichen Werken einen Unterschied zwischen großen und kleinen Eiern zu machen, genau dem alten Sprichworte: „'n Ei is 'n Ei". Dieses Sprichwort wird aber in der Regel unvollständig citirt, vollständig heißt es: 'n Ei is 'n Ei, sä der Schaulmester, „da greipe 'n an Gooseei", und in diesem Nachsatze liegt eben der Witz. Der Schulmeister, bis in die neueste Zeit der Prototy der kärglich besoldeten Staatsdiener, muß ein guter Rechenmeister sein, wenn er sich durchschlagen will, und deshalb weiß er den Unterschied zwischen einem großen und kleinen Ei besonders wol zu würdigen. Daß das im gewöhnlichen Leben nicht geschieht, ist um so auffallender, als es uns doch z. B. ganz geläufig ist, beim Ankauf von Aepfeln, Birnen, Kirschen, Nüssen 2c. nach Stückzahl, bei sonst gleicher Qualität, der Größe Rechnung zu tragen und danach den Werth zu bestimmen. Und doch ist die Sache bei Hühnereiern, die ja als Handelsartikel allein von Bedeutung sind, ihres verhältnißmäßig hohen Werthes wegen von ungleich größerer Bedeutung. Wir haben nämlich bei zahlreichen Gewichtsversuchen gefunden, daß kleine Eier aus wilden Züchtereien, wie sie in der Regel vom Lande an den Markt gebracht werden, das Stück im Durchschnitt 46,6, dagegen große aus rationellen Züchtereien 62,5 Gramm wiegen. Danach wiegt ein Schock von ersteren 5,6, von letzteren 7,5 Pfd. Kostet hiernach ein Schock kleine Eier 1 Thlr., so ist die gleiche Anzahl großer 1 Thlr. 10 Sgr. werth. Man reicht also mit 3 von letzteren so weit, als mit 4 von ersteren, denn der Nährwerth ist ganz vom Gewicht abhängig. Berücksichtigt man nun die vielen Millionen Eier, die jährlich in den Handel kommen, und die entsprechenden Summen, die dafür gezahlt werden, so liegt es auf der Hand, von wie großer Wichtigkeit die vorliegende Frage ist und wie ganz anders sich das Geschäft stellen würde, verkaufte man die Eier nach Gewicht. Wir wissen nun sehr wol, wie schwer es hält, im Handel alte Gewohnheiten und Usancen abzuschaffen, glauben aber doch, daß sich unser Vorschlag, beim Handel mit Eiern das Gewicht einzuführen, Bahn brechen wird, wenn die rationellen Züchter berücksichtigen, wie gut sie sich irrationellen gegenüber dabei stehen würden, zumal noch dazu kommt, daß Wiegen weit bequemer als Zählen ist und sich Ersteres, z. B. in Netzen, sehr bequem machen läßt.

Woher kommt nun aber der große Unterschied im Gewichte der Eier? Lassen wir bei Beantwortung dieser Frage außer Acht, daß einzelne Hühnerrassen sich durch große Eier auszeichnen, weil solche nur vereinzelt gehalten werden, auch ihre Produkte fast ausschließlich Brutzwecken dienen, so haben wir nur das Landhuhn als den eigentlichen Faktor im Eierhandel ins Auge zu fassen, und nach zahlreichen Erfahrungen unterliegt es keinem Zweifel, daß bei ihm die kleinen Eier nicht seinen natürlichen Eigenschaften entsprechen, sondern ihren Grund lediglich in der weit verbreiteten Inzucht, d. h. in der mangelnden Auffrischung des Blutes haben. Wie bei Menschen und Thieren die Inzucht in der Regel zur Degeneration führt, so besonders bei Hühnern namentlich in Bezug auf die Größe der Eier. Wir haben auf unserem Hühnerhofe ein schlagendes Beispiel, indem selbstgezogene Hühner, deren Eltern nicht mit einander verwandt sind, große, angekaufte dagegen von unbekannter Abstammung kleine Eier in dem oben angegebenen Gewichtsverhältnisse legen. So steht es überall, und da beide Arten gleich viel Futter fressen, so liegt der Vortheil der Blutauffrischung auf der Hand. Wer also große Eier haben will, der vermeide die Paarung verwandter Thiere und schaffe sich zu dem Zweck alljährlich neue Hähne an.

Die diesjährige Thierversteigerung in Antwerpen findet laut vorläufiger brieflicher Mittheilung am 8. und 9. September statt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird dieselbe diesmal noch bedeutend großartiger, als im vorigen Jahre, werden.

Aus den Vereinen.

Bericht über die 1. allgemeine Geflügel-Ausstellung des Vereins „Fauna" zu Düsseldorf.

Die erste Geflügelausstellung des Vereins „Fauna" zu Düsseldorf fand am 23.—26. Mai a. c. in den Räumen der städtischen Tonhalle statt, welche dem Verein von Seiten der betreffenden Verwaltung mit anerkennungswerther Bereitwilligkeit zur Verfügung gestellt wurden.

Die zur Aufnahme der auszustellenden Thiere dienenden Behälter, Volièren und Käfige wurden für Rechnung des Vereins von der Drahtflechterei des Herrn Kircher in Köln (Geflügel) und Herrn Zimmermeister Berg (Kaninchen) in Düsseldorf in möglichst zweckmäßiger Herstellung geliefert. — Letzteres gilt namentlich von den Behältern der Kaninchen, welche in Bezug auf gefälliges Aeußere, innere Bequemlichkeit und leichte Reinigung nichts zu wünschen übrig lassen.

Der postalische Verkehr der Kommission (in Bezug auf Abgabe und Rücksendung der Thiere) ward von Herrn Postdirektor Schmidt in zuvorkommendster Weise geregelt und durch Sendung eines geeigneten Postbeamten in das Verpackungsbureau unserer Ausstellung ganz wesentlich erleichtert.

In nicht geringe Verlegenheit ward die Kommission indeß durch die übergroße Zahl verspätet angemeldeten Geflügels gebracht. Die Schlußzeit der Anmeldungen war laut Einladungscirkular auf den 15. Mai festgesetzt. Es trafen indessen an den folgenden vier Tagen unaufhörlich neue Anmeldungen ein, welche der Verein bei dieser seiner ersten Ausstellung zurückzuweisen für um so mißlicher hielt, als dieselben größtentheils von rühmlichst bekannten Züchtern herrührten, deren Sendungen voraussichtlich hervorragende Zierden unserer Ausstellung bilden mußten. Um nun aber die große Zahl des nachträglich angemeldeten Geflügels unterbringen zu können, reichten die noch zur Verfügung stehenden Käfige (obschon auf eine bedeutende Ueberzahl vorgesehen) nicht aus. Daher blieb nichts weiter übrig, als den Versuch zu wagen, noch eine Doppelreihe von 64 großen Hühnerkäfigen einfacher Einrichtung herstellen zu lassen, welche die Kircher'sche Drahtflechterei in Köln in letzter Stunde

noch glücklich zu Stande brachte, während der Kölner Verein für Geflügelzucht auf unser dahin gehendes Ersuchen uns sofort 120 Taubenkäfige übersandte. —

Dieselbe Unregelmäßigkeit zeigte sich bei den Einsendungen des Geflügels. Der Schlußzeitpunkt der Annahme war auf den 22. Mai festgesetzt, allein am Abend dieses Tages waren kaum 2/3 der angemeldeten Thiere eingetroffen; noch spät in die Nacht hinein, bis zum Nachmittag des ersten Ausstellungstages brachte jeder neue Postzug zum Schrecken der übermüdeten Annahme-Kommission neue Sendungen von Körben und Kisten.

Die natürliche Folge dieser verspäteten Einsendungen aber war, daß die Annahme-Kommission erst am Mittag des ersten Ausstellungstages im Stande war, das Bureau zu räumen, um den Verkauf der ausgestellten Thiere endlich beginnen zu können. —

Verlassen wir nunmehr die unerquickliche Betrachtung der immer mehr oder weniger lästigen und anstrengenden Vorarbeiten eines derartigen Unternehmens und betreten wir die inzwischen vollendeten Ausstellungsräume, aus denen uns schon von weitem ein wahres Chaos hundertstimmigen Hahnengeschreies und lauten Hühnergegackers entgegentönt. Der große, lange Saal, welcher die muntere, buntgefiederte Welt beherbergt, ist von Künstlerhand unter C. Hoffs Leitung geschmückt, wobei Herr Garteninspektor Hering, unterstützt durch Herrn Kunstgärtner Lenné, die in das Gebiet der Kunstgärtnerei einschlagenden Arbeiten übernommen hatte. Der Saal macht nunmehr in seinem reichen Schmuck von grünen Laubgewinden, Flaggen und Wappen, mit Statuen und Springbrunnen auf dunkelm Tannengrün des Hintergrundes, mit den prächtig nachgeahmten großen chinesischen Blumenvasen (C. Hoff's eigenste Schöpfung), welche die unvermeidliche Einförmigkeit der langen Käfigreihen so glücklich unterbrechen, — auf jeden unbefangenen Beschauer einen überraschenden festlichen Eindruck. So trug die Betheiligung der Künstler an diesem Unternehmen nicht wenig dazu bei, der Ausstellung ein durchaus eigenartiges Gepräge zu verleihen und einen Andrang des einheimischen wie auswärtigen Publikums hervorzurufen, welcher die kühnsten Erwartungen des leitenden Komitees übertraf.

Die mit der Geflügelschau verbundene Ausstellung von Kaninchen ward aus verschiedenen Rücksichten nach der im Garten belegenen, offenen und parquettirten Halle verlegt und bildete bald den Sammelpunkt der die Ausstellung besuchenden Kinderwelt.

Früh am Morgen des ersten Ausstellungstages trafen die Mitglieder der Preisrichter-Kommission von allen Seiten ein und begannen ihr beschwerliches (bekanntlich oft sehr undankbares) Amt. Gegen 3 Uhr Nachmittags war diese Arbeit glücklich erledigt und die Herren Preisrichter versammelten sich nun mit den Mitgliedern des Ausstellungskomitees zu einem gemeinsamen Diner im vordern Saal der Tonhalle. — Herr Prof. Camphausen brachte den ersten Toast auf Seine Majestät unsern Kaiser in Form einer kleinen, halb improvisirten Dichtung, welche der Bedeutung des Tages höchst glücklich angepaßt war, wie folgt, aus:

Nun öffnet weit das Herz und alle Thore,
Gekommen ist der Pfingsten lieblich Fest,
Das Wald und Haide feiert, denn mit ihm
Zieht in der Hoffnung grünem Farbenkleid
Auch triumphirend ein ja König Lenz!
Er naht — da zittert freudig Mutter Erde,
Aus ihrem Schoße holt er keck hervor
Die Blumenkinder all' und „schleudert jubelnd
Der Lerchen Singraketen in die Luft!"
In alle Fernen ist sein Ruf gedrungen,
Die Schwalbe fand den Weg zum alten Nest,
Zur Heimath lenkte seinen Flug der Storch
Und Fink und Amsel und die Nachtigal,
Sie stimmen ein in seines Ruhmes Hymnen!

Mit ihnen allen auch die Taube ist's,
Das Festsymbol der Gottheit, die da spricht:
„Der Friede sei mit Euch!" Das ist der Geist
Im Taubenfittig, der den Oelzweig spendet,
Und segnend um der Erde Völker schlingt
Sein Band, das sie zum Friedens-Wettkampf einigt.
So grüßt auch unsre frohe Tafelrunde
Der Tag, der festliche, der unserm Werk
Prophetisch hold die Weihe geben möge,
Dem Werk, das sich erkor zu Schutz und Pflege
Der Vögel buntes Reich. — Und schauen wir
In ihm und seiner tausendfält'gen Art
Uns um, so schweift vor Allem unser Blick
Empor in hoher Lüfte Regionen,
Darein ihr König, stolz und hehren Schwunges,
Ein Herrscher über Wald und Triften, schwebt.

Du aber bist es unter seiner Sippe,
Deß' wir zuerst in dieser guten Stunde
Gedenken, du gewalt'ger Kaiseraar,
Der uns erkämpfte mit den reis'gen Fängen
Des Friedens köstlich Kleinod, auf daß ruhig
Jetzt unter deiner Schwingen mächt'gem Schutz
Auch gottgesandt die Taube walten darf!

Drum, wo zu ihrem Amt sich deutsche Männer
Verbinden immer, wo zu frohem Fest
In edler Gäste Mitte Becher schäumen,
Da wollen dessen dankbar sie gedenken,
Der seinen Adler siegreich flughaft machte
Aus träger Rast zur Frühlingsauferstehung
Und ihm auf's Haupt die Kaiserkrone drückte.
So laßt auch uns mit hellem Gläserklingen
Anstimmen den Akkord, den rechten, ersten
In dieses Jahres Pfingstkoncert, zu dem
Der Nord und Süd, des Erdballs fernste Küsten
Die Sänger uns gesandt und Musikanten.
Vom Wüstensand zu Indiens Palmenhainen,
Vom zuchtgeübten Albion, von der Schelde,
Von Hollands fetten Höfen, wie ringsher
Aus allen heim'schen Gauen kamen sie,
Ja selbst die Seine, ihren Groll vergessend,
Schickt diesmal uns willkomm'ne Invasion.
In allen Scalen girrend, krähend, singend,
Sind alle sie bereit als liebe Gäste,
Im schmetternden und tausendstimm'gen Echo
Die Kehlen zu erproben, wenn wir rufen:
Heil, dreimal Heil dem ruhmgekrönten Adler!
Heil seinem Träger, unserm Landesherrn!
Seine Majestät Kaiser Wilhelm lebe hoch!!!

Herr Advokat Anwalt Lützler brachte hiernach den zweiten Toast auf die anwesenden Herren Preisrichter und Herr Maler C. Hoff den dritten auf Ihre Königliche Hoheit die Frau Prinzessin Karl von Preußen. Zuletzt dankte Herr Direktor A. Funck (Zool. Garten zu Köln) im Namen seiner Herren Kollegen, gedachte in äußerst liebenswürdiger Weise der Thätigkeit des Ausstellungskomitees und beglückwünschte den ganzen Verein zu dem großartigen Aufschwunge, welchen derselbe sofort bei dieser seiner ersten Ausstellung genommen. Die Gesellschaft blieb in heiterster Stimmung bis gegen Abend versammelt, wo dann die Mehrzahl der auswärtigen Gäste sich verabschiedete und heimwärts kehrte.

Vom Wetter ausreichend begünstigt, verliefen die übrigen drei Ausstellungstage zu allgemeiner Zufriedenheit und die Räume waren von früh bis spät von Besuchern gedrängt erfüllt. Die für den ersten Pfingstabend mit vielen Mühen und Kosten vorbereitete Gartenbeleuchtung nebst großem Feuerwerk (wobei unter Andern ein 10 Fuß hoher flammender Hahn erglänzen sollte), kam leider durch zeitweise ungünstige Witterungsverhältnisse nicht zur vollen Geltung. In Folge verschiedener Gewitterschauer sank nämlich die Temperatur gegen Abend so tief, daß an ein längeres Ver-

weilen im Freien nicht zu denken war. — Dasselbe wiederholte sich am zweiten Pfingstabend, denn kaum waren die Gaskörper entzündet, als auch schon das naßkalte Wetter die Zuschauer — noch vor Einbruch der Dunkelheit — wieder zurück in die Gashalle und Restaurationsräume scheuchte. Am 26., dem vierten Ausstellungstage des Nachmittags fand die von dem Vereine angeordnete Verloosung statt, bei welcher sich wie gewöhnlich Frau Fortuna oft genug als eine launenhafte Dame erwies.

Rühmend glauben wir zum Schlusse hervorheben zu müssen, daß im Verlaufe der ganzen Ausstellungszeit nirgends die geringste Störung stattfand, wiewol der Andrang des Publikums — namentlich während der beiden Festtage ein ganz außerordentlicher war und in Folge des sehr mäßigen Eintrittspreises der Besuch der Ausstellung auch den minder bemittelten Ständen ermöglicht wurde.

Nach vorstehender, allgemeiner Uebersicht der Einrichtungen und des Verlaufes der Ausstellung, wenden wir uns nunmehr in gedrängter Kürze zu einer Schilderung der ausgestellten Thiere.

(Fortsetzung folgt.)

Bücher- und Schriftenschau.

Mein Leben und Streben im Verkehr mit der Natur und dem Volke, von **E. A. Roßmäßler.** Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von **Karl Ruß** (Hannover, Carl Rümpler). Für die Jugend und alle diejenigen, welche mit der heimischen Natur sich befreunden und sie recht kennen lernen wollen, war und ist Roßmäßler noch immerfort in seinen Schriften ein ebenso zuverlässiger, als liebevoller Führer; für alle Freunde der populären Darstellung überhaupt gilt er als ein hochgeschätzter Schriftsteller; zählen wir dazu seine vielen persönlichen Verehrer, die sein zu frühes Scheiden schmerzlich bedauern — so dürfen wir annehmen, daß dies Buch von einem sehr weiten Leserkreise dankbar aufgenommen werde. Es enthält: I. Jugendjahre. II. Die ersten Versuche im wahren Berufe. III. Als akademischer Lehrer. IV. Als Volkslehrer. V. Meine Gegenwart. Weiteres über diese Selbstbiographie zu sagen, ziemt uns hier nicht, da der Herausgeber dieses Blattes auch dies Buch in die Oeffentlichkeit geführt hat. Es wird bei unsern Lesern einer eingehenderen Empfehlung auch nicht bedürfen.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

1 rothbrüstiger Kernbeißer . . . . . Thlr. 10. —.
1 rothköpfiger Würger, guter Sänger . . „ 1. 15.
1 Paar Dominikaner . . . . . à „ 7. —.

C. Koch, Hoflieferant
[470] Wiesbaden.

Gute getrocknete Ameiseneier sind zu haben, pro Liter 30 Kreuzer. Auch sind von den kleinen Kaninchen in bester Beschaffenheit zu haben bei **Georg Miltenberger**
[471] in Zellingen, Haus Nr. 295, bei Würzburg (Bayern).

Ich habe aus Rußland mitgebracht:
Bucharische Trommeltauben 40 Thlr. pr. Paar, **Sprosser** 4 Thlr. pr. Stck., **Hakengimpel** 4 Thlr. pr. Stck., **Steppenlerchen** 3 Thlr. pr. Stck., **Karmingimpel, große Dompfaffen, Weiden-** und **Schneeammer** und **rothe Kreuzschnäbel** pr. Stck. 2 Thlr.

A. Brune, Vogelhändler,
Berlin, Gartenstraße 62. [472]

Unterzeichneter erlaubt sich hierdurch seine p. t. Kundschaft darauf aufmerksam zu machen, daß die seit Kurzem am hies. Platze bestehende, der meinigen nachgeahmte Firma

Grosshandlung exot. Vögel

(Inhaber Arnim Kräger),

welche den Text meiner Inserate, Offerten und diversen anderen Mittheilungen meistens fast wörtlich abschreibt und den Inhalt meiner verschiedenen Preislisten wortgetreu nachdruckt, überhaupt meine sämmtlichen Geschäftseinrichtungen, Versandt- und Verkaufsbedingungen ꝛc. genau nachahmt, zu meiner Firma in keinerlei Beziehungen steht.

Herr K. benutzt zu seinen Offerten die Adressen, welche ein bis vor kurzer Zeit bei mir Bediensteter, der seiner geringen Fähigkeiten halber nur eine der untergeordnetsten Stellungen bekleidete und wegen verschiedener Ungehörigkeiten, die er sich zu Schulden kommen ließ, sein ferneres Verbleiben in meinem Geschäft unmöglich machte, aus meinem Geschäft Herrn K. überbracht hat.

Ich bitte daher den an mich gerichteten Briefen, welche oft nur „An die Großhandlung exot. Vögel" adressirt sind, meinen Namen stets beifügen zu wollen.

Mit Hochachtung
Karl Gudera,
[473] Leipzig und Wien.

Blau- und Steindrosseln, Beo's, Kalanderlerchen, brasil. Seidenstaare, Mönchsittiche, 500 Paar Bengalisten, Bandfinken, Goldbrüstchen, Goldfische, Amphibien verschiedenster Gattung, Schildkröten ꝛc. zu billigsten Preisen bei
[474] **Carl Bandisch u. Co. in Triest.**

[475] **Vogel-Eier.**

Die Bestände mehrerer bedeutender Sendungen südrussischer, spanischer und hochnordischer Vogeleier sind zur Hälfte der üblichen Handelspreise abzugeben durch
A. Grunack, Berlin, Schützen-Str. 56.

1 Paar kräftige Lady Amherst-Fasanen, ½ Blut, } Junge
Kreuzung von Gold-Fasanen, } von
12 Paar Vénérés, König-Fasanen, } 1874,
sind abzugeben. [476]
Auskunft giebt die Redaktion der „Gefiederten Welt".

Naturalienhandlung
von
Wilh. Schlüter
in Halle a. d. Saale.

Die Preisverzeichnisse Nr. 43, 44 u. 45 über **Skelette, Schädel, Gehörne, Nester** und **Instrumente** zur Präparation und zum Fang naturhist. Gegenstände sind erschienen und stehen gratis zu Diensten. [477]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 20. August 1874. Nr. 34.

Inhalt:

Mittheilungen des Herrn Dr. Stölker (Schluß). —
Die Singvögel Amerika's (Schluß). —
Bastard-Zucht. —
Ueber die beste Kanarienzucht. —
Zur Brieftauben-Liebhaberei. —
Mittheilungen zur Hebung der Hühnerzucht: Befruchtung des Huhns.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Schwalbennest. —
Briefliche Mittheilungen: Honigsauger, Organist, schwarzköpfiger Zeisig; freie Vögel. —
Aus den Vereinen: Ausstellung in Düsseldorf (Forts.) —
Französisches Geflügel. —
Anzeigen.

Mittheilungen des Hrn. Dr. Stölker in St. Iden.

(Schluß).

Ueber Nachzucht des Reisfinken.
(Padda oryzivora.)

Im „Journal für Ornithologie" von Dr. Cabanis, März 1870, glaube ich als einer der Ersten ausführlicher über die Nachzucht des Reisfinken berichtet zu haben.

In diesem Frühjahre erzielte ich wieder eine Brut dieser Vögel von drei Köpfen und zwar hielt ich das Paar allein in einem meiner Kistenkäfige von 9 Meter Länge und ½ Meter Höhe und Tiefe, mit einem Nistkästchen in einer oberen Ecke. Diese Brut zeigte nichts neues, der früheren gegenüber, bestätigte aber einige Eigenthümlichkeiten derselben. Das Brüten scheint lange zu dauern, da die Vögel schon während des Eierlegens viel sitzen.

Die Jungen verlassen das Nest nicht zusammen, sondern je einen Tag eines mehr, wahrscheinlich in der Reihenfolge, wie die Eier gelegt wurden. Die Jungen sind bald sehr munter und muthwillig, ergötzen sich an allerlei Spielerei.

Jetzt, Mitte Juli, sind die Jungen vollständig ausgefärbt, von den Alten nicht zu unterscheiden; einer singt die Strophe des Alten. Ich hebe noch hervor, daß das Paar ein anderes war, als das, von dem die früheren Jungen stammten, der Fall somit als ein neuer zu betrachten ist. Als ich sie vor etwas mehr als einem Jahre erhielt, zeigten sie noch einige braune Federn des Jugendkleides. Sie bekamen als Nahrung, nebst verschiedenen Sämereien, auch Insektenfutter. Stand des Käfigs in einem geheizten Zimmer in der Höhe.

Es steht nun fest, daß der Reisfink bis vor wenigen Jahren, trotz seiner schon längst massenhaften Importation, nie bei uns zur Nachzucht schritt (oder solches wenigstens nicht veröffentlicht wurde), während jetzt eine solche, laut verschiedenen Schilderungen, gar nicht selten mehr stattfindet.

Es liegt somit die Frage sehr nahe, warum die Züchtung des Reisfinken jetzt leichter gelingt, als früher? Ich glaube zur Beantwortung dieser Frage zwei Anhaltspunkte zu haben.

Wie man bis in letzter Zeit von vielen fremdländischen Vögeln nur die schön gefärbten oder singenden Männchen in den Handel brachte, so wurden von den gemeinen Reisfinken gewiß nur schön ausgefärbte alte Exemplare eingeführt, während jetzt des billigen Transportes und der größeren Nachfrage wegen auch junge, noch nicht ganz vermauserte (ausgefärbte) zu uns gelangen und solche zur Akklimatisation natürlich geeigneter sind, als alte.

Andererseits hat sich die Pflege der finken-

artigen Vögel insofern sehr verbessert, als man ihnen jetzt möglichst gemischte Nahrung bietet, und eingesehen hat, daß sie auch Insektennahrung gern zu sich nehmen, während sie früher (und merkwürdigerweise beharrlich jetzt noch von Einzelnen) ausschließlich mit Körnern versorgt wurden. Wie wohlthätig mannichfache Nahrung auf das Gedeihen der sogenannten Körnerfresser wirkt, ist in diesen Blättern schon mehrfach hervorgehoben worden, so z. B. in bemerkenswerther Weise von Herrn Linden in Nr. 7 dieses Jahrganges bei Beschreibung einer Brut des Quäkersittichs.

Sollte ich Rathschläge geben, wie Reisfinken am ehesten zur Zucht schreiten, so könnte ich ungefähr Folgendes empfehlen.

Man verschaffe sich junge Reisfinken und zwar, da sich das Geschlecht äußerlich nicht erkennen läßt, mehrere Exemplare zusammen; scheidet sich später ein Pärchen durch sein Benehmen aus, so bringe man solches allein in einen mäßig großen Käfig, der mit einem Nistkästchen versehen ist. Der Käfig stehe an einem Orte, an welchem die Vögel möglichst wenig gestört werden.

Die Nahrung sei die ganze Zeit durch möglichst mannichfaltig: Hirse, Kanariensamen, Hanf, Brot und Rüben, Ameiseneier, Grünzeug und Sepia.

St. Fiden, Schweiz.

Dr. Stölker.

Die Singvögel Amerika's.

(Schluß.)

Die Gold-Amsel[31]), Oriole. Von diesen ist besonders der Baltimore Oriole[32]) bekannt. Er macht ein Nest in Sackform und hängt es an das äußerste Ende eines Baumes, so daß auch keine Schlange es erreichen kann. Er ahmt gern den Gesang anderer Vögel nach, so daß man seine eigene Melodie schwer ausfindet.

Der Orchard Oriole[33]) wird oft mit dem vorigen verwechselt.

Von den Zaunkönigen ist die House Wren[34]) nur im Sommer bei uns zu finden, die Winter Wren[35]) hält sich über Winter in Pennsylvanien auf.

Die Meadow Lark[36]), Titlark, Wiesen-Lerche, wird auch der amerikanische Staar genannt. Sie lebt von Kanada bis Louisiana.

Die Meisen, Tits or Tit mice[37]), sind in mehreren Arten zu finden. Die Haubenmeise, Tufted Tit mouse[38]), bewohnt im Sommer die Wälder; im Winter kommt sie in die Gärten und pickt aus den Rinden der Bäume allerlei Insekten heraus. Nüsse macht sie mit dem Schnabel auf. Kleinere Vögel tödtet sie und frißt ihr Gehirn.

Der Chicadee[39]) ist ihr verwandt, doch ist sein Gesang nicht so gut. Er heißt auch schwarzhaubige Meise wegen einer schwarzen Platte auf dem Kopfe. Er ist einer der bekanntesten Wintervögel und singt zuweilen in der größten Kälte.

Das Rothschwänzchen[40]), American Redstart, kommt im Mai zu uns und baut sein Nest aus Rindenstreifen. Sein Gesang ist süß und angenehm.

Die Ammern, Buntings[41]) oder Emberizas, findet man in mehreren Arten hier.

Die Snow buntings[42]) kommen im Winter zu uns. Sie wechseln ihre Farbe mit den Jahreszeiten, doch ist ihre Grundfarbe weiß.

Der Schwarzhals, Black-throated bunting[43]), erfreut mit seinem Gesang im Sommer jeden Zuhörer.

Der Kuhvogel, Cow bunting[44]), hält sich gern beim Vieh auf und frißt Insekten und Samen. Er hat viele Kehllaute und flattert mit den Flügeln zum Gesang. Er baut kein Nest, sondern legt seine Eier in fremde Nester.

Der Whip-poor-will[45]) und die Chuck-willis-widow[46]), beide nach ihrem Geschrei so genannt, ge-

---

31) Oriols- oder Gilbvogel-Arten (Icterus) werden ziemlich zahlreich nach Deutschland gebracht, und einige sind bei allen Vogelhändlern zu haben. Hierher gehört

32) Der Baltimorevogel (Oriolus baltimore, Linné), auch Golden Robin und Hang Nest genannt. Er heißt im Vogelhandel auch Baltimore-Star oder Baltimore-Trupial.

33) Oriolus spurius, Linné, Garten-Trupial oder kleiner brauner Oriol, wird nur selten von Herrn Reiche oder Herrn Schoebel eingeführt.

34) Troglodytes aedon, Vieillot, Haus-Zaunkönig, dürfte wol kaum lebend herübergebracht sein.

35) Troglodytes hyemalis, Vieillot, Winter-Zaunkönig, wie der Vorige.

36) Der hier gemeinte Vogel gehört zu den Starlingen und heißt auch Meadow Lark und Old Field Lark (Sturnella magna, Swainson; Alauda magna, Linné). Uebrigens irrt sich Herr S. hier, indem er zwei ganz verschiedene Vögel zusammenzieht. Denn die Titlark, Anthus, ludovitianus, Lichtenstein, gehört zu den Piepern. Dieser letztere Vogel ist bereits mehrfach von Herrn Reiche herübergebracht worden.

37) ?

38) Parus — Lophophanes — bicolor, Linné, ist meines Wissens noch nicht eingeführt worden.

39) Parus septentrionalis, Harris, Long-tailed chikadee, wie die Vorige.

40) ?

41) Buntings werden in Amerika eine beträchtliche Anzahl verschiedenartiger Vögel genannt, welche allerdings zum größten Theil zu den Ammern (Emberiza) gehören.

42) Der Schneeammer (Emberiza nivalis, Linné) wird nicht selten von Amerika aus in den Vogelhandel gebracht. Ich erhielt ihn von Ch. Jamrach in London und dann auch von Hagenbeck als amerikanischen Vogel.

43) Emberiza — Euspiza — americana, Gmelin, wird nur sehr selten einmal von Herrn Reiche eingeführt.

44) Molothrus pecoris, Swainson, richtiger Cow Blackbird oder Cowbird, der allbekannte Kuhstar, welcher alljährlich in sehr großer Zahl eingeführt wird.

45) Caprimulgus vociferus, Wilson, die berühmte oder berüchtigte amerikanische Nachtschwalbe oder Ziegenmelker.

46) Caprimulgus carolinensis, Gmelin, die karolinische Nachtschwalbe, der vorigen nahe verwandt. Dr. K. R.

hören zu den Ziegenmelkern und sind kaum zu den eigentlichen Singvögeln zu rechnen.

J. Straubenmüller
im New-Yorker „Belletr-Journ."

Bastard-Zucht.

Von einem Männchen Goldzeisig oder amerikanischen Stieglitz (Fringilla tristis) erzielte ich aus zwei Gehecken 7 Junge, während jetzt abermals das Weibchen auf vier Eiern brütet. Diese Bruten sind außerordentlich interessant, besonders durch den ungemeinen Liebreiz, welchen das herrliche Vögelchen während der Nistzeit entfaltet. Stundenlang sitzt es mit halb herabhängenden Flügeln vor dem Nest des brütenden Weibchens und unterhält dieses mit leisem Gezwitscher der zartesten und einschmeichelndsten Töne, dabei das blaßrothe Schnäbelchen so weit vorstreckend, daß es den Schnabel des Weibchens fast berührt. Mit dieser Unterhaltung glaubt es allerdings, seine volle Schuldigkeit gethan zu haben, denn weder das Weibchen noch die Jungen versieht es mit Nahrung. Fast alle jungen Bastarde gleichen in der Gestalt dem Kanarienvogel, in der Farbe und Zeichnung dem Goldzeisig im Winterkleide, bei einigen aber nur mit geringen gelben Abzeichen auf der Platte. Sehr gespannt bin ich darauf, in welcher Weise sie sich weiterhin verfärben werden; arten sie mehr nach dem Männchen, so dürften es prachtvolle Vögel sein.

Bödicker,
Hauptmann in Stettin.

Ueber die beste Zucht von Kanarienvögeln. Vom Apotheker Schüler in Rohfelden.

In Ihrer von mir bisher mit großem Interesse gelesenen Zeitschrift habe ich seit Monaten so viele Fragen und Erörterungen über die Zucht von Kanarienvögeln gefunden, daß ich schon häufig den Vorsatz faßte, Ihnen auch meine zahlreichen Erfahrungen mitzutheilen.

Denn die Liebhaberei an allem Gefieder habe ich — fast möchte ich behaupten — geerbt, und erinnere ich mich noch heute, welche große Freude es mir schon als kleiner Knabe gewährte, wenn mein Vater mich im Herbste zum Fang eines Rothkehlchens an den Saum des sich herbstlich färbenden Waldes mit hinausnahm, das in kurzer Zeit die vielen, lästigen Fliegen in der Stube vertilgte und als lieber, traulicher Gast den Winter bei uns zubrachte, mit seinem lieblichen, zarten Gesang in den der Schwarzamsel, des Schwarzköpfchens, Edelfinks u. a. einstimmend, freilich oft übertönt von den Andern. Diese Freude an den lieben Sängern habe ich in allen Lagen meines Lebens beibehalten, gleichwie mein lieber Vater trotz seiner 80 Jahre die seinigen heute noch mit derselben Pünktlichkeit füttert, wie ich sie von ihm vor 30 Jahren verpflegen sah.

Gern möchte ich wissen, wie groß die Zahl der von mir gezüchteten Kanarienvögel und Bastarde wol eigentlich ist, da ich, nur wenige Sommer abgerechnet, diese Zucht bereits seit 26 Jahren betrieben habe. Und zwar in den letzten 8 bis 10 Jahren mit solchem günstigen Erfolg, wie ihn nur wenige Züchter werden aufweisen können. Der Hauptzweck dieses Schreibens ist daher, meinem Verfahren Freunde zu gewinnen, in der sichern Ueberzeugung, daß der Ertrag sie für die aufzuwendende größere Mühe reichlich entschädigen wird. — Entgegen dem fast allgemein üblichen Züchtungs-Verfahren bin ich nämlich zu der Einrichtung gekommen, stets nur ein Paar in einem Käfig zusammen hecken zu lassen, und will ich versuchen, die nach meinen Erfahrungen sehr bedeutenden Vortheile zu schildern. Jahrelang habe ich früher meine Kanarienvögel in den sogen. fliegenden Hecken gezüchtet, ehe ich schließlich zu einem Feinde der letzteren geworden bin. Denn welcher Besitzer einer solchen Hecke könnte leugnen, daß er in jedem Sommer vielen Aerger durch die in derselben sich zutragenden unvorhergesehenen Fälle hätte. Anfangs, einige Wochen nach dem Einsetzen der Zuchtvögel, geht Alles nach Wunsch (höchstens zieht ein Weibchen dem andern einmal sein schön gebautes Nest mit sämmtlichem oder theilweisem Inhalte heraus). Gute Heckweibchen vorausgesetzt, sitzen fast sämmtliche auf ihrem Gelege brütend, und der Züchter zählt schon im Geiste die vielen Jungen, welche ihm allein aus dieser ersten Brut nach Anzahl der gelegten Eier erwachsen sollen. Es dauert nicht lange, so sind seine Hoffnungen schon bedeutend herabgestimmt, in diesem und jenem Gelege waren sämmtliche oder der größte Theil der Eier unbefruchtet und, selbst das Ausgehen der meisten zugegeben, tritt die Hauptstörung in den Tagen ein, da die Weibchen, welche nur in wilder Ehe leben, wieder nisten wollen. Ich habe nach meinen langjährigen Erfahrungen noch keinen Hahn gehabt, welcher ein wirkliches Eheverhältniß mit mehr als einem Weibchen eingegangen wäre, und darunter verstehe ich, daß, obwol die Hähne zum Begatten eines jeden Weibchens in einer fliegenden Hecke stets bereit sind, sie das Füttern während der Brutzeit und das Füttern der Jungen im Neste immer nur bei dem einen — ihrem — Weibchen besorgen, die flüggen Jungen von diesem auch nach der begonnenen neuen Brut selbstständig groß füttern. Wie sieht es aber im Gegensatz hierzu bei den andern Weibchen aus? Die schlechtesten von ihnen lassen einfach, sobald sich der Trieb zum Hecken von Neuem regt, ihre Jungen schon im Neste verhungern oder bauen sie mit Nistmaterial zu, selbst im besten Falle ist ihr Augenmerk naturgemäß jetzt weniger auf das Füttern ihrer Kleinen, als auf das Bauen eines neuen Nestes gerichtet. Sie fliegen mit Baumaterial unruhig hin und her, die Jungen werden von ihnen gerade dann, wenn ihre Entwickelung so rasch fortschreitet, nur halb gesättigt, machen sich, vom Hunger getrieben, frühzeitig aus dem Neste und

gehen auch dann noch oftmals zu Grunde, würden jedenfalls in noch größerer Anzahl sterben, wenn sich nicht in einer solchen Hecke öfters Vögel (im Nachsommer zuweilen Junge aus den ersten Bruten) fänden, welche, erstere aus Dummheit, letztere aus Mitleid, sich über sie erbarmten und ihnen Futter reichten. Denn mit dem Tage, da die Mutter auf ihrem neuen Gelege brütet, versiegt die in den letzten Tagen immer schwächer von dieser Seite fließende Nahrungsquelle gänzlich, selten oder fast nie sind aber die Jungen dann schon so weit gediehen, um sich selbstständig ernähren zu können, thuen sie es, vom Hunger getrieben, zu früh, so entstehen durch ihre Vorliebe, in diesem Alter nur weiche Nahrung in übermäßigen Massen zu verschlingen, auch zahlreiche Verluste. Das viele Futter, welches sie aber bis zu diesem Zeitpunkte gekostet haben, ist verloren, während sie innerhalb weniger Tage bei richtiger Versorgung würden selbstständig in's Leben getreten sein.

In Allendorf an der Werra aufgewachsen, wo die Züchtung und Liebhaberei der Kanarienvögel auf einen Höhepunkt gediehen ist, wie sie in Andreasberg nicht größer sein kann, indem beispielsweise im vorigen Herbste in der nicht großen Landstadt für 12,000 Thaler Kanarienvögel verkauft wurden, hatte ich noch im vorigen Sommer bei einem mehrwöchentlichen Besuche bei meinem Vater reichlich Gelegenheit, die Züchtereien alter Freunde und Bekannte wiederzusehen, und habe nach Einsicht derselben erst recht keine Neigung verspürt, von meiner Züchtungsweise abzugehen. Zugleich will ich bei dieser Gelegenheit nebenbei bemerken, daß im Widerspruch zu den Mittheilungen des Herrn Kontroleur Böcker die dortigen zahlreichen Hecken nicht allein sämmtlich ungeheizt sind, sondern von dem Haupteinkäufer Herrn Busch aus Andreasberg als erste Bedingung des Einkaufes die durch ein großes, Tag und Nacht offen stehendes Drahtfenster stattfindende Lüftung bezl. Abhärtung verlangt wird. Auch meine Vögel sind Sommer und Winter in einem ungeheizten Raum in meinem oberen Hausgang, wo freilich nur bei einer anhaltenden Kälte von mehr als 10 Grad Nachts das Wasser ein wenig gefriert. Dafür sind sie aber durchweg so gesund und kräftig, wie Kanarienvögel nur sein können. Die in diesem Blatte angeregte Frage wegen eingetretener Heiserkeit eines jungen Hahnes war bei einem ausgezeichneten Hohlroller entstanden, den ich mit anderen zur Veredlung meiner Rasse bei ziemlich niederer Temperatur aus meiner früheren Heimat geschickt erhalten hatte.

Doch ich wollte die Vorzüge meines Zuchtverfahrens beleuchten, und will ferner als Beispiel das Für und Wider anführen, daß mir Ende Juli vorigen Jahres ein Züchter, welcher 19 Hähne mit 50 Weibchen in 2 großen Heckräumen hatte, mittheilte, daß er schon 200 junge Vögel habe. Stand, frage ich, dieses Ergebniß in Verhältniß zu dem bei einer solchen Anzahl aufzuwendenden Futter? Ich antworte nein, denn zur selbigen Zeit hatte ich von 6 Paaren in Einzelkäfigen bereits über 60 Junge. Wie viel traulicher, schöner und erfolgreicher ist das Familienleben eines solchen Paares, welches in seinem Käfig allein wohnt! Da stößt kein Hahn den andern im entsprechenden Augenblick aus Eifersucht von dem zur Begattung einladenden Weibchen (woraus ich mir die vielen nicht tauglichen Eier in den fliegenden Hecken erkläre); da wird bei richtiger Fütterung auch kein Weibchen veranlaßt, durch das zu reichliche Fressen des für Alle gleichmäßig dastehenden Eifutters seine Eier oder Jungen zu verlassen, um aus Ueppigkeit zu früh zu einer neuen Brut zu schreiten, bevor die vorhergehende beendet ist. Das durch die vielen Futtergefäße veranlaßte umständlichere Futtergeschäft ist der einzige Uebelstand, den ich als stichhaltig gegen mein Züchtungsverfahren anerkenne. Und auch dieses ist nicht so schlimm, als man denkt, wenn die richtige Einrichtung vorhanden, und wie das bei mir der Fall, sämmtliche 12 Brutkäfige (auf welche Zahl ich sie in diesem Jahre vermehrt habe) in zwei Räumen dicht beisammen hängen. Die Futter-Ersparniß und der Erfolg lohnen reichlich die größere Mühe. Die Jungen werden von mir, sobald sie allein fressen, in größere Räume gesetzt. Das Verlassen der Eier oder Verhungernlassen von Jungen ist mir noch nie vorgekommen, selten ist ein Ei nicht fruchthaltig und Nester mit 6 Jungen habe ich in den letzten Jahren wiederholt gehabt, sogar zweimal mit 7 Jungen. Man behandle nur die Vögel möglichst naturgemäß und liebevoll, und sie werden den Kenner und Liebhaber reichlich lohnen. Selbst in kleinen Brutkäfigen bekommen meine Vögel zu ihrer größten Wonne von jeher Badenäpfchen mit Wasser, und noch nie sind mir Eier fehl geschlagen durch das Aufsetzen der Weibchen, bevor sie trocken sind, weshalb ich alles gegen das Baden Geschriebene nicht anerkenne. Durch lebhaftes Hin- und Herfliegen, Rütteln und Schütteln wissen sie sich sehr bald so viel zu trocknen, als genügend ist, um nach dieser Richtung keinen Schaden zu verursachen. — Da hört und sieht man nicht dieses unausgesetzte Kämpfen und Beißen streitender Hähne und Weibchen, wie in fliegenden Hecken, und könnte ich noch manche Nachtheile anführen. Ich habe in diesem Frühjahre 10 Kanarien-Paare und je 1 Grauedelfink und 1 Distelfink mit einem Kanarienweibchen in zwei Räumen untergebracht, in dem einen die Hohlroller, im andern die Nachtigal-Schläger, und bin überzeugt, wenn diese Paare so forthecken, wie bis jetzt, der Ertrag wiederum für meine Ansicht sprechen wird. Dabei werden die Vögel durch den nahen Verkehr, in welchem man mit ihnen steht, so zutraulich, daß ich beispielsweise öfter Weibchen am Schwanze vorsichtig in die Höhe heben muß, um nach ihren Jungen sehen zu können.

Es giebt wol Vögel, von denen man unbeschadet zwei oder mehr Weibchen mit einem Hahn zusammensetzen darf, (was auch ich zuweilen thue), es gehören aber hierzu sanfte, verträgliche Thiere.

So habe ich vor 2 Jahren Folgendes erlebt. Die gleich großen flüggen Jungen aus dem einen Nest flogen zu denen im, bezüglich auf dem andern, und während ich durch Krankheit verhindert war, den Vögeln rechtzeitig neue Nester anzuhängen, hatten — ein gewiß seltener Fall — die beiden so verträglichen Weibchen in das eine leer gewordene Nest zusammen 9 Eier gelegt, auf welchen sie friedlich bei einander brüteten.

Noch will ich zum Schluß einige in letzter Zeit in Ihrer Zeitschrift erörterte Fragen nach meinem Dafürhalten, bezl. Erfahrungen beantworten.

Bastarde von Distelfinken, Grauedelfinken und Zeisigen sind (gleich den Mauleseln und Maulthieren) stets unfruchtbar, und wo Fruchtbarkeit behauptet wird, beruht solche sicherlich durch Zusammenleben mehrerer Vögel auf Täuschung. Ferner halte ich es für eine große sich meist bitter bestrafende Thorheit, zwei gehaubte Vögel zusammen zu paaren. Ausnahmsfälle mögen vorkommen, in denen keine Kahlköpfe mit krankhaften Auswüchsen zur Welt gebracht werden, denn nach dem alten lateinischen Sprichwort bekräftigen Ausnahmen nur die Regel. Ich schiebe solche einzelne günstige Ergebnisse auf das Einschlagen der Vögel nach den Großeltern (wie man solche oft beobachten kann). So habe ich z. B. jetzt 1 Paar, dessen Hahn gehaubt ist und die 4 Jungen (ein seltenes Glück, sämmtlich Hähne) ungehaubt; ein anderes Paar, von denen nur das Weibchen gehaubt ist, hat 6 Junge, von denen fünf schöne Hauben haben. Ferner bin ich ein entschiedener Gegner der fortgesetzten Inzucht, denn ich habe in früheren Jahren traurige Erfahrungen in Betreff der Folgen gemacht, wenn man zu nahe Verwandte hecken läßt. So viel ich weiß, sind ja auch alle Menschen- und Thier-Aerzte über das Gesundheitswidrige in dieser Richtung einverstanden. Zu dem Zwecke führe ich genaue Verwandtschafts-Uebersicht, um Nachtheil zu verhüten, und habe wiederholt neue feine Schläger gekauft, mit denen ich also einen doppelten Zweck erreiche.

Zur Brieftauben-Liebhaberei.

Laibach. Dieser Tage fand sich im Taubenschlage eines Adelsberger Taubenbesitzers eine fremde Taube ein, welche durch ihre graue Färbung und durch ihren kleineren Körperbau von den andern Tauben so abstach, daß sie der Besitzer des Taubenschlages einfing. Eine nähere Untersuchung derselben ergab, daß man es mit einer französischen Brieftaube zu thun habe, welche wahrscheinlich durch das schlechte Wetter bis Adelsberg verschlagen wurde und dort im Taubenschlage Futter suchte. Eine dem „Laib. Tgbl." eingesandte Feder derselben trägt die in blauer Stempelfarbe ausgeführte Aufschrift: 748 Concours nationale de Marseille société libre ... abr ... Das Weitere ist nicht leserlich. Es wäre interessant, zu erfahren, wann die Brieftaube ausgesandt worden.

Köln. Am Sonnabend 3. v. M. schickten wieder der Verein „Concordia" und zugleich eine Anzahl außer der Gesellschaft stehender Brieftaubenbesitzer ihre geflügelten Pfleglinge nach Brüssel. Sonntag früh um 5 Uhr wurden dieselben in Freiheit gesetzt. Eine Strecke von 40 Stunden in gerader Richtung, welche die schnellen Segler der Lüfte zu durchmessen hatten, legte die erste, dem Herrn Houbé in unserer Nachbarstadt Mülheim gehörige Siegerin binnen 4 Stunden 10 Minuten zurück. Montag früh um 6 Uhr stiegen 70 Tauben der Gesellschaft „Columbia" zu Gardelegen in die Lüfte. Für diese mag die Wiedererlangung der 77 Stunden entfernten Heimat bei dem herrschenden ziemlich starken Westwinde wol kein Leichtes gewesen sein, weshalb die Herren Richter auch länger als sie geahnt, auf die Ankunft der Preisfliegerinnen harren mußten. Um 1 Uhr 11 Min. wurde der erste Ankömmling vorgezeigt, um 3 Uhr 4 Min. der zweite, beide sind im Besitze des Herrn Andreas Krings. Um 4 Uhr 34 Min. waren acht weitere eingetroffen.

Mittheilungen zur Hebung der Hühnerzucht.

Beantwortung der Frage des Herrn Schüerholz in No. 20 über Befruchtung des Eierstockes des Huhnes, bezüglich des Tretens des Hahnes.

Zur Klärung dieser Sache will ich vorerst meine eigenen Beobachtungen und Erfahrungen mittheilen.

Vor vier Jahren besaß ich einen sehr schönen weißen deutschen Hahn, welcher in Folge eines Beinbruches über drei Wochen einsaß und meine Hühner also nicht treten konnte. Ein anderer Hahn konnte nicht zu meinen Hühnern. Nachdem der Hahn 16 Tage abgesperrt war, legte ich zur Probe 12 Eier von den letzten 8 Tagen einer Glucke unter, von denen 7 Stück ausgingen, 3 andere waren mit todten Jungen ausgefüllt und 2 waren unbefruchtet. Diese beiden letzten waren in Folge des Brütens nur etwas leichter geworden und der leere Raum des Eies war etwas größer, als bei frischen Eiern, sonst waren sie unverdorben und gut und konnten genossen werden; ich verfütterte sie aber gebacken den kleinen Kücken. Die Erfahrung lehrt überhaupt, daß unbefruchtete Eier stets unverdorben beim Brüten bleiben, und wenn faule Eier unter der brütenden Glucke vorhanden sind, so waren diese stets befruchtet, aber sie sind in den ersten Tagen des Brütens abgestorben aus irgend einer bekannten oder unbekannten Ursache. — Der Hahnenstich hatte also bei meinen Hennen 10—16 Tage Wirkung, nur 2 Eier ergaben eine Ausnahme, welche ich mir gut erklären kann, da eins der Hühner 8 Tage mit Legen ruhte und 2 Eier legte nach der Ruhezeit, ohne von dem Hahn getreten zu sein. Bei den

Vögeln wird der Eierstock befruchtet und nicht, wie viele Züchter meinen, der Dotter in seiner größeren Ausbildung, wenn er nach 1—2 Tagen von Eiweiß und der Schale umschlossen wird.

Im vorigen Jahre sperrte ich meine verschiedenen Stämme Hühner am 12. März ab. Am 28. März setzte ich 2 Glucken. Der einen gab ich 12 Spaniereier, der andern 6 Silberbrabanter- und 6 Kochinchinaeier unter. Nach 6 Tagen setzte ich die dritte Glucke mit 4 Brahmaeiern, 4 Spanier- und 4 Silberbrabantereiern. Sämmtliche Eier waren von den letzten 5 Tagen, nachdem also die Hühner 11—15, bez. 20 Tage abgesperrt waren, und dennoch waren bei den 3 Glucken 5 Bastarde, Kreuzungen von Brahma und Silberbrabantern, sowie von Spaniern und Silberbrabantern, bei der letzten Glucke sogar allein 3 Stück. Der Hahnenstich hatte bei den letzten Eiern also 15—20 Tage Wirkung. Noch eigenthümlicher erging es mir bei einem Zwerghühnchen, welches ich im Spätsommer vorigen Jahres von einem Hamburger Züchter mir verschafft hatte. Als ich zu diesem Herrn kam und das Thierchen betrachtete, wurde es gerade von dem im Hofe sich befindlichen Spanierhahne getreten. Herr Buchhändler Frauenholz daselbst, welcher anwesend war, sprach die Ansicht aus, daß dies Treten ohne Wirkung sein müsse, da die Thiere zu verschieden in ihrer Größe seien;*) ich hatte die entgegengesetzte Ansicht. Nach 11 Tagen erst legte an den darauffolgenden Tagen, das Zwerghühnchen mehrere Eier, welche ich einer Glucke unterschob. Von 5 Eiern schlüpften 3 aus und das Ergebniß war: 2 Bastarde von Spaniern und Zwerg und ein reines Zwergküchlein. Das alte Zwerghühnchen hatte also 11 Tage den Samen des Spanierhahnes bei sich getragen und dennoch wirkte er, trotzdem das Hühnchen sehr oft von meinem Zwerghähnchen getreten wurde. Auch in diesem Jahre habe ich Erfahrungen gemacht, welche die obigen Behauptungen bestätigen.

Ebenso hat ein Züchter in Usingen dieselben Erfahrungen gemacht und ein anderer in Homburg. Demgemäß kann unter gewissen Umständen der Hahnenstich volle 3 Wochen Wirkung haben. Tritt eine Ruhezeit im Legen bei dem begatteten Huhne ein, so muß es von Neuem vom Hahne bestiegen werden, und ist der Eierstock von einem jungen, gesunden Hahne befruchtet, so hat der Stich so lange Wirkung, bis das Huhn mehrere oder 8—14 Tage ruht. Daß der Hahn nun aber seine Hennen während der Legzeit dennoch öfter tritt, als nöthig ist, ist gewiß kein Gegenbeweis meiner Behauptungen, denn ein gesunder Hahn bindet sich an keine natürliche Regel in diesem Punkte; er tritt oft führende Glucken, trotzdem sie erst in 4—6 Wochen wieder legen.

*) Herr Frauenholz war nämlich der Ansicht, daß die Begattung nicht richtig stattfinden könne; doch habe ich sogar Bastarde von Kochin- und Zwerghuhn gesehen.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In der Behausung des Hrn. Louis Coridaß in Mosbach baute sich eine Schwalbe ihr Nest, in welches sie 3 Eier legte. Ein Sperling vertrieb die Schwalbe aus ihrem Eigenthum, legte 1 Ei dazu und brütete sämmtliche Eier aus, so daß nach der Brut 3 Schwalben und 1 Sperling das Licht der Welt erblickten. Muthwillige Jungen fanden ihr Vergnügen daran, das Nest zu zerstören, in der Meinung, daß die Insassen lauter Sperlinge seien und hierbei ging der junge Sperling auch zu Grunde, während die 3 Schwalben von dem Hauseigenthümer in ein leeres in seinem Stalle befindliches Nest, woselbst noch ein zweites Schwalbennest mit 4 Jungen sich befand, verbracht wurden. Der alte Sperling aber fütterte die 3 jungen Schwalben nach wie vor, bis die Schwalben des im Stalle befindlichen zweiten Nestes den Sperling vertrieben und die jungen Schwalben bis zu ihrem Ausflug pflegten.

Briefliche Mittheilungen.

..... Meinen Honigsauger (Coereba cyanea) füttere ich vor wie nach mit einer fein gestoßenen und trocken vorgesetzten Mischung von zwei Theilen Zwieback und je einem Theile süßer Mandeln und Zucker; Fliegen nimmt der Vogel sehr gern.

Mein Organist*) (Euphone violacea) hat sich längst ins Grab gesungen. Er hatte sich hier keiner besonderen Beachtung zu erfreuen.

Anlangend die Brut meiner schwarzköpfigen Zeisige (Astragalinus cucullatus), so kann ich Ihnen darüber nur wenig mittheilen, da ich dieselbe nicht stören mochte. Meine Erfahrungen darüber gipfeln etwa dahin: Ich hatte, bei meinem großen Interesse an diesen Vögeln und bei beständiger Beobachtung derselben, vor der Brut weder eine größere Lebhaftigkeit, noch eine Feindseligkeit gegen die anderen Bewohner der Vogelstube wahrgenommen, auch keine Begattung;**) nur fütterte das Männchen bisweilen sein Weibchen aus dem Kropfe. Ende April bemerkte ich das Letztere häufig ein nur vorn offenes Harzer Bauerchen untersuchen und besichtigen, in welchem ein Paar Zebrafinken ein Nest gebaut hatte. Diese Untersuchungen arteten endlich in offenen Kampf aus, dessen Ende die Vertreibung der Zebrafinken war. Nun trugen die Zeisige Nistmaterial in den Käfig, überschütteten damit die in dem Neste der Zebrafinken liegenden Eier, und endlich wurde das Weibchen unsichtbar, worauf es das Männchen mit Futter versorgte. Kein anderer Vogel durfte sich nun ungestraft dem Nistkäfige nähern. Nach nochmals 14 Tagen zeigte sich das Weibchen wieder und trug mit dem Männchen abwechselnd Futter nach dem Neste. Mit großer Spannung wartete ich auf den weiteren Erfolg, und als ich die Jungen etwa 14 Tage alt glaubte, sah ich nach und fand schon ziemlich kräftige Vögelchen vor. Etwas später wurden sie laut und riefen nach Futter. Am 12. Juni flog ein junger Vogel aus dem Neste, ein zweiter folgte am 14. d. M.

Der letztere, sogleich als Männchen, an weit lebhafterer und röthlicher Färbung erkennbar, war weit schwächer als der andere, ein Weibchen. Dies ist jetzt völlig ausgewachsen und fliegt munter umher. Leider verunglückte das junge Männchen durch meine Schuld.

Die Vögelchen sind nur mit weißer Hirse und Glanzkorn, zum Theil gequellt, von den Eltern aufgezogen. Ich gebe, außer frischen Ameisenpuppen, kein anderes Futter und

*) Ich habe ihrer noch sehr schöne. Dr. K. R.

**) Diese geschieht bei den meisten Vögeln des Morgens ganz früh, wenn Niemand in der Vogelstube ist. D. Red.

finde, daß junge Vögel dabei sehr gut gedeihen, wenn sie nur erst da sind.

Vorgestern untersuchte ich sämmtliche Nester der Zebrafinken, da sie fortwährend auf Eiern saßen und keine Junge erbrüteten. Ich fand über 40 Stück unbefruchtete Eier, nahm diese und sämmtliche Weibchen fort, um letztere 4 bis 6 Wochen allein zu lassen.

Seit April sind nun ein Paar Kubafinken in meiner Vogelstube, sie treffen aber keine Anstalten, um zu nisten. Dasselbe ist mit den grauköpfigen Zwergpapageien der Fall. Ich habe jetzt daher gar keine brütenden Vögel. Dagegen treiben feine Wasserstrahlen aus einem neu angelegten Springbrunnen hoch in die Vogelstube hinauf und kühlen die jetzige tropische Hitze ein wenig ab.

Heer, Kreisgerichtsrath in Striegau.

.... Ich freue mich, Ihnen mittheilen zu können, daß in meinem Parkgarten seit vielen Jahren nicht so viele junge Vögel aller Art flügge geworden, als in diesem, trotz des kalten und regnerischen Mai und Juni.

Landkammerrath Vogt in Blankenhain bei Weimar.

Aus den Vereinen.

Bericht über die 1. allgemeine Geflügel-Ausstellung des Vereins „Fauna" zu Düsseldorf.

(Fortsetzung.)

Laut Katalog enthielt die Ausstellung: 362 Nummern Tauben, 302 Nrn. Hühner. 16 Nrn. verschiedenes Geflügel, 50 Nrn. Papageien, etwa 80 Nrn. Sing- und Ziervögel und 39 Nrn. Kaninchen. Wie schon Eingangs erwähnt, trafen noch am ersten Ausstellungstage einige neue unangemeldete Sendungen ein, welche leider nicht mehr in den Nachtrag des Katalogs aufgenommen werden konnten. Die Zahl der wirklich ausgestellt gewesenen Nummern übertrifft daher die im Katalog angegebenen um ein bedeutendes. Der Ordnung des Katalogs folgend beginnen wir zunächst mit den

Tauben.

Ihre Königliche Hoheit, Frau Prinzessin Karl von Preußen hatte neun prächtige Paare, ebensoviel Rassen vertretend, gesandt, unter denen namentlich die blauen egyptischen Mövchen, die schwarzen Indianer und französischen Kropftauben ungetheilt Bewunderung fanden.

Wildtauben. Außer den im Katalog aufgeführten Ringeltauben und sechs Paar der reizenden Indischen Turteltäubchen trafen später noch 1 Paar amerik. Wandertauben und 1 Paar der kostbaren Mähnen- oder Nikobartaube (vom Zool. Garten zu Antwerpen) ein, welche sämmtlich in Kurzem Käufer fanden.

Bagdetten. Deutsche waren nur mittelmäßig vertreten, die weißen des Herrn R. Geßner in Zeitz verdienen allein hervorgehoben zu werden. Französische waren nur in zwei nicht besonders hervorzuhebenden Paaren ausgestellt. Besser vertreten waren die Englischen oder Karrier, unter denen die schönsten die schwarzen des Herrn Dr. Schönfeld in Düsseldorf und die blauen von Herren Baily et Son in London waren. Wenig nach standen diesen die schwarzen des Herrn Th. Hesse in Köln, die blauen des Herrn Donny Sapin in Gent und die braunen des Herrn Dr. Schönfeld.

Die „Türken" in vier Paaren vertreten, mit Stillschweigen übergehend, kommen wir zu den „Indianern" und erwähnen zunächst der prächtigen schwarzen der Herren Baily et Son, welche indeß, des hohen Preises (100 Thlr.) wegen nur Bewunderer, aber keine Käufer fanden. Ein anderes schwarzes und ein weißes Paar derselben Londoner Firma wurden dagegen von den weißen des Herrn R. Geßner in Zeitz übertroffen. Auch die rothen Indianer des Herrn Hesse in Köln und die gelben des Hern Dr. Schönfeld in Düsseldorf verdienen lobend erwähnt zu werden.

Kleine (sogenannte sächsische) Indianer waren in 20 Paaren vertreten, unter denen jedoch nur die rothen des Herrn Büddinghausen in Kalk mustergültig genannt werden konnten.

Brieftauben können selbstverständlich nur nach vorhergegangenem Wettfliegen geschätzt werden und entzogen sich daher auch auf unserer Ausstellung jeder Beurtheilung und Prämiirung.

Mövchen. Eine sehr schöne Sammlung Schildmövchen (11 Paar) sendete Herr C. Gilliam in Aachen, unter denen 1 Paar grau geschuppte und 1 Paar rothe den ersten und zweiten Preis erhielten. Auch die weißen des Herrn A. Mayer in Düsseldorf wurden in gleicher Weise ausgezeichnet. Unter den Egyptischen Mövchen waren unstreitig die weißen mit schwarzem Schwanz des Herrn Hesse in Köln als das mustergültigste und eleganteste Paar zu bezeichnen. — Auch die schwarzen und weißen des Herrn Donny Sapin in Gent, sowie die weißen des Herrn Büddinghausen in Kalk ließen wenig zu wünschen übrig. — Chinesische Mövchen waren — außer den Eingangs erwähnten der Frau Prinzessin Karl — nur durch 2 Paare vertreten, von welchen das dem Herrn Hesse gehörende Paar den zweiten Preis erhielt.

Tümmler in etwa 50 Nummern vorhanden, unter denen eine Sammlung Kopenhagener Elstertümmler von C. Gram in Kopenhagen, die schwarzen Kalotten des Herrn Bernhöft in Lübeck und die schwarzen mit weißen Schlägen und Schwanz des Herrn C. Petermann in Rostock besondere Erwähnung verdienen. — Englische Almonds-Tümmler waren nur durch 4—5 Paare vertreten, welche sämmtlich keinen Anspruch auf Mustergültigkeit erheben konnten, da keines derselben vielfarbig und auch nicht einmal unter sich gleichmäßig einer Farbe war.

Römische Tauben, Montauban, Hühnerschecken und Malteser waren nur in wenigen Paaren ausgestellt. Unter diesen wurden die blauen Römer und weißen Montauban des Herrn Dr. Schönfeld, die schwarzen Hühnerschecken von bedeutender Größe des Herrn R. Geßner in Zeitz und die weißen Malteser des Herrn L. Römer in Witten prämiirt. — Pfauentauben in einigen 20 Nummern, von denen indeß nur die blauen des Herrn J. F. Röhrig in Frankfurt a. M. den ersten Preis errangen. Unter den Uebrigen verdienen die schwarzen des Herrn Dr. Schönfeld und die weißen mit schwarzen Schilden des Herrn Donny Sapin in Gent vorzugsweise genannt zu werden. — Perrücken in 24 Nummern, unter denen die einfarbigen gelben des Herrn Hesse in Köln ohne Frage den ersten Rang einnahmen. Diesen schlossen sich zunächst an: die weißen, doppelkuppigen des Herrn Wujanz in Kumschitz; auch die schwarz-gemönchten des Herrn Donny Sapin in Gent und die gelb-gemönchten der Herren Baily et Son in London verdienen wegen ihrer brillanten Erscheinung erwähnt zu werden.

Kropftauben. Im Ganzen sehr gut, namentlich die französischen in sehr schönen Exemplaren, und in allen Farbennüancen vertreten. Herr Donny Sapin in Gent und Herr Michael in Berlin waren außer Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Prinzessin Karl von Preußen die einzigen Aussteller dieser (französischen) Rasse und die Tauben beider Herren wurden durch erste und zweite Preise ausgezeichnet. — Unter den englischen Kropftauben fanden sich sehr schöne Exemplare; die beiden Paare der Herren Baily et Son standen indeß unerreicht da. Unter den deutschen Kröpfern zeichnete sich das schwarz und weiße Paar des Herrn Schnettler in Solingen durch erstaunliche Größe — unter den böhmischen dagegen das isabellfarbige Pärchen des Herrn C. Müller in Lomatzsch durch besondere zierliche Bauart aus.

Unter den Trommeltauben verdienen die Bucharen des Zool. Gartens in Köln, welche Herr Direktor Funck uns freundlichst zur Ausstellung überließ, als das prachtvollste Taubenpaar der Ausstellung hervorgehoben zu werden. — Unter den zahlreichen Varietäten der Feldtaube (Schwalben-, Schild-, Eis-, Gimpel-, Pfaffen-, Storchtauben 2c.) zeigten sich, namentlich in Bezug auf Färbung, viele hübsche Paare, welche bei geringen Preisen bald Käufer fanden.

(Fortsetzung folgt.)

Französisches Geflügel.

Aufgemuntert durch die vielfachen Beweise der Zufriedenheit, namentlich von Seite meiner rheinländischen und norddeutschen Kundschaft, erlaube ich mir auch dieses Jahr wieder den Freunden von feinem Geflügel meine Vermittlung zum Bezug von jungen Stämmen aus Frankreich anzubieten. Obschon ich ausschließlich mit größern und durch Erfahrung erprobten höchst ehrenwerthen Züchtern in Verbindung stehe, erachte ich es im Interesse meiner verehrlichen Kunden, wenn ich mich entschließe, dieses Jahr die Einkäufe persönlich an Ort und Stelle zu machen, um den Vortheil eigener Auswahl ungehindert benutzen zu können. Ich gedenke zu diesem Behuf, Ende dieses Monats meine Reise anzutreten, und lade die Liebhaber ein, mir Ihre Aufträge bis spätestens den 28. August hieher einzusenden, wobei ich zur Verhütung von Verspätungen bemerke, daß gewöhnliche Briefe aus Deutschland 2 Tage, chargirte meistens 3 Tage unterwegs sind. — Was bis jetzt den Hauptgegenstand meiner Bezüge aus Frankreich bildete, das sind die schönen schwarz und vollhaubigen Crève-Coeurs, die überall ungetheilten Beifall gefunden haben. Daran reihen sich die La Flèche-, Houdan- und Le Mans-Hühner, ebenso Rouen-Enten, Toulouser- und Alençoner-Gänse, sowie im Gebiet Kaninchen die Léporiden, Normandiner u. dgl. Mit Vergnügen übernehme ich auch Aufträge auf Gold- und Silberfasanen, Truthühner ꝛc., über deren Preise ich jedoch vor der Hand keine Auskunft zu geben vermag. Diesjährige erwachsene Hühner dürften sich einschließlich meiner Provision und aller Spesen mit Ausnahme des Korbes durchschnittlich auf Fr. 13—15 für das Stück (Hahn oder Henne) franco Zürich stellen; Hähne ohne Hennen eine Kleinigkeit höher. Vorjähriges Geflügel ist in dieser Jahreszeit kaum mehr zu finden, da in Frankreich durchweg mit jungen Stämmen gezüchtet wird. Ich leiste vollkommene Garantie für reine Rasse und tadellose Beschaffenheit der zu bestellenden Hühner ꝛc., und werde, wie immer, bemüht sein, durch alle wünschbaren Vorkehrungen bezügl. Verpackung und Futterversorgung allen Zufällen der Reise von Zürich aus, die auf Kosten und Risiko des Empfängers geschieht, vorzubeugen. Frisch ankommende weitgereiste Hühner sind jeweilen (selbst zur Nachtzeit) sofort auszupacken, zu tränken, mit geweichtem altbackenen Weißbrot zu füttern und in einem reinlichen vor Zugluft wohlverwahrten Stalle unterzubringen. Das gleiche Futter ist auch am nächsten Tage zu reichen nebst frischem Wasser und Grünzeug. Der Uebergang zur Körnerfütterung darf nur allmälig geschehen. Allfällig eintretende Appetitlosigkeit wird am geeignetsten mit ein- oder zweimaliger Eingabe eines Pfefferkorns, und das Entgegengesetzte, nämlich harter Kropf, durch Futterentziehung bei frischem Wasser beseitigt.

Außersihl-Zürich. **A. Zumpf.**

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Zu verkaufen oder zu vertauschen: 3 große Pfauen, 2 Hähne und 1 Henne, bei [478

F. Lütkemeyer in Coburg.

Zwei Paar Ind. Perlhalsband Täubchen, schön im Gefieder, à Paar 5 Thaler, verkauft **E. F. Hitzschke,** Naumburg a. S. [479

Ich erhalte in nächster Zeit eine größere Parthie Wasservögel und nehme Bestellungen schon jetzt entgegen für

Braut-Enten,
Mandarin-Enten,
schwarze Schwäne,
mehrere Sorten amerikanische Gänse.

Die Thiere kommen von einem Privatmanne und sind gut in Federn. **E. Geupel-White,**

480] Leipzig.

K. Kittel's Naturalien- u. Thier-Handlung,

Hamburg, St. Pauli,

Spielbudenplatz No. 21,

hat in den letzten Sendungen erhalten: graue, Surinam-, Amazonen- und Portorikopapageien, Halsband-, Ring-, Goldkopf-, Gras-, Karolinen-, Quäker-, Schön- und Pracht-Sittiche. Dom.-Kardinäle, Nasen- und Rosakakadu, Nonnen Rosellas, blaßköpfige Rosellas, Pennantis, Inseparables, Sperlingspapageien, Safranfinken, Diamantvögel, Zebrafinken, Muskatvögel, Orangefasänchen, Goldbrüstchen, Bandvögel, Silberfasänchen, Astrils, kleinste Elsterchen, Tigerfinken, Madagaskarweber, Paradieswitwen, Türkisinen, chin. Sonnenvögel, Königssittiche, blaue Gebirgs-Lori, 1 großer sprechender gelbhaubiger Kakadu, 30 verschiedene Arten Affen, 2 Leoparden, 4 Zibetkatzen, 2 Silberschakals, 1 Ameisenbär und 6 Shetsland-Ponies.

Graue Papageien, mit Segelschiffen importirt, empfehle à Stück 10 Thlr., sowie 6000 Stück Goldfische, à 100 Stück 17 Thlr. [481

Vogelbälge! Preisverzeichnisse über Kolibris und diverse andere Arten sind erschienen und stehen gratis und franko zu Diensten. [482

G. Benda in Coburg.

Zu verkaufen: 2 Paar importirte Zebrafinken à 4½ Thlr.

483] **Gustav Schmey** in Coburg.

Ein Weibchen des rothen Kardinal zu kaufen gesucht. Näh. in der Expedition. [484

1 Paar kräftige Lady Amherst-Fasanen, ½ Blut, Kreuzung von Gold-Fasanen, 12 Paar Vénérés, König-Fasanen, } Junge von 1874, sind abzugeben. [485]

Auskunft giebt die Redaktion der „Gefiederten Welt".

Lachtauben hat zu verkaufen

Herm. Durchschlag,

486] Woldegk, Mecklenburg-Str.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 27. August 1874. Nr. 35.

Inhalt:

Zum deutschen Geflügelzüchter-Tage. —
Nachruf. —
Die Thierversteigerung in Antwerpen. —
Aus den Vereinen: Düsseldorf (Fortsetzung). —
Bücher- und Schriftenschau. —
Berichtigung. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.

Zum deutschen Geflügelzüchter-Tage.

Bei Gelegenheit der Ausstellung des Hamburg-Altonaer Vereins traten am 15. August die Preisrichter und viele andere anwesende Geflügelliebhaber auf Anregung des Herausgebers der „Gefiederten Welt" zu einer vorläufigen Berathung zusammen, über die von dem Stettiner Verein ausgegangene oder wenigstens doch neu aufgenommene Idee eines dritten allgemeinen deutschen Geflügelzüchter-Tages. Nachdem dieselbe in wirklich eingehender Weise nach allen Seiten hin für und wider beleuchtet worden, faßte die Versammlung den Beschluß, ihr Urtheil dahin abzugeben, daß die Wiederholung einer solchen Zusammenkunft durchaus nothwendig erscheine. Um aber für diesmal nicht wiederum einerseits einer mangelhaften Theilnahme und andererseits end- und resultatlosen Berathungen entgegensehen zu müssen, einigte man sich dahin, einen Vorort zu wählen, und an demselben die Organisation in die Hände eines erfahrenen und für die Sache begeisterten Mannes zu legen. Man wählte Stettin und dort den Vorsitzenden der Ornithologischen Gesellschaft, Herrn A. Creutz, für den ehrenvollen Auftrag, die Angelegenheit nun in entsprechender Weise zum Ziele zu führen, sich mit allen hervorragenden Persönlichkeiten auf den verschiedenen Gebieten (Hühner-, Tauben- und Stubenvogelliebhaberei) in's Einvernehmen zu setzen und dann einen vollständig ausgearbeiteten Plan für die Berathungen des Geflügelzüchter-Tages durch die drei Zeitschriften als Einladung zu veröffentlichen.

Indem ich im Auftrage der Versammlung allen Freunden unserer Bestrebungen die Theilnahme an dem bevorstehenden Kongreß warm und dringend an's Herz lege, bemerke ich noch, daß die folgend verzeichneten Geflügel-Liebhaber und -Kundigen anwesend waren und fast sämmtlich auf das lebhafteste an den Berathungen sich betheiligten: Oettel-Görlitz, Gebrüder Wilhelm und Ch. Birk-Wiesbaden, J. F. Nöhrig-Frankfurt a./M., E. E. Prosche-Dresden, B. Jakob-Wiesbaden, A. Mehnert-Goslar, Petzold und Koppe aus Berlin, A. Gatow-Stettin, H. Marten-Linden bei Hannover, J. Baur-Kreuznach, Arthur Donner, E. Hamann aus Altona, K. Noltenius-Bremen, H. Kronenwerth, L. Kohrs, Ferdinand Lorenhagen, T. Sievers, J. G. Hemmann, E. L. Witte, E. T. W. Arens und der Präsident des Vereins Julius Völschau aus Hamburg; außerdem noch die Ornithologen Herren Dr. Dorner-Hamburg, Dr. Finsch-Bremen und Graf Noedern-Breslau.

Schließlich bitte ich, daß jeder Freund der Sache seine Meinung, bezüglich Vorschläge, Anträge u. s. w., Herrn A. Creutz, Präsident des Ornithologischen Vereins in Stettin, mittheilen wolle.

Dr. Karl Ruß.

Nachruf.

Die deutsche Wissenschaft ist von einem schweren Verluste betroffen worden.

Am 21. Juli 1874 Abends gegen 11 Uhr, verschied nach längerem, in der letzten Zeit qualvollem Leiden, noch in der Blüte seines Lebens stehend, der in weiteren Kreisen, insbesondere auf dem Gebiete der Ornithologie bekannte Naturforscher und Schriftsteller

Ferdinand Freiherr von Droste-Hülshoff,

Präsident der deutschen Ornithologen-Gesellschaft und Direktor der zoologischen Sektion für Westfalen und Lippe.

Geboren auf dem Hause Hülshoff bei Münster in Westfalen am 16. Februar 1841, schloß er eben daselbst, umgeben von seinen Angehörigen, seine irdische Laufbahn ab. Seine erste Jugend verbrachte der Verstorbene ausschließlich auf dem Lande, wo sich seinem empfänglichen Gemüthe die Liebe zur Natur und namentlich zu der dieselbe belebenden Thierwelt tief einprägte. Einen entscheidenden Ein-

fluß darauf übte vorzüglich der Umgang aus mit seinem vor wenigen Jahren verstorbenen Oheim, dem Freiherrn Johannes von Droste-Kerkerink zu Stapel, einem ebenso scharfen Beobachter als eifrigen Förderer der Zoologie, welcher zwar aus Bescheidenheit mit seinen Erfahrungen niemals an die Oeffentlichkeit getreten ist, dem jedoch mehrere noch lebende Naturforscher werthvolle Mittheilungen zu verdanken haben, wie er denn auch als Geflügelzüchter bekannt war und eine reiche Insektensammlung hinterlassen hat. Sodann lernte Droste auch frühzeitig den jetzigen Professor der Zoologie an der Forstakademie zu Neustadt Eberswalde, Dr. Altum, kennen, mit dem er bis an sein Ende eng befreundet blieb, und welcher besonders sein Interesse an der Vogelwelt weckte. So kam es, daß er schon als Knabe sich eine Eiersammlung anlegte, die im Jahre 1858 nach Acquisition der vom verstorbenen Oberbürgermeister von Olfers hinterlassenen Vogeleier bereits manche werthvolle Stücke enthielt und die Grundlage seiner späterhin recht reichhaltigen Sammlung bildete. Im Sommer des letztgedachten Jahres und in seinem 17. Lebensjahre ereilte ihn während seines Aufenthaltes auf dem Gymnasium zu Münster, das er seit Oktober 1855 besuchte, nach vorangegangener Erkältung und mehrmonatlichem Husten am 17. Juli unvermuthet ein Blutsturz, ein Ereigniß, welches mit Rücksicht auf seinen zarten Körperbau seine Eltern veranlaßte, ihn vom Gymnasium fortzunehmen und seine fernere wissenschaftliche Ausbildung in der gesunden Landluft durch Privatunterricht fördern zu lassen. Von jetzt ab widmete er sich vollständig dem Naturstudium, insbesondere, als in Folge zu eifrigen Jagens der Husten sich wieder einstellte und er im Frühjahr des nächsten Jahres abermals einen Blutsturz bekam, somit die Aussicht auf Wiedereintritt ins Gymnasium mehr und mehr schwand. Mit Ausnahme eines mehrwöchentlichen Aufenthalts in dem Kurorte Soden am Taunus in den Jahren 1859 und 1860, von wo er eine reiche Ausbeute an Schmetterlingen mitbrachte, verweilte er bis zum Juni 1862 in Hülshoff und abwechselnd auch in Münster. In Folge mehrfacher Rückfälle war er sodann genöthigt, auf längere Zeit das mildere Klima am Bodensee und Genfersee aufzusuchen und begab sich hierauf Ende Juli 1863 zur Nachkur zum ersten Male nach der Nordsee-Insel Borkum, wo er bis zum 1. September jenes Jahres verweilte. Das reiche Vogelleben jener Insel gewährte ihm Gelegenheit zu zahlreichen Beobachtungen und zur Erweiterung seiner ornithologischen Kenntnisse, als deren Früchte eine Reihe von Publikationen im „Journal für Ornithologie" in den Jahren 1864 — 1868 anzusehen sind. Bereits im Jahre 1862 hatte Droste — damals 21 Jahre alt — mehrere Aufsätze über die Waldschnepfen und die Wasserschnepfen in der naturwissenschaftlichen, zu Münster i. W. unter der Leitung der DD. Michelis und Altum erscheinenden Zeitschrift „Natur und Offenbarung" veröffentlicht. Der erstere Aufsatz enthält u. A. eine höchst anmuthige Schilderung des Schnepfenstrichs. Die Insel Borkum besuchte er von nun ab regelmäßig bis zum Jahre 1868 auf mehrere Wochen, selten im Frühjahr, meistens im Sommer und Herbst. Im Winter hielt er sich gewöhnlich in Süddeutschland und zwar vorwiegend in Freiburg i. B. auf, bei welcher Gelegenheit er die Bekanntschaft vieler dortigen Zoologen machte und mit Baron König-Warthausen in sehr freundschaftliche Beziehungen trat. Außerdem besuchte er Holland, wo er im Reichsmuseum zu Leyden arbeitete, sodann Hannover, Holstein und andere Gegenden Deutschlands. Auf der 16. Versammlung der Deutschen Ornithologengesellschaft zu Kiel, Anfang Juni 1868, wurde Droste trotz seines Widerspruchs zum Geschäftsführer der Gesellschaft gewählt und er brachte neues Leben in dieselbe, welche, in Folge des Ausscheidens des Dr. Cabanis u. A., sowie der Gründung der Berliner Gesellschaft, dem Erlöschen nahe schien.

Im Jahre 1868 vollendete Droste auch sein größeres ornithologisches Werk, „Die Vogelwelt der Nordsee-Insel Borkum", welches im Beginn des nächstfolgenden Jahres im Selbstverlag des Verfassers und in Kommission bei Niemann in Münster in Westfalen erschien. Dasselbe gibt in einem ziemlich starken Bande nach einer kurzen topographischen Einleitung eine anziehende Schilderung des Vogellebens auf Borkum und der benachbarten „Eierinsel" Rottum, nebst einer systematischen Uebersicht aller dort nistenden oder auch nur zeitweise sich aufhaltenden Vögel und schließt mit einer Uebersicht der Vögel an den südlichen Nord- und Ostseeküsten. Das Werk machte in der gelehrten Welt über die Grenzen Deutschlands hinaus Aufsehen und wurde in zahlreichen Blättern im allgemeinen sehr günstig beurtheilt, wenn auch nicht ausbleiben konnte, daß gelegentlich einzelne Mängel und Irrthümer zur Sprache kamen. Wir verweisen in dieser Beziehung speziell auf die Rezension des Herausgebers dieser Zeitschrift in Gottschall's „Blätter für literarische Unterhaltung". Der Verfasser wurde in Anerkennung seiner Verdienste um die Naturwissenschaft von mehreren in- und auswärtigen gelehrten Gesellschaften ehrend ausgezeichnet. Wir erwähnen hier die Zool. Soc. of London, welche ihn zu ihrem Korrespondirenden und den k. k. Zool. botan. Verein zu Wien, der ihn zu seinem ordentlichen Mitgliede ernannte. Der berühmte russische Gelehrte, Baron von Middendorff, gedenkt des erwähnten Buches, sowie zahlreicher sonstiger Publikationen des Baron Droste an mehreren Stellen seines umfangreichen, noch in der Herausgabe begriffenen Werkes über die Ergebnisse seiner Reisen in Sibirien in rühmender Weise.

Inzwischen war das chronische Lungenleiden des Dahingeschiedenen langsam fortgeschritten, es war jedoch immer noch Hoffnung auf zeitweisen Stillstand vorhanden, als der im Sommer 1870 ausge-

brochene französische Krieg ihn veranlaßte, in Bethätigung seines Patriotismus sich als freiwilligen Krankenpfleger auf den Kriegsschauplatz entsenden zu lassen. Ein zweimaliger Aufenthalt in Frankreich und die damit verbundenen Strapazen verschafften ihm zwar in Anerkennung seiner Verdienste das eiserne Kreuz II. Klasse, gaben aber seiner Gesundheit den letzten Stoß. Leidend aus dem Feldzuge zurückgekehrt, konnte er sich nicht wieder erholen und eilte von da ab sichtbar mit raschen Schritten seinem Ende entgegen. Zwar betheiligte er sich noch lebhaft, soweit sein Gesundheitszustand es irgendwie zuließ, an allen das Gebiet der Zoologie berührenden wissenschaftlichen Bestrebungen, und manche Vorträge in Vereinen und zahlreiche Aufsätze gaben bis in die neueste Zeit ein Zeugniß seiner rastlosen Thätigkeit auf diesem Felde. Insbesondere seit dem Tode seines intimen Freundes, des unvergeßlichen J. H. Blasius, lag ihm das Gedeihen der „Deutschen Ornithologen-Gesellschaft", deren Leitung er auch noch im Jahre 1873 auf dringendes Zureden seiner Freunde sich fernerhin unterzog, sehr am Herzen, wie seine — leider gescheiterten — Bemühungen im Jahre 1872, eine Einigung mit dem Berliner Verein zu erzielen, hinlänglich bekunden. Im letztgedachten Jahre übernahm er auch die Direktion der hauptsächlich auf seine Anregung gegründeten zoologischen Sektion des westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst, wie er auch als thätiges Mitglied des westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht an dessen Versammlungen und der im Jahre 1873 veranstalteten Ausstellung sich betheiligte. Die auf Anregung dieses Vereins von der Regierung zu Münster unter dem 19. März 1873 erlassene Polizei-Verordnung zum Schutze der nützlichen Vögel gründet sich vorzugsweise auf seine Vorschläge. In seinem im Druck erschienenen Referate über die Vogelschutzfrage (Münster 1872 bei Brunn) klassifizirt er, abweichend von andern ähnlichen Publikationen, zum ersten Male die verschiedenen Vogelspezies in zutreffender übersichtlicher Weise in ihren Beziehungen zur Landwirthschaft, Forstwirthschaft, zum Gartenbau, zur Jagd und Fischerei und faßt alsdann die Resultate in einem allgemeinen Schlußurtheil zusammen. Leider gestattete seine überaus angegriffene Gesundheit eine Betheiligung an dem im September 1873 in Wien zusammengetretenen internationalen Kongreß zur Berathung der Waldschutzfrage, auf welcher auch die Schonung der nützlichen Vögel zur Sprache kam, und zu welchem die „Deutsche Ornithologen-Gesellschaft" zur Entsendung eines Mitglieds als Sachverständigen aufgefordert worden war, nicht. (Der statt dessen von ihm in Vorschlag gebrachte Vereins-Vice-Präsident v. Heuglin erhielt in Folge unrichtiger Adressirung durch Versehen der Wiener Kanzlei die Einladung zu spät, um noch rechtzeitig zu den Sitzungen eintreffen zu können.

Im Winter 1873—74, wo Droste sich vorzugsweise in Münster aufhielt, wurde sein Befinden beständig schlechter. Die Lungenblutungen wiederholten sich und hektische Fieber rieben seine Kräfte mehr und mehr auf. Er konnte sich nur selten noch an den Sitzungen des zoologischen Vereins betheiligen und ließ meistens die ausgearbeiteten Vorträge durch einen Andern verlesen. Seine literarische Thätigkeit und den sonst so regen Briefwechsel mit Freunden und Gelehrten nach den verschiedenen Gegenden Europa's mußte er zuletzt fast ganz einstellen. Auch eine Uebersiedelung nach Hülshoff kurz nach Ostern d. J. brachte keine Besserung, wozu wol die anhaltende Dürre und große Hitze dieses Sommers wesentlich beitrugen. Er war fast stets an das Bett gefesselt, wo ihn das Fieber nur selten noch auf kurze Zeit verließ, bis endlich am 21. Juli Abends ein wiederholter Blutsturz seinen Leiden ein Ende machte. Die Wissenschaft verliert in ihm einen hochbegabten, rede- und schriftgewandten Jünger, der wol ohne Frage als eine der bedeutendsten Kapazitäten auf dem Gebiete der Zoologie vorzügliche Leistungen in Aussicht stellte, sofern nicht ein vorzeitiger Tod ihn aus dieser Welt abgerufen hätte. An Schärfe der Beobachtung und emsigem Bemühen nach Erweiterung seiner Erfahrungen dürfte er unseren berühmtesten Naturforschern würdig zur Seite stehen. Leider unterbrach der Tod auch ein von ihm im Auftrage der zoologischen Sektion für Westfalen und Lippe in Angriff genommenes größeres Werk, zu welchem er bereits reiches Material gesammelt hatte. Dasselbe sollte eine Naturgeschichte der Wirbelthiere der Provinz Westfalen und der Fürstenthümer Lippe und Waldeck in 3 Bänden umfassen. Die Ausführung des I. Bandes, enthaltend a) Biographische Nachrichten über verstorbene Zoologen Westfalens, welche sich um Erforschung der Wirbelthiere Westfalens verdient gemacht haben, b) landschaftliche Physiognomie der Provinz mit Berücksichtigung des Einflusses auf die Thierwelt, c) Naturgeschichte der Säugethiere, sowie des II. Bandes, enthaltend die Naturgeschichte der Vögel, hatte der Verstorbene übernommen.

Wenn wir zum Schluß noch hervorheben, daß Droste, jederzeit liebenswürdig im Umgange und frei von allem aristokratischen Stolze, ein gefühlvolles Herz und treue Freundschaft bewahrte, werden auch diejenigen unserer Leser, welche ihn nicht persönlich gekannt haben, die tiefe Betrübniß ermessen können, die sich, bei der Nachricht von seinem plötzlichen Hinscheiden, der ihm nahe stehenden zahlreichen Freunde bemächtigte. *

Freiherr Ferdinand von Droste wird unter uns in seinen Werken fortleben. Als Naturforscher und Schriftsteller hochgeachtet und als edler Mensch hochgeschätzt, müssen ihm Alle ein ehrendes und liebendes Andenken bewahren, die ihn kannten. Unterzeichneter betrauert in ihm einen theilnehmenden bewährten Freund, der mit Rath und That auch der „Gefiederten Welt" nahe stand. Dr. Karl Ruß.

Die Thierversteigerung in Antwerpen.

Das uns soeben zugegangene „Avis" der Société Royale de Zoologie d'Anvers zeigt auch in diesem Jahre eine sehr großartige Kollektion von Säugethieren und Vögeln, nebst Schlangen.

Die Versteigerung findet, wie schon bemerkt, am 8. und 9. September von 10 Uhr früh bis 4 Uhr Mittags statt. In dem Cirkular sind aufgeführt: einige fünfzig größere Vierfüßler, außerdem zahlreiche Affen und große indische fliegende Hunde, ferner große Vögel, wie Strauße, Geier, Schlangenadler, Kraniche, Jabiru- und andere Störche, Marabus, Ibise, Flammings, Purpurhühner, Pelekane, Schwäne, Gänse, Enten u. drgl. in überaus großer Verschiedenheit und Reichhaltigkeit, ferner Fasanen in zahlreichen Varietäten, Hühner in vielen Rassen und andere Hühnervögel in großer Mannichfaltigkeit, besonders Sonnerats, sowie Wachteln, Perlhühner, Pfauen, Talegallas und Hokkos, sodann eine mannigfaltige Sammlung verschiedenartiger Taubenrassen, außerdem Nashornvögel, Tukane, Turako's und dergleichen; eine sehr große Kollektion der verschiedensten Papageien und Glanzdrosseln, darunter namentlich langschwänzige, sowie alle kleineren Stubenvogelarten, Prachtfinken, Widahfinken, Webervögel, andere Finken, Drosseln, Stare und verwandte Vögel in namhafter Reichhaltigkeit; schließlich auch mehrere große Schlangen.

Aus den Vereinen.

Bericht über die 1. allgemeine Geflügel-Ausstellung des Vereins „Fauna" zu Düsseldorf.

(Fortsetzung.)

Hühner.

Wildhühner. Diese beschränkten sich auf ein Pärchen des seltenen Gangegar-Huhns (Gallus furcatus) vom Zool. Garten in Antwerpen, da der als „G. Bankiva" angemeldete Stamm doch schon zu viel vom ursprünglichen Typus verloren hatte.

Malayen. Der schönste und mustergültigste Stamm war unstreitig der braune des Herrn Dr. Schönfeld. Nächst diesem folgten die jungen braunen Malayen des Herrn R. Baumann in Ehrenfeld, welche allerdings nur klein, aber vielversprechend erschienen.

Jokohama. Diese zierlichste aller Hühnerrassen war durch 5 Stämme vertreten, von denen der braungesattelte des Herrn Apotheker Funke in Hagen wol der Vorzüglichste war und den ersten Preis davon trug. Als Nächstbester dürfte der weiße des Herrn Haas in Nippes zu bezeichnen sein. Streng genommen war indeß unter sämmtlichen ausgestellten Stämmen kein einziger Hahn, welcher den Anforderungen, welche an diese elegante Hühnerrasse gestellt werden, vollkommen genügte.

Kochin-China. In 36 Stämmen und allen Kochinfarben glänzend vertreten, nur die schwarzen fehlten; der im Katalog aufgeführte Stamm konnte doch füglich nicht wol als schwarz gelten. — Gelbe in 18 Nummern, unter denen der prächtige Stamm des Herrn H. Marten in Linden bei Hannover den ersten Preis erhielt. — Als Nächstbesten erwähnen wir den Stamm des Herrn Lütkemeyer in Elberfeld und einen zweiten des Herrn Marten. Unter den weißen Kochins siegte der Stamm des Zool. Gartens zu Antwerpen, als zweitbester folgte der des Herrn Marien in Linden. Rebhuhnfarbige in 4 Nummern, von denen die der Herren Baily und Sohn und die des Herrn W. Stein aus Mülheim a. d. Ruhr den ersten Preis, der Stamm des Herrn Marten, den zweiten erhielt. — Die immer seltener auftretenden Kuckuksperber waren nur durch 2 Nummern vertreten, von denen der Stamm des Herrn Robert Klewitz in Styrum wegen der prächtigen Hühner zu erwähnen, der Hahn war weniger mustergültig.

Brahma-Putras. Unter den 10 Nummern dunkeler Brahmas gebührt die Krone unstreitig dem Stamm des Herrn W. Zeppenfeld in Mülheim a. d. Ruhr. Diesem zunächst folgte der Stamm des Herrn Pohlig in Dülken und dann die noch jungen Thiere der Herren Baily und Sohn. Unter den 10 hellen Stämmen waren die hervorragendsten die beiden Stämme des Herrn Marten in Linden und des Herrn Schmits in Mülheim a. d. Ruhr. — Japanesische Zwerg- und Seidenhühner. Nur je durch einen Stamm vertreten. Von dem Zwerghühnerstamm des Herrn Noack in Darmstadt war nur der Hahn gut. — Dorkings. In drei Stämmen, unter denen der des Herrn Zeppenfeld in Mülheim a. d. Ruhr glänzend siegte. — Kämpfer. Englische gar nicht vorhanden, indem die von London angemeldeten ausblieben. Belgische dagegen um so zahlreicher und in schönen Exemplaren, unter denen als bester Stamm der des Herrn Piedboeuf in Jupille bei Lüttich und als nächstbester der des Herrn W. Zeppenfeld in Mühlheim a. d. Ruhr zu erwähnen sind. — Zwergkämpfer. Diese niedliche Rasse, welche sich der steigenden Gunst der Liebhaber erfreut, war in 26 Nummern und fast durchweg gut vertreten. Durch besondere Kleinheit und Eleganz der Erscheinung zeichneten sich vor Allen der goldhalsige Stamm des Herrn Bürgermeister Rheinen in Broich bei Mülheim a. d. Ruhr und der der Herren Baily und Sohn vortheilhaft aus. Unter den silberhalsigen sind die des Herrn Küpper in Mülheim a. d. Ruhr und die des Herrn Dr. Gerhardy zu Düsseldorf hervorzuheben. Schöne Rothschecken hatten die Herren Baily und Sohn eingesandt, denen übrigens der Stamm des Fräulein Clara Wegelin in Köln wenig nachstand.

Bantams. Unter den 10 Nummern Goldbantams ließ der von Herrn Marten in Linden eingesandte Stamm in Hinsicht auf Farbe, Zeichnung und Gestalt nichts zu wünschen übrig, doch hätten die Thierchen wol etwas kleiner sein können. Der fast eben so schöne Stamm des Herrn Robert Klewitz in Styrum erhielt den 2. Preis. — Silberbantams in 6 Nummern, unter denen die Stämme des Herrn Klewitz und des Herrn C. Schiffer in Düsseldorf hervorzuheben sind. Letztere waren kleiner, aber weniger schön in der Zeichnung, als die des Herrn Klewitz. Unter den einfarbigen Bantams ist nur 1 Stamm schwarzer des Herrn Reichard in Köln und der weiße des Herrn Bürgermeister Rheinen zu Broich besonders hervorzuheben. Unter den Bakies (Courtepattes) zeichnete sich der schwarze Stamm des Herrn J. D. Ohliger und der weiße des Herrn Jansen, beide in Solingen, vortheilhaft aus.

Spanier. Diese ebenso nützliche, als schöne Hühnerrasse scheint trotz der vielen neu eingeführten noch immer sich steigender Beliebtheit zu erfreuen. Sie war in 32 Stämmen durchweg gut — in einzelnen Nummern wirklich vorzüglich vertreten. Der schönste Stamm war unstreitig der des Herrn Zeppenfeld in Mülheim, diesem folgten als zweiter der Stamm des Herrn Winkhaus in Hagen, dann derjenige des Zoolog. Gartens zu Antwerpen und endlich als viertbester der des Herrn Bartels in Döhren.

Crève-Coeur. Der Stamm des Herrn Zeppenfeld in Mülheim a. d. Ruhr ist hier als Sieger zu nennen, namentlich war der Hahn ein Musterbild seiner Rasse. Der von Seiten der „Fauna" im Pariser Jardin d'Acclimation gekaufte Stamm ließ Manches zu wünschen übrig und wurde durch die Stämme des Herrn Brandis in Döhren und des Zool. Gartens zu Antwerpen bei Weitem übertroffen. — La Flèche. In 18 Stämmen, unter denen der des Herrn

Haas in Nippes besonders hervorragte; die Stämme des Herrn Zeppenfeld, des Zool. Gartens in Köln und des Herrn Spindler in Hilden kamen diesem am nächsten. Der Stamm des Herrn Donny Sapin übertraf an Größe die drei letzteren und es war wol nur die nicht regelrechte Bildung des Kammes beim Hahn Ursache, daß dieser Stamm von der Prämiirung ausgeschlossen wurde. — Houdans waren weniger gut und mustergültig vertreten. Der von Herrn Haarmann in Witten ausgestellte Stamm und demnächst der des Herrn Heuckeshoven in Braunsfeld dürften als die besten dieser Gruppe zu betrachten sein. — Le Mans. Der vom Zool. Garten zu Antwerpen ausgestellte Stamm erinnerte doch zu stark an La Flèche. — Von den 2 ausgestellten Breda-Stämmen war nur der Hahn des Herrn Juxberg in Offenbach gut — die Hühner schwächer und anders gefärbt.

Italiener in 7 Stämmen, unter denen jedoch nichts Bemerkenswerthes. — Paduaner in 22 Stämmen, unter denen ein Stamm Gold- und ein Stamm Silber-Paduaner des Herrn Zeppenfeld in Mülheim durch die stattliche Vollhaube, prächtige Farbe, Zeichnung und Haltung eine wahre Zierde der Ausstellung bildeten. Rühmend zu erwähnen sind außerdem die Silberpaduaner des Herrn Schmits in Mülheim a. d. Ruhr, die Goldpaduaner des Herrn Cnaux in Solingen und die weißen des Herrn Robert Oettel in Görlitz. — Holländer. 7 Stämme in seltener Güte, unter denen die blauen mit weißen Hauben des Herrn Marten in Linden, die ebenso gefärbten des Herrn Haas in Nippes und die schwarzen des Herrn Gehring in Düsseldorf sich durch besondere Schönheit auszeichneten. — Hamburger. Diese allgemein beliebte Rasse war in 28 Nummern vorhanden, unter denen Silberlack am zahlreichsten, Goldlack in 7, Goldsprenkel nur in zwei Stämmen und Silbersprenkel (die als solche angemeldeten erwiesen sich als Silberlack) gar nicht vertreten war. Unter den Silberlack ist der Stamm des Herrn Körner in Pulsnitz und der des Herrn Wirtz in Neuß — unter den Goldsprenkel der Stamm des Herrn Roßkotten in Broich rühmend zu erwähnen. Unter den Goldlack erhielt der von Herrn Marten ausgestellte Stamm den ersten und der von Herrn Haas ausgestellte Stamm den zweiten Preis. Ein Stamm schwarzer Hamburger vom Zool. Garten in Antwerpen fiel durch Größe und stattliche Haltung des Hahnes auf.

(Schluß folgt.)

Bücher- und Schriftenschau.

„Der Harzer Kanarienvogel." Beitrag zu seiner Kenntniß, Pflege und Zucht von **Rudolf Maschke** (Leipzig, C. H. Reclam). Wol dürfen wir behaupten, daß die Liebhaberei und damit die Zucht des Harzer Kanarienvogels in letzterer Zeit wiederum einen bedeutenden Aufschwung gewonnen. Um dieselbe in die rechten Bahnen zu lenken und selbst in den weitesten Kreisen der Liebhaber zu ersprießlicher Ausbreitung zu führen, bedarf es der Anleitung von sachverständigen und erfahrenen Züchtern, welche mit der nöthigen Bildung zugleich auch die echte Liebe und Lust verbinden und denen vor Allem nicht Gewissenhaftigkeit mangelt. Hoch obenan unter den kenntnißreichen und zugleich federgewandten Selbstzüchtern des Harzer Vogels steht Herr Kontroleur Böcker, und es liegen uns zahlreiche Beweise vor, dahin, daß die Böcker'schen Darstellungen auf dem Gebiete der Kanarienvogelzucht bei allen gebildeten Lesern unserer Zeitschrift volle Aufmerksamkeit gefunden und das regste Interesse für den Gegenstand erweckt haben.

Das vorliegende Büchelchen ist in diesem Sinne ebenfalls als ein werthvoller Beitrag zur Hebung der Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels anzusehen, und dies vorausgeschickte Urtheil veranlaßt uns eben dazu, dasselbe eingehend zu besprechen.

Vor allen Dingen hat Herr Maschke darin recht, daß es zahlreiche Leute giebt, die den Harzer Kanarienvogel sehr hoch schätzen, ihn um seines Gesanges willen förmlich verehren, keineswegs aber ihn recht zu behandeln und zu verpflegen verstehen. Sie bringen alljährlich mehr oder minder bedeutende Opfer durch Ankauf eines vorzüglichen Sängers und schaden dennoch nur der Sache, dadurch, daß sie diese guten Vögel den kundigeren Liebhabern, bezüglich der Zucht, entziehen. Abgesehen von der bisher erst recht kleinen Gemeinde der eigentlichen Verehrer des Harzer Vogels gab es bis dahin selbst unter den Gebildeten nur Wenige, welche diese besondere Rasse gebührend kannten und zu schätzen wußten. Auch ich habe ihr in meiner Monographie des Kanarienvogels leider keineswegs in ausreichendem Maße Rechnung getragen und deshalb die Ergänzungen des Herrn Kontroleur Böcker mit großer Freude und mit Dank zur Kenntniß meiner Leser gebracht. Diesem Uebelstande Abhülfe zu bringen, d. h. also zum rechten Kennenlernen des Harzer Vogels möglichst beizutragen, ist ja auch der Zweck der vorliegenden Schrift.

Herr Maschke beschäftigt sich seit verhältnißmäßig sehr kurzer Zeit mit der Zucht und dem Studium des Kanarienvogels — und um so mehr ist es anzuerkennen, daß er bereits mit Umsicht und achtungswerthen Kenntnissen das Nothwendigste und Wissenswertheste über den Vogel zu sagen weiß. Denn die Abschnitte über das Erkennen der Geschlechter, über die Gesundheit, über den Gesang, über die Behandlung innerhalb der Hecke, sowie der flüggen Jungen, über die Fütterung, Krankheiten und den Handel, müssen wir als sachgemäß und ausreichend zur Orientirung über den Vogel erachten.

Rügen müssen wir aber, daß auch Herr Maschke — wie es heutzutage freilich mehrfach vorkommt — von angeblicher Konkurrenz sich gefährdet sieht und es daher nicht unterlassen kann, seinerseits den Nebenbuhler mit einigen Seitenhieben zu bedenken. Durch solche gegenseitigen Bissigkeiten wird aber der Liebhaberei nur ganz entschieden geschadet, denn in den Augen eines jeden Gebildeten kann nicht allein die Liebhaberei, sondern auch die Wissenschaft widerwärtig erscheinen, durch die Raufereien ihrer Anhänger und Lehrer unter einander.

Herr Böcker hatte für die Redaktion der „Gefiederten Welt" eine Beurtheilung aller Züchter und Händler in St. Andreasberg geschrieben — im beiderseitigen Einverständniß wurde dieselbe aber nicht veröffentlicht, obwol Herr Böcker bei allen Denen, die ihn kennen, in so hoher Achtung steht, daß seine strengste Unparteilichkeit über allem Zweifel erhaben ist. Um so mehr bedauern wir, daß Herr Maschke die Behauptung ausspricht, in den Böcker'schen Schilderungen seien „die St. Andreasberger Vögel oder der Handel mit ihnen" schlecht gemacht — oder wie er wörtlich sagt, dieselben haben in seinen Aufsätzen „stets einen Hieb abbekommen". Jeder unbeeinflußt urtheilende Leser wird zugeben müssen, daß dies ganz entschieden nicht der Fall ist. Obgleich aber, wenigstens in verblümter Weise, auch die „Gefiederte Welt" von dem streitbaren Verfasser einiger Seitenhiebe sich zu erfreuen hat, so hindert uns dies doch durchaus nicht an der aufrichtigen Empfehlung — die übrigens nahezu ebenso lang geworden ist, als das ganze Büchelchen selber. Dr. K. R.

Berichtigung.

In Nr. 33 Seite 266, zweite Spalte ist haarlose, anstatt harmlose Kuh; Seite 267 oben: ein kolossales Mammut von 18 Fuß Höhe, anstatt 25 Fuß Höhe zu lesen. — Der in Nr. 34 abgedruckte Aufsatz „Beantwortung der Frage des Herrn Schüerholz u. s. w." ist von Herrn Fr. Diegand, Lehrer in Ansbach geschrieben.

Briefwechsel.

Herrn Karl Schnelle in Stavenhagen: Ihren Beitrag haben wir mit Dank empfangen. — Herrn Dr. Ackermann in Hersfeld: Es ist allerdings ein seltener Fall, daß Tigerfinken in einem Harzer Bauerchen nisten. Wir wünschen besten Erfolg. — Herrn Pastor E. F. Lübs in Wulsbüttel: Künstliche Hühnereier aus Porzellan für die Legenester der Hennen erhalten Sie in den Porzellanhandlungen jeder größeren Stadt. Eine bestimmte Quelle wissen wir Ihnen nicht anzugeben. — Herrn Eduard Tauber in Tückelhausen: Der übersandte todte Wellensittich konnte der bereits zu weit vorgeschrittenen Fäulniß wegen nicht mehr untersucht werden. Wollen Sie uns aber die Krankheitserscheinung genau beschreiben, so können wir Ihnen vielleicht Rath geben. Jedenfalls müssen Sie aber auch Ihre ganze Verpflegungsweise mittheilen. — Herrn Simon Paulus in Saaz bei Wien: Als die besten Nistkasten für Wellensittiche und Nymphen haben sich wol die aus der Fabrik von Frühauf, jetzt in Mühlhausen in Thüringen, bewährt, nachdem dieselben, den Wünschen der erfahrensten Züchter entsprechend, mehrfach verändert sind. — Die ersten Lieferungen meines größeren Werks erscheinen ganz bestimmt noch vor dem Oktober cr.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Vogelhandlung
von
Joseph Zuckerkandel,
Dresden, Zahnsgasse 26. I.
empfiehlt ein wohlassortirtes Lager exotischer Vögel, franz. Kanarien und die allgemein bekannten und renommirten reinen, fehlerlosen Kanarienvögel eigener Zucht, als Glucker, Hohlkoller, Klingelkoller mit Knurren, Koller mit herrlichen Touren, ebenso beste reinste Harzer Kanarienvögel zur Zucht.
Dalmat. Ameiseneier, Millet, Brutkästen. [487]

Zu verkaufen: 1 Paar Sperlings-Papageien 6⅓ Thlr., 1 Paar Tigerfinken 3⅓ Thlr., beide Paare gut eingewöhnt und zuchtfähig. 1 M. kl. Elsterchen 1⅓ Thlr.
[488] Böttcher, Berlin, Oranienstr. 66. III.

Abzugeben (auch auszutauschen): Graue Kardinäle mit und ohne Haube, rothe Kardinäle Paar 8 Thlr., grüne Kardinäle 12 Thlr., kleine Alexander und Nymphen, Paar 8 Thlr., Weiße Moschus- und Zwergenten, Paar 6 resp. 5 Thlr., gelbe und weiße Kochinchina, Spanier, Malaien, Yokohama ꝛc. Fasanen verschiedener Art. Näheres durch die Expedition. [489]

Folgende Vögel in tadellosen Exemplaren sind abzugeben: 2 Paar Goldstirnige Weber (P. aurifrons), 1 Paar der äußerst seltenen Braunköpfigen Ammern (Emberiza icterica) aus Nordasien, mehrere Pärchen Tauben: ganz kleine Sperlingstäubchen, Brasilische Erdtauben, Ruftäubchen und Aegyptische Turteltauben, Lori von den blauen Bergen, Schönsittiche, Büllbülls, Kubafinken und Sonnenvögel zu mäßigen Preisen. [490]
Auskunft giebt die Redaktion.

Zu verkaufen:
6 Paar diesjährige Wellenpapageien, sehr kräftige, im Freien gezogene Vögel, à Paar 5 Thlr., sowie zwölf Stück diesjährige sehr zahme Rebhühner, à Stück 1½ Thlr.
Angebote an die Expedition. [491]

[492] **Die Thier-Versteigerung**
der
SOCIÉTÉ ROYALE DE ZOOLOGIE D'ANVERS
findet am 8. und 9. September cr. von 10 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags im Lokale der Gesellschaft statt.
Sollten die vorhandenen Säugethiere und Vögel an diesen Tagen noch nicht sämmtlich verkauft sein, so wird noch ein dritter Versteigerungstag am 10. September stattfinden.
Zu bemerken ist, daß alle Thiere in der von der Verwaltung festgestellten Reihenfolge ausgeboten werden, und daß auf die Wünsche der Liebhaber, diese Reihenfolge zu unterbrechen, keine Rücksicht genommen werden kann. Der Verkauf findet gegen Baarzahlung statt und nach den Bestimmungen, welche vor dem Beginn jeder Sitzung eingesehen werden können. Die näheren Bedingungen sind vorher bei der Direktion zu erfahren.
Noch erbietet sich die Direktion, die Aufträge derjenigen Personen, welche bei der Versteigerung nicht anwesend sein können, bestmöglichst auszuführen.
Vorhanden sind unter Andern:
Eine Sammlung von Säugethieren.
Eine Girafe, Männchen (une Girafe mâle; Camelopardalis Girafa).
Eine Girafe, Weibchen (une Girafe femelle; Camelopardalis Girafa).
Ein afrikanischer Elephant, Weibchen (un Elephant d'Afrique, femelle; Elephas africanus).
Zwei Burchells Zebra's, Weibchen, hier geboren (deux Zebres de Burchell, mâles; Equus Burchellii).
Drei Lippenbären (trois Ours à longues lèvres; Prochilus labiatus).
Ein junger malaiischer Bär, Männchen (un Ours malais, mâle; Helarctos malayanus).
Ein junger brauner Bär (un jeune Ours brun; Ursus Arctos).
Drei Löwen, ein Männchen und zwei Weibchen (trois Lionceaux, un mâle et deux femelles; Felis Leo).
Eine Kanna-Antilope, Männchen, hier geboren (une Antilope Canna, mâle; Oreas Canna).
Eine Kanna-Antilope, Weibchen, hier geboren (une Antilope Canna, femelle; Oreas Canna).
Zwei Hirschziegen-Antilopen von Indien, Weibchen (deux Antilopes de l'Inde, femelles; Cervicapra bezoartica).
Zwei Moschusthiere von Java (deux Chevrotins; Tragulus javanicus).
Ein Wapiti-Hirsch, Männchen (un Cerf Wapiti, mâle; Cervus canadensis).
Ein Wapiti-Hirsch, Weibchen (un Cerf Wapiti, femelle; Cervus canadensis).
Ein Aristoteles-Hirsch, Weibchen (un Cerf Hippelaphe, femelle; Cervus Aristoteles).
Zwei Paar junge virginische Hirsche (deux couples de jeunes Cerfs de Virginie; Cervus virginianus).
Ein Paar Schweinehirsche (un couple de Cerfs-Cochons; Cervus porcinus).
Drei junge Damhirsche (trois jeunes Cerf Daims; Cervus dama).
Ein amerikanischer Bison, Weibchen, eingeführt (un Bison d'Amerique, femelle; Bison ameri anus).
Zwei amerikanische Bisons, Weibchen, eingeführt (deux Bisons d'Amerique, mâles; Bison americanus).
Ein Yak oder Grunzochs, Männchen, hier geboren (un Yack mâle; Poephayus grunniens).
Ein Yak oder Grunzochs, Weibchen, ebenfalls hier geboren (un Yack, femelle; Poephagus grunniens).
Ein Durham-Stier, mit kurzen Hörnern (un Taureau, race de Durham à courtes cornes; Shorthorn).
Zwei Durham-Kühe, mit kurzen Hörnern (deux Vaches, race de Durham à courtes cornes; Shorthorn).

Zwei Durham-Ferfen, mit kurzen Hörnern (deux Génisses, race de Durham à courtes cornes; Shorthorn).
Ein Mouflon, Männchen, hier geboren (un Mouflon à manchettes, mâle; Ovis tragelaphus).
Zwei Mouflons, Weibchen, hier geboren (deux Mouflons à manchettes, femelles; Ovis tragephalus).
Ein rothes Känguru, Männchen, hier geboren (un Kanguroo rouge, mâle; Macropus rufus).
Ein rothes Känguru, Weibchen, ebenfalls hier geboren (un Kanguroo rouge, femelle; Macropus rufus).
Ein Bennet'fches Känguru, Männchen (un Kanguroo de Benett, mâle; Macropus Bennettii).
Ein Bennet'fches Känguru, Weibchen (un Kanguroo de Benett, femelle; Macropus Bennettii).
Ein Warzenfchwein vom Senegal, Weibchen (un Phacochère du Sénégal, femelle; Phacochaerus africanus).
Ein Ameifenbär (un Fourmilier Tamanoir; Myrmecophaga jubata).
Ein Waschbär (un Raton Crarier; Losor cancrivorus).
Ein Ichneumon (un Mangouste d'Egypte; Ichneumon Pharaonis).
Ein Paka (un Paca; Caelogenys Paca).
Zahlreiche Affen (Plusieurs Singes).
Zahlreiche große indifche Flatterhunde (Plusieurs grandes Chauve-Souris Rousettes de l'Inde; Pteropus medius).

Eine reiche Sammlung von Zier-, Schmuck- und Nutzvögeln.

Große Vögel.

Zwei Strauße vom Kap (deux Autruches du Cap; Struthio camelus).
Zwei amerikanifche Strauße (deux Autruches du Nandou; Rhea nandou).
Zwei Kafuare (deux Casoars à casque; Casuarius galeatus).
Ein Bartgeier (un Gypaete Barbu; Gypaëtus barbatus).
Zwei Königsgeier (deux Rois des Vautours; Sarcoramphus papa).
Ein Gänfegeier (un Vautour Griffon; Gyps fulvus).
Ein Mönchsgeier (un Vautour Moine; Vultur monachus).
Ein Aquia (un Aigle Aquia; Geranaëtus Aquia).
Ein Karakara (un Caracara; Polyborus brasiliensis).
Zwei Sekretäre vom Kap (deux Secrétaires ou Messagers du Cap; Gypogeranus serpentarius).
Ein Hahn und ein Huhn, Sonnerats (Cox et Poule de Sonnerat; Gallus Sonneratii).
Ein Gangegar-Hahn und Hühner (Cox et Poule à queue fourche; Gallus furcatus).
Hähne und Hennen von verfchiedenen Raffen (Coqs et Poules de diverses races).

Verfchiedene Fafanen und andere Hühnervögel.

Ein Paar große Argusfafanen (un couple de Faisans, Grand Argus; Argus giganteus).
Ein Stamm Lady Amherft-Fafanen, alte, eingeführt (un couple de Fasans, de Lady Amherst, adultes; Thaumalea Amherstiae).
Ein Stamm Lady Amherft-Fafanen, junge, hier geboren (un couple de Fasans, de Lady Amherst, jeunes; Thaumalea Amherstiae).
Ein Stamm Lady Amherft-Fafanen, Dreiviertelblut, alte (un couple de Fasans de Lady Amherst; Thaumalea Amherstiae).
Ein Stamm Lady Amherft-Fafanen, Halbblut, alte (un couple de Faisans, de Lady Amherst; Thaumalea Amherstiae).
Ein Stamm Lady Amherft-Fafanen, Halbblut, junge (un couple de Faisans, de Lady Amherst; Thaumalea Amherstiae).
Ein Stamm Prälaten (un couple de Faisans-Prélats; Diardigallus praelatus).
Ein Stamm Tremmincks-Trogopane, alte, eingeführte (un couple de Tragopans de Tremminck, adultes; Ceriornis Temminckii).
Ein Stamm Satyrhühner alte, eingeführte (un couple de Tragopans Satyres, adultes; Ceriornis Satyrus).
Ein Stamm Glanzfafanen von Kochinchina, junge, hier gezüchtet (un couple d'Eperonnuers de Cochinchine, jeunes; Polyplectron Germaniae).
Ein Stamm Spiegelpfauen, alte (un couple d'Epéronniers Chinquins, adultes; Polyplectron chinquuis).
Ein Stamm Fafanenhühner, alte (un couple de Gallophases de Vieillot, adultes (Gallophasis Vieillotii).
Ein Stamm Königsfafanen, alte (un couple de Fasans Vénérés, adultes; Syrmaticus, Reveesii).
Ein Stamm Königs-Fafanen, junge (un couple de Faisans Vénérés, jeunes; Syrmaticus, Reveesii).
Ein Stamm Swinhoë-Fafanen, alte (un couple d'Euplocames Swinhoë, adultes; Eupoclamus Swinhoii).
Ein Stamm desgleichen, junge.
Ein Stamm Feuerfafanen, eingeführte (un couple d'Acomes à queue rouge; Acomis erythrophtalmus).
Ein Stamm Halsbandfafanen (un couple de Faisans à collier; Phasianus torquatus).
Ein Stamm Goldfafanen, alte (un couple de Faisans dorés, adultes; Thaumalea picta).
Ein Stamm Silberfafanen (un couple de Faisans argentes, adultes; Nycthemeria argentata).
Ein Stamm gewöhnliche Fafanen (un couple de Faisans de Bohème; Phasianus cholchicus).
Ein Stamm Talegallahühner, alte (un couple da Talégalles de Latham, adultes; Talegallus Lathamii).
Mehrere Arten Steißhühner (plusieurs variétés de Tinamous; Tinamus).
Ein Paar Aehrenträger-Pfauen (un couple Paons Spicifères; Pavo muticus).
Zwei Pauxi-Hokkos (deux Hoccos à Pierre; Pauxi Galeata).
Verfchiedene andere Hokkohühner (plusieurs autres Hoccos; Crax).
Desgleichen Schakuhühner (plusieurs Marails; Penelope).
Desgleichen Perlhühner (plusieurs Pintades ordinaires; Numida Meleagris).
Ein Paar Sonnini-Wachteln (une paire Colins Sonnini; Philortyx Sonnini).
Ein Paar kalifornifche Wachteln (une paire Colins huppés de la Californie; Callipepla Californica).

Tauben, Schwimm-, Sumpf- und Käfigvögel.

Zwei Paar Nikobartauben (deux paires Pigeons de Nicobar; Calaenas Nicobarica).
Mehrere Pärchen Schmucktauben für die Volièren und eine große Sammlung von fremdländifchen und Haustauben-Raffen (plusieurs paires de Pigeons de volière et une grande collection de diverses Tourterelles indigènes et exotiques).
Ein Paar Karunkelkraniche (une paire de Grues couronnées du Cap; Balearica regulorum).
Ein Paar Pfauenkraniche (une paire de Grues couronnées du Sénégal; Balearica pavonina).
Ein Paar weiße mexikanifche Kraniche (une paire de Grues blanches du Mexique; Grus struthio).
Ein Paar. weiße indifche Kraniche (une paire de Grues blanches de l'Inde; Grus leucogeranos).
Ein Paar Paradieskraniche (une paire de Grues de Stanley; Tetrapteryx paradiseus).
Ein Paar Antigonekraniche (une paire de Grues de Antigones; Grus Antigone).
Ein Kranich von Kanada (une grue du Canada; Grus canadensis).
Ein Paar Jungfernkraniche (une paire de Demoiselles de Numidie; Anthropoïdes Virgo).
Zwei auftralifche Jabirustörche (deux Jabirus d'Australie; Xenorhynchos australis).
Ein Senegal-Jabiru (un Jabiru du Sénégal; Ephippiorhynchus senegalensis).
Mehrere Flamingo's (plusieurs Flamants; Phenicopterus antiquorum).

Ein Marabu (un Marabou; Argala Marabou).
Mehrere gewöhnliche weiße Störche (plusieurs Cigognes ordinaires; Ciconia alba).
Zwei rosenrothe Ibise (deux Ibis roses; Eudocimus albus).
Zwei Purpurhühner von Cochinchina (deux Poules sultanes de la Cochinchine; Porphyrio caelestis).
Zwei desgleichen vom Senegal (deux Poules sultanes du Sénégal.
Mehrere Sporen-Kibitze (plusieurs Vanneaux armés; Hoplopterus spinosus).
Zwei graue Pelekane (deux Pélicans frisés; Pelecanus crispus .
Zwei gewöhnliche Pelekane (deux Pélicans ordinaires; Pelecanus onocrotalus).
Zwei Paar schwarzhalsige Schwäne, hier geboren (deux couples de Cygnes blancs à cour noir, nés au local; Cygnus nigricollis).
Zwei Paar Trompeter-Schwäne, hier geboren (deux couples de Cygnes trompettes, nés au local; Cygnus buccinator).
Mehrere schwarze Schwäne (plusieurs Cygnes noirs; Cygnus atratus).
Desgleichen weiße Schwäne (plusieurs Cygnes blancs; Cygnus olor).
Zwei Paar indische Gänse (deux paires d'Oies barrées de l'Inde; Anser indicus).
Zwei Paar Dorngänse (deux paires d'Oies à casque; Anser sarcidiornis).
Zwei Paar Japanesische Höckergänse (deux paires d'Oies caronculées du Japon).
Ein Paar Australische Hühnergänse (une paire d'Oies Céréopsis; Cereopsis Novae Hollandiae).
Ein Paar Magellangänse (une paire d'Oies Bernaches de Magellan; Anser mangellanicus).
Ein Paar ägyptische Gänse (une paire d'Oies d'Egypte; Chenalopex aegyptiaca).
Ein Paar Paradiesenten (une paire de Canards; Casarka variegata).
Ein Paar grünbäckige Enten von Chile (une paire de Canards à tête verte du Chiloë; Mareca chiloensis).
Ein Paar Baumenten (une paire de Canards vagans; Dendrocygnus vagans).
Ein Paar indische Schildenten (une paire de Canards de l'Inde; Dendrocygnus arcuata).
Ein Paar rothschnäblige Herbstenten (un paire de Canards à bec rouge; Dendrocygnus autumnalis).
Ein Paar Witwenenten mit weißem Gesicht (une paire de Canards à masque blanc; Dendrocygnus viduata).
Mehrere Pärchen Mandarinenenten (plusieurs paires de Canards Mandarins; Aix galericulata).
Mehrere Pärchen Brautenten (plusieurs paires de Canards de la Caroline; Aix sponsa).
Mehrere Pärchen Bahamaenten (plusieurs paires de Canards de Bahama; Anas bahamensis).
Mehrere Pärchen Australische Wildenten (plusieurs paires de Canards d'Australie; Anas superciliosa).
Mehrere Pärchen Fuchsenten (plusieurs paires de Canards Kasarkas; Casarca rutila).
Mehrere Pärchen gelbschnäblige Kapenten (plusieurs paires de Canards à bec jaune du Cap; Anas xantorhyncha).
Mehrere Pärchen Sporengänse (plusieurs paires de Canards à bec jaune dy Chili (Dafila spinicauda).
Mehrere Pärchen Labrador-Enten (plusieurs paires de Canards labrador).
Außerdem noch verschiedene andere Entenarten (encore d'autres variétés de Canards).
Ein Paar japanesische Knäkenten (une paire de Sarcelles Formoses; Querquedula formosa).
Ein indischer Elster-Nashornvogel (un Calao Pica de l'Indie; Hydrocissa pica).
Ein abessinischer Nashornvogel (un Calao caronculé; Bucorvus abyssinicus).
Zwei Turakos (deux Tourgacous; Turacus Persa).
Mehrere Tukane oder Pfefferfresser (plusieurs Toucans à gorge jaune).
Zwei Glanzelstern (deux Pies Acahés; Uroleuca pileata).
Eine namhafte Sammlung von Araras, Kakadu's, großen und kleinen Sittichen (une nombreuse collection d'Aras, Cacatoes et Perruches).
Mehrere langschwanzige Glanzdrosseln (plusieurs Merles bronzés à longue queue; Lamprotes Oenea) etc.
Eine sehr reichhaltige Sammlung von kleinen Zier- und Singvögeln, wie Oryxweber, Zebrafinken, Diamantvögel, Pfaffenvögel, Ringelastrilds, Kubafinken, Grüne Kardinäle u. dgl. (une nombreuse collection de divers oiseaux exotiques chanteurs, tels que: Euplectes pseudoryx, Toeniopigia castanotis, Steganopleura guttuta, Poëphila cinta, Donacola bivittata, Phonipara lepida, Gubernatrix cristatella) etc., etc., etc.
Auch mehrere große Riesenschlangen (plusieurs grands Serpents Python).

1 Paar Icterus baltimore (Baltimore-Trupiale) à 6 Thlr. und
1 gezüchtetes Paar Turdus saxatilis (Steindrossel) à 10 Thlr.
zu verkaufen.
[493] **Dr. E. Rey** in Halle a./S.

Indische Vogeleier hat abzugeben
[494] **Dr. E. Rey** in Halle a./S.

Zu verkaufen oder zu vertauschen: 3 große Pfauen, 2 Hähne und 1 Henne, bei [495
F. Lütkemeyer in Coburg.

Von diesjähriger Zucht habe ich
85 californische Schopfwachteln (coturnix californianus) à Paar 8 Thlr.,
15 Goldfasanen à Paar 12 Thlr.,
inclusive Emballage abzugeben. Die Hälfte der Wachteln sind im September, — der Rest im November, — die Goldfasanen im Oktober zu haben. Im Interesse der Liebhaber bitte ich jetzt schon um Bestellungen, um möglichst allen Wünschen gerecht werden zu können.
Oscar Vetter,
[496] Ludwigsburg.

Eine größere Partie Ameiseneier (in diesem Monat gesammelt) giebt ab gegen ausländ. Körnerfresser
[497] Dr. **Ackermann** in Hersfeld.

Einen schönen kräftigen Uhu hat für 18 Thlr. incl. Verpackung abzugeben **A. Tancré,** Anclam. [498]

Uhus, 4 Stück, Prachtexemplare, sind zu verkaufen. Anfragen unter **„Uhu“,** poste restante, Hildburghausen. [499

Ein ebenso elegant als praktisch eingerichteter Heckkäfig für kleine bis mittelgroße Papageien, 3 Fuß hoch, 3 Fuß breit, 1½ Fuß tief, mit natürlichem Nistkasten ausgestattet, ist für 15 Thlr. zu verkaufen. Auskunft giebt die Redaktion. [500]

Rosenrothe Kakadus in sehr schönen Exemplaren und richtigen Pärchen sind zu verkaufen. Auskunft giebt die Redaktion. [501]

Ein gut sprechender Amazonenpapagei mit blauer Stirn, ganz zahm, ist für mäßigen Preis abzugeben. Auskunft giebt die Redaktion. [502]

Für Liebhaber und Züchter kleiner fremdländischer Schmuckvögel ist eine große Anzahl verschiedener Arten zu sehr billigen Preisen abzugeben.
Auskunft giebt die Redaktion. [503]

1 Paar kräftige Lady Amherst-Fasanen, ½ Blut, } Junge
Kreuzung von Gold-Fasanen, } von
12 Paar Vénérés, König-Fasanen, } 1874,
sind abzugeben. [504]
Auskunft giebt die Redaktion der „Gefiederten Welt“.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 3. September 1874. Nr. 36.

Inhalt:

Zur Frage der Schädlichkeit des Mäusebussard. —
Lose Plaudereien aus der Vogelstube. —
Bericht über Harzer Kanarienvögel. —
Sperlingstäubchen. —
Zur Fütterung: Erbsen für Wellensittiche. —
Aus den Vereinen: Düsseldorf (Schluß). —
Ausstellung des Akklimatisations-Vereins in Berlin. —
Ausstellung des Hühnerologischen Vereins in Görlitz. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.

Zur Frage der Schädlichkeit des Mäusebussard.

Ist der Bussard unter allen Umständen und zu jeder Zeit als jagdgefährlich zu tödten? Wir antworten entschieden mit nein! und begründen dies in Folgendem: In mäusereichen Jahren nimmt der Bussard im Herbst bekanntlich nur Mäuse zur Nahrung; in denjenigen Gegenden, wo sie fehlen, ist er erfahrungsmäßig nur in geringer Anzahl vorhanden. Sein Zug wendet sich also nach solchen Strichen, wo er seine Lieblingsspeise im Ueberflusse findet. Im Frühjahre nimmt er an den Orten, wo er zu bleiben gedenkt und wo die durch den Winter vernichteten Nager fehlen, Regenwürmer, Frösche und dergleichen Thiere auf, was die Untersuchung des Magen- und Kropfinhaltes mehrfach ergab; er flieht jedoch die mäusearmen Gegenden und richtet sich da nicht gern häuslich ein, weil ihm das Großziehen seiner Jungen schwer wird. Im Frühsommer sieht man den Bussard auf dem Felde selten, er bringt den größten Theil dieser Jahreszeit im Walde zu, wo er, unbeweglich unter dem schattigen Blätterdache sitzend, Mäusen und Reptilien auflauert und an Waldbächen den Lurchen nachstellt. Erst im Juli, beim Beginn der Ernte, streicht er vom Holze ab, um seine Wanderungen durch die Flur wieder aufzunehmen. Seine Zugzeit dauert ungefähr vom 20. September bis Mitte Oktober. (Landw. Ztg.)

Lose Plaudereien aus der Vogelstube.

Ich habe mir vor mehreren Jahren in die tiefe Nische eines großen Bogenfensters (gegen Südwest gelegen und Doppelfenster) ein Vogelhaus gebaut, welches außerdem noch 70 Ctm. in die Stube (mein Arbeitszimmer) herein tritt und reichlich 2 Meter lang und 3 Meter hoch ist. Es bildet eine Ecke des ziemlich großen Zimmers und enthält auch einen etwas dunklern Raum für etwaige, melancholischen und philosophischen Betrachtungen gewidmete Stunden der Bewohner. An die Seitenwand, gegen Südost, schließt ein zweites, eben so großes Fenster, welches den Strahlen der Morgensonne und — wenn geöffnet — der frischen Luft fast unmittelbar den Eintritt in die Vogelresidenz gewährt. Der Fußboden ist 6 Ctm. hoch und mit Quarzsand bedeckt, den ich wöchentlich zweimal erneuern lasse. Frisches Wasser, wie es aus unserm Buntensandstein-Gebirge hervorquillt, erhält die Bewohnerschaft täglich zweimal in einem geräumigen Blechgefäß. In diesem Drahtpalais führt ein heller Schwarm von Prachtfinken und andern Finkenvögeln ein vergnügliches Leben, ganz nahe meinem Schreibtische, so daß ich von hier aus ihr Thun und Treiben bequem beobachten kann. Außer einigen Papageien, rothbrüstigen

Kernbeißern, rothen und grauen Kardinälen und einem vorzüglichen „Harzer", von der Zucht des Herrn Böcker, welche aber alle in andern Zimmern untergebracht sind, halte ich mir nämlich nur jene Vogelarten, offen gestanden: weil deren Pflege und Behandlung am wenigsten Mühe macht, für mich, der ich weder Zucht von Jungen beabsichtige, noch gelehrte Forschungen. Die ewige Heckerei der Zebrafinken — obschon ich ihnen alles Material zum Nestbau versage — langweilt mich vielmehr und ich werde nächstens das gesammte Zebraweibervolk herausfangen, damit diese Wirthschaft aufhört. Horribile dictu! Dagegen ist von großem Interesse für mich, das Wesen und Leben der Arten, ihre kleinen Liebhabereien u. s. w. zu beobachten und die Charakterverschiedenheit der Individuen. Denn bei Weitem sind nicht alle von einer Gattung einander gleich und gleichen Charakters, wenn man nur genauer hinschaut. Der eine meiner beiden männlichen Hartlaubzeisige z. B. ist und bleibt, — obwol ein „lustiger Zeisig" und deshalb immerhin angenehm — doch ein scheuer und mißtrauischer Bursche, während der andere ein zutraulicher, liebenswürdiger Bengel ist. Sowie ich mich dem Vogelhause nähere, kommt letzterer heran, klammert sich an den Draht, neckt mich durch Beißen meines vorgehaltenen Fingers und fängt dann an, mir sein schönstes Lied aus Leibeskräften in das Gesicht zu schmettern, wofür er regelmäßig als Belohnung einen kleinen Mehlwurm erhält. Von den Grauedelfinken frißt der eine Mehlwürmer mit Gier, der andere sieht sie nicht an. Von meinen drei Atlasfinken sind zwei ganz vergnügliche Kerlchen und den ganzen Tag auf den Beinen; aber sie thun Keinem etwas zu Leide. Der dritte dagegen ist ein bösartiger Flegel und ein rechter Lump dazu, insofern er gerade die kleinsten und schwächsten seiner Mitbürger unausgesetzt verfolgt, quält und zerzaust. Ich wollte ihn deshalb eben außer Landes verweisen, als ich bemerkte, daß ein kürzlich im Staate eingewanderter kräftiger Purpurfink ihn mores lehrte. Zu meiner Freude handhabt derselbe überhaupt und im Allgemeinen Polizei, und wo nöthig, sogar strenge, ohne daß ich jedoch von jenen polizeilichen Plackereien, von denen wir anderen Sterblichen häufig geärgert werden, etwas zu sehen bekommen hätte. Wo aber irgend auf offener Straße ein Krawall entsteht, da wirft er sich dazwischen und jagt die Tumultuanten auseinander, in milder Weise, wenn diese ausreicht; geben aber die Krakehler keine Ruhe, so zieht er wol auch blank und haut mit scharfer Waffe unter sie. Besonders ist es jener Atlasne, den er, als einen ausgemachten Raufbold, schon oftmals scharf gezüchtigt hat; derselbe hat unter seiner Zuchtruthe schon manchmal „Federn lassen" müssen und kann ein Lied singen von dem Regiment des Herrn Polizeiministers und Schutzmanns in einer Person. Ist solche Katzbalgerei vorüber, bei welcher der Atlasne stets übel wegkommt, so humpelt er in eine dunkle Ecke, bläst sich zu einer Kugel auf und athmet tief und schwer. Wenn er wieder ordentlich in Athem ist, dann beginnt er seine Toilette, welche bei solchen Kämpfen gewöhnlich in arge Unordnung zu gerathen pflegt, wieder zu ordnen, wobei ihm zuweilen eine Dame seines Stammes als Kammerjungfer Dienste leistet. Der Purpurfink aber, unbeschädigt und unverletzt, setzt sich auf einen Zweig dicht am Fenster und beginnt im stolzen Gefühle, seinem hohen Amte volle Genüge gethan zu haben, ein Lied zu dichten und sofort auch zu komponiren und abzusingen, vielleicht um die abscheuliche Nachrede und Verleumdung Lügen zu strafen, daß die Polizei keinen Sinn habe für Poesie und Romantik. Im Vertrauen gestehe ich Ihnen aber, daß ich mich für diese Lyrik des Rothrocks nicht auffallend begeistern kann, daß mir dieselbe vielmehr stellenweis ebenso wässerig vorkommt, wie ein guter Theil derjenigen, welche — ein schlagender Beweis für die Engelsgeduld des Papiers — gedruckt zu haben ist. Indeß, von einem Polizisten ist man auch nicht berechtigt, Großartiges im Fache der Lieder zu erwarten.

Trahit sua quemque voluptas, sagt Virgil, wenn ich mich recht erinnere. So bevorzugen z. B. Sie im „Handbuch" vor allen Finkenarten die Tiger, die ich auch ganz hübsch finde. Aber meine Lieblinge sind und bleiben, besonders wenn ich nur die Schönheit der Farben ins Auge fasse, die Schmetterlingsfinken und die Schönbürzel. Was bedeutet z. B. die Harlekinsjacke der grünen Bengalisten, dieser überdies recht langweiligen und trägen Gesellen, und wenn man ihnen zehnmal den Beinamen „formosae" zugewendet, gegen die edele, einfache Farbe jener Arten? Wo findet man einen gleichen wunderbaren Schmelz? Wo einen so sanft und wahrhaft künstlerisch modulirten Uebergang der einzelnen Farbentöne in einander? Mir scheint, unter den Malern hätte ich nur bei Tizian diese bezaubernden Farben und das wunderbar schöne Hinüberleiten aus einem Tone in den andern, an seinen prachtvollen Frauengewändern, bewundern können. Warum nun aber gerade Herr Schönbürzel die prachtvolle Robe seiner Gemahlin durch hartnäckiges Rupfen an Nacken und Rücken auf das häßlichste schändet, ist mir unerfindlich. Mein Geschmack wäre es wenigstens nicht, wenn meine Gemahlin so köstlich bekleidet wäre. Madame, in ihrem Naturkostüme ein Bild vollendeter Schönheit, sieht nun fast immer ruppig und struppig aus und kann bei Dem, welcher den Verwüster ihrer natürlichen Schönheit nicht kennt, leichtlich in den Verdacht kommen, als vernachlässige sie ihre Toilette in unverantwortlicher Weise.

G. V., L. in B.

Bericht über Harzer Kanarienvögel.

Herr Redakteur!

Ihrem Wunsche und meinem Versprechen gemäß erlaube mir, im Nachfolgenden über den Gesang der von mir im Laufe des vergangenen Winters von Herrn Boecker in Wetzlar — dessen vortreffliche sachgemäße Schilderungen der Mehrzahl der Leser Ihres Blattes bekannt sind — bezogenen Kanarien sowol nach meiner eigenen Wahrnehmung, als nach den mir von Herrn Boecker gemachten Mittheilungen ausführlich zu berichten. Damit die Liebhaber jedoch nicht zu übertriebenen Anforderungen dadurch veranlaßt werden, weise ich ausdrücklich darauf hin, daß sich nachstehende Schilderung auf Mustervögel bezieht, und daß gute, vollständig fehlerfreie Stämme nirgends, auch nicht in Andreasberg, häufig anzutreffen sind; was hier gezüchtet wird, ist freilich noch viel besser, als der gewöhnliche deutsche Kanarienvogel, allein meist ist es doch nur mittelgut und mitunter auch herzlich gering. Gleichzeitig mache ich bei dieser Gelegenheit, wie dies von kompetenter Seite schon häufiger geschehen, darauf aufmerksam, daß der erste und schlimmste Fehler beim Ankauf in der Regel dadurch begangen wird, daß die Liebhaber schon im August oder Anfangs September junge, aus den verschiedensten Züchtereien aufgekaufte Männchen von herumreisenden sogenannten „Harzer Händlern" erstehen. Vor 8 bis 9 Monaten ist kein Vogel vollständig ausgebildet, und ihn zu früh von seinem Lehrmeister entfernen, heißt, sich einen Stümper heranbilden. Und nun gar erst diese „wandernden Vögel!" Ich habe diese Erfahrung in den ersten Jahren meiner Liebhaberei oft theuer büßen müssen. Auf Veranlassung einiger Vereinsmitglieder, welche Gelegenheit hatten, bei mir einen vorzüglichen Boecker'schen Rollvogel zu hören, und die von seinem Schlage entzückt waren, bezog ich nach und nach noch zwölf dieser Vögel mit den verschiedensten Touren und wurde nun erst den großen Unterschied gewahr, zwischen einem Sänger und einem Roller ersten Ranges in seinen verschiedenen feinen Nüancirungen in den einzelnen Rollen. Wenn auch nicht durch Farbe und Gestalt, so unterscheiden sich der Harzer Vogel im Allgemeinen und die Boecker'schen Vögel besonders doch so wesentlich durch den Gesang von der gemeinen deutschen Rasse, daß sie hierin auch von Unkundigen nicht wol mit der letzteren verwechselt werden können. Eher wird man sie noch für eine ganz andere, mit dem Kanarienvogel verwandte fremde oder einheimische Singvogelart halten. Die Harzer Kanarien werden in Bezug auf ihren Gesang im Wesentlichen eingetheilt in Nachtigalschläger oder Gluckvögel, in Kollervögel und in Roller oder Rollvögel. Diese Bezeichnung ist zwar keine ganz feststehende, sie wird indeß von Kennern in einem großen Theile Deutschlands, namentlich in Rheinland und Westfalen, auch in Sachsen und Schlesien verstanden. Daneben giebt es noch besondere Bezeichnungen, die sich auf einzelne Wendungen, Strophen im Gesange beziehen, als Klingelroller, Hohlroller, Baßroller, Gluckroller, Schnattervögel ꝛc. Ich komme auf diese technischen Ausdrücke noch später zurück.

Die Nachtigalschläger anlangend, so darf man darunter keine Vögel verstehen, die in ihrer Jugend etwa von einer Nachtigal ausgebildet sind oder sonst eine oder mehrere Touren zufällig aus dem Gesange der Nachtigal entlehnt haben. Es sind zwar Versuche angestellt, junge Kanarien durch eine Nachtigal ausbilden zu lassen, allein der Erfolg ist nicht nennenswerth gewesen, und es konnte auch wol nicht sein, da bekanntlich die Nachtigal gerade zu der Zeit schweigt, in der den Jungen ein Vorschläger ganz besonders noth thut. Die Harzer Züchter, namentlich die Andreasberger, glauben übrigens, daß eine Nachtigal, trotz ihrer wundervollen Touren, einem feinen Harzer Vogel gefährlich werden könne. „Die Vögel lernen den wilden Schlag," heißt es bei ihnen, und deswegen wird zur Zeit keine einzige Nachtigal in Andreasberg gehalten. Die Nachtigalschläger sind eigentlich Gluckvögel. Ihr Gesang zeichnet sich dadurch aus, daß er viel weniger aus Rollen, als aus vollen, runden und tiefen Tönen mit meist glockenreiner Klangfülle, den sogenannten Glucken oder Nachtigaltönen, besteht, welche lebhaft an gewisse Passagen im Nachtigalgesange erinnern. Wenn sie recht viele dieser Töne besitzen und bestimmte Gluckertouren im Gesange mehrfach wiederholen, so heißen sie Doppelglucker; besteht aber ihr Gesang vorherrschend aus Rollen und kommen darin nur einige Triller oder wellenartig gebildete Glucken vor, so nennt man sie Gluckroller. Die Kollervögel sind eigentlich Rollvögel mit einem eigenthümlich schönen abfallenden Triller, der sogenannten Koller, von welcher Tour die Vögel ihren Namen haben. Die Koller, wenn sie rein und voll ausgeschlagen wird, was übrigens nur bei den besten Sängern geschieht, erinnert an eine Klangfigur, die entstehen müßte, wenn ein tönender Gegenstand von einem Felsen herunterrollt, im Fallen an regelmäßigen Absätzen auf dem zerklüfteten Gestein aufschlägt, so daß der Schall in der Tiefe allmälig, aber in leisen Schwingungen sich verliert. So ist übrigens nicht jede Koller gebildet; andere Kollertouren erinnern an Schallwellen, die mit einer kleinen Pfeife im Wasser erzeugt werden können; immer aber muß eine richtige Koller tief sein und leise verklingen. Die Kollervögel leiden meistens an einem mehr oder weniger scharfen, oder mehr oder weniger weichen — losen — ce-ce-ce, ein Ton, der leider im Gesange der verschiedensten Stämme Andreasbergs, am seltensten noch bei seinen Rollvögeln, vorkommt. Als eine feststehende besondere Art in der Harzer Rasse können die Kollervögel nicht erachtet werden. Ebenso, wie sich aus Roller- oder Schnattervögeln im Laufe der Zeit Gluckvögel entwickeln können, ebenso gut können aus Rollvögeln in mehrjährigen Züchtungen auch Kollervögel entstehen. Ein junger Vogel bildet sich

— und dies ist namentlich in größeren Züchtereien der Fall — eine Tour, die an eine Koller erinnert oder eine starke Verwandtschaft mit ihr hat. Die Passage gefällt, und man setzt den Vogel im nächsten Jahre in die Hecke. Die Kollerrolle wird von der Nachzucht zur Koller erweitert, die nächstfolgende Zucht bringt sie in ihrer ganzen Reinheit, und — die Kollervögel sind fertig.

Die feinen Rollvögel sind unter den Harzer Kanarienvögeln diejenigen, denen die Kenner den ersten Preis ertheilen und ihnen den Vorzug vor allen übrigen geben. Rollvögel sind es daher auch meistens, die in Andreasberg und im Harze gezüchtet werden. Aber nicht jeder Rollvogel ist ein guter, feiner Roller. Es giebt überhaupt in Andreasberg ebenso gut wie an anderen Orten eine Menge von Stämmen verschiedener Rollvögel, die nur einen geringen Werth besitzen. Ein feiner Rollvogel geht nur aus den Rollen heraus, um einige Pfiffe, sog. Hohlpfeifen oder Flöten, einen Glucker, eine Klingel oder eine Schnatter — die übrigens wiederum eine, wenn auch ganz eigenartige Rolle ist — einzufügen. Je geringer der Stamm ist, desto mehr Neben- oder Zwischentouren haben die Vögel, wobei aber einzelne Passagen brillant sein können. Den Stamm ganz rein von derartigen Nebentouren zu erhalten, von allen kleinen Fehlern oder solchen Tönen, die dafür bei den Kennern gelten, erfordert außerordentlich viel Aufmerksamkeit, viel Zeit seitens des Züchters, und eine nicht zu kleine Wohnung. Daher giebt es auch in Andreasberg zur Zeit wol keinen einzigen ganz reinen Rollerstamm, wol aber einzelne ganz reine, vorzügliche Rollvögel in den besten Stämmen. Allerdings sind die von Kennern gerügten kleinen Fehler oft so unbedeutend, daß sie nur ein superfeiner Geschmack Fehler nennen kann. Wollte man alle diese Töne, die man als Fehler bezeichnen könnte, ausmerzen, so würde man dahin gelangen, daß man zuletzt nur noch Vögel mit sehr wenigen Touren, und diese vielleicht nicht einmal in der erforderlichen Anzahl besäße.

Man unterscheidet im Rollenschlage Schwirr-, Hohl-, Knarr-, Lach-, Pfeif-, Gluck-, Klingel-, grobe, gerade und Bogenrollen-Schnatter, und Flöte oder Hohlpfeife; es trifft aber wol niemals oder doch höchst selten zu, daß ein Vogel alle diese Touren in seinem Gesange vorträgt. Je nachdem die eine oder andere Rolle vorherrscht, wird der Vogel zum Baß-, Knarr-, Hohl-, Klingel- oder Gluckroller. Was eine Rolle überhaupt ist, brauche ich wol nicht zu beschreiben. Unter einer Schwirrrolle versteht man gewöhnlich eine feine, mehr oder weniger schwirrende Rolle, welche häufig gleich zu Anfang des Gesanges, oft auch nach einigen einleitenden Pfiffen, zuweilen auch nach einer andern Rolle mitten im Gesange gebracht wird. Man hört sie sehr gern gleich zu Anfang des Schlages. Etwas tiefer und voller ist die grobe Rolle, noch tiefer die Knarre, auch Baßrolle genannt, ein sehr schöner Brustton auf trrrrrrrrrrr oder rrrrrrrrrrr, der in keinem guten Rollenschlage fehlen sollte. Die Lachrolle, etwas weniger tief, hat einige Aehnlichkeit mit dem Lachen eines Menschen. Die Pfeifrolle, eine sehr schöne klangvolle Tour, besteht aus rasch gezogenen, an einander gereihten Pfiffen, bei der die Rollenform eigentlich nur zum Durchbruch kommt, wenn die Passage lang ist. Eine Aehnlichkeit mit dieser Tour hat die Gluckrolle, aus perlartig an einander gereihten hellen Tönen bestehend. Auch die Klingelrolle ist eine äußerst wohlklingende Passage; sie erinnert an die Schwingungen, die durch eine in Bewegung gesetzte kleine silberne hellgehende Schelle verursacht werden und hat oft viel Aehnlichkeit mit einer Koller, nur daß sie feiner ist und etwas höher liegt. Die Schnatter hat als charakteristischen Ton ein f oder v oder auch ein w. Sie ist oft von einer geschmackvollen Härte, oft sehr weich und rund und bringt je nach ihrer verschiedenen Modulation fast alle einfachen Vokale. Eine Hohlrolle ist eine klangvolle Rolle auf ü, seltener auf u, d. h. wenn sie gut ist. Gebogene Rollen oder Bogenrollen sind mehr trillerartig gebildet; was aber im Uebrigen eine Bogen- oder eine gerade Rolle ist, bedarf wol keiner Beschreibung. Die Hohlpfeife soll tief und rein sein und darf nicht zu rasch geschlagen werden. Eine Hohlpfeife, die von unten heraufgeht, so daß eine höhere nach einer tieferen folgt, macht sich nicht so gut, als wenn sie sich auf einer Tonlage hält oder eine höhere der tiefen Flöte vorhergeht. Es giebt zwei verschiedene Hohlpfeifen, nicht blos im Klange, sondern auch in der äußeren Form — tü tü tü und ü ü ü — beide sind gleich schön. Die Nasenflöte aber, ein unreines ti ti ti, ist ein Fehler.

Die Rollen sind oft so verschieden modulirt und ebenso die Glucken und Schnattern, und diese ganz besonders, selbst bei Vögeln ein und desselben Stammes, daß es schwer hält, für jede Tour gleich den richtigen Namen zu finden. So unterscheidet sich eine Schnatter zuweilen nur mit Mühe von einer Hohlrolle, mitunter, namentlich die sogenannte Hohlschnatter kaum noch von einer Glucke, ferner eine Knarrrolle, namentlich eine sogenannte Krachrolle, sehr wenig von einer Lachrolle. Endlich herrscht auf diesem Gebiete zur Zeit noch eine große, eine babylonische Sprachverwirrung unter den Kennern, Liebhabern und Züchtern. Was versteht man z. B. in Ostpreußen unter einer Weinrolle? Soll das eine melancholische Hohlrolle sein, die allerdings vorkommt, oder leitet man den Ausdruck vom Weine, nicht vom Weinen ab? Vielleicht weiß ein Leser Ihres Blattes darüber Auskunft zu geben?

Ein guter Rollvogel soll nicht zu kurz und zu laut in seinen Rollen sein, daher der Ausdruck: lange und düstere (düstere) Vögel; er soll ruhig und gut gehen, d. h. er soll ordentlich ausschlagen und keine Nebentouren bringen.

Dies wäre im Wesentlichsten dasjenige, was ich

über den Gesang der Harzer Vögel nach Herrn Boecker's Erfahrungen und meinen eigenen Anschauungen mitzutheilen mir erlaubte, und hat genannter Herr vielleicht die Freundlichkeit, in einer der nächsten Nummern Ihrer „Gefiederten Welt" diese meine Schilderung noch zu vervollständigen. Gleichzeitig bitte ich um Entschuldigung, wenn ich mich für heute etwas zu weit ausgedehnt habe, allein der Wunsch der Herren Lehrer Kant, Fabrikant Grimm, Sekretär Pahl und des Herrn Nic. Tincauzer, Mitglieder unseres Ornithologischen Vereins und Besitzer Boecker'scher Rollvögel, sowie meine eigene Dankbarkeit veranlaßten mich, Herrn Boecker hiermit öffentlich den Dank für die uns gesandten vorzüglichen Vögel auszusprechen.

Gustav Prütz,
Sekretär des Ornithologischen Vereins
zu Stettin.

Sperlingstäubchen.

Ein Bild aus meiner Vogelstube.

Vom Herausgeber.

Die kleinste der lebend in den Handel gelangenden Tauben, das Sperlingstäubchen (Columba passerina) ist in den deutschen Vogelstuben bis jetzt erst verhältnißmäßig selten vorhanden. Zum Theil mag hieran wol die Bemerkung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" schuld sein, daß nämlich alle fremdländischen Tauben sich in der Vogelstube nicht als angenehme Gäste zeigen und daß sie namentlich schwierig nisten.

Im Nachfolgenden kann ich nun aber, zunächst über dies eine Täubchen, denn doch Anderes berichten.

Die ersten Sperlingstauben erhielt ich von Herrn Hieronymi in Braunschweig. Sie waren nahezu splinternackt und geberdeten sich allerdings, in ihrer fabelhaften Aengstlichkeit, geradezu wie toll. Auch verunglückten sie fast sämmtlich, indem eine im Badenapf ertrank, eine zweite in einem Weberneste sich erhängte, die dritte während des Greifens mir in der Hand plötzlich Krämpfe bekam und starb, jedenfalls aus Angst. Zu dem einzigen übrig behaltenen Täuber war Herr Dr. Bodinus so gütig, mir ein Weibchen zu überlassen. Aber auch dies Pärchen ging leider ein. Ein anderes Paar, welches Herr Graf Rödern für seine Vogelstube entnahm, hat sich seit einem Jahre vortrefflich gehalten.

Erst nach langer Zeit sandte mir Fräulein Hagenbeck wiederum einige Pärchen, welche bei weitem nicht so wild, als die ersteren waren. Ich ließ zwei Paare in die Vogelstube frei, wo sie sich als liebenswürdige Gäste zeigten. Sie waren anfangs auch außerordentlich scheu und liefen bei jedem geringsten Geräusch hurtig ins dichteste Gebüsch oder flogen sehr gewandt auf hochhängende Käfige u. dgl. Von den größeren Tauben, Bronzeflügel-, Kap- und Australischen Sperbertäubchen, werden sie wenig befehdet; dagegen führen die beiden Pärchen untereinander Krieg, jedoch in nicht gefährlicher, sondern vielmehr nur drolliger Weise.

Diese Sperlingstauben sind nun in kurzer Zeit ziemlich dreist und keck geworden. Wenn des Morgens die Futtergefäße gefüllt sind, kommen sie, gleich vielen andern Vögeln, auf den Boden herab und trippeln mir dicht vor den Füßen umher. Sodann halten sie sich viel in dem draußen angebrachten Gitter des offenen Fensters auf und da dies sogar bei naßkaltem Wetter der Fall ist, so sind sie nichts weniger als weichlich.

Vor einigen Tagen bemerkte ich, als ich regungslos in der Vogelstube saß, daß der Täuber sein Täubchen in sehr komischer Weise bekurrte und umhüpfte. Dann trug der kleine drollig-bewegliche Täuberich auch sehr eifrig feine Reiser, Strohhalme und Bastfäden in ein Nestkörbchen und nun brütet das Pärchen dieser allerliebsten Vögel zum ersten Male in meiner Vogelstube. Zwei winzig kleine, schneeweiße und sehr runde Eier liegen im Nest und die beiden Gatten des Pärchens lösen sich wechselnd im Brüten ab, wie bei allen übrigen Tauben.

Wer meine Vogelstube besucht hat, wird sich erinnern, daß in der Mitte derselben hoch oben an der Decke eine sogenannte Krone hängt. Dies ist ein Bau aus dichtem Gesträuch, innen mit zahlreichen Nestkörben, Harzer Bauerchen u. a. Nistgelegenheiten ausgestattet und mit einem Papp- oder Strohdach überdeckt. Eine solche Krone, die freischwebend hängt, ist in allen meinen Vogelstuben immer ein beliebter, vielbesuchter Nistort gewesen, und es erscheint wirklich erstaunlich, in welcher Friedfertigkeit sich hier die verschiedenartigste Bevölkerung zusammendrängt. Geradeaus im vordersten Nest, einem überdachten kleinen Korbe, brüten die Sperlingstäubchen, rechts oberhalb haben ein Paar Ringelastrilds ein kugelrundes Nest mit sehr engem Schlupfloch, links oben baut der Rothkopffink mit dem Bandfinken-Weibchen zur dritten Brut, tief drinnen, unterhalb des Taubennestes wohnen ein Pärchen Pfaffenvögel. Ebenso sind die andern Seiten bevölkert. Rechts, an weit abstehenden Zweigen hängt ein in der Vollendung begriffenes Nest des Manyarwebers, und seitwärts unterhalb desselben haben in einem Körbchen ein Paar Sonnenvögel gebaut, während ein zweites Paar anderwärts in einem frei im Gebüsch stehenden Neste brütet. An der Vorderseite wohnen ein Paar Kubafinken, die unverträglich sind und den ganzen Raum für sich in Anspruch nehmen. An der düsteren Hinterseite aber nisten ganz oben ein Paar Ceresfinken und unterhalb dieser hat das von Japanesischen Mövchen ausgebaute Nest ein wunderliches Paar bezogen. Ein Männchen schwarzköpfige Nonne nämlich mit einem Weibchen Schilffink gepaart. Ganz vorn an dieser Seite hatte ein Paar Swainsonsspatzen ein elsterartiges, aus Reisern errichtetes, kuppelförmiges Nest, aus welchem ich sie leider fortfangen mußte, weil sie zu arge boshafte Störenfriede sind. Nun haben den Bau ein zweites

Paar Pfaffenvögel nach ihrem Geschmack eingerichtet. In den untersten Nestern, welche von Zebrafinken sämmtlich ausgebaut waren, übernachten, nach deren Entfernung, jetzt Rothschwänzchen und dergleichen kleines zartes Gesindel.

Zur Fütterung.

An meinen Wellensittichen habe ich gestern zufällig bemerkt, daß sie sehr gerne junge Erbsen verzehren. Ein Körbchen mit dieser noch in den Schoten befindlichen Frucht stand in der Nähe ihres Brutraums. Kaum hatten die Wellensittiche sie gesehen, als sie an das Gitter flogen und sehnsüchtige Blicke danach warfen. Es wurden daher einige Schoten in den Brutraum geworfen und sogleich machten sich die Vögel darüber her. Sehr drollig sah es aus, wie sie sich die Leckerbissen zeternd und schreiend gegenseitig abjagten und in Sicherheit zu bringen suchten. Viel Mühe machte ihnen auch, wie es schien, das Enthülsen der Erbsen; Schnabel und Klauen vermochten die kollernden Schoten kaum festzuhalten. Nach Verlauf einer Stunde hatte indeß jeder Vogel seine Erbsen verzehrt und die Schoten bis auf den harten faserigen Theil abgenagt. Heute wiederholte sich dasselbe Schauspiel; ich möchte daher glauben, daß die Wellensittiche im Freien einer Erbsenanpflanzung noch gefährlicher werden könnten, als unser naschhafter Spatz. W. B.

(Herr Apotheker Jaenicke in Hoyerswerda füttert alle seine Papageien regelmäßig auch mit eingequellten Erbsen. D. R.).

Aus den Vereinen.

Bericht über die 1. allgemeine Geflügel-Ausstellung des Vereins „Fauna" zu Düsseldorf.

Hühner.

(Schluß).

Bergische Kräher und Schlotterkämme (welche recht wol zu einer einzigen Gruppe vereinigt werden könnten) waren in 13 Nummern vorhanden, unter denen zunächst die Kräher des Herrn Paashaus bei Solingen und die Schlotterkämme des Herrn Baute in Dortmund, in zweiter Reihe auch die Kräher des Herrn Werth in Solingen rühmend erwähnt werden müssen. — Die ausgestellten Strupp- und Kaulhühner als mittelgut übergehend, kommen wir zu den Lakenfeldern, welche in 2 Stämmen vertreten waren, die aber beide in Bezug auf Färbung und Zeichnung ebenfalls viel zu wünschen übrig ließen. — Unter den Zwerghühnern verdient der Stamm (weiße englische) des Herrn Birnapfel in Münster rühmend erwähnt zu werden, ebenso die Japanesischen Seidenhühner des Herrn A. Meyer in Düsseldorf, obwol denselben das dieser Rasse eigenthümliche schwarze Gesicht fehlte. Letzterer Umstand mag den Aussteller veranlaßt haben, diesen Stamm als „Russische Seidenhühner" anzumelden. — Unter der Rubrik „Diverse" fanden sich 13—15 Stämme der verschiedensten Kreuzungen als Landhühner zusammen, von denen die Mehrzahl sich nur durch die auffallenden Benennungen auszeichnete.

Unter den Perlhühnern erwähnen wir den schönen weißen Stamm des Herrn Donny Sapin in Gent. — Silberfasanen waren in mehreren prächtigen, ausgewachsenen Stämmen, Goldfasanen nur durch einen halbwüchsigen Stamm vertreten. — Von Truthühnern war nur ein schöner schwarzer Stamm vorhanden, welcher sofort einen Käufer fand. Aussteller: Herr Ohliger in Solingen. — Von den angemeldeten Pfauen traf nur 1 Paar vom Zool. Garten in Köln ein. — Enten. Nur in wenigen, aber durchweg guten Stämmen zu finden. Hervorzuheben sind die Rouen- des Herrn Reichard in Köln und die weißen Türkischen des Herrn Worms in Düsseldorf. Die prachtvollen Aylesbury- des Herrn Marten waren leider zu hoch im Preise, um Käufer zu finden.

Sing- und Schmuckvögel.

Papageien waren in etwa 50 Nummern und einer bei Weitem größeren Kopfzahl vorhanden. Unter den neueren oder selteneren Arten fanden wir den Lori von den blauen Bergen (Trichoglossus Swainsonii), rothbrüstige Keilschwänze (Conurus jendaya) und eine andere noch unbestimmte Conurus-Art, sowie ein Paar Königssittiche des Herrn Hagenbeck in Hamburg. Ferner ein Paar schöne Rothflügel-Sittiche vom Zool. Garten in Köln, und ein hübsches sprechendes Exemplar des kleinen Alexanderpapagei, Herrn Worms in Düsseldorf gehörig. Herr Bresges in Rheydt hatte einen prachtvollen, ganz zahmen Leadbeater Kakadu gesandt, der eine wirkliche Zierde der Ausstellung bildete. Graupapageien waren in mehreren Exemplaren vertreten, von denen außer dem des Herrn Liebelt noch ein zweiter durch angenehmes Pfeifen die Aufmerksamkeit auf sich zog. Ferner sind noch zu erwähnen ein wirklich prachtvolles Paar Pennants-Sittiche (Pl. Pennanti) und ein hübsches Paar Vielfarbige Sittiche (Pl. multicolor) beide vom Verein „Fauna" ausgestellt. Das Herrn Daubenspeck gehörige Paar Buntsittiche (Pl. eximius) war von den fünf vorhandenen Paaren am schönsten im Gefieder. Der Zoolog. Garten in Antwerpen hatte sowol von gewöhnlichen Inseparables, als grauköpfigen Inseparables und den hübschen kleinen Sperlingspapageien mehrere Paare zur Ausstellung gesandt.

Wildvögel, 1. Samenfresser, (etwa 50 Nummern). Außer den gemeinsten Astrilden, Amadinen und kleinen Fringillen fanden sich sechs Paar weiße Reisvögel und drei Paar gelbe amerikanische Drosseln aus dem Zool. Garten zu Antwerpen vor. Ferner sind der schöne Larvenweber (Pl. larvatus) und der Tertorweber (Pl. Textor) des Herrn Bresges in Rheydt, der Madagaskarweber, sowie der grüne Kardinal des Vereins „Fauna" zu erwähnen. — Unter den 2. Weichfressern fanden drei Steindrosseln (Einsamer Spatz, Petrocincla saxatilis) von Herrn Bonvie in Köln und Zuckerkandel in Dresden sofort Käufer. Die von Herrn Hagenbeck eingesandten prachtvollen Arten fremdländischer Staare, Glanzdrosseln und Jamaika-Trupiale wurden größtentheils vom Zool. Garten in Köln angekauft. — Kanarienvögel. Nur in wenigen Nummern, mit etwa 20 Exemplaren vertreten und kaum Käufer findend, da die Liebhaberei für diese Singvögelklasse hier verhältnißmäßig noch gering ausgebildet ist.

Kaninchen.

Flandrische Riesenkaninchen. Durch ein Paar des Zool. Gartens in Gent und drei Stück des Herrn Donny Sapin in Gent in schönen und wirklich riesigen Exemplaren vertreten. Erstere wurden trotz des hohen Preises (21 Thlr.) sofort angekauft, und ebenso kurz nachher die andern drei Stück. — Lapins beliers. (Widderkaninchen.) Durch 2 Nummern des Herrn Behling in Rheydt sehr gut vertreten, außerdem verdienen noch die Beliers des Herrn Dahm in Elberfeld und die des Herrn Birlenbach in Diez erwähnt zu werden. — Normandiner. (Hasenkaninchen.) Von Herrn Witsch in Dülken in einem Paar alter und einem Weibchen mit vier Jungen ausgestellt. — Lapins à fourrure riche. Diese neuere, durch ansehnliche Größe und feines dichtes Pelzwerk ausgezeichnete Rasse, von meist eisengrauer Färbung mit dunkler Schnauze, war durch zwei schöne Paare des Zool. Gartens zu Antwerpen und zwei desgl. des Zool. Gartens zu Gent sehr gut vertreten. — Die Batavischen (Chinesischen) Kaninchen des Herrn Daubenspeck in Düsseldorf fanden

wegen ihrer auffallenden Zeichnung und Farben (weiß mit braunschwarzer Nase, Ohren und Schwanz) viel Beifall. — Unter den sonst ausgestellten Kaninchenrassen: Lapins garenne, Seidenkaninchen, persische Wollhasen, Silberkaninchen u. s. w. ist nur eine persische Wollhäsin des Herrn Witsch in Dülken besonders hervorzuheben.

Unter den verschiedenen Käfigen, Geräthschaften u. s. w., welche gleichzeitig zur Ausstellung gelangten, erwähnen wir zunächst des großen Kaninchen-Zuchtkastens mit neun Abtheilungen des Herrn Behling in Rheydt, eines Sortiments von Nistkästen der mannichfaltigsten Art von Herrn Frühauf in Schleusingen und einer (im Katalog nicht aufgeführten) Sammlung von vielen Fallen und Fangeisen zum Vertilgen des unsere Hühnerhäuser und Taubenschläge schädigenden Raubzeuges, vom Fabrikanten Pieper in Moers.

Soweit der Bericht über dies unser erstes Unternehmen, auf dessen glücklichen Verlauf wir um so freudiger zurückblicken, als es das erste Lebenszeichen unseres jungen Vereins und deshalb nicht ohne die sorgliche Erwägung begonnen war, daß das Gelingen zugleich zu einer Frage für sein ferneres reges Fortbestehen werden würde. Unsere weiteren Ziele werden wir nun um so muthiger anstreben können, als wir die reichen vielseitigen Kräfte unserer Mitglieder erprobt und erkannt haben, und mit ihnen und den gewonnenen Erfahrungen künftighin auch eine immer geregeltere, festere Organisation zu erreichen hoffen dürfen.

Jedenfalls findet unsere „Fauna" ihre erfreulichste Aufmunterung, den besten Lohn für alle angewendete Mühe und Arbeit in dem über alle Erwartung günstigen Erfolge, der sich in der allgemeinen Anerkennung, sowohl der anwesenden fremden Fachmänner und Preisrichter, als auch der Besucher aller Stände erwiesen und unsere Ausstellung unter der fröhlich erregten Stimmung der Pfingsttage zu einem wahren Volksfest gestaltet hat.

Indem der unterzeichnete Vorstand vorstehenden Bericht der Oeffentlichkeit übergiebt, dankt er zunächst sämmtlichen Ausstellern, namentlich den Direktionen der Zoologischen Gärten zu Köln, Antwerpen und Gent für die reichhaltigen Thiersendungen, wie für das Vertrauen überhaupt, mit welchem dieselben diesem ersten Unternehmen des jungen Vereines entgegengekommen sind.

Ihrer Königlichen Hoheit, der Frau Prinzessin Karl von Preußen ist der Verein zu besonderm Dank verpflichtet, indem Höchstdieselbe die Ausstellung auf dahin gehendes Ersuchen von Seiten des Komités mit einer Sammlung prachtvoller Tauben beschicken ließ, welche der betreffenden Abtheilung zur größten Zierde gereichte.

Auch spricht das Komité bei dieser Gelegenheit allen Denen, welche das Zustandekommen unserer Ausstellung auf's Bereitwilligste beförderten und unterstützten, im Auftrage des Vereins dessen Dank aus. — Es gilt dies zunächst für das Königliche Ministerium der landwirthschaftlichen Angelegenheiten, für das hiesige K. K. Postamt, sowie für den Verwaltungsrath der städtischen Tonhalle und die Direktion der hiesigen Gas- und Wasserleitungs-Anstalt.

Die nachfolgend verzeichneten Herren Mitglieder der „Fauna" bildeten gemeinschaftlich mit dem Vorstande die für diesen Zweck zusammengetretene „Ausstellungs-Kommission": H. Berg, Zimmermeister, Graf von Bocholz, E. Booch, Maler, Bueck, General-Sekretär, Courth, Assessor, A. Frank, Ingenieur, Grohmann, Direktor der städtischen Gas- und Wasserleitung, A. Günther, Rentier, J. de Haen, Kaufmann, Hennighausen, Kaufmann, Hering, Königl. Garten-Inspektor, C. Hoff, Maler, C. Jutz, Maler, Kramer, Advokat-Anwalt, Müller, Notar, Gustav Poensgen, Fabrikbesitzer, L. Plümacher, Kaufmann, Schleger, Steuerrath, Schoras, Kaufmann, Seeldreyer, Maler, Severin, Hof-Photograph, H. Stahl, Buchdruckereibesitzer, Tannert, Maler, Vogel, Ingenieur, F. Windscheid, Fabrikbesitzer, R. Windscheid, Kaufmann, O. Wolff, Maurermeister, F. Worms, Kaufmann. Ihnen gebührt nicht minder Dank und Anerkennung. Noch sei bemerkt, daß die zur Aufnahme der auszustellenden Thiere dienenden Behälter, Volièren und Käfige für Rechnung des Vereins von der Drahtflechterei des Herrn Kircher in Köln (Geflügel) und Herrn Zimmermeister Berg (Kaninchen) in Düsseldorf in möglichst zweckmäßiger Herstellung geliefert wurden. Letzteres gilt namentlich auch von den Behältern der Kaninchen, welche in Bezug auf gefälliges Aeußere, gute innere Einrichtung und die Möglichkeit leichter Reinigung nichts zu wünschen übrig lassen.

Schlußbemerkungen zum Bericht über die Düsseldorfer Ausstellung.

Ankäufe. Die während der Ausstellung gemachten Privatankäufe betrugen eine Summe von mehr als 2000 Thaler. Der Verein kaufte zur Verloosung, nach dem vom Königl. Oberpräsidium in Coblenz genehmigten Plane, für $^2/_3$ des Werthes der ausgegebenen Loose (7500), also für 1666 Thlr. an, so daß im Ganzen auf der Ausstellung von den als verkäuflich angegebenen Thieren für etwa 3800 Thlr. gekauft wurden.

Prämien. Das Ministerium für landwirthschaftliche Angelegenheiten hatte dem Verein neun Preismedaillen (3 silberne und 6 bronzene) zur Prämiirung hervorragender Leistungen übermitteln lassen. Die sonstigen Prämien bestehen in einem Ehrendiplom, nach dem für diesen Zweck von Herrn Maler Jutz bereitwilligst hergestellten und dem Verein gewidmeten trefflichen Original-Aquarell, welches auf der Ausstellung aufgestellt, sich den allgemeinsten Beifall erwarb, und sauber kolorirt, als erster, in elegantem Tondruck als zweiter Preis ausgegeben wurde. So gewährt auch in dieser Beziehung die Ausstellung ein recht günstiges Ergebniß.

Preisrichter. Das Amt der Preisrichter wurde durch Beschluß des Vorstandes nur auswärtigen Herren übertragen. Als solche waren gewählt für Tauben: Hausmeister Meyer aus Berlin, Theodor Hesse aus Köln, F. Hermann aus Köln; für Hühner: Direktor Funck aus Köln, Direktor van der Snickt aus Gent, W. Zeppenfeld aus Mülheim a. d. Ruhr, W. Haas aus Nippes bei Köln; für Vögel: Direktor Funck aus Köln, Heinrich Schmitz aus Mülheim a. d. Ruhr, Professor W. Camphausen in Stellvertretung des verhinderten Professors Landois aus Münster; für Kaninchen: Direktor N. Funck, Direktor van der Snickt, Professor W. Camphausen, wie oben.

Der Vorstand des Vereins „Fauna" in Düsseldorf.

Adv.-Anwalt Lützeler; Professor Camphausen; Maler L. Beckmann; Dr. F. Schoenfeld; Kaufmann Th. Jaeger; Rittergutsbesitzer Julius Wolters; Kaufmann Herm. Seebohm; Kaufmann Herm. Garnich; Rentner Oskar Günther; Bankier Leonh. Scheuer.

Die fünfte große Ausstellung des Akklimatisations-Vereins in Berlin findet nicht, wie in Nr. 34 angegeben, vom 26. bis 29. September, sondern vom 23. bis 26. September cr. im Hotel Imperial, Unter den Linden Nr. 44, statt. Anmeldungen bis zum 12. September cr. frankirt an das Bureau des Akklimatisations-Vereins in Berlin, Adlerstraße 12. Einsendung der Ausstellungsgegenstände bis zum 22. September, Nachmittags 2 Uhr, nach dem genannten Ausstellungslokal. In allem Uebrigen verweisen wir auf das bereits veröffentlichte Programm.

Ausstellung des Hühnerologischen Vereins in Görlitz.

Nach dem uns soeben zugegangenen 12. Bericht findet die diesjährige Ausstellung am Donnerstag und Freitag, den 10. und 11. September cr., im Englischen Garten des Herrn Hütter in der Konsulstraße statt. Anmeldungen bis zum 5. September und Einsendungen frei bis zum 9. September. Rücksendung unfrankirt, doch wird weder Standgeld, noch Provision für die Verkäufe erhoben.

Das Direktorium des Hühnerologischen Vereins ist auch gern bereit, Aufträge zum Ankauf von Geflügel zu übernehmen und in dieser Hinsicht wird darauf aufmerksam gemacht, daß die beliebtesten Rassen, wie z. B. Kochin-, Brahma-, Spanier-, Bantam-, Yokohama-, Crèvecoeur-, Paduaner- und dergl. Hühner, sowie auch die stets gesuchten blauen Schwedischen Enten, welche sich durch große Fruchtbarkeit und Mastfähigkeit auszeichnen, recht schön vertreten sein werden.

Bei dem leider immer mehr überhand nehmenden Schwindel, namentlich in Betreff der Hühner, sagt das Direktorium des Hühnerologischen Vereins, können wir nur warnend rathen, mit Bestellungen bei Unbekannten vorsichtig zu verfahren. Wir gestatten uns, zwei uns als sehr solid bekannte Männer, aus voller Ueberzeugung zu empfehlen, und zwar Herrn A. Rumpf in Aufersihl-Zürich für italienische Hühner und französische Rassen, und Herrn H. Marten in Linden bei Hannover hauptsächlich für aus England zu beziehende Rassen. Letzterer beabsichtigt auch eine große Züchterei anzulegen, selbstverständlich nur zur Aufzucht des edelsten Geflügels.

Briefwechsel.

In Hinsicht des deutschen Geflügelzüchtertages sei allen Freunden unserer Bestrebungen angezeigt, daß Herr A. Creutz in Stettin, obwol er von Seiten des Ornithologischen Vereins recht sehr in Anspruch genommen ist, sich dennoch gern entschlossen hat, die Angelegenheit in die Hand zu nehmen und in der gewünschten Weise vorzubereiten.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Soeben erschienen und sind in allen Buchhandlungen vorräthig:

Prütz, G., Die Arten der Haustaube. 2. mit einem Anhange **„Die Krankheiten der Tauben“** vermehrte Auflage. Eleg. geh. Preis 15 Ngr. [505]

Herrn Dr. Karl Russ gewidmet.

Willibald, E., Die Nester und Eier der in Deutschland und den angrenzenden Ländern brütenden **Vögel. 2.** vermehrte Auflage. Mit 228 colorirten Abbildungen. Elg. geh. Preis 24 Ngr.

Leipzig. **C. A. Koch's** Verlagshandlung.

---

1 junger Sperber, sehr schönes Exemplar, ist à Thlr. 3. zu verkaufen. Näheres i. d. Exped. d. Bl. [506]

Zu verkaufen: [507]

1 Paar Nymphenpapageien, 1 Paar Elsterchen, 1 Paar Astrilds, 1 Reisvogel, 1 Bandfink, 1 Feuerfink, 1 Silberbäckchen und 1 Helenafasänchen, zusammen für 12 Thlr. Näheres bei Dr. **Renking,** Berlin, von der Heydtstr. 5.

Ein Graupapagei, tadellos im Gefieder, sehr zahm und schön pfeifend, ist billig zu verkaufen oder gegen Wellensittiche zu vertauschen durch Apotheker **F. Koeppen** in Rudolstadt. [508]

Ein Amazonen-Papagei mit blauer Stirn, welcher ganz zahm ist, wie ein Hund in der Stube und im Freien nachläuft, auch gut spricht, lacht, weint, hustet u. s. w. ist zu verkaufen von **Friedrich Geisler** in Langenburg in Württemberg. [509]

Ein schöner, junger **Graupapagei,** sehr gelehrig, gut sprechend und zahm, ist für 80 Thlr. zu verkaufen. Näheres i. d. Exped. d. Blattes. [510]

Prachtexemplare von **Viper ammodyles** hat à 3 Thlr. zu verkaufen **H. Fiedler,** Buchhändler, Agram. [511]

Amseln 1 Thlr., Gartenrothschwanz, bunter, 10 Thlr., Lerchen 22½ Sgr., Schwarzplatten, Grasmücken, graue, und Nachtigalen, einzeln, und Pärchen, 2 Paar Wiesenroller (Wachtelkönige), sowie Stieglitze und Hänflinge bei **Rudolph Schmidt,** Erfurt. [512]

Russische 1874er Ameisen-Eier empfingen und empfehlen **Mey & Bengelsdorff,** Berlin. [513]

Sommerrübsamen à Ctr. 6½ Thlr., Hanf 5½ Thlr., Mais 5½ Thlr, Hirse: weiße 8½ Thlr., bunte 4¾ Thlr., Mohn: blauer 11⅔ Thlr., weißer gr. 11⅔ Thlr., weißer kl. 8¾ Thlr., Ameiseneier à Pfd. 20 Sgr., Salatsamen à Pfd. 4 Sgr. empfiehlt **Rudolph Schmidt,** Erfurt. [514]

Junge Kanarienhähne, echt Harzer Abstammung, Stück 1 Thlr. 20 Sgr., Weibchen Stück 7½ Sgr. sind noch zu haben bei **W. Langner** in **Liegnitz,** [515] Uferstraße Nr. 1.

Eine größere Partie Ameiseneier (in diesem Monat gesammelt) giebt ab gegen ausländ. Körnerfresser [516] Dr. **Ackermann** in Hersfeld.

Abzugeben: 1 P. Madagaskarweber in Pracht, 1 P. Nymphen, 1 P. graue gehäubte Kardinäle. Sämmtliche Paare haben schon genistet und befinden sich in bestem Zustande. Gesucht, ev. in Tausch angenommen: Grüne, grüngehäubte Kanarienweibchen und Isabellen. [517]

O. Ohlendorf in Lingen, Prov. Hannover.

Ich beehre mich anzuzeigen, daß Steinröthel (junge Männchen) pr. Stück mit 5 Thlr., ferner:

Herbst-Sprosser, bereits gut ans Futter gewöhnt, das Stück mit 1 Thlr. 15 Sgr. (bei größerer Abnahme billiger) und junge Dompfaffen (zum Lernen) das Stück mit 20 Sgr. abgegeben werden bei

F. Zioša, Vogelhandlung in Troppau, [518] (Oesterreich).

Zu vertauschen.

6 bis 8 **Zebra-Finken-Männchen,** im besten Zustande, sollen gegen eben solche Weibchen vertauscht werden. Offerten mit Bedingungen werden erbeten.

Cassel. Cölnische Allee Nr. 28½. **Frantz.** [519]

Graue Papageien, Undulaten oder Wellensittiche, Reisvögel, Zebrafinken, Astrilds, Schmetterlingsfinken, Bronzemännchen, Tigerfinken, Atlasvögel, ferner rothe Kardinäle, Morgenfinken und sodann auch folgende Tauben:

1 Paar blaue Chinesen, fehlerfrei	Thlr.	15.
1 Paar schwarze Egypter do	„	8.
1 Paar Indianer, schwarze do.	„	5.
1 Paar Storchröpfer, Isabellenfarbiger Täuber und weiße Taube	„	5.
1 **Cyprianer**-Täuber, weiß und schwarz getigert	„	5.

hat vorräthig

Rudolf Schoebel,

[520] Thierhändler aus New-York. (z. Z. Grünau bei Berlin, Villa Schoebel.)

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 10. September 1874. Nr. 37.

Inhalt:

Die einheimischen Finken. —
Zebrafinken-Zucht. —
Zur Wellensittich-Zucht. —
Zur Hühner-Zucht: Todtleger. —
Anfragen und Auskunft: Tigerfink, Grauedelfink, Ofen für die Vogelstube; Flügellähmung; Bandfinken; Fasanenhühner. —
Aus den Vereinen: Ausstellung und Geflügelmarkt in Karlsruhe. —
Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel: Hühnerkrankheit. —
Anzeigen.

Die einheimischen Finken.

Die Vogelliebhaberei in unserer Gegend ist sehr einseitig, denn sie erstreckt sich mit wenigen Ausnahmen nur auf die Vertreter der Finken-Familie. Unter diesen steht auch hier an der Spitze der in der ganzen Welt beliebte und verbreitete Kanarienvogel. Ueber Ansichten und Erfahrungen der hiesigen Kanarienvogel-Züchter, zu denen ich selbst gehöre und die ich fast alle kenne, werde ich Mittheilungen zu machen mir später erlauben. Heute habe ich es vornämlich auf die übrigen bekanntesten Finkenarten abgesehen, als da sind Stieglitz, Hänfling, Edelfink, Zeisig, Grünling und Girlitz, welche man in Einzelhaft fast in jeder Häuslichkeit des Handwerkers und sonstigen Stubenhockers findet. Sie werden von unserm hiesigen Vogelfänger (seines Zeichens ein ehrsamer Schuhmacher) als Wildfänge in jeder beliebigen Zahl der Kopf für 5 bis allerhöchstens 10 Sgr. geliefert, und in diesem letzteren Umstande liegt hauptsächlich die Erklärung ihrer großen Beliebtheit; denn ein Kanarienvogel kostet bei uns immer mehrere Thaler.

Auch den Dompfaffen findet man, wenn auch seltener, da er schon höher im Preise steht. Unser Vogeltobies liefert das Pärchen nicht unter 2 Thaler. Sogenannte gelehrte Dompfaffen habe ich hier noch nie gefunden. Von unsern insektenfressenden Meistersängern ist bei hiesigen Liebhabern nicht eine Spur zu finden; man müßte denn ein Rothkehlchen, das in der Stube eines Kleinbürgers oder Landmannes zum Vergnügen der Kinder überwintert, als Ausnahme von der Regel ansehen wollen. Ausländische Vögel habe ich trotz meines eifrigsten Forschens auch bis jetzt nur in drei Familien gefunden; es waren Papageien, die sich als Geschenke dahin verirrt hatten.

Somit bleiben für meine Berichte über Vogelliebhaberei in hiesiger Gegend nur einheimische Vögel, und unter diesen besonders, wie erwähnt, Finken übrig. Und ich selbst besitze gegenwärtig unter meinen vielen einheimischen Vögeln fast alle Finken.

Besonderes Vergnügen gewähren mir dieselben in einem großen Gebauer, das in meinem Zimmer Platz gefunden hat. Als Insassen habe ich Buchfink, Stieglitz, Hänfling, Zeisig, Grünling, Girlitz und Kanarien; alle, natürlich mit Ausnahme des letzten, sind Wildfänge, von dem bereits erwähnten Vogeltobies bezogen. Sie zeichnen sich sämmtlich durch große Zutraulichkeit und Zahmheit aus, was seinen Grund wol besonders darin hat, daß der Zeisig und der Hänfling schon seit zwei Jahren in Einzelkäfigen von mir gehalten wurden, in welcher Zeit ich mich vielfach mit beiden beschäftigte. Sie

gehen nun in Gemeinschaft mit dem Kanarienvogel den übrigen mit gutem Beispiel voran, und dasselbe wirkt ganz entschieden.

Für gewöhnlich herrscht die schönste Eintracht unter ihnen. Eine kleine Paukerei giebt es nur, wenn ich mit einem knapp zugemessenen grünen Leckerbissen erscheine. Dann bleibt aber regelmäßig der Stieglitz Sieger. Sein starker spitzer Schnabel, mit dem er äußerst freigiebig tüchtige Hiebe nach allen Seiten austheilt, hält die übrigen Insassen in respektvoller Entfernung. So unbedingt würde freilich sein Sieg nicht sein, wenn der Edelfink, der ihm mindestens ebenbürtig ist und ihn an Raufluft bedeutend übertrifft, und der sich auch in keiner Weise in seinen vermeintlichen Rechten schmälern läßt, nicht das Grünzeug vollständig verschmähte, von dem alle übrigen desto eifrigere Liebhaber sind.

Der Spaßmacher der bunten Gesellschaft ist der Zeisig. Der kleine, äußerst lebhafte Bursche, der nur wenn er vor dem Mohnnapf sitzt oder sein kurzes Liedlein trillert, auf demselben Flecke bleibt, steckt seinen Schnabel überall dazwischen. Wirklich drollig sind seine Kletterübungen, die er mit großer Kunstfertigkeit an den Drahtstäben der Decke des Gebauers ausführt. Mit einer fast unglaublichen Schnelligkeit läuft er von einem Ende der Decke zur andern, dreht sich flink um und läuft mit derselben Geschwindigkeit zurück. Und dieses kletternde Laufen am Drahtgeflecht wiederholt sich mitunter 5—10 Mal, ohne daß der kleine Gymnastiker Ermüdung zu fühlen scheint. Ueberhaupt ist seine ewige Unruhe, seine stete Beweglichkeit nach meiner Meinung eine gute Anregung für die übrigen Insassen. Seinen unbedeutenden Gesang trägt er als Wildfang unvermischt vor. Recht unangenehm und störend für mich ist aber sein langgezogenes „tschrrrrrrrtsch", welchen Ruf er zwar nicht in sein Liedlein mischt, wol aber ertönen läßt, wenn besonders seine Genossen sich durch ihren Gesang hervorthuen.

Der Gewaltige der Gesellschaft, der schöne lebhaft gefärbte Stieglitz, der bis jetzt wenig von seiner ursprünglichen Färbung eingebüßt hat, zeichnet sich, wie schon bemerkt, besonders durch seinen großen, starken und langen Schnabel aus, dessen scharfe Spitze tüchtig gebogen ist. Ich habe früher vielfach den Stieglitz im Freien beobachtet, auch im Herbste große Gesellschaften gesehen, aber nie einen mit solchem Schnabel gefunden. Ueberhaupt ist dieser Stieglitz ausnahmsweise groß, und als ich ihn bekam, war er lebhafter gefärbt, als ich bisher je einen solchen Vogel in der Freiheit gesehen habe. Aus allen diesen Anzeichen schloß ich, daß ich es mit einem bemosten Haupte zu thun hatte; doch bin ich von dieser Idee wieder abgekommen, da sich der Vogel verhältnißmäßig leicht eingewöhnte und die Erfahrung doch lehrt, daß recht alte Thiere immer wild und scheu bleiben. Wenn der Edelfink nicht da wäre, würde er unbestrittene Alleinherrschaft haben. Doch geht aus seinem ganzen Gebahren hervor, daß er nicht gerade sehr herrschbegierig ist und es nicht übel nimmt, daß der Edelfink ein Wörtchen mitspricht. Im Uebrigen ist er ein gewandter, rühriger und munterer Gesell, immer nett und reinlich, immer sauber und geputzt! Und welche Sorgfalt verwendet er auf sein Gefieder! Er glättet und ordnet ebensoviel, als die Andern zusammen genommen. Ja, der große Bursche kommt mir ganz wie ein recht putzsüchtiges, eitles Dämchen vor! Für diese kleine Schwäche bietet er aber dem Auge ein stets tadelloses Gefieder, das er gleichsam mit würdiger Haltung zur Schau trägt. Auch ist er ein sehr fleißiger Sänger. Wenn er nicht speist, nicht putzt und glättet und auch nicht, was öfters geschieht, es dem Gymnastiker Zeisig im Deckenlaufen gleichthun will — was ihm übrigens nie recht gelingt — dann trägt er seinen vollen, schmetternden und feurigen Wildgesang vor und zwar so herrlich, so tönend, wie ich ihn nie zuvor hörte. Dafür ist er aber auch mein Liebling, den meine Augen immer zuerst suchen und auf dem sie am längsten verweilen. Im Herbste versäume ich nie, bestielte Distel- und Mohnköpfe in das Gebauer zu stecken, an welchen sich dann der gewandte und pfiffige Bursche nach Art der Meisen anhängt, um zu dem begehrten Inhalte zu gelangen, bei welchen Bemühungen ihm dann der Gymnastiker Zeisig, soweit natürlich nur, als er es erlaubt, eifrig hilft. — Trotzdem er mich kennt und auch wol von meiner guten Absicht ihm gegenüber überzeugt ist, so bekommt er doch, wenn ich nahe an das Gebauer trete, immer noch starkes Herzklopfen. Wenn er sich aber auf einer entfernteren Sitzstange befindet, dann bleibt er häufig sitzen, klammert sich mit dem linken Fuße krampfhaft fest und schurrt mit dem rechten auf der Stange entlang, wobei er sich mit dem ganzen Körper gleichseitig nach rechts wendet; dabei stößt er schnell hintereinander sein: „Räh, räh, räh" aus. Da die Wendungen ziemlich schnell ausgeführt werden, so hat das Ganze etwas ungemein Komisches. —

Der Edelfink im Gesellschaftsbauer kommt mir wie der Puter im Hühnerhofe vor; anmaßend und vorlaut, nach der Herrschaft ringend. Durch jede Kleinigkeit läßt er sich aufregen. Mit gespreizten Flügeln, aufgehobenem Schwanze und schreiender Stimme durchhüpft und durchjagt er den Käfig. Mit Ausnahme des Stieglitz fürchten ihn alle. Und zwischen diesen beiden herrscht ein ganz eigenes Verhältniß. Es scheint mir, sie haben sich einmal gerauft, ohne daß einer Sieger geblieben ist, und seit dieser Zeit erkennen sich beide in ihrer Kraft an und gehen sich aus dem Wege oder dulden sich wenigstens. Dem Edelfinken aber gefällt dieses Verhältniß gewiß nicht. Er wäre gar zu gerne Alleinherrscher, und ich glaube, er würde, wenn ihm der Stieglitz nicht so gut die Stange hielte, ein rechter Despot sein, und die liebe Eintracht würde viel häufiger Unterbrechungen erleiden, als es jetzt der Fall ist. — Trotz dieser nicht gerade lobenswerthen

Eigenschaften möchte ich den Meistersänger, den Edlen, nicht im Gesellschaftsbauer missen. Sein munteres Wesen, seine große Beweglichkeit, sein schönes, stets sauberes Kleid und seine stolze Haltung, seine, mit einem Worte, „elegante Erscheinung" ist dort so recht am Platze. Mein Auge wenigstens entzückt er dort mehr, als in Einzelhaft. Dazu kommt noch sein fleißiger Meisterschlag (ein Bräutigam), den er voll und häufig bis Anfang November ertönen ließ, und ich hoffe, zum Februar soll er wieder beginnen. Er hat einmal bei mir gemausert und ist noch sehr lebhaft gefärbt. —

Ein sehr tüchtiger und fleißiger Musikus, mit einem äußerst bescheidenen, dabei aber lebhaften und heiteren Wesen — das ist der Hänfling. Er ist nicht raufsüchtig, nicht neidisch, nicht zänkisch, sondern fein verträglich und gutmüthig, mit einem Worte „liebenswürdig." Er mengt sich weder in Streitereien, noch kümmert er sich um die Anmaßung der Andern. Schon seit mehreren Jahren ist er in meinem Besitze und daher sehr zutraulich und zahm. Seine schöne rothe Brust ist leider verschwunden; nur eine hellere gelbliche Färbung erinnert in trauriger Weise an die einstige Schönheit. Trotzdem er schon ein ziemliches Alter erreicht haben muß, singt er doch noch sehr fleißig und angenehm. —

Der Grünfink ist ein plumper, ungeschickter Gesell, schwerfällig in allen seinen Bewegungen und faul in seiner ganzen Haltung. Als höchstes Glück seines Daseins hat er glücklich den Inhalt der verschiedenen Futternäpfe entdeckt, welche letztere er denn auch bedeutend mehr, als jeder andere Bewohner des Gebauers heimsucht. Er bildet das phlegmatische Element in der Gesellschaft, kümmert sich nur um sich selbst und läßt die Andern machen, wozu sie Lust haben. Er scheint als Lebensregel das Sprüchwort zu haben: „Ruhe und Rast ist die halbe Mast". Besonders lebhaft machte ihn nur die Angst in der ersten Zeit der Gefangenschaft; seitdem er aber eingewöhnt ist — was bei ihm übrigens sehr schnell der Fall war — läßt er sich durch nichts sonderlich erregen. Unter den bis jetzt beschriebenen munteren Gesellen nimmt er sich jedoch mit seiner unerschütterlichen Seelenruhe recht gut aus und befriedigt den Liebhaber, während er in Einzelhaft unausstehlich durch sein langweiliges Benehmen wird. Seinen unbedeutenden Gesang trägt er mit leiser Stimme ziemlich fleißig vor. —

Der kleine, zierliche Girlitz zeichnet sich in keiner Weise aus. Er ist weder besonders lebhaft, noch phlegmatisch, weder raufluftig, noch duckmäuserig, vielmehr ist er ein stiller, sanfter Gast, in bescheidenster Weise munter und lebhaft. Dem Beobachter fällt weder seine Haltung, noch die Farbe seines Gefieders, noch sein Wesen auf, dennoch füllt auch er in der bunten Genossenschaft seinen Platz recht gut aus. Für die Einzelhaft besitzt er freilich keine empfehlenden Eigenschaften, da auch sein Gesang nur unbedeutend ist. —

Der Kanarienvogel, der siebente und letzte Bewohner des Gebauers, gebehrdet sich ganz so, wie in der Einzelhaft. Er verträgt sich recht gut mit seinen Kameraden, singt fleißig und gewährt dem Auge durch seine hochgelbe Färbung eine angenehme Abwechselung. S. in N.

Zebrafinken-Zucht.

(Briefliche Mittheilung von Herrn Dr. Franken).

... Ich besitze von Zebrafinken zwei Männchen und ein Weibchen, die sich in einem eigenthümlichen Verhältnisse befinden. Es baut nämlich das Paar ein Nest, das Weibchen legt einige Eier und der Mann brütet eifrigst, während das Weibchen unterdessen sich mit dem andern Männchen herumtreibt. Die erste solcher Bruten ging fehl, die zweite aber, bei der während des Tages, nach Ablage von 4 Eiern, das Weibchen nach meiner Beobachtung nie im Neste war, hat 2 lebende Junge ergeben, die das Männchen ganz allein besorgt, obwol sich das Weibchen durchaus nicht darum zu kümmern scheint. Es hat mit dieser Vogelart eine ganz sonderbare Bewandtniß. Ein Bekannter von mir hatte ein Paar, die im Käfig am Boden neben einer Thüre standen, durch welche fortwährend dieser Herr oder das Dienstmädchen vorbei ging; ein alter hustender Hund und ab und zu eine Taube machten die Gegend auch noch unsicher, was aber alles die Zebra's nicht störte. Zum Verzweifeln legten die Vögelchen aber nur Eier, vielleicht 60—70. Dann fingen sie aber auch an zu brüten und zwar ohne Unterlaß, mitten in der Mauser, halb nackt, und zogen Geleg um Geleg auf, vielleicht 120—130 Junge in 2 Jahren. Als ich München verließ, war dieser Fortpflanzungsvorgang immer noch im besten Flusse und er war schwer zum Stillstehen zu bringen, da Brut auf Brut folgte, wie ein Schuß eines Hinterladers auf den andern; flog heute eine Brut aus, so waren in zwei oder drei Tagen die Eier bereits wieder da.

Zur Wellensittichzucht.

In den in Ihrem Blatte enthaltenen Mittheilungen über Wellensittichzucht findet sich von Herrn Schuster die Frage aufgeworfen, woher es komme, daß so viele Junge die Nistkasten in mangelhaftem, oft bis auf die Schwung- und Schwanzfedern ganz fehlendem Gefieder verlassen. Ich habe diese Erfahrung ebenfalls und zwar an sehr kräftigen, gut genährten Jungen in Nistkasten, in denen Nichts von Ungeziefer zu entdecken war, gemacht und glaube die Erklärung dieses Mißstandes daraus herleiten zu können, daß die alten Weibchen ihre Jungen rupfen. Ich beobachtete, daß, wenn die Jungen mit vollständigem Gefieder im Nistkasten lagen, sie nach einigen Tagen vollständig kahl waren, bis auf die Flügel-, Schwanz- und Bauchfedern, und bei einer Brut ging dies Rupfen sogar geradezu

in ein Benagen der Jungen über, so daß die Flügelknochen derselben ganz wund waren. Ob nun ein solches Treiben der Alten, wenn man sie ruhig gewähren läßt, in einzelnen Fällen nicht in das Auffressen der Jungen ausartet, bleibt dahingestellt, da wenigstens ich die Sache nie so weit kommen ließ. Ein Bekannter von mir, der ebenfalls viele Wellensittiche gezüchtet hat, machte die nämlichen Beobachtungen, und das ausgerupfte Gefieder der Jungen fand sich bei Reinigung des Nistkastens stets in demselben vor. Aus welchem Grunde dies Rupfen der Jungen nun stattfindet, ob aus Langeweile oder Unart, bleibt sich im Grunde ziemlich gleich, die Hauptsache wäre, ein Mittel zu finden, es zu verhüten. Ich habe nun stets, sowie ich dergleichen bemerkte, das Weibchen aus dem Nistkasten genommen und abgesondert und dann gewartet, bis das Männchen den Nistkasten besuchte und, wenn das Weibchen auf sein Locken nicht zum Vorschein kommen wollte, in den Nistkasten schlüpfte. Den Kasten mit Männchen und Jungen entfernte ich sodann aus dem gemeinsamen Nistraum und brachte ihn in einem besonderen Käfig unter und regelmäßig fütterte das Männchen die Jungen auf und das Gefieder derselben kam allmälig wieder zum Vorschein.

In einem großen Flugraum, und wenn man viele Vögel hätte, hat dies Verfahren allerdings seine Uebelstände, denn es dauert oft sehr lange, bis das Männchen sich in den Nistkasten zu gehen entschließt; züchtet man aber in einem großen Käfige und hat nicht viele Pärchen, so ist das Männchen bald zu erlangen und braucht dann nur zu den Jungen gesetzt zu werden, derer es sich ohne Weiteres annimmt. Die Jungen in dem gemeinschaftlichen Raum zu lassen, ist nicht anzurathen, denn wenn das Männchen dieselben auch anfangs füttert, so passirt es doch, daß es sich schließlich mit andern Weibchen zu schaffen macht, und dann die Jungen vernachlässigt oder daß der Kasten mit den mutterlosen Jungen von einem fremden Weibchen besucht und die Jungen von demselben getödtet werden.

Sind die Jungen vom Männchen groß gefüttert und selbstständig, so kann man das alte Männchen und Weibchen wieder in den Flugraum entlassen; sie werden sich in den meisten Fällen gleich wieder zusammenfinden, und zu einer neuen Brut anschicken.

Der Ansicht des Herrn Schuster, daß die Zucht in Einzelkäfigen sicherer und erfolgreicher sei, neige auch ich zu. Wenn man eine größere Anzahl Pärchen im Fluggebauer hat, so wird allerdings die Zahl der Jungen unter günstigen Verhältnissen eine ganz beträchtliche sein. Wieviel Eier aber in Folge gestörter Paarung unbefruchtet sind, wieviel Eier von den Weibchen einander zerstört, wieviel Junge todt gebissen werden, kann man dann nicht ergründen, und wie die Weibchen sich oft gegenseitig zurichten, weiß Jeder, der Wellensittiche in größerer Anzahl beisammen gehabt hat; nicht allein, daß sie sich oft schwer verwunden und tödten, sie vernachlässigen auch über ihrer Rauflust die eigenen Eier und Jungen und lassen letztere verkommen.

Die Ansicht, daß man von der gleichen Anzahl Sittiche, die man in einer großen Flugvolière hält, in demselben Zeitraum wol die doppelte Zahl Junge erhalten hätte, wenn man dieselben Pärchen für Pärchen allein, in besonderem Raume hätte nisten lassen, dürfte nach dem Gesagten nicht richtig sein. Die Züchtung in Einzelkäfigen hat aber allerdings auch ihre Mißstände, namentlich den, daß die Vögel überhaupt nicht im Käfige so leicht nisten, als im Flugraum. Jedenfalls sind die Ansichten des Herrn Herausgebers, daß es durchaus gerathen ist, die Vögel erst zutraulich zu machen, wenn man mit Erfolg im Käfige züchten will, durchaus richtig und zu beherzigen, und wenn die Vögel sich in ihrem Käfig sicher fühlen, werden sie bei gehörigem Alter nicht lange mit dem Nisten zögern.

Wiesbaden. M. B.

Zur Hühnerzucht.

In einem vollständig abgeschlossenen, geräumigen Hühnerhofe hatte ich acht reine Silberkampiner-Hühner (weißhalsige, silbersprenkelige Todtleger) mit einem gleichen Hahne. Behufs eines Versuches, den ich mit dieser Rasse mit Vervielfältigung der Farben machen wollte, ersetzte ich im Februar meinen obigen Hahn, von welchem ich bisher nur reine Silberkampiner zog, durch einen Goldkampiner. Ich zog etwa 50 Küchen, von letzterem abstammend, auf, unter denen sich reine silber-, gold- und gelbgesprenkelte, aber auch gemischte befanden. Am ersten Mai setzte ich an Stelle des Goldkampiner wieder den alten Hahn dazu. Am achten Juni, also 39 Tage später nahm ich aus den Nestern die an diesem und dem vorherigen Tage gelegten Eier und legte sie der Glucke unter. Von den am 30. desselben Monats ausgefallenen Küchen sind fünf roth, die andern weiß. Der Tritt des rothen Hahnes hat also bei mehreren Hühnern seine Wirkung nach 38 Tagen nicht verloren, während man allgemein annimmt, daß er nur für eine Dauer von 20 Tagen wirksam sei. Im nächsten Jahre werde ich die Beobachtungen hierüber fortsetzen und Ihnen das Ergebniß mittheilen. Es dürfte für die Liebhaber vielleicht interessant sein, zu erfahren, eine wie große Eierzahl diese 8 Hühner legten. Ich erhielt:

im Dezember . .	24	Eier
im Januar . . .	125	„
im Februar . . .	32	„
im März	153	„
im April	181	„
im Mai	196	„
im Juni	193	„
in 7 Monaten also	904	Eier.

Im Januar waren die Hühner erkrankt. Ich glaube kaum, daß eine andere Hühnerrasse die „Todtleger" an Fruchtbarkeit übertrifft, muß aber

bemerken, daß ich sie immer sehr reichlich mit Gerste, Weizen, Fleisch und Küchenabfällen fütterte. Die Eier sind mitteldick, 10 Stück wiegen durchschnittlich 26 Loth. Im vorigen Jahre legten die Hühner bis Ende September und fingen, wie oben ersichtlich, im Dezember wieder an.

Julius Johann Classen in Köln.

Anfragen und Auskunft.

Fragen: 1. Meine Mövchen hatten ein Nest (oben zugewölbt) gebaut, wurden aber durch ein Paar Elsterchen daraus vertrieben; sie fingen deshalb ohne Weiteres ein zweites Nest in einem Harzer Bauerchen an, in welchem sie auch ein Junges erbrüteten und groß zogen. Da jedoch die Elsterchen auch in dieses zweite Nest eindrangen und die Brut störten, so verkaufte ich dieselben. Das Nest hat nun 6 Wochen lang unbenutzt gestanden; seit einigen Tagen tragen aber ein Paar Tigerfinken in dasselbe und bauen es nach ihrer Weise aus. Ich war darüber ganz überrascht, da Sie doch in Ihrem „Handbuch" angaben, daß Tigerfinken nie in Kästchen, sondern stets frei in's Gebüsch bauen.

2. Giebt es gar keine Merkmale, um das Geschlecht beim Grauedelfink zu unterscheiden? Ich habe zu dem Männchen, das ich schon hatte, nach und nach 3 Weibchen kommen lassen, die sich nach 3—4 Wochen sämmtlich als Männchen zeigten.

3. Heute ist mir, wie es schien, ein junges Männchen Grauedelfink an einer eigenthümlichen Krankheit gestorben. Der sonst muntere Vogel fing vor acht Tagen an traurig zu werden und die Federn zu sträuben, der Appetit wurde außerordentlich stark und die massenhaften Entleerungen sahen ganz weiß, wie verkalkte Ameiseneier aus, dabei magerte das Thierchen immer mehr ab, und wurde immer matter, bis es heute früh todt im Bauer lag. Ich fütterte trockene und gequellte Hirse, frische Ameiseneier und täglich zweimal frische Vogelmiere. Auch der Durst hatte sich vermehrt, denn der andere Vogel, ebenfalls ein Grauedelfink, trinkt nur äußerst selten und badet nie, während dieser häufig trank; gestern noch fraß er mit großem Heißhunger, namentlich auch vielen Sand.

4. In Nr. 20 wurde der Vorschlag gemacht, die Vogelstuben mit sogen. Coupeekohle zu heizen. Da mir der Vorschlag gefiel, habe ich mir eine Art Ofen von Blech mit Ziegelwandungen bauen lassen, und kann denselben nur empfehlen, da eine sehr gleichmäßig dauernde Wärme damit erzielt wird und da sich derselbe überall, ohne feuergefährlich zu sein, anbringen läßt und sehr billig ist. Wenn Sie wünschen, lasse ich die Beschreibung dieser Heizvorrichtung folgen.

J. Stichling, Apotheker.

Antworten: 1. Es ist ein seltener Fall, daß Tigerfinken in einem Harzer Bauerchen nisten. 2. Beim Grauedelfink oder richtiger Graugirlitz sind die Geschlechter an äußeren Zeichen nicht zu unterscheiden. Der einzige sichere Weg ist der, daß man den Vogel irgendwie zum Gesange reizt (siehe „Handbuch für Vogelliebhaber" I.). 3. Der junge Vogel ist an Unterleibsentzündung gestorben. Sie hätten sogleich das Grünkraut und Quellfutter entziehen müssen. Doch giebt es dabei kaum eine Möglichkeit der Wiederherstellung. 4. Die Beschreibung Ihres Ofens für die Vogelstube wollen wir sehr gern aufnehmen.

Frage: In welchem Alter und auf welche Weise lähmt man Fasanen und wilden Enten den Flügel, und welche Vorsichtsmaßregeln sind dabei zu beobachten?

Frau W. M. in Quedlinburg.

Frage: In Betreff der Aufzucht junger Bandfinken hört man nur selten günstige Ergebnisse; auch ich gehöre zu denen, welche über Mißerfolge berichten können. Mein Paar Bandfinken brütete sechsmal auf Gelegen von 4—5 Eiern, brachte stets Junge aus, aber regelmäßig fand ich am 5—6 Tage die Jungen todt, anscheinend gut genährt und erst nach dem Tode von den Alten verlassen. Das gereichte Futter war: trockene Hirse, Kanariensamen und Ameiseneier, dieses auch gequellt. Bei den letzten Hecken reichte ich auch ganz frische Ameiseneier, welche aber verschmäht wurden. — Es wäre nun wol wünschenswerth, wenn Sie oder andere glückliche Züchter dieser Vögel hier Ihre Erfahrungen in dieser Richtung freundlichst mittheilen wollten. Voigt in Halle.

Frage. Welche von den bereits in Deutschland eingeführten Fasanhühner-Gattungen eignet sich am besten zur Einbürgerung und um welche billigsten Preise, bezl. Tausch gegen Ringfasanen (Phasianus torquatus) ist das Paar zu haben? Lassen sich kalifornische Wachteln im Freien züchten und was kostet das Paar?

(Antworten in der nächsten Nummer.)

Aus den Vereinen.

Ausstellung und Geflügelmarkt in Karlsruhe.

Der Badische Verein für Geflügelzucht will am 27. bis 29. September im Thiergarten zu Karlsruhe einen Geflügelmarkt, verbunden mit einer Geflügelausstellung, veranstalten. Das Programm ist in dem soeben ausgegebenen Monatsblatt des Geflügelzuchtvereins Nr. 9 erschienen und kann unentgeltlich von dem Vereinssekretär, Herrn Revisor Wilckens in Karlsruhe (Stephanienstraße 44), bezogen werden. Dies Programm legt das beste Zeugniß dafür ab, daß der Verein Alles aufzubieten sucht, möglichen Anforderungen gerecht zu werden, und überdies lassen die außerordentlich günstigen Ergebnisse der zehn vorausgegangenen Ausstellungen in den früheren Jahren auch für dieses Jahr die besten Erfolge hoffen.

Derartige Märkte und Ausstellungen bieten den Geflügelzüchtern die beste Gelegenheit zum möglichst günstigen Verkauf ihres gezüchteten Geflügels, und eröffnen zugleich den Geflügelliebhabern eine entsprechend reichhaltige und reelle Bezugsquelle.

Die Geflügelausstellungen haben aber auch dadurch einen allgemeinen Nutzen, daß sie den Besucher an die große land- und volkswirthschaftliche Bedeutung der Geflügelzucht erinnern, denselben mit den verschiedenen Geflügelrassen befreunden, zur Zucht ermuntern und so diesem höchst wichtigen Zweige der Land- und Hauswirthschaft immer mehr Eingang verschaffen. Um den Markt und die Ausstellung recht lebhaft und reichhaltig zu gestalten, wurde obengenanntes Blatt mit diesbezüglich interessantem Stoff versehen und den verehrlichen Vereinsmitgliedern, den Herren Landwirthschaftslehrern, den Vorständen der landwirthschaftlichen Bezirksvereine und allen Bürgermeistern des Landes ein Exemplar des Monatsblattes des Badischen Vereins für Geflügelzucht zur Verbreitung zugesendet. Weitere Blätter zu diesem Behufe stehen auf Verlangen durch den Vereinssekretär, Herrn Revisor Wilckens in Karlsruhe, gerne gratis zur Verfügung. Ebenda können auch Anmeldebogen bezogen werden, welche ausgefüllt längstens bis 18. September an diese Adresse einzusenden sind. Die eingegangenen Anmeldungen werden nach Rassen geordnet, mit dem Namen des Ausstellers und dem Preise des Verkäuflichen versehen, in das Oktoberblatt, welches schon einige Tage vor Beginn der Ausstellung erscheinen wird, aufgenommen, welches Blatt vom 20. September ab durch den Vereinssekretär gegen Einsendung einer Siebenkreuzer-Marke bezogen werden kann, wodurch den Geflügelfreunden und Kaufliebhabern ein allgemeiner Ueberblick des Markt- und Ausstellungsbestandes geboten wird.

Möge der Badische Verein für Geflügelzucht auch durch dieses Unternehmen die erwünschte Unterstützung in seinen schönen und nützlichen Bestrebungen finden und sich stets neue Mitglieder und Freunde erwerben.

Bücher- und Schriftenschau.

Die Arten der Haustaube. Nach den Bestimmungen der Delegirten des I. Deutschen Geflügelzüchter-Tages, beschrieben und herausgegeben von **Gustav Prütz**, Sekretär des Ornithologischen Vereins zu Stettin. Zweite verbesserte und mit einem Anhange: „Die Krankheiten der Tauben" vermehrte Auflage. (Leipzig, 1874. C. A. Koch's Verlagsbuchhandlung). Im ersten Jahrgange unserer Zeitschrift haben wir dies Büchelchen mit Freude begrüßt und unsern Lesern angelegentlich empfohlen. Denn, sagten wir uns, selbst ein Versuch auf diesem Gebiete ist von großem, unschätzbarem Werthe, da die Liebhaberei nur dann erst recht lebendig sich ausbreiten und in ersprießliche, rationelle Bahnen gelangen kann, wenn sie nicht als bloße Spielerei, sondern auch mit wirklicher Schätzung, d. h. voller oder doch wenigstens ausreichender Kenntniß ihrer Gegenstände, betrieben wird.

Jetzt, nach verhältnißmäßig sehr kurzer Zeit, heißen wir die „Arten der Haustaube" in neuer Erscheinung um so mehr willkommen, da sie einerseits in erweiterter und vervollkommneter Gestalt uns vorliegt und da andererseits das Bedürfniß, welches sie überhaupt hervorrief, noch keineswegs befriedigt ist.

Wer mit allen Erscheinungen der Gegenwart fortschreitet, wer die Kritik, d. h. die Beurtheilung seiner Leistungen zu beherzigen und zu benutzen weiß, dem darf man die Aussicht eines Erfolges gewiß nicht absprechen. Wir müssen nun vor Allem anerkennen, daß Herr Prütz in dieser zweiten Auflage nicht allein alle Besprechungen seines Buchs gründlich durchgenommen, sondern daß er auch die gesammte vorhandene Literatur aufmerksam und sachgemäß zurathegezogen hat. Außerdem haben Autoritäten, namentlich der auch von unsern Lesern gekannte und geschätzte Herr H. Dietz in Frankfurt a. M., dem Verfasser mit Rath und That beigestanden.

Somit dürfen wir mit gutem Gewissen dies kleine Taubenbuch als einen werthvollen Führer dringend empfehlen. Eine wichtige Bereicherung hat dasselbe durch den angehängten Abschnitt „Die Krankheiten der Tauben" erhalten. Diese Darstellung ist unseres Wissens die eingehendste und ausführlichste, welche es bis jetzt hierüber giebt. Herr Prütz hat sie nach dem Werke von Chapuis, jedoch frei, auch nach eigenen Erfahrungen und mit Berücksichtigung der Urtheile und Rathschläge eines praktischen Arztes, der zugleich selber Taubenliebhaber ist, bearbeitet — und wie umsichtig dies geschehen, erhellt daraus, daß sogar Martin's Schilderung der Mundfäule oder des gelben Knopfes in unserer Zeitschrift (Nr. 21 u. 22 v. J.) verständnißvoll benutzt worden.

Das auch im Aeußeren (abgesehen von dem häßlichen Umschlagsbilde) ansprechend ausgestattete Buch macht dem Herrn Verfasser alle Ehre und wird ein empfehlender Vorläufer sein für das größere Werk („Die Tauben, ihre Geschichte, Zucht und Pflege", mit 10 Tafeln Abbildungen in Farbendruck), welches, wie wir aus der Vorrede ersehen, demnächst erscheinen wird.

Eine Berücksichtigung der mir erzeigten Aufmerksamkeit durch die freundschaftliche Widmung durfte mich nicht davon abhalten, dies Buch mit Anerkennung zu besprechen und warm zu empfehlen; sie läßt mich aber umsomehr den dringenden Wunsch eines abermaligen guten Erfolges hinzufügen.

Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Unter der Bewohnerschaft eines Hühnerhofes tritt eine eigenthümliche Krankheit auf. Die bis dahin kerngesunden Hühner, Bastarde von Spanier- und Landhuhn und echte junge Chamois-Italiener, sind wohlgenährt und die älteren unter ihnen legen sehr fleißig. Plötzlich, ohne besondere Krankheitserscheinung, liegt das Huhn, fast regelmäßig im Nest, todt da. Bei der sorgfältigsten Untersuchung ergiebt sich eigentlich durchaus keine wahrnehmbare Todesursache. Die Hühner sind im vorzüglichsten Ernährungszustande, nicht übermäßig fett, doch voll und stark und die Legehennen außerordentlich eierreich. Da gar keine krankhafte Veränderung bei drei Zerlegungen zu bemerken war, so wurde auch das Gehirn untersucht und namentlich am kranken Huhn vor dem Tode der Kopf, und hier ergab sich starke Hitze im dunkelgerötheten Kamm. Das dann auch sorgsam besichtigte Gehirn zeigte einige, jedoch nur ganz schwache Blutansammlungen.

Erfahrene Züchter werden dringend gebeten, ihre etwaigen Beobachtungen dieser Art freundlichst mittheilen zu wollen, wenn möglich aber Hülfsmittel anzugeben.

Die Redaktion.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Von diesjähriger Zucht habe ich
85 kalifornische Schopfwachteln (Coturnix californianus) à Paar 8 Thlr.,
15 Goldfasanen à Paar 12 Thlr.,
inclusive Emballage abzugeben. Die Hälfte der Wachteln sind im September, — der Rest im November, — die Goldfasanen im Oktober zu haben. Im Interesse der Liebhaber bitte ich jetzt schon um Bestellungen, um möglichst allen Wünschen gerecht werden zu können.

Oscar Vetter,
[521] Ludwigsburg.

Ein schöner junger **Graupapagei**, sehr gelehrig, gut sprechend und zahm, ist für 80 Thlr. zu verkaufen. Näheres i. d. Exped. d. Blattes. [522]

Russische 1874er Ameisen-Eier empfingen und empfehlen **Metz & Bengelsdorff**, Berlin. [523]

Uhus

sucht zu kaufen **E. Geupel-White.**
[524] Leipzig, Barfußberg.

Ueberseeische Vögel

habe jetzt in kleinen Sorten großes Lager, und kann besonders an Händler billig abgeben

E. Geupel-White
[525] Leipzig.

Für Spottdrosselliebhaber.

Ein Paar Spottdrosseln, welche kin diesem Jahre 9 Junge ausbrachten, von denen 6 von beiden Eltern groß erzogen wurden.

Eine Spottdrossel, ganz vorzüglicher Tag- und Nachtsänger, hat abzugeben

Essen a. d. R. **Chr. Neuß.**
[526] Apotheker.

NB. Die Vögel werden erst nach bald bestandener Mauser versandt.

Zwei Stück rothe Kardinal-Männchen, zahm und singend à Stück 6 Thlr.
Ein Paar Ringel-Tauben, welche bereits zweimal gebrütet à Paar 1½ Thlr.
Eine Wasserralle (Rallus aquaticus) 20 Sgr.
Einen europäischen Dickfuß (Oedinemus crepitanus) 1½ Thlr.
Eine Eiersammlung, enthaltend über 160 Arten in einzelnen Exemplaren und variirenden Gelegen.
Trockene Ameiseneier à Pfund 20 Sgr.
empfiehlt [527]

August Dietz
Emballage frei. in Burg bei Magdeburg.

Graue, sprechende Papageien, zahm, schön in Federn, niedrig im Preise empfiehlt

E. Geupel-White.

[528] Leipzig.

Wichtig für Käufer von franz. Kaninchen.

Eine der ersten Züchtereien in Frankreich hat mir den Verkauf ihrer Lapins kommissionsweise übertragen.

Ich verkaufe bis auf Widerruf 2—3 Monat alte kräftige Thiere, incl. Verpackung frei ab Leipzig, Paar à 5⅔ Thlr.

[529] **E. Geupel-White.**

---

1 Paar Bandfinken, 1 Paar Muskatfinken à 2½ Thlr., 4 Paar junge Blutfinken à 2½ Thlr., 1 Paar junge Zebrafinken à 4 Thlr., 6 Stück junge Silberschnäbel à 1 Thlr. pr. Stück, 1 Paar blaue Hüttensänger nebst 1 bereits selbstfressenden Jungen, 10 Thlr., hat zu verkaufen

[530] **F. Dommasch,** Danzig, Paradiesgasse 36.

Circa 500 Paar **exotische** und **einheimische Vögel** sollen **spottbillig** im Einzelnen wie im Ganzen abgegeben werden, der Correspondenz wegen jedoch nur an Händler. Anfragen befördert sub **N. 62553** die **Annoncen-Expedition** von **Haasenstein & Vogler** in **Frankfurt a. M.** [531]

Ein Paar Sperlings-Papageien hat für 6 Thaler incl. Verpackung abzugeben

[532] **Jean Schilling. Euskirchen.**

Ein zahmer **gut sprechender Graupapagei,** welcher Wasser trinkt, ist für den festen Preis von Thlr. 90 — zu verkaufen. [533] **Näheres in der Expedition.**

Vogelhandlung
von

Joseph Zuckerkandel,

Dresden, Zahnsgasse 26. I.

empfiehlt ein wohlassortirtes Lager exotischer Vögel, franz. Kanarien und die allgemein bekannten und renommirten fehlerlosen, reinen Kanarienvögel eigener Zucht, als Glucker, Hohlroller, Klingelroller mit Knurren, Roller mit jammernden Touren, ebenso beste reinste Zuchten Harzer Kanarienvögel. [534]

Den geehrten Fragestellern die ergebene Nachricht, daß ich die gewünschten hochfeinen

Kanarien-Roller

unter Garantie gesunden Eintreffens vom 1. October d. J. ab zu liefern bereit bin. Der Preiscourant steht schon jetzt zur Verfügung. [535]

Rudolf Maschke.

St. Andreasberg im Harz.

Zu kaufen sucht: 1 Paar Rebhühner, 1 Paar Goldfasanen, 1 Paar Kampfläufer, 1 Paar Rothhühner, 1 Paar Felsenhühner, 1 Paar Krikenten, 1 Paar Kibitze, 1 Paar rothfüßige Strandläufer

[536] **J. F. Engelhard** in Nürnberg.

Carl Capelle, Hannover,

empfiehlt alle Sorten Vogelfutter in Prima, staub-, geruch- und hederichfreier Waare zu billigen Preisen, als

ff. Sommersaat,
„ Kanariensaat,
„ blaue u. weiße Mohnsaat,
„ weiße span. Hirse,
„ Hanfsaat,
„ do. gebrochen od. gequetscht,
„ gesch. Hafer,
„ do. Buchweizen. [537]

Ein sachgemäß und praktisch eingerichteter Heckkäfig für kleine bis mittelgroße Papageien, 3 Fuß hoch, 3 Fuß breit, 1½ Fuß tief, mit natürlichen Nistkästen ausgestattet, ist für 15 Thlr. zu verkaufen. Auskunft giebt die Redaktion. [538]

Rosenrothe Kakadus in sehr schönen Exemplaren und richtigen Pärchen sind zu verkaufen. Auskunft giebt die Redaktion. [539]

Für Liebhaber und Züchter kleiner fremdländischer Schmuckvögel ist eine große Anzahl verschiedener Arten zu sehr billigen Preisen abzugeben.

Auskunft giebt die Redaktion. [540]

Folgende Vögel in tadellosen Exemplaren sind abzugeben: 2 Paar Goldstirnige Weber (P. aurifrons), 1 Paar der äußerst seltenen Braunköpfigen Ammern (Emberiza icterica) aus Nordasien, mehrere Pärchen Tauben: ganz kleine Sperlingstäubchen, Brasilische Erdtauben, Ruftäubchen und Aegyptische Turteltauben, Lori von den blauen Bergen, Schönsittiche, Büllbülls, Kubafinken und Sonnenvögel zu mäßigen Preisen. [541]

Auskunft giebt die Redaktion.

Gesucht:

1 älteres Männchen von Coryllis galgulus.

Zu verkaufen:

3 Paar große Elsterchen à 20 Mark; alle á 50 Mark.
2 Stämme (1. 2.) oder (1. 3.) 4 Monat alte sehr schöne weiße Italiener Hühner à 12 respect. 16 Mark.
1 Paar weiße kleine Brünner Kröpfer (alt) à 6 Mark.

Dr. **Franken.**

[542] Schloßberg 10, Baden.

Heurige getrocknete Ameiseneier, I. ma Qualit. pr. Litr. 9 Sgr. Muster werden auf Verlangen portofrei zugeschickt.

F. Zivsa.

[543] Troppau (Oesterreich)

C. REICHE,

Alfeld, Provinz Hannover,

empfing neue Sendung amerikanischer

Spottdrosseln (diesjährige Wildfänge),
Paperlinge und sehr schöne und zahme rothbärtige
Kubapapageien.

[544]

Christiane Hagenbeck's

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

hat vorräthig: Hell- und dunkelrothe Araras, Leadbeateri-, Rosa- und Nasen-Kakadus, Surinam-, Amazonen-, Neuholländer-; Maximilian's-, blauköpfige-, weißstirnige Amazonen-Papageien, Pennantis, Rosellas, blaßköpfige Rosellas, Portlincoln-, Paradies-, vielfarbige, Rothrumpf-, Nymphen- und 1 Gelbstirniger Neuseeländersittiche, Halbmond-, Gelbwangen-, Kaktus-, Quäker- und Alexandersittiche, blaue Gebirgslori, Turquisinen, Wellensittiche (importirt), grauköpfige Inseparables, Sperlingspapageien, graue u. Dominikaner Kardinäle, Nonpareils, Indigovögel, Safranfinken, Hartlaubszeisige, Graupfäffchen, Diamantfinken, Zebrafinken, Kastanienbrüstige Schilffinken, dreifarbige und weißköpfige Nonnen, Muskatvögel, Bronzemännchen, weiße und bunte japanesische Mövchen, Silberfasänchen, Bandfinken, weiße, bunte und gewöhnliche Reisvögel, Elsterchen, Goldbrüstchen, Bengalisten, St. Helena-Fasänchen, Astrilds, Atlasvögel, junge Paradieswittwen, Blutschnabelweber, Fuchsweber, Textorweber (Männchen), große Orangeweber, Indische Gelbkopfweber, braunköpfige Ammer (Emberiza icterica), Chinesische Heherdrosseln, Chinesische Mynah (Acridotheres cristatella), schwarze und weißohrige Büll-Büll, Sonnenvögel, Jamaika-Trupiale, Garten-Trupiale, Baltimorevögel, Katzenvögel, Glanzstaare (Männchen, Molothrus sericeus), Blauheher, gelbschnäblige Elstern und von Tangaren, rothe, schwarze, olivengrüne, Zier-, Kron- und dreifarbige, sowie violette Organisten.

Von den schönen und starken mit Segelschiff hierher gebrachten Graupapageien à 12 Thlr. sind noch einige vorräthig.

Die so seltenen großen und kleinen schwarzen Papageien von Madagascar sind noch in wenigen Exemplaren vorräthig.

So eben erhielt wieder eine Sendung der so sehr beliebten Graspercquiten (Brotogerys tirica), die leicht zahm werden und auch sprechen lernen, à Paar 4 Thlr. 15 Sgr.

---

[546]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. [illegible], den 17. September 1874. Nr. 38.

Inhalt:

Zu Ehren des Herrn Professor Dr. Cabanis. —
Nach Afrika. —
Herrn Ch. Jamrachs Etablissement in London. —
Neue Geräthschaften und Apparate der Vogelliebhaberei: Trinkgefäß für Transportkäfige. —
Vogelkrankheiten: Graupapagei. —
Zur Geflügelzucht. —
Zur Ueberwinterung der fremdländischen Vögel. —
Briefliche Mittheilungen: Züchtungen; Schönsittiche, Girlitze, Todesfälle, Züchtungen; Sittiche. —
Anfragen und Auskunft: Beantwortungen. —
Aus den Vereinen: Bairische Geflügel-Ausstellung. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Ehrenbezeigungen. —
Anzeigen. —

Zu Ehren des Herrn Professor Dr. Cabanis.

Die Spitzen der Deutschen ornithologischen Gesellschaft, unter Betheiligung vieler Namen der Kunst und Wissenschaft, begingen Donnerstag Nachmittag im Saale des zoologischen Gartens zu Ehren ihres Nestors, des ersten Kustos der zoologischen Abtheilung der Friedrich-Wilhelms-Universität, Professor Dr. Cabanis, eine Gratulationsfeier, verbunden mit einem durch Straußeneier, welche von Herrn Dr. Bodinus gespendet waren, gewürzten Festmahl. Die Theilnehmer übten durch dieses Zusammensein nicht allein einen Akt der Pietät und Hochachtung gegen ein in der Wissenschaft so erhaben dastehendes Mitglied aus, sondern sie feierten dessen endlich erfolgte Ernennung zum Professor auch als die wohlverdiente Auszeichnung eines Mannes, der nur aus eigenen patriotischen Gefühlen unserm Vaterlande erhalten wurde. Fast vierzig Jahre der hiesigen Universität angehörend, erkannten gleich anfänglich Alexander von Humboldt, der Fürst von Radziwill und Andere die dem jetzigen Professor Dr. Cabanis innewohnende umfassende Kenntniß der Vogelwelt der ganzen Erde und zeichneten denselben in hochachtendster Weise aus. Im Auftrage des Jardin des plantes zu Paris überbrachte der Prinz Lucian Bonaparte demselben seiner Zeit einen Ruf für eine der höchsten Stellungen daselbst, welche aber aus Liebe zum Vaterlande nicht angenommen wurde. Bei dem nach allen Seiten immer mehr Anhänger findenden Studium der Ornithologie, ist durch diese allerhöchste Anerkennung auch einer Sache im Prinzipe der Weg gebahnt, welcher den ständigen Fortschritten auf diesem Gebiete nur fördernd sein dürfte.

(Berliner Zeitungen).

Nach Afrika.

Die Berliner Afrikanische Gesellschaft rüstet gegenwärtig eine zweite Expedition zur Erforschung Inner-Afrikas aus, die nur ungefähr 120 Meilen südwärts von dem Ausgangspunkt der ersten Expedition aufbrechen wird. Als Leiter dieser Expedition ist der rühmlichst bekannte Ornithologe Herr Alexander v. Homeyer, gewonnen worden. Derselbe wird sich von St. Paul de Loanda über Kassimbe, dem am meisten nach dem Innern Afrikas vorgeschobenen Portugiesischen Posten, nach dem Fabelreiche der Moatta Jambe begeben, das bisher noch kein Europäer betreten. Die Betheiligung eines Geologen, der zugleich Ortsbestimmungen ausführen kann, und die eines Zoologen oder Botanikers wird von dem Vorstande gewünscht und wahrscheinlich würden geeignete Bewerber auf Kosten der

Gesellschaft nach jenen Gegenden entsandt werden. In Chinchoxo, der Hauptniederlassung der Güßfeldtschen Expedition wird, nach dem Muster der zoologischen Station in Neapel, eine dauernde naturwissenschaftliche Beobachtungs-, bezl. Arbeitsstation errichtet werden. Die Afrikanische Gesellschaft soll denjenigen Gelehrten, welche dorthin gehen wollen, freie Hin- und Rückfahrt und unentgeltlichen Aufenthalt auf der Station gewähren wollen. Herr Dr. Lohde, Pflanzenphysiologe aus Leipzig, hat sich als der Erste bereit erklärt.

Herrn Ch. Jamrach's Etablissement in London.

Wenn ein Londoner Vogelliebhaber eine Taube, Drossel oder Amsel, Lerche oder einen Staar kaufen will, so geht er nach Dethnal Green, braucht er einen Kanarienvogel oder auch einen Maulesel, so sucht er diese in Seven Diols, wünscht er junge Hühner, Enten oder Pfauen, so findet er sie in Leadenhall Market, will er aber fremdländische Vögel, Fische oder andere Thiere, sowie Muscheln oder dergleichen Naturgegenstände anschaffen, so muß er zu Ch. Jamrach, 179—180 St. Georges Street, East gehen.

Wer ist Ch. Jamrach? Wirft man diese Frage auf in Australien, Indien oder China, in Japan, Neuseeland, Fiji oder Rußland, in Kanada und den Vereinigten Staaten, in Südamerika oder Afrika — überall wird man dieselbe Antwort erhalten. Wer Jamrach nicht kennt, stellt sich selber das Zeugniß aus, daß er mit der gesammten Thier-Liebhaberei, insbesondere aber mit der Vogelliebhaberei, erst wenig befreundet sei.

Will ein zoologischer Garten einen jungen Elephanten oder bengalischen Tiger, eine Büchse voll köstlicher Klapperschlangen, einen großen Ameisenfresser, einen ringschwänzigen Affen, eine lachende Hyäne, einen sprechenden oder prächtig gefiederten Papagei oder eine Volière mit fremdländischen Vögeln anschaffen, so wendet er sich sicherlich zuerst an Herrn Ch. Jamrach. Verlangt eine reisende Menagerie oder Schaubude einen abgerichteten Affen, einen tanzenden Bären, eine kolossale Riesenschlange oder einen Pelikan aus der Wildniß, so muß ebenfalls Jamrach dergleichen liefern. Will ein Gentleman vom Lande seine Besitzung durch Pfauen verschönern, seinen Park mit Wasservögeln bevölkern, seine Volièren mit lieblichen Schmuckvögeln, möchte er seine Sammlungen durch Kriegerkeulen von der Südsee, vergiftete Pfeile, ein Tam-Tam oder ein geschnitztes Kanoe-Ruder vervollständigen — immer und in allen diesen Fällen wendet man sich an Jamrach.

Sobald Mr. Barnum glaubt, eine ägyptische Mumie, einen blaugesichtigen Pavian, einen Gorilla oder Chimpanse für seine Schaustellungen nöthig zu haben, so thelegraphirt er sofort von New-York oder Philadelphia aus und giebt seinem Londoner Agenten den Auftrag, gleicherweise bei Jamrach einzukaufen.

Kehrt ein Seemann von seiner Reise heim und bringt eine Anzahl große oder kleine Papageien, Liebesvögel und anderes Schmuckgeflügel oder Seemuscheln, Tomahawks, indianische Kriegskeulen und andere derartige Kuriositäten mit, so lenkt er seinen Schritt nicht minder zu Jamrach, in der Gewißheit, dort für seine Waare einen guten Markt zu finden.

Beabsichtigt eine Gesellschaft nobler Herren eine Vogelschau in Whitechapel, Lambeth oder sonstwo abzuhalten, so muß man vor allen Dingen auf die Theilnahme und den Beistand von Jamrach rechnen, wenn man nicht riskiren will, daß der Plan von vornherein ins Wasser falle.

In der That, Mr. Charles Jamrach in Ratcliff Highway St. Georges street in London ist der bekannteste und unternehmendste Händler und Lieferant von naturgeschichtlichen Merkwürdigkeiten der ganzen Welt. Er nennt sich selber Naturalist, also Käufer und Verkäufer von fremdländischen Vögeln und andern Thieren und allen derartigen verwandten Naturgegenständen, und in den drei Häusern, welche seine wundervollen Sammlungen enthalten, ist eine größere Mannichfaltigkeit und ein bedeutenderer Reichthum an seltenen und interessanten Naturdingen zu finden, als solche die meisten Museen der Welt vielleicht bergen, wol nur mit Ausnahme des Britischen Museum und einiger der hervorragendsten andern.

Wenn wir von der Straße aus den Laden betreten, so befinden wir uns inmitten einer glänzenden Vogelwelt. In verschiedenartigen, langen, viereckigen oder runden Käfigen, von englischer und fremder Arbeit, welche, auf Brettergerüsten stehend, die ganzen Wände und Fenster einnehmen, sehen wir Vögel aus allen möglichen Familien, vorzüglich aber Finkenartige, die selteneren in zwei bis vier Köpfen oder höchstens einem Dutzend, andere zu vielen Hunderten, die großen Papageien auch frei auf Ständern sitzend. Der Reichthum an Schmuck- und Prachtgeflügel aus allen Zonen ist, wenigstens zeitweise, ein wahrhaft überraschend großartiger und wir brauchen hier auf denselben im Einzelnen wol nicht näher einzugehen.

In der Mitte des Ladens sind die schönsten und seltensten Papageien, Finkenvögel und Verwandte vorhanden. Auch stehen hier viele große sprechende Papageien, von denen es aber bekannt ist, daß sie leider jedesmal dann am schweigsamsten sich zeigen, wenn ein Besucher ihre Kunstfertigkeit kennen lernen möchte.

Höchst interessant erscheint auch eine Wanderung durch den zweiten Laden, in welchem die Muscheln, Korallen u. dgl., theils noch roh und ungereinigt, theils schon zubereitet, auch wol zu Kunstgegenständen geformt und nicht selten von bedeutendem Werthe, sodann auch ausgestopfte Vögel und Vierfüßler in nicht geringerer Mannichfaltigkeit, ferner noch die

Gebrauchsgegenstände der uncivilisirten Völkerschaften aller Welttheile angehäuft sind. Bogen und Pfeile, ganze Kriegsausrüstungen und Nationalwaffen aller Art, Perlenschnüre und Arbeiten, rohe Musik-Instrumente, Matten, Gürtel und allerlei häusliche Geräthe von den Südsee-Indianern, wie von den fernsten Negerstämmen und allen übrigen dieserartigen Völkern, sind hier in wahrhaft unübersehbarer Menge und Mannichfaltigkeit vorhanden. Daran reihen sich dann in unzähligen Schubladen die Sammlungen von Käfern, Schmetterlingen u. a. Insekten, ein fabelhafter Reichthum von tropischen Vogelbälgen 2c.

Betreten wir den Hausflur, so grinsen uns eine Anzahl ausgestopfter Alligatoren entgegen, in einer Kiste befindet sich eine wirkliche ägyptische Mumie, an der Decke hängen Speere, vergiftete Pfeile, roh geschnitzte Amulette, kunstvoll geschnitzte Ruder, mit Perlen und Kugeln verzierte Kostüme, Fischereigeräthe, Straußeneier und hundert andere merkwürdige Gegenstände aus fremden Ländern.

Oberhalb des Ladens führen Gallerien entlang, welche ebenfalls mit Kuriositäten in mannichfaltiger Weise angefüllt sind. Namentlich sehen wir hier eine Sammlung von Waffen von allen Völkern der Erde und aus allen Zeiten her. Hier giebt es Schwerter, Handkanonen, Musketen, Pistolen, alte Arquebousen u. dgl. von europäischen Völkerschaften, ferner chinesische, japanesische, indische, malaysche, singalesische u. a. Dolche, Messer und andere Mordwaffen, darunter viele mit vergifteten Spitzen, welche wol schon so manches Leben vernichtet haben. Weiterhin sind Vogelfang-Geräthschaften in großer Vielfältigkeit, sodann Kanoës und wundervoll geschnitzte Ruder, ferner Gewänder, wie der vollständige Kriegsanzug eines japanesischen Soldaten, der Federschmuck und die Perlenschnüre eines wilden Häuptlings, Kopfbedeckung und Waffen einer Amazone, Swal und Turban eines asiatischen Herrschers, Robe und Bijouterien einer Neger-Braut, das aus Federn gearbeitete Kostüm einer indischen Prinzessin u. s. w. vorhanden. Das Sattelzeug von Kameelen, arabischen Pferden u. s. w., Hausgeräth ganzer barbarischer Volksstämme, dann auch Skalpe u. a. Kriegstrophäen, ferner die Häute von Schlangen, seltenen Fischen und dergleichen Thieren, bilden hier noch eine so große Mannichfaltigkeit, daß wir Weiteres weder aufzählen können, noch mögen.

Jamrach's Menagerie ist nicht weit von hier in einer Baulichkeit, welche zunächst keinen besonders großartigen Eindruck macht, untergebracht.

„Dies ist Alles, was wir gegenwärtig haben", oder, „wenn Sie in der vorigen Woche herangekommen wären, so hätten wir Ihnen wol mancherlei Interessantes, z. B. einen Gorilla-Säugling, einen Polarbär oder kleinen, jungen Elephanten zeigen können; jetzt haben wir aber nicht viele lebende Thiere." Das hört man fast jedesmal beim Eintritt — und doch ist für alle Besucher und selbst für die wählerischen und anspruchsvollen immer eine Fülle von Neuem und Merkwürdigem vorhanden.

Jamrach's Etablissement ist aber nicht allein der Hauptstapelplatz von allen Naturmerkwürdigkeiten, die nach London eingeführt werden; es hat vielmehr auch Agenten in allen Theilen der Welt, für den Einkauf, wie für den Verkauf. Nichts ist für Jamrach zu billig oder zu theuer, er kauft Alles, vorausgesetzt nur, daß es brauchbar ist. Ebenso weiß er aber auch Alles in bester Weise unterzubringen, sei es ein Hippopotamus oder ein Prachtexemplar bengalischer Tiger, immer hat er den betreffenden Liebhaber an der Hand. Er ist nie in Verlegenheit, weder um Beschaffung von Merkwürdigkeiten, noch um deren Absatz und, was eine Hauptsache ist, er hat ein wirkliches, regsames Interesse für die lebenden Thiere, mit denen er Handel treibt. Alle seine Pflegebefohlenen ohne Ausnahme, vom Rhinoceros bis zum Strauß, vom Chimpanse bis zum kleinsten Senegalisten — sie Alle sind auf das zweckmäßigste untergebracht, werden gut gefüttert und zugleich sorgfältig beobachtet. Dabei zeigt sich Herr Jamrach nicht allein als eine durchaus liebenswürdige Persönlichkeit und als ein erfahrener und ungemein kenntnißreicher Mann, sondern er ist auch als Händler vollkommen zuverlässig, reell und ehrenhaft. G. F. P.

(In „The young Fancier's Guide").

Die vorstehende Darstellung haben wir gern aufgenommen, einerseits weil wir Herrn Jamrach kennen und schätzen, so daß wir den letzteren Aussprüchen vollkommen zustimmen, und andererseits in der Voraussetzung, daß es doch wol für manchen unserer Leser, der über kurz oder lang London besucht, interessant und vortheilhaft sein wird, durch diese Schilderung aufmerksam gemacht zu sein.

Mit Hinweis auf die hier veröffentlichten Anzeigen, der neuen Ankömmlinge in seinem Etablissement, bittet uns Herr Jamrach bei dieser Gelegenheit, die Bemerkung anzufügen, daß alle derartigen Angaben lediglich für die Händler, sowie auch besonders für die Direktionen der zoologischen Gärten und verwandten Anstalten bestimmt sind; daß er aber keineswegs sich mit der Befriedigung der Wünsche von Privatliebhabern in Deutschland befassen kann.

Die Redaktion.

Neue Geräthschaften und Apparate für die Vogelliebhaberei.

Trinkgefäß für Transportkäfige.

Zu den größten Uebelständen der Vogelversendung gehört der, daß man das Futter gewöhnlich ohne Weiteres auf den Fußboden des Käfigs schüttet und das Wasser in primitiven oder, um es deutsch zu sagen, vorsündfluthlichen Gefäßen beigiebt. Namentlich das letztere Verfahren zeigt sich nicht selten als ein sehr unheilvolles. Die Herren Postbeamten

geben unterwegs fast regelmäßig frisches Wasser, ob nur aus gutem Herzen oder infolge einer dienstlichen Anweisung, weiß ich nicht. Das erfährt man aber sehr bald, daß in den Posterpeditionen niemals ein dazu geeignetes Gefäß, d. h. eine Gießkanne mit langer spitzer Tülle vorhanden ist. Das Wasser wird vielmehr aus einem Trinkglase, Becher oder dgl. hineingegossen — und dies Plantschern kostet alljährlich zahlreichen Vögeln das Leben. Keine Sendung von Herrn Ch. Jamrach in London kommt mir anders, als in trostlosem Zustande zu; der ganze Fußboden nebst Futter ist mit schmierigem Brei oder wol gar stinkender Flüssigkeit überdeckt. Man denke nun an die zarten und überaus kostbaren Vögel — und man wird es fast als ein Wunder ansehen müssen, wenn Paradiessittiche und dgl. dann noch lebend ankommen. Freilich sind bei mir auch von ungefähr 7 Pärchen dieser Vögel im Ganzen nur 3 Köpfe lebend und ganz gesund eingetroffen; alle übrigen waren todt oder doch Todeskandidaten. Als Kuriosum will ich erzählen, daß ein grüner Kardinal, von Münster aus an mich gesandt, bei heißer Witterung noch lebend Berlin erreicht hatte, doch dadurch, daß der mitleidige Expreßbote ihn unterwegs, um das mangelnde Wasser zu ersetzen, mit dem Käfig unter die Pumpe hielt, augenblicklich getödtet wurde.

Um alle derartigen unliebsamen Vorkommnisse zu vermeiden, hat Herr Karl Baudisch in Triest ein ganz vortreffliches Wassergefäß für Versandtkäfige hergestellt. Dasselbe gründet sich ganz ebenso, wie die allbekannten Luftdruck-Trinkgefäße (in Nr. 23 v. J. beschrieben) darauf, daß aus dem Vorrathsglase immer nur so viel Wasser heraustreten kann, als zum Bedarf gehört, ohne daß die Flüssigkeit jemals überplantschern und den Boden des Käfigs nässen kann. Die Einrichtung ist sehr einfach und besteht in Folgendem. Ein Zinkbehältniß, von dem Umfange, daß es ein gewöhnliches starkes Trinkglas genau umschließt, buchtet an einer Seite in ein etwa $1\frac{1}{2}$ Quadratzoll großes Trinkbecken aus. Das hineinpassende Trinkglas enthält einen etwa $\frac{1}{2}$ Zoll langen und einige Linien breiten hineingefeilten Ausschnitt. Dies Glas wird nun bis an den Einschnitt mit frischem Wasser gefüllt und dann wird der Zinkuntersatz so daraufgestürzt, daß der Einschnitt gerade in der Mitte des ausgebuchteten Trinkbeckens sich befindet. Dreht man nun den ganzen Apparat um, so tritt Wasser in der Höhe des Ausschnitts heraus und füllt das Trinkbecken, während das übrige Wasser durch den Luftdruck zurückgehalten wird. Selbstverständlich muß das Glas in dem Zinkgefäß fest und dicht schließend eingepaßt sein, damit sich der Einschnitt nicht verschiebe oder umgekehrt, das Glas aus dem Untersatz herausfallen könne. Der ganze Apparat wird nun mit Draht oder Blechstreifen in dem Käfige sicher befestigt, auch bringt man in dem Trinkbecken vermittelst eines feinen Drahtes ein passendes Schwämmchen an, das Ausspritzen des Wassers zu verhindern.

Solche Trinkgefäße, sagt Herr Baudisch, sind billig, praktisch und jeder Spängler kann sie anfertigen. Wenn der Rand des Trinkbeckens ein wenig nach innen eingebogen wird, so kann man auch jedes Ueberspritzen selbst im schaukelnden Postwagen verhindern. Wir empfehlen diesen neuen Apparat der Beachtung unserer Leser angelegentlichst. R.

Vogelkrankheiten.

Ein Graupapagei leidet schon seit längerer Zeit an einer dicken Zunge und angeschwollenen Halsdrüsen, wodurch ihm das Sprechen sowie das Fressen viel Schmerzen verursacht. In der „Gefiederten Welt", sowie in den Handbüchern fand ich keinen ähnlichen Fall, also auch keine Hülfe. Könnten Sie mir recht eilig ein Mittel angeben, so würde ich dafür sehr dankbar sein. H. E. Frühauf, Inhaber der Holzwaarenfabrik, jetzt in Mühlhausen in Thüringen.

Behandeln Sie den Jako in folgender Weise: Der Hals unterhalb des Schnabels, also die Kehle bis zu den Ohren hinauf und etwa einen Finger breit herunter, wird unterhalb der Federn, so recht auf der Haut, mit flüchtigem Liniment (aus der Apotheke zu holen) bestrichen, darüber etwas lose Watte gelegt und nun ein Stückchen wollenes Zeug oder Strumpf so um den Kopf festgenäht, daß es der Vogel nicht abreißen kann. Das Einreiben mit dem Liniment wird täglich einmal wiederholt, doch ist zu vermeiden, daß der Papagei nicht zu viel von den stechenden Ammoniakdünsten einathmet. Sie können daher auch lieber anstatt des Liniments blos erwärmtes Provenceröl nehmen. Bei dieser Kur und nach derselben hüten Sie den Vogel sorgsam gegen Zugluft und geben ihm auch nicht eiskaltes, sondern etwas verschlagenes Trinkwasser. Dr. R.

Zur Geflügelzucht.

Die Frage, ob Eier wirklich auskommen, wenn sie während der Brütezeit einen Tag lang ganz unbebrütet geblieben und dann einer anderen Glucke untergelegt werden, ist schon vielmals erörtert worden, hat aber immer noch nicht alle Zweifel beseitigt. Meistens werden die Eier als verdorben betrachtet und einfach weggeworfen, eine Maßnahme, die bei schönen Rassehühnern sehr betrübend und gleichzeitig auch falsch ist. Hat man Gelegenheit, eine andere Glucke zu finden, oder kann man die Eier an andere Brüterinnen vertheilen, so kommen dieselben ganz gut aus.

Eine von mir in Moabit auf flacher Erde gesetzte Henne verließ nach 14tägiger Bebrütung ihr Nest und die Eier blieben zwei Tage und die dazwischen liegende Nacht unberührt liegen.

Dann nahm ich dieselben mit nach Berlin und legte sie Abends um 11 Uhr einer anderen Glucke unter. Sämmtliche Eier mit Ausnahme von vier unbefruchteten sind glücklich ausgekommen.

Hermann Köhne.

Zur Ueberwinterung der fremdländischen Vögel.

Ich habe meine sämmtlichen Vögel, mit Ausnahme der Roller, die ganz allein in einer Vogelstube im Hause sind, den Sommer über in drei größeren und zwei kleinen Volieren im Garten. Die kleineren ausländischen Finken werden bei Eintritt des Frostes herausgenommen. Wellensittiche, Nymphen, Singsittiche, kleine Alexandersittiche und rothe Kardinäle habe ich jetzt bereits zwei Winter hindurch im Freien gehabt und ist mir kein Vogel gestorben. Einmal mußte ich dieselben, weil gründliche Reinigung, Ausbesserung und Anstrich der Volieren erforderlich war, im Zimmer überwintern und hatte gerade damals einige Verluste.

Ob der Grund der Sterblichkeit darin lag, daß die Vögel ihre gewohnte Bewegung im engeren Raum nicht mehr so ausführen konnten, wie in der geräumigen Voliere, oder ob ihnen die Zimmerluft nicht so zusagte, kann ich nicht mit Bestimmtheit behaupten. Jedenfalls bin ich zu der festen Ueberzeugung gelangt, daß man oben angeführte Vögel unbedingt im Freien überwintern kann. Einmal hatten wir sogar eine lange andauernde Kälte und war das Wasser fast fortwährend gefroren.

Meine Volieren sind von etwa 1″ (rheinl.) starken Dielen gebaut und die Fugen mit Leisten übernagelt. Drei Seiten sind zu, die Westseite von Drahtgewebe. Das Dach ist von Holz und mit Asphaltpappe überzogen.

Von mehreren Vögeln habe ich in diesem Jahre sehr gute Bruterfolge und meine liebe Gesellschaft vermehrt sich ganz bedeutend.

Schließlich bemerke ich noch, daß in meinen Volieren die Futterbehälter so reichlich eingerichtet sind, daß ich nur alle 8—14 Tage zu füttern brauche.*) Wasser, Grünkraut und etwas Weichfutter gebe ich natürlich täglich. Es erwächst mir dadurch eine nicht so große Arbeit und ich kann meine freie Zeit zu angenehmen Beobachtungen meiner Lieblinge benutzen.

C. Korte jr., Fabrikant in Herford.

Briefliche Mittheilungen.

Von meiner Reise zurückgekehrt, fand ich in der Vogelstube folgende Bruten vor: ein Nest mit sechs jungen Helenafasänchen; welche auch glücklich ausflogen und jetzt schon sammt den Eltern sich in der inzwischen eingerichteten neuen Vogelstube umhertummeln. Das alte Pärchen Amarantvögel hatte zum fünften Male Junge seit dem letzten November. Ferner abermals eine Brut von dem kleinen Elsterchen, bestehend aus 4 Jungen, sowie verschiedene Nester mit Eiern von Zebrafinken u. a., welche ich leider bei der Verlegung der Vogelstube alle zerstören mußte. In der Volière im Garten sind junge Zebrafinken ausgeflogen, und hatten daselbst auch das zweifarbige Elsterchen mit dem kleinen Elsterweibchen sechs Eier, welche sich diesmal aber als unfruchtbar erwiesen. Dies Pärchen ist aber augenblicklich wieder im Brüten begriffen. Die jungen Bastarde der ersten Brut sind bis auf eines (es sind deren noch drei, indem eines, während ich auf Reisen war, starb) ziemlich ausgefärbt und stehen in der Färbung genau zwischen beiden Eltern. Der Schnabel ist wie bei der Mutter oben dunkel, unten hell, das übrige Kleid ist ziemlich schwer zu beschreiben, zumal dieselben frei in dem für Wellensittiche eingerichteten Zimmer fliegen, also nicht gut von der Nähe aus betrachtet werden können.

Aus der Brut einiger Buntsittiche oder Rosellas wurde in diesem Jahre nichts, indem die Jungen eines nach dem andern mit gefülltem Kropf starben, in welchem sich weiße Hirse, Kanariensamen und Grasrispen befanden. Sie starben alle in einem Alter von 8—12 Tagen, und glaube ich, daß ich durch Entfernung des Männchens hätte abhelfen können. (?)

H. Möckel in Homburg.

Ein Paar Schönsittiche (Ps.-Euphema-pulchellus) hat sich bei mir etwa vier Jahre hindurch in Gefangenschaft erhalten und in drei Jahren Junge gezogen.

Die gelbbäuchigen Girlitze (Fr. flaviventris) scheinen, nach dem, was ich bisher über diese Vogelart beobachtete, weit unter dem Graugirlitz (Fr. musica) und Kapkanarienvogel (Fr. atarogularis) zu stehen denn Gesang ist das, was der eine hören läßt, nicht, und wird es auch nicht werden; daher ist mir das Lob seines Sanges unbegreiflich. Sogar, wenn das quicksende Wesen nur ein Weibchen sein sollte, so läßt sich jedenfalls auf keinen gutsingenden Mann schließen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich doch etwas berichtigen, daß nämlich meine Pfaffenfinken nicht durch den Genuß von frischen Ameiseneiern zu Grunde gingen, weil ich gar keine füttere. Dies war mir gerade das Auffallende und seither ist blos noch eine Familie, Silberschnäbelchen, (A. cantans) ebenso schnell gestorben, bei denen allerdings der Grund in dem ewigen Jagen der kleinen Elsterchen gelegen haben mag und an der Schwäche des Weibchens.

Endlich habe ich doch auch einmal Zebrafinken durch ihre eigenen Eltern großgezogen, ebenso junge große und kleine Elstern; die ersteren, fünf Köpfe, waren in einem sehr engen Kästchen, so daß die Jungen kreuz und quer über einander liegen mußten. In der Nacht gab es nun ein gewaltiges Gewitter und die Lage des Nistkästchens war gerade neben dem offenen Fenster, ganz frei, so daß drei der Jungen des Morgens außerhalb des Fensters herumhüpften. Ich brachte sie ins Nest zurück, was aber den alsbaldigen Ausflug sämmtlicher fünf Jungen zur Folge hatte. Ein erneuter Versuch mit etwas Zwang hatte zeitweiligen Erfolg, Nachmittags aber saß jedes in einem andern Winkel der Stube und am nächsten Morgen waren drei in einem Neste, das die Kubafinken angefangen, die beiden letzten am Boden. Die Alten, die also die Jungen überall zusammensuchen müssen, füttern sie trotzdem auf's Beste und bis heute ist, da sie nun alle fliegen können, keines zu Grunde gegangen, und doch hatten dieselben noch nicht einmal Federn auf dem Kopfe und die Schwingen waren nicht im Stande, die Vögelchen zu tragen, als sie das Nest verlassen hatten. Ich habe 2 Paar große Elstern, die jetzt beide Junge haben. Dagegen haben 2 Paar Kubafinken, die nicht beisammen sind, schon mehrere Nester gebaut, aber brüten nicht; was mag da der Grund sein? Um meinem einsamen Rosenpapagei einige Beschäftigung zu geben, habe ich ein Graukopfweibchen in das Bauer, doch getrennt, gesetzt, was aber gar nicht nach des Rosenköpfigen Sinn ist, denn als ich nach drei Wochen die Scheidewand entfernte, war die erste Liebesbezeigung ein Schnabelhieb, daß das Blut dem Grauköpfchen davon lief. Es sind übrigens diese Grauköpfe auch zu ungeschickte Vögel, so daß sie sich sogar vor einem Inseparable flüchten müssen, der ihnen ohne Weiteres auf den Leib rückt, während doch das Aussehen der Grauköpfe ein viel kräftigeres ist, als das der rothen. Die Grauköpfe brüten übrigens immer noch nicht. Dagegen habe ich neulich bei Wellensittichen unter fünf Jungen, die mir dann durchgebrannt sind, eines erhalten, das weder Schwanz- noch Schwungfedern hat, sonst aber

*) Das ist denn doch sehr bedenklich. D. R.

sehr possierlich ist, da es natürlich in seinen Bewegungen sehr gehemmt ist, und Anfangs mehr kollerte, als kletterte.

Dr. F. Franken in München.

... Besonderes Glück habe ich mit den Wellensittichen gehabt. Ich kaufte mir im Herbst 1872 von einem Züchter zwei Weibchen und von einem andern zwei Männchen, welche ich in einen großen Käfig setzte. Im Monat Januar 1873 gab es die ersten Jungen, im März von dem zweiten Paare, und so haben die beiden Pärchen fortgenistet, ohne auszusetzen. Sobald die Jungen ausgeflogen waren, wurden gleich wieder Eier gelegt, und so fort, bis ich ihnen die Nistgelegenheit im vorigen Monat entzogen. Sie haben in dieser Zeit, also vom Januar 1873 bis Juli 1874, 86 Junge erzogen, durchschnittlich in jeder Brut 4 bis 7 Köpfe. Ist das nicht ein seltenes Glück? Gefüttert habe ich sie mit Hirse und Kanariensamen, trocken und eingequellt, Semmel eingeweicht und Eigelb, auch gedörrte Ameiseneier darunter, und so ist mir auch nicht ein einziges Junges verloren gegangen. Auch habe ich noch ein Paar Nymphen, von denen das Weibchen aber erst ein Jahr alt ist und doch schon mehrmals gelegt hatte, leider aber nicht in den Kasten. Jetzt hat sie endlich im Nistkasten ein Gelege von 7 Eiern, auf denen sie auch beide brüten, aber nur bei Tage. Sobald es Nacht wird, kommen sie heraus, und setzen sich zum Schlafen oben auf den Kasten. Wahrscheinlich ist das Weibchen doch noch zu jung. Meine Singsittiche machen noch gar nichts. — Die rothen Kardinäle haben Eier gelegt, aber nicht gebrütet, ebenso habe ich mit den kleineren Finkenarten kein besonderes Glück, außer den Bandfinken, welche sehr fleißig nisten, sowie den Zebrafinken und Silberschnäbelchen.

Friedrich Geißler in Langenburg.

Anfragen und Auskunft.

Antworten. Die Frage in Betreff der Flügellähmung soll in einer der nächsten Nummern durch einen eingehenden Aufsatz Erledigung finden.

Herrn Voigt in Halle. Bandfinken werden jetzt bereits in sehr beträchtlicher Anzahl gezüchtet und wenn Sie die Rathschläge in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber I." beachten und befolgen, so werden auch Sie günstige Ergebnisse haben. Hauptsache ist übrigens ein gutes, nistfähiges und nicht mehr dummscheues Paar, ein ruhiger Stand, wo die Vögel nicht beängstigt und erschreckt werden, und schließlich angemessenes Futter, namentlich ein Gemisch aus aufgequellten Ameisenpuppen und darüber geriebenem Eierbrot. Als Nistvorrichtung kann ich aus Erfahrung die größeren Nistkasten für Prachtfinken aus der Holzwaarenfabrik von Frühauf in Schleusingen oder auch gewöhnliche, oben mit Dach versehene Kanarien-Nestkörbchen empfehlen. —

Die Frage über Fasanhühner und kalifornische Wachteln stellen wir vorläufig unsern Lesern zur Beantwortung anheim.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht in München. Mit der landwirthschaftlichen Ausstellung im Glaspalast beim diesjährigen Oktoberfest ist eine bairische Geflügel- und Kaninchen-Ausstellung verbunden, deren Ausführung vom General-Komité des landwirthschaftlichen Vereins in Baiern dem obengenannten Verein übertragen ist. Die Ausstellung dauert vom 2. bis 11. Oktober und umfaßt alle Arten Geflügel, mit Ausnahme jener Vögel, deren Fang und Verkauf gesetzlich verboten ist, ferner Kaninchen, sodann Modelle von Ställen und Behausungen, Brut- und Nistvorrichtungen aller Art, sowie schließlich auch die betreffende Literatur. Anmeldungen bis zum 20. September an den Schriftführer des Vereins, Herrn C. v. Leveling in München, Kanalstraße 55. Einsendung frei unter Adresse: „An den Verein für Geflügelzucht in München", im Glaspalast, bis spätestens zum 2. Oktober Mittags. Alle übrigen Bedingungen sind aus dem Programm zu ersehen, welches ebenso wie der Anmeldezettel vom Präsidenten des Vereins, Herrn Ph. Pfister, zu beziehen ist.

Ausdrücklich sei aber darauf aufmerksam gemacht, daß an dieser bairischen Geflügel-Ausstellung nur Baiern theilnehmen können.

Bücher- und Schriftenschau.

Die Kaninchenzucht oder Anleitung, mit geringen Kosten und Raumersparniß durch rationelles Verfahren ein rentables Unternehmen zu begründen. Aus dem Französischen von M. Redares. Vierte Auflage, bearbeitet und nach neueren Quellen und Erfahrungen wesentlich umgestaltet von **Robert Oettel** (Weimar, B. F. Voigt). In Anbetracht dessen, daß die Kaninchen-Liebhaberei dahin führen sollte, das Volksleben mit einem neuen Nahrungsmittel zu bereichern, darf sie in so großer Wichtigkeit erscheinen, um das Interesse aller Volksfreunde zu beanspruchen. In diesem Sinne hat Herr Oettel es übernommen, das bekannte und sehr geschätzte französische Werk über Kaninchenzucht, zeitgemäß bearbeitet, den deutschen Lesern zugänglich zu machen. Der Inhalt des Buchs erstreckt sich nächst einer Einleitung, welche die französische Kaninchenzucht und ihre Verwerthung in Deutschland zur Nachahmung empfiehlt, über Folgendes: Biographie des Kaninchens — Wie man Kaninchen jagt und fängt — Das zahme Kaninchen — Kaninchengarten, Kaninchenberg oder Kaninchengehege — Kaninchenzucht in geschlossenen Räumen — Geschichte von Pierre Aller — Die eigentliche zahme Zucht: Abtheilungen, Fütterung, Vermehrung, Schlachten, Krankheiten, Vorbeugungsmaßregeln.

Das Buch ist ein werthvoller Beitrag zu der Wissenschaft, als welche man die praktisch-rationelle Kaninchenzucht betrachten darf, und von der wir hoffen wollen, daß sie sich im Volksleben einbürgere und allgemein verbreite. Es sei daher allen Freunden der Sache angelegentlich empfohlen.

Ehrenbezeigungen.

Die Ornithologische Gesellschaft **„Aegintha"** zu Demmin hat die Herren Johannes Kossow sen., Kaufmann und Brauereibesitzer daselbst und Dr. Karl Ruß, Schriftsteller in Steglitz bei Berlin zu ihren Ehrenmitgliedern ernannt und ihnen geschmackvoll ausgestattete Diplome überreicht.

Zum Vorstande der „Aegintha" wurden folgende Herren gewählt: Rektor Dr. Schumann, erster Vorsitzender; Gas-Inspektor Blohm, zweiter Vorsitzender; Buchbindermeister L. Strey, erster Schriftführer; Kaufmann H. Westphal, zweiter Schriftführer und Bibliothekar; Färbereibesitzer A. Wegner, Kassirer.

Anzeigen.

Prämiirungs-Liste

der I. allgemeinen Geflügel-Ausstellung des Vereins **„Fauna zu Düsseldorf".**

I. Tauben. [547]

Catalog-Nr. 3. Blaue egyptische Mövchen, Ihre Königliche Hoheit die Frau Prinzessin Karl von Preußen, I. Preis. Nr. 5. schwarze Indianer, do., I. Pr. Nr. 8. Französische Kropftauben, do., I. Pr.

Jagdtellen. Nr. 23. weiße deutsche, Robert Geßner in Zeitz, I. Pr.

Carriers. Nr. 30. blaue, Donny Sapin in Gent, II. Pr. Nr. 31. schwarze, Th. Hesse in Cöln, II. Pr., Nr. 32. schwarze, Dr. Schoenfeld in Düsseldorf, I. Pr. Nr. 33. braune, do., II. Pr. Nr. 85. blaue, Baily & Son in London, I. Pr.

Indianer (große). Nr. 40. weiße, Robert Geßner in Zeitz, I. Pr. Nr. 42. rothe, Th. Hesse in Cöln, I. Pr. Nr. 44. gelbe, Dr. Schoenfeld in Düsseldorf, II. Pr. Nr. 45. schwarze, Baily & Son in London, I. Pr. Nr. 40. schwarze, do., II. Pr. Nr. 47. weiße, do., II. Pr.

Indianer (kleine). Nr. 59. rothe, A. Büttinghaus in Kalk, II. Pr.

Deutsche Mövchen. Nr. 86. weiße, Albert Meyer in Düsseldorf, II. Pr. Nr. 110. rothe Schildmövchen, Conrad Gilliam in Aachen, II. Pr. Nr. 116. grau geschuppte Schildmövchen, Conrad Gilliam in Aachen, I. Pr.

Egyptische Mövchen. Nr. 124, weiße mit schwarzem Schwanz, Th. Hesse in Cöln, I. Pr. Nr. 126. weiße, A. Büttinghausen in Kalk, II. Pr. Nr. 129. schwarze, Donny Sapin in Gent, II. Pr.

Chinesische Mövchen. Nr. 136. scheckige, Th. Hesse in Cöln, II. Pr. Nr. 137. scheckige, Carl Claus in Dresden, II. Preis.

Tümmler. Nr. 166. schwarze Calotten, J. H. Bernhöft in Lübeck, II. Pr. Nr. 176. schwarze mit weißen Schlägen, C. Petermann in Rostock, II. Pr. Nr. 181. schwarze Calotten, J. J. Röhrig in Frankfurt a. M. I. Pr.

Römische Tauben. Nr. 192. blaue, Dr. Schoenfeld in Düsseldorf, I. Pr.

Montauban. Nr. 193. weiße, Dr. Schoenfeld in Düsseldorf, II. Pr.

Malteser. Nr. 198. weiße, L. Römer in Witten. II. Pr.

Pfautauben. Nr. 207. schwarze, Dr. Schoenfeld in Düsseldorf, II. Pr. Nr. 210. blaue, J. F. Röhrig in Frankfurt, I. Pr. Nr. 218. weiße mit schwarzen Schildern, Donny Sapin in Gent, II. Pr.

Perücken. Nr. 222. weiße, A. Wujanz in Kumschitz. I. Pr. Nr. 229. schwarz gemönchte, Donny Sapin in Gent, II. Pr. Nr. 236. gelbe, Th. Hesse in Cöln, I. Pr. Nr. 240. gelb gemönchte, Baily & Son in London, II. Pr.

Kropftauben. Nr. 241. schwarze deutsche, C. B. Schnettler in Solingen, II. Pr. Nr. 260. rothe französische, H. Michael in Berlin, II. Pr. Nr. 262. rothe französische, do., I. Pr. Nr. 272. gelbe französische, Donny Sapin in Gent, I. Pr. Nr. 282. weiße englische, Baily & Son in London, I. Pr. Nr. 283. gelbe englische, do., II. Pr. Nr. 291. isabellfarbig böhmische, Carl Müller in Lumatsch, I. Pr.

Trommeltauben. Nr. 304. gelbe, Robert Metzger in Reichenbach, II. Pr. Nr. 307. Bucharische, Director Funck in Cöln, I. Pr.

Feldtauben. Nr. 316. schwarze Schwalben, Hermann Müller in Craschwitz, II. Pr. Nr. 322. gelbe Schwalben, Alfred Hesse in Altenburg, II. Pr.

II. Hühner und Enten.

Malayen. Nr. 365. braune, Richard Baumann in Ehrenfeld, II. Pr. Nr. 367. braune, Dr. Schoenfeld in Düsseldorf, I. Pr.

Jokuhamas. Nr. 373. braun gesattelte, Apotheker Funke in Hagen, I. Pr. Nr. 376. weiße, W. Haas in Nippes bei Cöln, II. Pr.

Cochin-China. Nr. 378. gelbe, H. Marten in Linden, I. Pr. Nr. 382. gelbe, H. Lütkemeyer in Elberfeld, II. Pr. Nr. 386. gelbe, H. Marten in Linden, II. Pr. Nr. 895. weiße, do., II. Pr. Nr. 396. weiße, zoologischer Garten in Antwerpen, I. Pr. Nr. 405. rebhuhnfarbige, H. Marten in Linden, II. Pr. Nr. 406. rebhuhnfarbige, W. Stein in Mülheim a. d. Ruhr, I. Pr. Nr. 408. rebhuhnfarbige, Baily & Son in London, I. Pr. Nr. 410. Kuckuckssperber, Robert Klewitz in Mülheim a. d. Ruhr, I. Pr.

Brahma-Putra. Nr. 415. dunkle, Julius Pohlig in Dülken, II. Pr. Nr. 417. dunkle, W. Zeppenfeld in Mülheim a. d. Ruhr, I. Pr. Nr. 420. dunkle, Baily & Son in London, II. Pr. Nr. 422. helle, H. Marten in Linden, I. Pr. Nr. 428. helle, Heinr. Schmits in Mülheim an der Ruhr, II. Pr.

Dorking. Nr. 435. helle, W. Zeppenfeld in Mülheim a. d. Ruhr, I. Pr.

Kämpfer. N. 442. belgische, W. Zeppenfeld in Mülheim a. d. Ruhr, II. Pr. Nr. 447. belgische, Th. Piedboeuf in Jupille bei Lüttich, I, Pr.

Zwergkämpfer (Kampfbantams). Nr. 448. goldhalsige, H. Marten in Linden, II. Pr. Nr. 453. goldhalsige, Bürgermeister Rheinen in Broich, I. Pr. Nr. 454. goldhalsige, Baily & Son in London, I. Pr. Nr. 458. silberhalsige, August Küpper in Mülheim a. d. Ruhr, II. Pr.

Bantams. Nr. 473. schwarze, G. Reichard in Cöln, I. Pr. Nr. 479. weiße, Bürgermeister Rheinen in Broich, I. Pr. Nr. 480. Gold, H. Marten in Linden, I. Pr. Nr. 489. Gold, Robert Klewitz in Styrum, II. Pr. Nr. 491. Silber, Robert Klewitz in Styrum, II. Pr. Nr. 492. Silber, Caspar Schiffer in Düsseldorf, II. Pr.

Bakies. Nr. 497. weiße, H. Jansen in Solingen, II. Pr. Nr. 501. schwarze, J. D. Ohliger in Solingen, I. Pr.

Spanier. Nr. 502. H. Bartels in Döhren, II. Pr. Nr. 507. Zoologischer Garten in Antwerpen, II. Pr. Nr. 523. W. Zeppenfeld in Mülheim a. d. Ruhr, I. Pr. Nr. 524. Carl Winkhaus in Hagen, I. Pr.

Crève-Coeurs. Nr. 533. C. Brandis in Döhren, II. Pr. Nr. 539. W. Zeppenfeld in Mülheim a. d. Ruhr, I. Preis.

La Fleches. Nr. 543. Ad. Spindler in Hilden, II. Pr. Nr. 548. W. Haas in Nippes bei Cöln, I. Pr. Nr. 551. W. Zeppenfeld in Mülheim a. d. Ruhr, II. Pr.

Houdans. Nr. 561. Gottf. Haarmann in Witten, I. Pr. Nr. 566. J. C. Heuckeshoven in Braunsfeld, II. Pr.

Paduaner. Nr. 580. Gold, Franz Enaux in Solingen, II. Pr. Nr. 582. Gold, W. Zeppenfeld in Mülheim a. d. Ruhr, II. Pr. Nr. 587. Silber, W. Zeppenfeld in Mülheim a. d. Ruhr, I. Pr. Nr. 589. Silber, H. Schmits in Mülheim a. d. Ruhr, II. Pr. Nr. 596. weiße, Robert Oettel in Görlitz, I. Pr.

Holländer. Nr. 598. blaue, W. Haas in Nippes bei Köln, II. Pr. Nr. 599. blaue, H. Marten in Linden, I. Pr. Nr. 600. schwarze, H. Gehring in Düsseldorf, II. Pr. Nr. 601. weiße, W. Zeppenfeld in Mülheim a. d. Ruhr, I. Pr.

Hamburger. Nr. 602. Goldlack, H. Marten in Linden, I. Pr. Nr. 605. Goldlack, W. Haas in Nippes bei Köln, II. Pr. Nr. 610. Goldsprenkel, Ernst Rotzkotten in Broich, II. Pr. Nr. 615. Silberlack, Julius Körner in Pulsnitz, I. Pr. Nr. 621. Silberlack, Jacob Wirtz in Neuß, II. Pr.

Bergische Kräher. Nr. 632. Wilh. Werth in Solingen, II. Pr. Nr. 635. Carl Paashaus in Kolf bei Solingen, I. Pr.

Schlotterkämme. Nr. 637. Ch. Baute in Dortmund, I. Pr.

Zwerghühner. Nr. 647. weiße englische, X. Birnapfl in München, I. Pr. Nr. 650. russische Seidenhühner, Albert Meyer in Düsseldorf, II. Pr.

Landhühner. Nr. 664. C. J. Heuckeshoven in Braunsfeld, I. Pr.

Perlhühner. Nr. 666. X. Birnapfl in München, II. Pr. Nr. 668. weiße, Donny Sapin in Gent, I. Pr.

Enten. Nr. 669. Rouen, G. Reichard in Köln, I. Pr. Nr. 670. weiße türkische, Ferd. Worms in Düsseldorf, I. Pr. Nr. 672. Aylesbury, H. Marten in Linden, I. Pr.

III. Vögel.

Nr. 698. 1 Jako, J. Liebelt in Köln, II. Pr. Nr. 701. 1 Leadbeater Kakadu, J. Bresges in Rheydt, I. Pr. Nr. 721. 1 kleiner Alexanderpapagei, Ferd. Worms in Düsseldorf, I. Pr. Nr 722. 1 Amazonenpapagei, Alb. Meyer in Düsseldorf, II. Pr. Nr. 723. 1 Paar Buschwald Sittiche, Verein Fauna in Düsseldorf, I. Pr. Nr. 724. 1 Paar Buntsittiche, Verein Fauna, II. Pr. Nr. 763/4. 1 Paar Larven- und Textor-Weber, A. Bresges in Rheydt, I. Pr. Collection verschiedener Vögel, Adolph Bonvie in Cöln, II. Pr.

Außerdem wurde von den Preisrichtern eine ganz be-

sondere Anerkennung zuertheilt dem Herrn Director Vekemans in Antwerpen für: Nr. 682. Inseparables, Nr. 683. grauköpfige Inseparables, Nr. 727. weiße Reisvögel, Nr. 728. gelbe amerikanische Drosseln und mehrere andere im Catalog nicht angeführte Vögel, und dem Herrn C. Hagenbeck in Hamburg für: Nr. 704/8. verschiedene Papageien, Nr. 784/92. verschiedene Weichfresser.

IV. Kaninchen.

Nr. 800/1. 2 Paar Lapins à fourrure riche, Zoologischer Garten in Antwerpen, I. Pr. Nr. 802. 1 Paar Batavia (Chinesische), Ed. Daubenspeck in Düsseldorf, I. Pr. Nr. 804/12. Collection verschiedener, H. Vehling in Rheydt, I. Pr. Nr. 813. persische Wollhäsin, P. L. Witsch in Dülken, II. Pr. Nr. 827. 1 Paar flandrische Riesenkaninchen, Zoologischer Garten in Gent, I. Pr. Nr. 832/4. 3 flandrische Riesenkaninchen, Donny Sapin in Gent, II. Pr.

Die von dem Königl. Ministerium für landwirthschaftliche Angelegenheiten verliehenen **3 silbernen** und **6 bronzenen Medaillen** wurden folgenden Ausstellern zuerkannt:

Für Tauben: eine silberne Medaille Herrn Dr. Schoenfeld in Düsseldorf, eine bronzene den Herren Th. Hesse in Cöln, Donny Sapin in Gent.

Für Hühner: eine silberne Medaille den Herren W. Zeppenfeld in Mülheim a. d. Ruhr und W. Haas in Nippes bei Cöln, eine bronzene Medaille den Herren Robert Klewitz in Styrum, Bürgermeister Rheinen in Broich, C. J. Heuckeshoven in Braunsfeld bei Köln.

Für Kaninchen: eine bronzene Medaille Herrn H. Vehling in Rheydt.

Eine schöne systematisch nach Brahm geordnete ornithologische Sammlung, bestehend in ca. 1400 Exemplaren, ist unter sehr vortheilhaften Bedingungen zu verkaufen.

Bemerkt wird, daß die Vögel ganz rein und schön nach der Natur gestopft und in Glaskästen aufgestellt sind.

Cataloge werden auf Verlangen gratis zugesandt. Näheres bei

Georg Woerler,
[548] Flaschenhofstraße 32, Nürnberg.

Harzer junge **Kanarienhähne** eines bedeutenderen Züchters gegen 100 Stück, à 2 bis 2⅓ Thlr., habe nach dem 1. October d. J. gegen Garantie des gesunden Ankommens zu verabfolgen. [549]

Brake, Oldenburg. **J. Scurla.**

Ein Paar Nikobartauben
(Calloenas nicobarica) mit einem Jungen werden um 80 Thlr. zusammen oder auch einzeln verkauft bei
[550] **Jos. Seybold** in München, Sonnenstr.

---

2 **Hühnerhabichte** (Falco palumbarius), sehr schöne Exemplare, sind zu verkaufen. Adresse d. d. Exped. d. Bl. [551]

Vogelhandlung
von

Joseph Zuckerkandel,

Dresden, Zahnsgasse 26. I.

empfiehlt ein wohlassortirtes Lager exotischer Vögel, franz. Kanarien und die allgemein bekannten und renommirten fehlerlosen, reinen Kanarienvögel eigener Zucht, als Glucker, Hohlroller, Klingelroller mit Knurren, Roller mit jammernden Touren, ebenso beste reinste Zuchten Harzer Kanarienvögel. [552]

Russische 1874er Ameisen-Eier empfingen und empfehlen **Mey & Bengelsdorff,** Berlin. [553]

Heurige getrocknete Ameiseneier, I. ma Qualit. pr. Litr. 9 Sgr. Muster werden auf Verlangen portofrei zugeschickt. **J. Zivsa.**
[554] Troppau (Oesterreich).

Eine Sammlung, 500 Stück Vögel, auf das Beste conservirt und aufgestellt, soll baldmöglichst verkauft werden durch den Kirchschullehrer **Friedrich** in Blankenhein bei Chrimmitschau. [555]

Vom 2. October cr. befindet sich meine Wohnung nicht mehr Uferstraße 1, sondern Neue Glogauerstraße Nr. 9.

Liegnitz, 10. September 1874.

[556] **Wilh. Langner.**

Vorräthig sind wieder: Stieglitze zu 6 und 10 Sgr., Zeisige zu 5 und 6 Sgr. und andere Körnerfresser, gegen ausländische im Käfig nistende Vögel einzutauschen.

[557] **Wilh. Langner.**

In **R. Hieronymi's Zoolog. Handlung** zu Braunschweig sind zu verkaufen: Astrilden à P. 2½ Thlr., Orangebäckchen à P. 3 Thlr., Goldbrüstchen à P. 2½ Thlr., Silberbäckchen à P. 2½ Thlr., Muskatfinken à P. 3 Thlr., Bandvögel à P. 2½ Thlr., Atlasfinken, ein Prachtgefieder, à P. 3 Thlr., Bras. Kanar.-Vögel à P. 5 Thlr., à St. 3 Thlr., hies. u. Harzer Hähne von 1½ bis 3 Thlr., Papstfinken à St. 3 Thlr. Wellenpap. à P. 8 Thlr., Sperlingstäubchen à P. 3 Thlr., Lachtauben à P. 1 Thlr., Helmwachteln à P. 4 Thlr., Schwarzdrosseln à St. 1 bis 1½ Thlr., Stieglitze à St. ½ Thlr., Dompfaffen à St. 1 Thlr., rothe u. gelbe Kreuzschnäbel à 1 resp. ⅔ Thlr., Plattmönche à St. 1½ bis 2 Thlr., Fischreiher à 2 Thlr., Pirole, Königspapageien, sprechende Amazonen und Graupapageien, gebrauchte Nistkasten f. Wellensittiche, gebrauchte Käfige, für Amad. passend, verschiedene Hunde, als Ulmer Doggen, Boxer, Möpse ꝛc., Goldfische, Muscheln u. s. w., auch Futtersämereien, Mehlwürmer ꝛc.

NB. Alle Vögel befinden sich stets im Freien, sind daher sehr schön im Gefieder und möglichst akklimatisirt. [558]

Ein erst seit 3 Monaten in Gebrauch befindlicher **Heckkäfig,** 60 Centimeter tief, 110 breit und 200 hoch, von 3 Seiten von Holz, vorn von Drahtgeflecht, in 4 zerlegbaren Theilen, auf bequeme Weise in 4—8 Abtheilungen einzutheilen, wird ganz vollständig für Thlr. 18. abgegeben.

M. Schaller, Kaufmann u. Spediteur,
[559] Wertheim a/M.

Von den so beliebten italienischen Damen-Windspielen habe noch 5 Stück Hündinnen (2 schwarze und 3 mausgraue) von ganz reiner Race abzugeben. Im Alter von 6 Wochen pr. Stück 8 Thlr. incl. Embalage.

F. Zivsa,
[560] Troppau (Oesterreich.)

Schwarze Cochinchina,

1874er im April geboren, fast so schön und groß wie 1875er, kann einzelne Hennen oder Stämme von 1 Hahn und 4 Hennen, Stück zu 5 Thlr. abgeben. Die Hühner sind preiswerth, verkaufe sie jetzt nur so billig, um sie nicht zu überwintern. **E. Genpel-White,**
[561] Leipzig.

Ich empfing eine große Parthie graue Papageien, alte, kräftige, gesunde Vögel, vollständig ausgefedert, die billig abgehen kann. **E. Genpel-White,**
[562] Leipzig.

Weißwurm (Eintagsfliege)
als vorzügliche Fütterung für kerbthierfressende Vögel, empfiehlt billigst und liefert jedes Quantum

Emanuel Trillsch.
[563] Tetschen a. d. Elbe, Böhmen.

Mehrere Paare dies- und vorigjährige **Silber-Fasanen** (Prachtexemplare) hat wieder zu verkaufen **Julius Westhoff,** Apotheker in Haßloch in der Bayer. Rheinpfalz. [564]

Gold- und Silberfasanen (diesjährige) sucht zu kaufen
[565] **E. Hartmann**
in Drensteinfurt, Westfalen.

Zu verkaufen:

Zaunkönige, sehr zahm und singend, gut an Winterfutter gewöhnt; 2 Paar weiße 2jährige Schwäne und 2 Stück echte Dachshunde 2 Monate alt, Hund und Hündin, bei **Hermann Schulze,**
[566] Altenburg i./S., Milchwitzerstraße.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 24. September 1874. Nr. 39.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Zucht der Spottdrossel. —
Vortrag des Herrn Dr. Hausmann. —
Anfragen und Auskunft: Unglück in der Kanarienhecke, Wellensittich. —
Aus den Vereinen: Vogelfreunde in Würtemberg. —
Anzeigen.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Zum Vogelschutz.

Die Abtheilung für Vogelschutz des Stettiner Ornithologischen Vereins, deren Vorsitzender Herr Hauptmann Bödicker, wendet sich, wie schon früher, an die Lehrer und Förster der Provinz, so auch jetzt an die pommerschen Geistlichen in einem Rundschreiben mit der dringenden Bitte, in den Gemeinden und besonders bei der Jugend durch entsprechende Belehrung und Ermahnung dahin zu wirken, daß das Zerstören der Nester sowie das Fangen oder Tödten der für den Naturhaushalt nützlichen Vögel verhindert werde.

Zucht der Spottdrossel.

(Turdus — Mimus — polyglottus).

Die Schwierigkeit, mit welcher die Zucht der kerbthierfressenden Vögel verknüpft ist, aber auch der Reiz, den begabtesten Sänger der gefiederten Welt von frühester Jugend an in die Meisterschule europäischer Gesangskünstler zu bringen, lassen die in dieser Hinsicht gemachten Beobachtungen gewiß höchst wünschenswerth erscheinen, und so möchte auch ich meine diesjährige Erfahrung weiterer Prüfung anheimgeben.

Nachdem ich bereits im vorigen Jahre ein Paar Spottdrosseln angekauft, die aber bald nach dem Eintreffen starben, erneuerte ich in diesem Jahre meine Versuche mit zwei Paaren. Die würgerartige Mordlust, mit der diese Vögel namentlich kleinere Insektenvögel befallen, machten die Beschaffung eines besonderen Bauers durchaus nothwendig. Ein solches ließ ich auf meinem, vor rauhen Winden sehr geschützten und durch das anstoßende Laboratorium und die Küche etwas erwärmten Höfchen herstellen. Die Höhe beträgt 4 Fuß bis zum schrägen Dach, die Breite 16 Fuß, die Tiefe 2½ Fuß. Bis zu einer Höhe von 3 Fuß ist vorn ein Drahtgitter, der übrige Raum mit Dach aber durch Holzbekleidung vor jeder Störung, sowie vor Zugkälte geschützt. Vier Querabtheilungen gestatten die Trennung der einzelnen Vögel, doch ist die gegenseitige Beobachtung durch einige feste Drahtfenster ermöglicht; jeder Raum besitzt einen abgestorbenen Tannenbaum, in dessen Verzweigung Drahtnester angebracht sind.

Zu Mitte März setzte ich hier meine Vögel

gesondert in die Abtheilungen, ließ sie nach einigen Tagen schon paarweise zusammen, doch der blutige Kampf miteinander machte eine schleunige Trennung wieder nothwendig. Als ich aber nach einiger Zeit eine größere Paarungslust zu beobachten glaubte, vereinigte ich die Paare wieder, augenscheinlich vertrugen sich dieselben auch jetzt besser, doch nach wenigen Tagen ging der Kampf durch die stürmische Liebesbezeugung der Männchen von Neuem an. Andern Morgens fand ich ein Weibchen todt an der Erde. Das Weibchen des zweiten Paares zeigte mindestens ein freundschaftliches Verhalten mit seinem zukünftigen Ehegatten, bis eines Tages auch dieses mit zerhacktem Kopfe am Boden lag. Ich nahm dasselbe heraus, sah, daß dessen Augen ganz verschwollen waren, und versuchte dasselbe durch Umschläge und Päppeln zu erhalten. Andern Tages hatte ich jedoch eine zweite Leiche.

Nun wurde ein drittes Weibchen beschafft, doch bevor dieses eintraf, entpuppte sich ein sogenanntes Männchen als sehr willfähriges kräftiges Weibchen. Die Getödteten waren weit schwächer gebaut und kleiner. Es wundert mich übrigens, daß man bei diesen Vögeln, bei welchen das Geschlecht so schwer erkennbar, nicht ein Merkmal sicher auffindet, das selten bei älteren Exemplaren trügt. Ich meine das weitere Abstehen der Backenknochen beim Weibchen.

Jetzt hatte ich bald die Freude, ein Nest aus groben Tannenzweigen, Besenstrauchreisig und besonders viel Papierschnitzeln auf einem Drahtrost von dem Weibchen allein errichtet zu sehen. Dasselbe wurde mit Agavefasern, Roßhaaren und Federn leicht ausgepolstert und in wenigen Tagen bildeten zwei Eier das Gelege. Später fand ich noch zwei Eier zerstreut im Bauer. Wahrscheinlich waren dieselben vor der Fertigstellung des Nestes gelegt worden.

Nachdem das Weibchen fest brütete, entfernte ich das Männchen und brachte dasselbe zu dem neugekauften Weibchen, um sowol die gefürchtete Rabennatur des Männchens in Fesseln zu legen, als auch um womöglich eine zweite Brut mit dem andern Weibchen zu veranlassen. Beide ließen diesen Abweg der Tugend sich gefallen, und während das brütende Weibchen sich um die Trennung gar nicht kümmerte, paarte sich das Männchen von Neuem. Diese Paarung wurde auch mit einiger Gegenliebe besiegelt, doch zum Nestbau konnte sich das Weibchen nicht entschließen, obgleich das Männchen demselben sogar allerlei Baustoffe vortrug. Kurz vor dem 13. Tage entzog ich dem brütenden Weibchen die Mehlwürmer, um sie mehr an frische Ameiseneier zu gewöhnen, setzte jetzt auch Regenwürmer, Raupen und außerdem stets gegebene Korinthen, sowie auch zerschnittene Feigen, Zwieback in Milch vor. Vor Allem aber legte ich mir eine Maden- und Fliegenzucht an, indem ich in ein Becken rohes Fleisch, Blut und Honigwasser brachte. Letzteres hatte bei mir aber keinen praktischen Erfolg, denn die Maden wurden nicht gefressen und die Fliegen nicht gefangen, weil ein Vogel im Käfig seine Gewandtheit als Fliegenfänger eingebüßt.

Am 13. Tage fielen die Jungen aus, das Weibchen fütterte ausschließlich mit Ameiseneiern, verzehrte auch selbst keine Früchte mehr, wahrscheinlich, weil bei der Speichelfütterung, wie ich öfter beobachtete, der Saft dieser Stoffe den Jungen nicht zuträglich ist. Erst am 4. Tage begann ich, kleine Mehlwürmer vorsichtig in kleinen Portionen anzubieten. Sie wurden begierig den Jungen gefüttert. Am 5. Tage fand ich ein Junges todt am Boden, welches, mit halbgefülltem Schnabel und ohne sonstige Krankheitserscheinungen, wahrscheinlich beim Abspringen des Weibchens aus dem Neste geschnellt worden. Das andere Junge erreichte den 9. Tag und starb total abgemagert. Wie ich später ersah, hatte wol meine übertriebene Vorsicht in der Mehlwurmfütterung, sowie der gänzliche Mangel an Fliegen an der Todesursache Schuld.

Jetzt brachte ich das Männchen wieder zurück, und nach kaum acht Tagen hatte das Weibchen wieder ein neues Nest gebaut, in welches es vier Eier legte. Diese gingen in 13 Tagen aus, nachdem ich abermals das Männchen getrennt hatte. Das leidenschaftliche Gebärden der Alten, wenn eine Fliege in der Nähe des Bauers sich zeigte, veranlaßte mich, meinen früher gemachten Fehler jetzt doppelt gut zu machen. Ich fütterte vom ersten Tage an sechsmal täglich etwa 10 große aber zerschnittene Mehlwürmer, dabei etwa 20 todte Fliegen, da dieselben lebend von der Mutter selbst verzehrt wurden. Die Fliegen wurden zuerst bis zum letzten Stück den Jungen gegeben, dann bis zur Sättigung auch Mehlwürmer gefüttert, nur der Ueberschuß diente der Alten zur Nahrung; Ameiseneier wurden nur nebenbei als Aetzung der Jungen gebraucht. Koth wurde vorsichtig von der Alten entfernt, auch von dieser verzehrt, doch niemals den Jungen wieder dargeboten.

Am fünften Tage fand ich eins der vier Jungen todt. Ich hatte Tags vorher die Fliegenportionen sehr gesteigert, einmal sogar an 50 Stück zugleich ohne Mehlwürmer gegeben. So fand ich denn auch den Magen des Jungen mit Fliegenbälgen ganz angefüllt und verstopft. Die folgenden Tage fütterte ich täglich in 6 Portionen an 400—500 Fliegen und etwa 200 Mehlwürmer. Dabei gediehen die drei Jungen vortrefflich, so daß sie am 10. Tage schon sehr beweglich im Neste sich zeigten. Unterdessen hörte das allein abgesperrte Männchen den Lockton der Jungen, und trug seitdem die dargereichten Mehlwürmer im ganzen Bauer umher — es wollte füttern. Versuchsweise öffnete ich die Verbindungsthür und im Momente flog dasselbe zu den Jungen, die es nie gesehen, und ätzte dieselben von dieser Zeit an im Wetteifer mit dem Weibchen. Am 11. Tage nahm ich das Nest mit den Jungen auf den Boden, um ein Herabfallen der Letzteren zu verhindern. Auch hier fütterten die Alten sofort, ihre sonstige Scheu vergessend. Ich selbst päppelte mit einem Gemisch

aus Zwieback, Milch und Ameiseneier auch, und so sah ich meine Zöglinge am 14. Tage das Nest verlassen. Bald schritt das Weibchen zu einer dritten Brut, während das Männchen die Jungen noch etwa 14 Tage fütterte. Alsdann fing ich letztere ab, brachte sie in ein Nebenbauer, das durch eine kleine Lücke mit einem neugekauften Spottdrosselmännchen in Verbindung stand. Auch dieses machte nicht nur das Gerücht von der Mordlust der Väter gegen ihre Kinder zum bösen unverdienten Leumunde, sondern übernahm die Pflichten und Freuden eines Vaters in besonders liebevoller Weise, ja es suchte sogar den bereits völlig selbstständigen Jungen sowol durch Anbieten von Mehlwürmern, als auch durch Bau eines Nestes seine väterliche Fürsorge zu bethätigen, ohne im Geringsten als Sänger weniger zu leisten.

In der 5. Woche, nachdem sie die erste Mauser bestanden und nur noch durch die schwarz gerandeten Brustfedern von den Alten verschieden, brachte ich sie zum besseren Ausfliegen in die große Gesellschafts-Voliere. Die dritte Brut von 3 Eiern war unterdessen ausgefallen. Die Jungen mit anfänglich 120 bis 200 Fliegen und 50—100 Mehlwürmer täglich, nebenbei sogar bis zum 6. Tage mit trockenen Ameiseneiern, dann mit der doppelten Portion gefüttert, wurden in 14 Tagen flügge, ohne daß ich dießmal mitpäppelte.

„Doch mit des Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten und das Unglück schreitet schnell."

Ende Juli traten zwei kühle Nächte mit rauhem Nordostwinde ein. Ich fürchtete Nichts, da zur Zeit, als die Jungen noch ganz nackt, sie eine solche Kühle ohne Schutz der Alten bestanden hatten. Doch sah ich, wie das stärkste, welches allein schon auf einem Aste saß, an Durchfall zu leiden anfing. Am andern Morgen saß dasselbe am Boden, kein Futter mehr von den besorgten Eltern annehmend. Der Magen war sehr angeschwollen und Drang zum Stuhlgang vorhanden. Der Patient wurde nun in Pflege genommen, zunächst in Watte gehüllt und warm gestellt, dann auch ein Klystier mit einem in Oel getauchten Nadelkopf gegeben. Einige Fliegen in Milch getaucht wurden in den Schnabel gedrückt — Alles vergeblich. Schon des Nachmittags segnete er das Zeitliche. Andern Tages starb wieder ein Junges ohne meine Mithülfe, d. h. ohne ärztliche Behandlung. Am dritten Tage das letzte, doch nicht genug damit, forderte das Schicksal noch weitere Opfer. Die 3 älteren Jungen, welche bislang in der größten Munterkeit durch ihre schöne kräftige Gestalt und gewandten Flug jeden Liebhaber ergötzten, hatten sich in derselben Nacht eine Lungenentzündung zugezogen. Kurz athmend und bis zum Skelett innerhalb weniger Tage abmagernd, trotz Mehlwürmer und in Milch geweichtem Zwieback, starben auch sie eins nach dem andern. In acht Tagen besaß ich kein Stück mehr, während die Alten jetzt stark mauserten, also die gehoffte vierte Brut nicht mehr zu Wege brachten.

Die alten Spottdrosseln bekamen außer der Brutzeit als Hauptfutter ein Gemisch aus Ameiseneiern, mit Fleischextrakt zubereitetem Eierbrot und Mören, nebst Korinthen, dann pro Tag und Nacht 6 bis 12 Mehlwürmer, welche letztere ich indeß zuweilen ganz weggelassen. Mein vorzüglicher Sänger indeß verlangte 30 Mehlwürmer täglich, wollte ich ihn zum vollen Gesang reizen, fraß dann aber außerdem nicht viel.

Später wechselte ich zeitweise mit einem Gemisch aus gekochtem Ei und Ameiseneiern ab. Jetzt füttere ich für alle Insektenvögel ausschließlich mit 5 Prozent Fleischextrakt (in wenig Wasser gelöst), angefeuchtete trockene Ameiseneier, welche nicht verderben, Korinthen und Mehlwürmer, dabei als Leckerei Zwieback in gekochter Milch eingeweicht. Kartoffeln habe ich meinen Spottdrosseln trotz mehrfacher Versuche nie so recht mit Erfolg anbieten können.

Fasse ich nun die ganze Spottdrosselzucht nochmals zusammen, so lassen sich aus meinen Erfahrungen folgende Generalregeln zur Beobachtung empfehlen:

1. Das starke kräftige Weibchen werde erst gegen die Hälfte des April mit dem Männchen zusammengebracht, nachdem durch gegenseitige Beobachtung die Paarungslust des Weibchens gereizt wurde.

2. Das Bauer sei möglichst naturgemäß und mit Schutzstellen gegen Kälte und auch zur Beobachtung eingerichtet.

3. Die Nahrung außer der Brutzeit bestehe am einfachsten aus mit 5 Prozent Liebigs Fleischextrakt (in etwas Wasser gelöst) versetzten trockenen Ameiseneiern, nebst einer Schüssel Korinthen und täglich 10—15 Mehlwürmern für den Kopf. Zur Abwechselung mit den so präparirten Ameiseneiern gebe man dann auch zeitweise mit gekochtem Hühnerei gegemischte Ameiseneier.

4. Die Paare sind während der Brut nur dann zu trennen, wenn das Männchen sich als Rabenvater erwiesen.

5. Die Jungen werden für die ersten 4 bis 5 Tage à Stück sechsmal täglich mit jedesmal 4 bis 5 Fliegen und 2—3 großen zerschnittenen Mehlwürmern und Ameiseneiern (gut getrocknete scheinen auszureichen), nach der Zeit mit der doppelten Menge leicht und sicher groß gezogen.

6. Die Jungen sind äußerst empfindlich im ersten Jahre gegen niedere Temperatur und Windkälte, daher die Zucht im geschützten Raume und die spätere Unterbringung der Jungen in einem niemals unter + 15° Celsius bergenden geschlossenen Raum sehr zu empfehlen.

Die Erfüllung des Letzteren wird mir bei beschränkter Räumlichkeit schwer und da es mir im künftigen Jahre voraussichtlich sehr an Zeit gebricht, so werde ich für die nächste Zeit neue Versuche nicht aufnehmen können, möchte aber meine allerdings einseitigen und kurzen Erfahrungen allen Denen empfehlen, denen Lust, Raum und Zeit zu

demnächstigen Versuchen nicht fehlt. Viele interessante Episoden während der Aufzucht dieser ebenso intelligenten, als auch von Liebe zur Brut erfüllten Vögel, von denen ich nur erwähnen will, daß bei übergroßer Hitze die Jungen von den Eltern benetzt werden, lohnen gewiß reichlich die Mühe der herbeizuschaffenden Fliegen. Sobald Letztere in Viehstätten sich eingefunden, lassen sich dieselben außer mit der Hand unschwer fangen, indem man einen Busch von trockenen Farnkräutern an der Decke aufhängt. Da dieses Bündel als Schlafstelle den Fliegen dient, braucht man Abends nur einen Sack vorsichtig umzustreifen, auszuklopfen und dann in dem abgestreiften Sack die Fliegen zu tödten.

Essen a. d. Ruhr. Chr. Neuß.
Apotheker.

Von Vögeln, die keine Miethe bezahlen.

Vortrag von

Dr. Alfred Hansmann.

Mitglied des Ornithologischen Vereins in Stettin.

Das ist doch wol heut zu Tage ehrlicher Weise unmöglich! Beruhige dich, lieber Leser, es giebt allerdings auch solche, die keine Miethe bezahlen. Zwei Beine haben sie auch, so gut wie du, aber Menschen sind es freilich nicht, sondern — Vögel!

Was soll ich von unserm nächsten Nachbarn in Haus und Hof, in Garten und Feld, dem Haussperlinge, sagen? Stopft er nicht sein liederliches Nest zwischen die Stuckaturfiguren an die Häuserfronten, und sitzt er nicht zwitschernd und sich brüstend davor, als hätte er hierdurch die Façade Wunder wie verschönert und wäre der Erfinder der zweiten verbesserten Auflage von Johann Ballhorn? Kriecht er nicht unter die Dachziegel und in die Böden hinein, quetscht er sich nicht in die Astlöcher der alten Obstbäume unserer Gärten? Und wo er keine Höhlung, selbst kein leeres Schwalbennest findet, dessen bisherige Insassen er „summarisch expropriirt" hat, packt er da nicht seine Schichten von Werg, Bindfaden und Wolle und Papierschnitzeln zwischen die Zweige der Bäume selbst, am liebsten zwischen Stamm und Aeste der lombardischen Pappel?

Unverschämt frech und habsüchtig, weiß er sich von allem Genießbaren in seinem Bereiche den gebührenden Antheil zu verschaffen. Jedermann paßt ihm auf und Niemand erwischt ihn. Fällt er nicht von den Schroten — in eine Falle geht er nicht, es müßte ihn denn der Hunger bei Knie hohem Schnee schon halb seiner Sinne beraubt haben. Der junge unerfahrene Vogel mag wol einmal hin und wieder überrascht werden, der alte nicht. Er hat Alles beobachtet, weiß überall Bescheid. Jede neue Erscheinung in Hof, Garten oder Feld ist der sorgfältigsten Kritik in Bezug auf Nutzen oder Schaden von ihm unterworfen und lange und genau beobachtet worden, ehe er sich herantraut. Und hat sich doch Einer der Kameraden durch eine besonders schlaue Vorrichtung übertölpeln lassen — von denen, die dies mit angesehen haben, gewiß kein zweiter. Weiß nicht jeder Junge, der aus möglichster Nähe mit einem Steine nach Sperlingen werfen will, daß er es diese nicht sehen lassen darf, wenn er den Stein aufhebt?

Und ein solch' geniales savoir vivre sollte vielleicht nur Deutschland oder das gemäßigte und südliche Europa als Schauplatz seiner Thätigkeit erwählt haben? Nein, lieber Leser, von den kanarischen Inseln bis nach Japan, vom Kap der guten Hoffnung bis in die Regionen der Mitternachtssonne — überall, wo man Getreide erntet, hilft unser Spatz, überall, wo man Obstbäume gepflanzt, hält er die süßesten Früchte nicht für zu schlecht für seinen Schnabel. Mag ihm die Sonne und das Klima sein Kleid in den verschiedenen Weltgegenden verschieden gefärbt haben, mag die Wissenschaft den Sperling vom Kap Passer arcuatus, den von Mittelafrika P. jagoënsis, den vom Littorale des Mittelmeeres, bis weit nördlich nach Italien hinein P. hispaniolensis, neben der mehr lichten Form des italienischen P. cisalpinus genannt haben — er bleibt überall derselbe, derselbe Schelm und Spitzbube, in allen Sätteln gerecht und allen nach ihm geführten Stößen ausweichend.

Uebrigens hat ihn sich auch Uncle Sam mit schweren Kosten als Insektentilger von Europa verschrieben, sowie der Erdtheil, der den schwarzen Schwan im Wappen führt, Australien. Beide sollen indessen nachträglich mit der Aufführung unseres lieben Nachbarn ebenfalls nicht recht zufrieden sein. — Aber nicht allein der Spatz zieht seine gelbschnäbelige Brut in unseren Hausböden, in den Spalten unserer Mauern, oder in den alten Rüstlöchern unserer Kirchen groß. Es wohnt, wenn auch nur in wenigen Familien, neben ihm noch ein feines, zierliches, lebhaftes Vögelchen, gewandt, klaräugig, und nicht ohne Farbenschmuck — ich meine das Hausrothschwänzchen (Ruticilla tithys, Lath).

Wenn die Strahlen der Märzsonne den laichenden Hecht in die Wiesengräben und die ersten Teichunken (Pelobates fuscus Wagl.) aus dem erstarrten amphibischen Leben zu trägen Liebesspielen an die Ränder der Gewässer getrieben hat, ehe das Schwadengras (Glyceria fluitans) seine flottirenden Wurzelblätter, Fühlfäden gleich, dem kommenden Frühlinge entgegenstreckt, zugleich mit der weißen Bachstelze, dem Kiebitz, der Feldlerche, der Vorhut des Waldschnepfenstriches, dem Wiesenpieper (Anthus pratensis, Bechst.) und der Rohrammer (Schoenicola arundinacea), erscheint auch unser Rothschwänzchen.

Das schiefergraue Kleid an den Schornstein gedrückt, läßt es trotz Nebel und Sprühregen sein kurzes Liedchen ertönen, wenn man diese Töne überhaupt noch ein Lied nennen will. Und doch ist mir dieser Gesang stets ein lieber, freundlicher Frühlingsverkünder gewesen, mehr als das Lied der ersten

Lerche. Bei Sonnenschein und lauer Luft ist es eben nicht schwer, zu singen, aber unser Rothschwänzchen zeigt mit Vorliebe seinen besten Humor, wenn Jupiter pluvius die Stirne runzelt. Gerade, weil es sein Schnäbelchen triumphirend öffnet, wo die Andern alle mürrisch schweigen, habe ich mein Vögelchen stets so lieb gehabt.

Sagt doch auch John James Audubon in seinen „Birds of America", nachdem er von seiner Reise nach Europa zurückgekehrt und trotzdem er dessen Nachtigalen gehört, sei ihm doch der liebste Vogelruf der Frühling verkündende seines nordamerikanischen Ziegenmelkers, des „Whipp poor Will", (Caprimulgus vociferus) wie diesen nach der Stimme das Volk benannt, gewesen und geblieben.

In den dämmerigen Haus- und Speicherböden mit regelmäßig zerschlagenen Fensterscheiben, zwischen den Glockenstühlen der Kirchthürme, in den Spalten der alten Stadtmauern hat unser Rothschwänzchen sein heimliches lustiges Wesen, frei und ungebändigt, ohne jede Rücksicht auf das Treiben des Menschen, der von dem Dasein des schiefergrauen Vögelchens mit dem rostrothen Schwänzchen meistentheils kaum eine Ahnung hat. Aber der Eingeweihte vernimmt seinen Ruf aus weiter Ferne und erspäht auch bald das dunkle Pünktchen auf der Dachfirst, dem Rand des Schornsteins, an der Thurmecke oder im Schallloche, von wo jener Ruf herrührt, der in seiner Hälfte nicht unähnlich dem Knarren der benachbarten Wetterfahne klingt. —

Neben dem Rothschwänzchen, aber nur auf Kirchen und Thürmen, findet sich eine Vogelgesellschaft, deren Leben und Treiben allerdings kein so stilles, heimliches ist, wie dasjenige des oben geschilderten Vögelchens. In schwarzen Käppchen, schwarzen Fracks und Beinkleidern schreiten sie gravitätisch einher, mit dem Selbstbewußtsein des, etwa hundert Fuß tiefer predigenden Prälaten. Scharf und klug aus den perlgrauen Augen um sich und hinunter in die Welt blickend, leben sie, wenn die Frühlingsbalgereien um die besten Nistplätze vorüber sind, ziemlich verträglich unter einander, sich bei gutem Wetter gaukelnd in der Luft schwenkend.

Sollen Dich die Dohlen nicht umschrein,
Mußt Du nicht Knopf vom Kirchthurm sein,

sagt der Dichter. Die Dohlen eben sind es, die ich meine.

Auch sie führen ein freies, vom Haushalte der Städte gänzlich unabhängiges Leben. Von ihrer hohen Warte kommen sie nicht gerne in die Straßen und Plätze hinab, höchstens, um einiges Nistmaterial oder eine blinkende Kleinigkeit zu erwischen, des Futters wegen wol kaum. Das liefern ihnen reichlich die benachbarten Felder, und oft unternehmen sie meilenweite Flüge, wenn sie wissen, wo etwas für ihren Schnabel zu holen ist. Nur die Schlafstätte, nur den Platz, wo die Wiege ihrer Jungen steht, gewährt ihnen das Weichbild der Stadt oder des Dorfes; ihren Unterhalt muß das weite Land bestreiten.

Aber auch nicht einmal ausschließliche Schlafstätte ist ihnen der Thurm oder die Kirchenmauer. Wenn die Bruten alle flügge geworden und die Zahl des schwarzen Gesindels sich verdreifacht hat, ist zur Nacht kein Platz mehr für Alle in den Schallöchern, auf den Balken der Glockenstube, in den Nischen, oder zwischen Kreuz und Rose der gothischen Zierrathen. Da muß denn das junge Volk hinaus und muß selber für sein Unterkommen sorgen. Fast mit Tauben-Gewandtheit ziehen die schwarzen Flüge bei hohem Nachmittage, wenn die Sonne bereits tief golden scheint, über die Städte und Felder hinaus, dem Waldrande zu. Am liebsten übernachten sie in Flügen auf einzeln und frei stehenden Bäumen, denen sich Niemand so leicht ungesehen nähern kann. Da ruht denn die schwarze Schaar, ein wunderlicher Jeddschmuck im Haar der blonden Birken.

(Forts. folgt.)

Anfragen und Auskunft.

1. Frage: In diesem Jahre ergeht es mir wahrlich sehr schlimm mit meiner Kanarienvogelhecke. Anfang April räumte ich den Vögeln ein Zimmer und setzte 3 Hähne und 10 Weibchen hinein. Nach einigen Tagen mußte ich aber einen Hahn entfernen (den Vater der beiden andern), sonst wäre er auf dem Kampfplatze geblieben; seine Krone hat er in der Rauferei eingebüßt, er war vollständig nackt auf dem Kopfe. Ich nahm ihn heraus aus der Flughecke; nachdem er sich nach einigen Tagen erholt hatte, bekam er einen zweckentsprechenden Käfig und ich setzte ihm 3 Weibchen dazu. Das Weibchen, das er voriges Jahr hatte, brachte 4 Junge auf, zwei davon sind Glatzköpfe (nicht etwa, daß seine Weibchen auch gehaubt sind). Ob sein nacktgerupfter Kopf Schuld daran ist, oder — wie geht das zu? Die andern beiden Weibchen hatten je 5 Junge, welche nicht gefüttert wurden. Ebenso ist's in der Flughecke, wo vier Weibchen nicht füttern. Ich könnte eine viermal größere Zahl von jungen Vögeln haben, wenn dieselben treulich gefüttert würden. Ein Weibchen hatte seine Jungen so weit, daß sie beinahe flügge waren; eines Morgens um 5½ Uhr hörte ich ein Geflatter, kümmerte mich aber nicht darum; nach einer halben Stunde will ich die Vögel füttern, da liegt dieses Weibchen bei den Jungen und ist todt! Futter hatte es im Schnabel, wie es dieselben ätzen wollte. Besonders die Weibchen, die nicht füttern, leiden so sehr an Schweißsucht, die sich immer wieder einstellt nach einigen Tagen, wenn dieselben davon befreit sind. Ich wasche ihnen den Leib mit Salzwasser. Oder giebt es ein anderes sehr bewährtes Mittel?

2. Frage: Ich wollte mir gern eine Wellensittich-Hecke anlegen; genügt dazu ein Käfig von Holzgerüst mit Drahtiproßenwerk, oder muß es ein Papageienkorb sein ganz aus Metall, um ihn mit ihrem Schnabel nicht zu verwüsten? August Stöckel jun.

Antwort: 1. In einer geräumigen Stube pflegt der Zank unter den Vögeln sich in der Regel in den nächsten acht bis zehn Tagen mit wenig bedeutenden Ausnahmen zu legen; in kleinen Räumlichkeiten dauert er dagegen oft die ganze Brutzeit hindurch und wirkt dann sehr störend auf die Parung ein.

Man sehe daher darauf, daß das Zimmer möglichst geräumig sei und der Anzahl der anzusetzenden Vögel entspreche, vertheile auch Futter und Wasser in möglichst viele Gefäße, damit sich die Befehdung nicht aus Futterneid immer wieder erneuere.

Es giebt indeß auch einzelne besonders zänkische Vögel, die keinen andern Hahn neben sich dulden mögen; sie sind sonst gute Heckvögel, füttern namentlich Weibchen und Junge gut, und es ist daher nicht anzurathen, derartige feurige und lebenskräftige Vögel aus der Hecke zu entfernen. In jedem einzelnen Falle ist vielmehr besonders zu prüfen, welche Maßregeln zu ergreifen, um trotzdem eine ergiebige Nachzucht zu erhalten. Die Einsicht des Züchters wird dabei meist das Richtige treffen; es liegt indeß in der Natur der Sache, daß, wie überhaupt bei der Züchtung, so auch im Fragefalle mißliebige Erfahrungen nicht ganz vermieden werden können.

In einer kleineren Abtheilung der Hecke befanden sich anfangs 3 Hähne und 10 Weibchen; der Raum wäre eher passend gewesen für 2 Hähne und 8 Weibchen. Da indeß bei zwei Hähnen der schwächere immer mehr leidet, als bei einer größeren Anzahl derselben in den nämlichen Bruträumen, und da, wenn zwei Hähne sich befehden, der dritte Gelegenheit hat, sich mit den Weibchen zu paren, so zog ich es vor, den Versuch mit drei Hähnen zu machen. Die Zänkerei unter denselben wollte aber kein Ende nehmen, weshalb ich nach 4 Wochen einen weiteren Hahn einsetzte. Die Zahl der eingesetzten Weibchen war indeß nun entschieden zu gering; dieser Umstand und das mit Rücksicht auf die Jungen der ersten Brut reichlich gereichte nahrhafte Eifutter waren wol die Ursache, daß die meisten Gelege aus unbefruchteten Eiern bestanden. Ich nahm nun drei Hähne aus dem Brutraum heraus und überließ es dem vierten, einem sehr munteren Vogel, sich mit allen zehn Weibchen ins Einvernehmen zu setzen. Hatte sich nun vorher die Befehdung auf die Hähne beschränkt, so entstand jetzt Eifersucht und Zänkerei unter den bis dahin so friedliebenden Weibchen. Zwei Kronenvögel waren es besonders, die sich nach Weiberart beständig in den Haaren, will sagen, in der Krone lagen und sich recht derbe zausten. Dieser Unfriede war schlimmer, als der frühere Zustand der Dinge, und ich war daher nach mehreren Tagen genöthigt, demselben dadurch ein Ende zu machen, daß ich die ausgefangenen drei Hähne nach und nach wieder in die Hecke setzte.

Die Kahlköpfigkeit der beiden Jungen kann ein Rückschlag auf die möglicherweise an demselben Fehler mehr oder minder leidende Großeltern gewesen sein, auch vom Mangel an ausreichendem Kalk, Eierschale oder Sand im Heckgebauer herrühren; sehr wahrscheinlich aber liegt sie daran, daß der Hahn zur Zeit der Begattung selbst an Kahlköpfigkeit litt. Der Fall wäre dann allerdings merkwürdig, aber nicht unerklärlich, nach dem in dem Aufsatze über die Untauglichkeit der Kanarien-Weibchen berührten Gesetze der Erblichkeit. Ich habe in einem Jahrgange vier Junge mit fehlerhaften Beinen gehabt. Drei davon waren augenscheinlich wohlgebildet dem Ei entschlüpft; das vierte Junge hatte aber ersichtlich dieselbe Verkrüppelung mit auf die Welt gebracht.

Auf dem Gesetze der Erblichkeit beruht es, wenn wir gegenwärtig bei den Kanarienvögeln verschiedene, nach Gestalt und Farbe sich wesentlich von einander unterscheidende feststehende Rassen züchten. Was wir jetzt als besondere Merkmale der Rasse festzustellen und durch passende Wahl der Zuchtvögel auf die Nachzucht zu übertragen vermögen, war von Hause aus eine zufällige Abnormität des einzelnen Vogels, die bei der Nachzucht als ererbte Eigenschaft auftrat und sich so von Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzte. —

Die mangelnde Lust zum Füttern wird in diesem Falle an der Kränklichkeit der Weibchen, die an Schweißsucht leiden, gelegen haben.

Kränkliche Weibchen sind träge und haben mit ihrer eigenen Erhaltung genug zu thun, können sich demnach auch nicht mit der Erhaltung der Art — der Nachzucht — befassen. Uebrigens füttern auch anscheinend gesunde und namentlich jüngere, d. h. einjährige Weibchen mitunter sehr schlecht. Man mache in solchen Fällen das Futter den Weibchen möglichst mundgerecht, nehme daher auf ein Ei etwa ein halbes Dreierbrötchen, welches vorher in altbackenem Zustande eingeweicht und scharf ausgedrückt ist, menge beides unter einander und setze diesem Futter eine kleine Quantität Mohn zu, so daß das Gemenge davon schwach bunt wird. Dieses Eifutter fressen fast alle Weibchen sehr gern und füttern auch damit. Die vernachlässigten Jungen aber füttere man selbst täglich mehrere Male und besonders Abends mit verdünntem Eigelb, bis die Weibchen sich an das eigne Füttern gewöhnt haben.

In dem fraglichen Heckraume scheint mir die Hitze zu groß zu sein; daher wahrscheinlich der plötzliche Tod des einen Weibchens und die starke Schweißsucht der übrigen. Eine sehr hohe Temperatur ist den Kanarienvögeln schädlicher, als einige Grad Kälte; sie bekommen dann leicht Schlaganfälle.

Auch Verstopfung könnte die Todesursache gewesen sein; in diesem Falle hätte aber, meine ich, dieselbe bei Zeiten entdeckt werden können, da sie sich gemeiniglich auf mehrere Vögel erstreckt.

Die Schweißsucht der Weibchen ist im Allgemeinen so selten, daß ich sie bei meinen Vögeln nicht wahrgenommen habe. Außer dem bereits angewandten Mittel wüßte ich ein anderes dagegen nicht anzugeben; ich setze aber voraus, daß das Zimmer der kühlen Nachtluft zugänglich ist. Derartige Weibchen können meines Erachtens für die Folge in der Hecke nicht verwendet werden; auch ihre Jungen möchten sich nicht dazu eignen. — W. B.

2. Da die Wellensittiche keine schlimmen Nager sind, so genügt ein Käfig aus Pfeilern und Riegeln von hartem Holz und Drahtgeflecht. Die Einrichtung desselben ist im „Handbuch für Vogelliebhaber" zu finden.

Aus den Vereinen.

Verein der Vogelfreunde in Württemberg.

Bericht des Ausschusses. Während der Bericht vom 31. Dezember 1872 das erste Vereinsjahr umfaßte, begreift der gegenwärtige die Zeit vom 1. Januar 1873 bis 30. Juni 1874, also einen Zeitraum von 18 Monaten.

Durfte man anfänglich Zweifel hegen, ob auch der Verein recht lebensfähig sein und stets eine genügende Mitgliederzahl haben werde, so hat die Folge gezeigt, daß eine derartige Befürchtung eine unbegründete war. Er hat vielmehr feste Wurzeln geschlagen und einen Stamm von Mitgliedern aufzuweisen, welche das richtige Verständniß für die Vereinszwecke haben. Sie suchen weder in Ueberstürzung und Hast, in stetem Haschen nach Gelegenheit, den Verein oder ihre Personen von sich reden zu machen, noch verharren sie andererseits in einer stillen, unthätigen Beschaulichkeit. Dieser Stamm, welcher das wahre Interesse durch sein regelmäßiges Erscheinen in den Versammlungen zeigt, verbürgt das Bestehen und Gedeihen unseres Vereins genügend. Verschiedene Mitglieder, welche seiner Zeit der Neuheit wegen dem Vereine beigetreten waren, haben sich zurückgezogen, andere Mitglieder dagegen hat der Verein wieder in solchen erhalten, die erst abwarten wollten, was aus der Sache werden würde, und diese haben durch ihren Beitritt ein bleibendes Interesse gezeigt. So ist denn nun die Zahl der Mitglieder, Abgang und Zugang in Rechnung, eine nicht unbedeutende; von diesen sind hiesige: 119, auswärtige: 29, zusammen: 148, gegen 145 zu Ende des Jahres 1872.

Außer in den Monats-Versammlungen (an jedem ersten Freitage des Monats) haben verschiedene Mitglieder sich noch an den Mittwoch-Abenden zusammen gefunden; im Winter in der Restauration des Herrn Jäger, Rosenstraße 14, im Sommer in Nill's Thiergarten.

Im April v. J. ist auch die zweite Ausstellung veranstaltet worden, deren Ergebniß aber leider kein befriedigendes war und dem Vereine manche Verdrießlichkeiten gebracht hat, eine Erfahrung, die freilich auch andere Vereine gemacht haben. Dieselbe fand wieder in den Sälen der Liederhalle in den Tagen vom 20. bis 23. April v. J. statt. Eine Reihe von Umständen wirkte ungünstig zu-

sammen. Zwei Ausschußmitglieder wurden durch plötzlich in ihren eigenen Familien eingetretene Krankheits- und Todesfälle gänzlich in Anspruch genommen, zwei andere verließen Stuttgart, und die Anmeldungen erfolgten in den letzten Tagen vor dem Schlusse des Anmeldungstermins noch in so unerwarteter Menge, daß Einrichtungen nöthig wurden, auf die man vorher nicht gerechnet hatte, so daß die vorhandenen Kräfte nicht ausreichten, um alle Arbeiten mit solcher Pünktlichkeit und Sachkenntniß erledigen zu können, wie es hätte geschehen müssen und unter andern Umständen auch geschehen wäre. Wir hoffen, daß Aussteller und Besucher diesen außergewöhnlichen Verhältnissen Rechnung getragen und vorgekommene Unregelmäßigkeiten nachsichtig beurtheilt haben. Alle gemachten Erfahrungen werden von uns für die Zukunft benutzt werden, um ähnlichen Uebelständen vorzubeugen.

Diese zweite Ausstellung wurde von 103 Ausstellern aus 49 Orten beschickt, gegen 73 Aussteller der ersten Ausstellung, und zählte 664 Nummern gegen 385 der vorigen. Es waren:

358	Num.	für Tauben,	gegen 257	der 1.	Ausstellung,
137	„	„ Hühner u. s. w.	„ 83	„ 1.	„
111	„	„ Schmuckvögel	„ 45	„ 1.	„
606	Num.	für lebende Thiere	gegen 385	der 1.	Ausstellung.

Außerdem waren Bücher und Schriften über Geflügelzucht, sowie Käfige und vielerlei Geräthschaften ausgestellt, zusammen 34 Nummern, dann noch 3 Nummern ausgestopfte Vögel. Das Vereinsmitglied Herr L. Martin hatte 21 Nummern ausgestopfte nützliche und schädliche Raubvögel und Raben ausgestellt, mit Angabe der Gründe, weshalb sie nützlich, bez. schädlich sind. Das Arrangement der Ausstellung war zweckmäßig und die Ausschmückung der Lokalitäten, welche namentlich unser Mitglied, Herr Hof-Dekorationsmaler Maier, geleitet hatte, fand allgemeinen Beifall. Wir hatten die Ehre, Ihre Majestäten den König und die Königin zu den Besuchern der Ausstellung zu zählen. Der ungünstige Ausfall der Ausstellung nöthigte uns, ein Darlehen von 600 Fl. aufzunehmen, in welcher Höhe etwa unser Inventarium sich vermehrt hat; von dieser Schuld sind bereits am 1. April d. J. 200 Fl. wieder abgetragen und bis zum 1. Februar 1875 wird die ganze Schuld getilgt sein. Wir schulden noch 300 Fl. den Herren Stahl u. Federer und 100 Fl. einem Mitgliede.

Der Verein hat gegen 2000 Nistkästen machen lassen und zum Kostenpreise im Lande abgegeben, auch 50 mit Zustimmung Ihrer Majestäten in den Königl. Anlagen angebracht. Während des Winters ist von einer Anzahl von Mitgliedern Futter für unsere im Freien lebenden Vögel gesammelt und denselben an geeigneten Orten gestreut worden; auch Nichtmitglieder haben uns in dieser Hinsicht durch Geld- und Naturalbeiträge unterstützt, wofür wir auch an dieser Stelle danken.

Seither hatte man sich mit den provisorischen Statuten beholfen, dann aber wurde vom Ausschusse ein Entwurf zu neuen Satzungen vorbereitet, in mehreren Versammlungen berathen und in den beiden Generalversammlungen vom 7. und 23. Februar v. J. angenommen. Nach § 8 derselben schied Ende Juni v. J. die Hälfte der Ausschußmitglieder durch das Loos aus, einige andere wünschten, ihrer Aemter enthoben zu sein, und es traten somit überhaupt aus dem Ausschusse aus: die Herren Autenrieth, Wagner, Geiger, Dr. Hedinger jr., Marquardt, Fritz, Hackman, Martin, an deren Stelle die Herren Göppel, Knapp, Palm, Rau, Richter, Schiedt, Schleicher und Vetter gewählt wurden. Jetzt scheiden die sechs Aeltesten im Amte aus, nämlich die Herren Kolb jr., Knapp, Nill, Mösch, Rau, Röhrich sen., so daß nun sechs neue Ausschußmitglieder zu wählen sind.

In der Generalversammlung vom 9. Juli wurden an Stelle der austretenden Ausschußmitglieder gewählt: Röhrich sen., Jäger, Sorge, Röhrich jun., Rau und Vogel. Der neue Ausschuß hat sich dann in der Sitzung vom 15. Juli, wie folgt, gebildet:

Direktor Röhrich, Vorstand. Oskar Vetter, Stellvertreter. Röhrich jun., Schriftführer. Prof. Vogel, Stellvertreter. Julius Palm, Kassierer. Direktor Sorge, Inventar-Verwalter. Präparateur Jäger, Bibliothekar. J. B. Göppel. Eugen Rau. Franz Richter. Karl Schiedt. Gottlob Schleicher.

Stuttgart, Ende Juni 1874.

Anzeigen.

Russische 1874er Ameisen-Eier empfingen und empfehlen **Mey & Dengelsdorff**, Berlin. [567]

Gelbe Windhunde, Hund und Hündin, große Race, 5 Monat alt, schöne und gesunde Thiere, sind beide für 40 Thlr. zu verkaufen.

H. Hromada,
[568] Zoologische Handlung, Dresden.

Große schwere Kaninchen

(Lapins béllier et garenne)

empfiehlt das Paar

a) von 1— 3 Monate zu 1½ Thlr.
b) „ 3— 6 „ „ 2 „
c) „ 6—12 „ „ 4 „

J. Hilgen
[569] in **Elz** bei Limburg a. d. Lahn.

Wegen Aufgabe der Zucht sind 8 Stück Kanarienhähne und 22 Stück Weibchen für 30 Thlr. zu verkaufen oder gegen Papageien, Gold- und Silberfasanen zu vertauschen. Gefälliges Anerbieten wird entgegen genommen von

August Hempel,
[570] Stößen bei Naumburg a. S.

Gegen Nachnahme sind abzugeben:
ein Paar Nymphen mit drei Jungen 15 Thlr.,
ein altes Nistpaar Wellensittiche 7 Thlr.,
ein junger Alexandersittich 2½ Thlr.
Näheres in der Expedition dieses Blattes. [571]

Folgende Tauben hat billig abzulassen:
1 Paar schwarze Indianer,
2 Paar Almonds-Tümmler,
3 Paar Brieftauben,
2 Paar Danziger Flieger, Wolkenstecher,
6 Paar echte Altstämmer in verschiedenen Farben, auch diverse einzelne Tauben.

Heinrich Netz,
[572] Kaufmann, Thorn.

Vogelhandlung
von
Joseph Zuckerkandel,
Dresden, Zahnsgasse 26. I.

empfiehlt ein wohlassortirtes Lager exotischer Vögel, franz. Kanarien und die allgemein bekannten und renommirten fehlerlosen, reinen Kanarienvögel eigener Zucht, als Glucker, Hohlroller, Klingelroller mit Knurren, Roller mit jammernden Touren, ebenso beste reinste Zuchten Harzer Kanarienvögel. [573]

Eine schöne systematisch nach Brahm geordnete ornithologische Sammlung, bestehend in ca. 1400 Exemplaren, ist unter sehr vortheilhaften Bedingungen zu verkaufen.

Bemerkt wird, daß die Vögel ganz rein und schön nach der Natur gestopft und in Glaskästen aufgestellt sind.

Kataloge werden auf Verlangen gratis zugesandt. Näheres bei

Georg Boerler,
[574] Flaschenhofstraße 32, Nürnberg.

2 **Hühnerhabichte** (Falco palumbarius), sehr schöne Exemplare, sind zu verkaufen. Adresse d. d. Exped. d. Bl. [575]

[576] Man wünscht 5 Halsbandfinken, 1 Männchen, 4 Weibchen, 1 jungen Kanarienhahn, 1 männlichen Gartenrothschwanz gegen andere Vögel zu vertauschen, event. auch zu verkaufen. Adressen bei der Expedition, Wilhelmstr. 32 SW.

Brieftauben.

Alte bewährte, sowie junge ächte Brieftauben sind zu verkaufen von

J. Schnückel,
[577] **Eschweiler bei Aachen.**

Wegen Einschränkung der Liebhaberei werden abgegeben: 1 amerikanische Spottdrossel, 1 Schwarzblättchen, 12 Nachtigallen, 1 Trupial, 1 rother Kardinal, 2 Graupfäffchen, 1 Tigerfink, lauter Männchen und ganz vorzügliche Sänger, 1 Paar Bandfinken, 1 Paar Feuerfinken, 1 Astrild, W., 1 Silberfasänchen, M., 1 Büll-Büll, M., 1 Stieglitz, M., 1 großer weißhaubiger Kakadu, M., ganz zahm, 1 Lachtaube, M. Reflectanten belieben sich unter **Litt. V. L.** an die Expedition dieses Blattes zu wenden. [578]

Mein Vertreter kaufte auf der Auction in Antwerpen eine größere Partbie kleiner Schmuckvögel, die durch die Bank mit 1½ Thlr. pro Paar versende.

Ueber die Sorten gebe gern franco Auskunft.

E. Gempel-White,
[579] Leipzig.

Graue Papageien, mit Segelschiffen angekommen, an Wasserfaufen, Hanf, Mais und anderes Futter gewöhnt, empfiehlt Stück à 10—12 Thlr. **E. Gempel-White,**
[580] Leipzig.

Die zoologische Handlung von Carl Baudisch u. Comp. in Triest erhielt heute ca. 2000 Bengalisten und zwar Tigerfinken, Malabarfasänchen und Muskatfinken, außerdem geschepfte, dann rothbürzliche und gelbbürzliche Bül-Büls, Beos, Brillenvögel, Seidenstaare, Sonnenvögel, Alexandersittiche, Bart- und Taubensittiche, Quäker, Zierpapageichen ꝛc. ꝛc.

Triest, am 17. September 1874. [581]

Französisches Geflügel ꝛc.

Aus Frankreich zurückkehrend, erlaube ich mir, meinen verehrlichen Kunden anzuzeigen, daß ich bis Ende October liefern kann:

Diesjährige fast ausgewachsene Frühbrut feinster Cove-Coeur, La Flèche, Houdan, Le Mans, Courte Patte, Coucou de France und Gold-Bantam-Hühner zu 50 Frcs. pro Stamm (von 1 Hahn und 2 Hennen) franco Zürich incl. Korb; Rouen-Enten, Toulouser Gänse, Lapins de Normandie, Leporiden, Gélicgris, sowie ganz weiße, sämmtliches zu mäßigen Preisen, je nach dem Alter der Thiere, Californische Wachteln, in der Gegend von Le Mans im Freien gezüchtet, 26 Frcs. per Paar, Lieferungsfrist ca. 14 Tage nach Empfang des Auftrages. Acconto-Zahlung bei Ertheilung des Auftrages ist erwünscht.

A. Rumpf,
[582] Außersihl bei Zürich.

Die

Zoologische Handlung

[583] von

H. HROMADA,

Moritzstraße 10. Dresden. Moritzstraße 10.

versendet folgende Vögel unter Nachnahme und leistet Garantie bis im Besitz des Empfängers für gesunde Ankunft und gutes Gefieder:

Alte zuchtfähige Wellensittiche, Paar 6 Thlr.; junge 3 Monat alte Vögel, Paar 5 Thlr., bei Abnahme von 10 Paaren à Paar 4½ Thlr.; Astrilds, Goldbrüstel, Reisvögel, Silberbecks, Muskat- und Bandvögel, à Paar 2 Thlr.; Atlas- und Schmetterlingsvögel, Elsterchen, Paar 2½ Thlr.; Orangebäckchen und Tigerfinken in Pracht, Paar 3 Thlr.; Zebrafinken, Paar 4½ Thlr.; Diamantvögel, Paar 5⅔ Thlr.; Bartfinken, Paar 8 Thlr.; alle Sorten Weber, Paar von 2—4½ Thlr.; reinweiße Bengalisten, à Paar 10 Thlr.; gelbbunte desgleichen, Paar 9 Thlr.; reinweiße Reisvögel, Paar 30 Thlr.; etwas gefleckt, Paar 23 Thlr.; Inseparables, Paar 8 Thlr.; Sperlings-Paar 5½ Thlr.; weißköpfige Nonnen, desgleichen mit schwarzer Brustbinde, sowie dreifarbige, à Paar 4⅔ Thlr.; schwarzköpfige, Paar 3½ Thlr.; rothe Kardinäle, Stück 4½ Thlr.; graue 4 Thlr.; ungehäupt 3½ Thlr.; Nonpareils, Stück 3½ Thlr.; Indigo 2½ Thlr.; echte feine Harzer Kanarienvögel von 3, 5 bis 15 Thlr.; echte französische Kanarienvögel in Pracht-Exemplaren, sowie eine Auswahl sprechender und nichtsprechender Papageien, zahme Affen (besonders empfehle ich ein ganz zahmes kleines Moorenäffchen, Größe eines Eichhorns), Goldfische, 100 Stück 14, 16, 18 Thlr., 1 Stück 6—7½ Sgr., alle Sorten Vogelfutter, Weißwurm und Dalmatinische Ameiseneier, ½ Kilo 22 Sgr., Ebereschbeeren, Aloëfasern ½ Kilo 10 Sgr., alle Sorten praktische Nistkästen und Aquarien-Muscheln, Tuffsteine, Ctr. 2½ Thlr., Mehlwürmer ½ Kilo 2 Thlr.; Vögel und Vierfüßler werden auch nach Auswärts gut und billig konservirt. Hühner und Tauben werden, gestützt auf langjährige Liebhaberei, in jeder Rasse nur echt geliefert, und empfehle ich eigene Zucht Chinesischer Möven und gelber Kochins zu billigen Preisen.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 1. October 1874. Nr. 40.

Inhalt:

Jahresversammlung der Deutschen ornithologischen Gesellschaft. —
Der Glockenvogel. —
Vortrag des Herrn Dr. Hansmann (Fortsetzung). —
Die Brut und Aufzucht der kalifornischen Wachtel. —
Ueber das Hühnersterben. —
Vogel-Versendungen. —
Verschiedene Mittheilungen: Eierverbrauch in England. —
Anfragen und Auskunft: Perlhuhn.
Aus den Vereinen: Stettin.
Bücher- und Schriftenschau.
Anzeigen.

Die Jahresversammlung der „Deutschen ornithologischen Gesellschaft."

In den Septembersitzungen der deutschen ornithologischen Gesellschaft stellte man, nach den Anträgen und der Erledigung der Tagesordnung, das Programm für die nächste jährlich zu Anfang Oktober unter Betheiligung der meisten in- und ausländischen Ornithologen stattfindende Jahresversammlung fest, das dahin lautet: Die Versammlung findet in den Tagen vom 5. bis 8. Oktober cr. in Berlin statt, und zwar: Montag den 5., Abends 7 Uhr, im Restaurant Zennig, Unter den Linden Nr. 13. Vorversammlung und gemeinschaftliches Zusammensein der hiesigen und auswärtigen Mitglieder; Dienstag den 6., früh 10 Uhr, Besichtigung des Zoologischen Gartens unter Leitung des Direktors Dr. Bodinus, demnächst gemeinsames Diner daselbst; Mittwoch den 7., früh 10 Uhr, im Restaurant Zennig, öffentliche Vorträge auf einschlagendem Gebiete; Donnerstag, den 8., früh 10 Uhr, Versammlung in dem Zoologischen Museum unter Leitung der Professoren Dr. Peters und Cabanis. Gleichzeitigem Beschlusse gemäß kommt der Gesellschaft die Betheiligung von Gästen, sofern solche Gefallen an den Besichtigungen und Vorträgen finden, höchst erwünscht.

Der Glockenvogel im zoologischen Garten zu Köln.

(Chasmarhynchus variegatus).

Zu den interessantesten Thieren unseres zoologischen Gartens gehört unstreitig der Glockenvogel aus Brasilien, von den Eingeborenen Araponga genannt. Dieser Vogel ist etwa von der Größe unserer Drosseln, nur mit etwas kräftigerem Schnabel, das Gefieder ist ganz weiß, der Hals und Kopf nackt, die Hautfarbe violett, die Haut an den nackten Stellen ist mit sehr vielen fleischigen kleinen Anhängseln bedeckt, die Füße sind schwarz. Seine Nahrung besteht in Obst und Beeren. Der Lockton gleicht ungefähr dem Schall, der entsteht, wenn man mit einem Messer an ein Weinglas schlägt, und ist weithin hörbar; meistens läßt er ihn des Vormittags hören.

Herr Direktor Funck, welcher diesen interessanten Vogel auf seinen Reisen in Brasilien schon beobachtet, erklärte, daß es in der Stille des Urwaldes nichts Ergreifenderes gäbe, als wenn mehrere dieser Vögel abwechselnd und in verschiedenen Tonarten diesen Ruf erschallen ließen. In gleicher Weise spricht sich Prinz von Wied in der Schilderung des Glockenvogels aus und andere Forscher haben Aehnliches berichtet. Bis jetzt haben die Reisenden und Naturforscher vier Arten Glockenvögel gefunden

und zwar den Schmidt (Chasmarhynchus nudicollis) in Brasilien, welcher der bekannteste ist, den Hämmerer oder Hämmerling (Ch. tricaruncula tus) in Kostarika, den Glöckner (Ch. caruncula tus) in Guyana und den Araponga im Norden Südamerikas. Dieser letztere ist eben der hier vorhandene. Die interessanten Vögel sind durch die Forschungen des Prinzen Max von Wied, Schomburgk's u. A. ziemlich bekannt und es sei vergönnt, über die Lebensweise nach den Mittheilungen des ersteren Naturforschers Einiges hier anzufügen.

Die vier Arten dieser Vögel zeichnen sich durch ein reinweißes oder doch größtentheils weißes Gefieder und dann durch sonderbare Fleischwucherungen um den Schnabel herum, welche denen des Puthahns ähnlich sind, aus. Sie leben in den Urwäldern, im finstersten Dickicht, von wo aus sie ihre wunderliche Stimme erschallen lassen. Ihr Geschrei entspricht ihren Benennungen, d. h. es klingt etwa wie wenn Metall aufeinander geschlagen wird. Ich vernahm aus dem dunkeln Walde her sonderbare Töne, wie ich solche noch nie gehört, fast als harmonisch abgestimmte Glasglocken erklingend und zwar nach minutenlangen Pausen mehrmals und dann wieder nach einem längeren Zwischenraum. Kein Gesang, keine Stimme eines andern gefiederten Bewohners der Wälder von Guyana, selbst nicht die Rufe des Whip-poor-will (amerikanischer Ziegenmelker) hat mich in solches Erstaunen versetzt, als die Glockentöne des Hämmerlings. Der Glöckner läßt seine zauberhaften glockenreinen Töne nur von dem äußersten Wipfel der riesigen Morabäume erschallen. An jedem Morgen begrüßt er den jungen Tag und an jedem Abend nimmt er unter allen Sängern am spätesten Abschied von der scheidenden Sonne.

Die Nahrung der Glockenvögel besteht in Beeren und Früchten; niemals fand Prinz von Wied Reste von Kerbthieren im Magen eines Glockenvogels, während Schomburgk behauptet, daß sie auch Insekten fressen. Ueber die Brut dieser Vögel ist durchaus nichts bekannt, da keiner von den Reisenden jemals ein Nest von denselben gefunden hat. Auch sind sie bis jetzt in der Gefangenschaft erst wenig oder gar nicht beobachtet worden, einerseits weil in ihrer Heimat Niemand sich mit dem Fang oder Aufziehen solcher Vögel beschäftigt und andererseits, weil das Fangen auch jedenfalls sehr schwierig ist.

Nach Ansicht des Herrn Direktor Funck dürfte der Glockenvogel wol schwerlich noch in irgend einem andern Besitz sein.

Zur Orientirung der Besucher des zoologischen Gartens bemerke ich, daß sich der Araponga in der Vogelhalle links vom Eingange befindet, der Käfig trägt Nr. 60.

Köln. Th. Hesse.

Von Welchen, die keine Miethe bezahlen.

Von

Dr. Alfred Hansmann,
Mitglied des Ornithologischen Vereins in Stettin.

(Fortsetzung).

Mitten unter den Dohlen, aber vornehm, fremd und gleichgültig gegen deren Thun und Treiben, lebt zuweilen ein hoch- und wohlgeborner Herr, wenn auch nur Einer von den „kleinen Herren", der Thurmfalk. Er ist kein so furchtbarer Ritter vom Stegreif, wie sein kühner und starker Vetter, der ihn öfter vorübergehend besuchende Wanderfalk (Falco peregrinus).

Der Thurmfalk (Tinnunculus staudarius) ist eben ein harmloser Bursche. Mäuse, kleine Vögel bis zur Größe der Turteltaube, große Käfer und Geradflügler, sowie Eidechsen bilden hauptsächlich seine Nahrung. Damit kann er dem Haushalte des Menschen wenig Schaden zufügen, um so weniger, als er kein Wald- oder Buschjäger ist, sondern vorwiegend Feld und Wiese sein Jagdrevier bilden.

Wenn im Februar ein paar wärmere Tage das Herannahen des Frühlings ahnen lassen, kehrt dieser Falk, gewöhnlich das Männchen, von seinen winterlichen Streifzügen auf seinen alten Brutplatz zurück, um sich diesen auf alle Fälle zu sichern. Bald wird sich auch die andere Ehehälfte einfinden, und unter klirrendem Rufe werden die Nischen und Löcher der Thurm- und Kirchenmauern untersucht, um ein passendes Plätzchen zur Anlegung des Horstes ausfindig zu machen. Es ist nicht allemal dieselbe Stelle, an der sie im vergangenen Jahre genistet, welche ihnen zu diesem Zwecke in dem darauf folgenden wieder ansteht. Auch bei ihnen heißt es oft: variatio delectat.

Und wenn dann später der Frühling wirklich hereingebrochen ist, und das Weibchen bereits auf den 5—7 rostrothen Eiern brütet, wie schwenkt sich da das Männchen hoch oben in der warmen Vormittagssonne, ohne Flügelschlag kreisend und sich vom Winde treiben lassend, oder mit einem einzigen kräftigen Stoße gegen denselben anschwimmend, oder aber rüttelnd minutenlang auf derselben Stelle schwebend, um zuletzt pfeilgeschwind herabzustoßen und in einem Mauerloche zu verschwinden.

Wenn in der Nähe des Thurmfalken die Abendglocken ausgeklungen haben, die Sonne unter den Rand des Horizontes getaucht ist und die Strahlen des Mondes und der Sterne immer lebhafter gegen die immer kräftiger aufsteigende Dunkelheit ankämpfen, wenn Dohlen und Falken längst die Köpfe unter die Flügel gesteckt haben und schlafen, da fällt etwas von dem Dunkelsten, hintersten Balkenwinkel der Glockenstube fast geräuschlos herab auf den Boden. Es huscht vorwärts nach den Luken zu, es breitet zwei große sammetweiche Schwingen aus und schießt lautlos herab über die in dämmerndes Mondlicht getauchten Dächer der Häuser.

Die Schleiereule (Strix flammea, Linn.) mit ihrem fratzenhaften Katzengesichte ist ebenfalls Mitbewohnerin unserer Thürme, Kirchen, Böden und Scheuern, ohne daß der Mensch meistentheils auch nur eine Ahnung von ihrem Dasein hat. Höchstens, daß sie zur Paarungszeit, die allerdings sehr frühe im Jahre, wenn noch Schnee liegt, eintritt und (nach Gloger) bis in den Herbst dauert, ihr kreischender, fauchender Ruf verrathen würde, wenn sie nicht eben den entferntesten und verborgensten Winkel zu ihrer Wohnung ausgesucht hätte. Da überrascht sie denn wol öfter der erstaunte Bauer, wenn er die letzte Fuhre Heu oder Korn aus der Scheuer entnehmen will, um die auf dem Rücken liegende und mit dem knapfenden Schnabel und den nadelscharfen Fängen sich verzweifelt wehrende unverständiger Weise todt zu schlagen, um sie als Zeichen seiner Heldenthat nachher an das Scheunenthor zu nageln. Der Katze sieht der Bauer das Naschen nach, wenn sie gut mauft, aber seine wirksamste Mäusepolizei in Hof, Garten und Feld muß ihre unbefugte Mitbewohnerschaft mit dem Tode büßen! Der unverständige Mensch urtheilt eben nur nach der äußeren Erscheinung, und haßt darum die Eulen, Spinnen, Kröten, Eidechsen, Blindschleichen und Ringelnattern, weil er nur die Gestalten dieser Thiere kennt, ohne den geringsten Begriff von deren hohem Werthe in seinem eigenen Haushalte zu haben. Andere Leute haben dies bereits anders und besser erkannt, und der englische Gartenbesitzer bezahlt gerne für eine, in seiner Heimat seltene Kröte zehn Silbergroschen nach unserem Gelde, um diese in seinen Garten zu setzen, den sie ihm von Schnecken und Regenwürmern reinigt.

Aber noch sind nicht alle unsere Thurmbewohner vorgeführt. Die Löcher, welche selbst für das Rothschwänzchen viel zu flach sein würden, werden dennoch von einem noch viel größeren Vogel, als dieses, bezogen, der großen, fast ganz schwarzen Schwalbe, dem Mauersegler (Cypselus Apus, Linn).

Ein vorzüglicher Flieger, ausdauernd, und, wenn er will, mit fast elektrischer Schnelligkeit hoch oben in der blauen Luft fortschießend, berührt er wol in den seltensten Fällen den flachen, uns andern zweibeinigen Sterblichen als Tummelplatz unseres närrischen Lebens angewiesenen Boden. Selbst sein geringfügiges Nistmaterial sucht er dem Wirbelwinde aus der Luft abzujagen, oder in vollem Fluge, wie ein gewandter Voltigeur in voller Karrière seine Reitpeitsche, von der Erde aufzuraffen. Und eben, weil er seine Füße, deren sämmtliche vier Zehen er nach vorne zu richten vermag, höchstens zum Anklammern an eine steile Wand, nicht aber zum Fortbewegen, wie die andern Zweibeiner gebraucht, hat ihn Linné „Ohnefuß" (Apus) genannt. Und wirklich, ein bemitleidenswerthes Bild von Unbehülflichkeit gewährt ein solcher Segler, wenn ihn der Zufall oder das Schicksal hat auf den flachen Boden gelangen lassen. Seine Schwingen sind so lang, daß ein Schlag derselben nicht die Luft, wol aber mit den Spitzen wieder den Boden treffen läßt. Da sucht der Vogel denn auf einen etwas höheren Punkt hinaufzukriechen, um von diesem aus seine eigentliche Thätigkeit in wirksamerer Weise zu wiederholen.

Oft sind, wie bei uns Menschen, auch bei den Seglern die Wohnungen knapp. Da muß denn auch ein Mauerloch, das bereits von einem verlassenen Neste besetzt ist, aushelfen. Dasselbe enthält aber noch ein zurückgebliebenes, halb verwestes Junge der früheren Bewohner. Der kleine Schnabel und die schwachen Füßchen sind nicht im Stande, die fremde Leiche zu entfernen. Da weiß denn das zuletzt zugezogene Seglerpaar eine andere Auskunft. Der schleimige klebrige Speichel ist unserm Vogel in eben so reichlichem Maße zu Theil geworden, als den übrigen Gattungs- und Ordnungs-Verwandten. Mit diesem Material nun wird der störende Körper überzogen und durch den hart gewordenen Schleim verdeckt, worauf dann der Bau eines neuen Nestes beginnen kann. In der That hat Schreiber dieses ein dergestalt hergestelltes Seglernest mit eigenen Augen gesehen, und dasselbe befindet sich noch in dem zoologischen Museum zu Berlin.

Wenn alle vorher genannten zinsfreien Miether Dach und Fach vom Menschen beanspruchen, so verlangen die Schwalben im engeren Sinne nur einen Mauerwinkel, nur Etwas, aus der glatten Wand Hervorragendes, um einen Haltpunkt für ihre Mauerarbeit zu finden.

Und wenn das Nest der Rauchschwalbe fertig, wenn der, mit dem eigenen Speichel zu festem Mörtel verarbeitete feuchte Boden seine warme Ausfütterung von Halmen und Federn erhalten und das erste weiße, braunroth gepunktete Ei aufgenommen hat, wie läßt da das Männchen vom Dachrande, oder sonst einem hervorspringenden Punkte her seinen triumphirenden Jubelgesang erschallen, daß, wie die Backen eines Fanfare blasenden Trompeters, die kleine rothbraune Kehle sich mächtig hebt und die langen spitzen Schwanzfedern von der Bewegung beben. Und dann fortgeschossen durch die warme zitternde Luft, und immer wieder das Jubellied von vorne angefangen. Sollte das wirklich so wehmüthigen Sinn haben, wie der Dichter singt:

Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm,
Waren Kisten und Kasten schwer,
Als ich wieder kam, als ich wieder kam,
War Alles leer.

(Schluß folgt.)

Die Brut und Aufzucht der kalifornischen Wachtel.

(Coturnix californica).

Im vorigen Spätjahre habe ich von Herrn Karl Gudera in Leipzig 1 Männchen und 2 Weibchen kalifornische Schopfwachteln bezogen, und dieselben bei meinen Goldfasanen in einer sehr ge-

räumigen Volière meines Gartens, die gegen Osten vergittert, von den anderen 3 Seiten fest zu ist, laufen lassen. Ueber den Winter blieben dieselben mit den Fasanen im Freien ohne weiteren Schutz, als den eines zur Seite der Volière angebrachten hölzernen Nachtstalles, der aber gegen Zugluft gut verwahrt ist.

Im Monat März dieses Jahres kaufte ich auf Anrathen eines Freundes, der vor Jahren schon kalifornische Wachteln züchtete und vom Paar 16 bis 18 Eier bekam, ein zweites Männchen, da 1 Hahn und 2 Hennen zu keinem Ergebniß führen sollen. Dann richtete ich in meiner Papageien-Volière durch Gitterwerk einen besonderen Raum für das zweite Paar her, theilte auch den für diese Volière dienenden Nachtstall so ab, daß die Wachteln etwa Eindrittel und die Papageien Zweidrittel des ungefähr 200 Kubikfuß haltenden Raumes benutzen konnten, ohne einander zu stören.

Mitte April etwa fand ich bei den Fasanen 1 zerbrochenes Wachtelei, die nächsten Tage je 1 gutes zerstreut herum liegen, oder auch in den Fasanen-Nestern bei deren Eiern. Ich nahm diese Eier stets weg, und verwahrte sie in Sägespähnen. Nach etwa 8 Tagen fand ich bei diesem Paare keine Eier mehr, dagegen hatte jetzt das andere Paar angefangen, zu legen, und zwar gab ich diesen auf den mit Flußsand dick bestreuten Boden ein Kistchen, 2′ lang, 1′ breit, 1′ hoch, mit einem seitlichen, an der Langseite angebrachten viereckigen Schlupfloch.

Dieses Paar legte täglich ein Ei.

In der Fasanen-Volière beherbergte ich auch einige Paare Kardinäle, die meine kleineren Prachtfinken in ihrer Behausung zu sehr beunruhigt hatten, und als ich eines Tages junge rothe Kardinäle vermuthete, stieg ich mit der Leiter nach dem Neste derselben, und entdeckte zu meiner großen Freude in einem unter demselben angebrachten weiteren Nestkörbchen, das aber zum Schutz gegen die Fasanen mit 2 Zoll im Quadrat geflochtenem Drahtgitter verdeckt war, 16 Wachteleier. Also hatte auch dieses Paar nicht aufgehört zu legen, sondern seine Eier nur an einen verborgenen Ort gebracht. Beide Paare legten nun fort und fort täglich, bis 1 Paar 105, das andere 100 Eier hatte.

Um schließlich nicht noch um die alten Hennen zu kommen, trennte ich die Paare, sperrte die 2 Hähne zusammen, und die 2 Hennen abgesondert, Letztere legten dann noch 20—30 Eier zusammen, die ich nicht mehr benutzte.

Die ersten 20 Eier legte ich einer gewöhnlichen Landhenne unter, nachher gelang es mir, Zwerghühner verschiedener Rassen zu bekommen, und setzte ich davon je eine, sobald ich 15 Eier hatte. Ein Freund, der viele kleine Javahühner hat, unterstützte mich durch Darleihung solcher Hühner, und so war es möglich, viele Bruten in den Gang zu bringen, bei denen es sich stets herausstellte, daß der weitaus größte Theil der Eier befruchtet war. Schließlich erzog ich aus allen diesen verschiedenen Bruten, alle Unglücksfälle abgerechnet, im Ganzen etwa 80 junge kalifornische Wachteln.

Die erste Brut des Landhuhnes mit den 20 Eiern kam am 25. Tage aus. Als ich in der Frühe die Mutter lüftete, wimmelte es ordentlich darunter. Als ich gegen Abend die neue Nachkommenschaft einem meiner Familienglieder zeigen wollte, waren Junge und Eierschaalen bis auf 3 oder 4 schlechte verschwunden.

Die Henne hatte alle gefressen.

Die beiden in offenen Nestern in einem abgesonderten ziemlich dunkeln Raume sitzenden Zwerghühner brachten von je 15 Eiern nur 6 und 5 Stück heraus und verließen dann das Nest, während die Untersuchung der Eier ergab, daß beinahe in sämmtlichen reife aber erkaltete Junge waren.

Nun richtete ich eigene Brutkisten ein, die etwa 1¼′ lang, 1′ breit und 1¼′ hoch mit einem Deckel versehen sind. Diese füllte ich einige Zoll hoch mit Steinkohlenasche und richtete oben mit namentlich in den Ecken sehr fest eingedrücktem weichem Heu bis zu ½′ der Höhe ein ausgewölbtes Nest, setzte die Henne und schloß den Deckel, so daß die Henne vollständig dunkel saß.

Alle Morgen wurde die Henne herausgenommen, die Eier mit einem Federsäckchen bedeckt, und derselben etwa ¼—½ Stunde zur Bewegung und Befriedigung ihres Hungers gelassen. In den meisten Fällen ging sie selbst wieder in die Kiste, nachdem man den Sack entfernt hatte, und dann wurde diese wieder für 24 Stunden bedeckt.

Am 25. Tag schlüpfen die Jungen aus, bedürfen aber den ersten Tag kein Futter, und so nahm ich sie, nachdem ich mich am 25. Tag nur überzeugte, ob Leben im Neste sei, erst am 26. Tag heraus.

Für die junge Brut habe ich nun eine Anzahl Kinderstuben eingerichtet, die aus einer etwa 6′ langen, 3½′ breiten, oben nach vorne abgeschrägten Kiste, die mit Drahtgeflecht bedeckt ist, bestehen.

Bei heißem Sonnenschein bedecke ich die nach Mittag gestellten Kästen zur Hälfte mit Pappdeckel, so, daß noch genug sonniger Raum bleibt.

Beinahe täglich müssen frische grüne Rasen, wenigstens 2 Quadratfuß groß, gegeben werden, da sich die kleinen Thiere sehr gerne darin aufhalten.

Durch die Mitte läuft ein Holzgitter, das wohl den Jungen, aber nicht der Mutter den Durchgang gestattet. Auf der Rückseite dieses eben beschriebenen Kastens befindet sich ein hölzernes Haus, 1½′ breit, 3½′ lang und mit dem Dach ½′ über die hintere Kastenhöhe reichend, zum Nachtaufenthalt.

Gegen Regenwetter und des Nachts habe ich an den Kasten vier eiserne Träger angebracht, auf welche ein Fenster gelegt wird, das unter dem Dach des Nachtstalles anfangend bis einige Zoll unterhalb des Kastens und etwas breiter als dieser in schräger Lage 4—5″ über dem Drahtgitter aufgelegt wird, um noch genug frische Luft einzulassen.

Die ersten Tage füttere ich die Jungen bei

der alten Henne mit fein gehacktem Eiweiß, frischen Ameisenpuppen, etwas Hirse, Mohn und zerdrücktem Hanf, gebe auch gleich fein geschnittenen grünen Salat und zwar sämmtliches Futter auf den mindestens 1" hohen trockenen Flußsand, da die Thierchen nicht gerne aus Gefäßen fressen.

Zum Wasser nehme ich einen mit Kieselsteinen gefüllten Teller, damit die Kleinen nicht ertrinken können. Das Wasser erneuere ich täglich einige mal, und Futter gebe ich stets wenig, aber oft, so, daß die Jungen stets Hunger haben und herbeispringen, wenn ich mit Futter komme.

Nach einigen Tagen, wenn die Jungen ganz selbstständig fressen, füttere ich diese auf der, der alten Henne nicht zugänglichen Seite, und lasse nach und nach das Eiweiß fort.

Die Henne erhält dann gewöhnliches Hühnerfutter, den Jungen aber gebe ich 3—4 Wochen lang vorzugsweise frische Ameisenpuppen, später solche trocken mit geriebenen gelben Rüben und hartem geriebenem Weißbrod gemischt, und dann nach und nach mehr Körnerfutter und immer weniger Ameiseneier. Nach 5—6 Wochen können die Jungen gut ohne die Alte fortkommen, müssen dann aber auch einen großen Raum zu ihren Bewegungen haben.

Im Allgemeinen habe ich die Bemerkung gemacht, daß große Hühner gar nichts für diese Bruten taugen, daß Zwerghühner mit Federfüßen viele Kleine zertreten und also die kleinsten Arten Hühnchen, mit federlosen Füßen, die besten Brüter für diese Aufzucht sind.

Goldfasanen züchte ich ganz in derselben Weise, nur dienen zum Brüten gewöhnliche Landhühner.

Es sollte mich freuen, wenn ich durch meine Mittheilungen dazu beitragen könnte, daß dieser anmuthige Hühnervogel in den nächsten Jahren immer mehr gezüchtet und dann bald in den meisten Vogelsammlungen vertreten sein möchte.*)

Oskar Vetter in Ludwigsburg.

Ueber das Hühnersterben.

Auf S. 300 der „Gefiederten Welt", theilen Sie über das plötzliche Absterben von Hühnern eines Hofes einige Angaben mit, die mich veranlassen, auch meine Erfahrungen darüber zu veröffentlichen, indem ich vermuthe, daß die beregte Krankheitsform mit der von mir beobachteten übereinstimmen dürfte, zumal über das eigentliche Wesen dieser Erscheinung im Ganzen noch wenig nachgeforscht worden ist.

Es wird Vielen erinnerlich sein, daß die Zeitungen bald von hier, bald von da über eine Hühner- oder Geflügelpest berichtet, welche ganze Ortschaften in kurzer Zeit davon entvölkert hat. Im Frühjahr 1873, etwa im März, wurde mir nun aus zwei Ortschaften bei Stuttgart über eine dort grassirende Hühnerpest, aber erst um das Ende derselben, Verschiedenes mitgetheilt, und hatte ich deßhalb leider keine besondere Gelegenheit mehr, an Ort und Stelle genügende Beobachtungen machen zu können, weßhalb ich mich fast nur auf die Mittheilungen der Landleute verlassen mußte.

Besagte beide Ortschaften liegen etwa 2 Stunden von einander entfernt, und kam es vor, daß über Nacht der gänzliche Bestand eines Hühnerstalles plötzlich ausstarb. Die Krankheitserscheinung wurde mir folgendermaßen geschildert: das eben noch anscheinend ganz gesunde Huhn wurde von einigen Fieberschauern befallen und lag gewöhnlich nach fünf Minuten todt am Boden. Das Auffälligste bei der Sache war, daß die Krankheit, gleich andern epidemischen Krankheiten der Menschen, manche Theile eines Dorfes unberührt ließ und überhaupt in ihrem Verlaufe langsam fortschritt, weßhalb es kam, daß das eine Ende dieser Ortschaften diese Krankheit früher erlitt, als das andere. Daraus geht aber deutlich hervor, daß die Krankheit eine ansteckende war und durch energische Separirung leicht hätte zum Stillstand gebracht werden können. So viel ich mir Mühe gab, in den Besitz einiger frisch gestorbenen Hühner zu gelangen, so war dies bei der Indolenz der Landleute doch nicht zu erreichen. Dagegen wurde mein Rath, den noch lebenden Hühnern veränderte Fütterung und etwas Bittersalz in das Trinkwasser zu geben, in einigen Fällen befolgt und als erfolgreich befunden.

So viel ich nach eigener Anschauung der Lokalitäten heraus gefunden, so scheint mir an beiden Orten der Mangel an gutem Trinkwasser die Hauptursache gewesen zu sein, denn beide Ortschaften haben kein fließendes Wasser und es muß sämmtliches Geflügel in den meisten Fällen das Abwasser der Mistgruben mit genießen, was nothwendiger Weise zu irregulärer Verdauung und schlechter Blutmischung führen muß.

Bei solchen Thatsachen ist es nun sehr wahrscheinlich, daß zu jener Zeit irgend eine mikroskopisch kleine Konserve das in Pfützen stehende Trinkwasser vergiftet haben kann, worüber jedoch nur meine Vermuthung, nicht aber direkte Beobachtungen existiren. Diese Vermuthung scheint inzwischen durch die von mir empfohlene leichte Purgenz mit veränderter Fütterung bestätigt zu werden, da die gleichermaßen behandelten Hühner gerettet worden. Ich kann daher nicht umhin, allen Hühner-, Tauben- und Vogelliebhabern recht dringend zu empfehlen, auf die Reinheit des Trinkwassers weit größeres Gewicht zu legen, als auf eine reichliche Fütterung, wie ich dies schon in meinem „Vogelheerd" gethan habe, und widerrathe ich deshalb alle sparsam spendenden Trinkgefäße, welche höchstens für die Zeit einer Ausstellung, nicht aber für die Lebensdauer eines Vogels ausreichend sein können. Daher wiederhole ich es noch einmal,

*) Herr Oskar Vetter hat aus seiner ergiebigen Zucht noch junge Pärchen abzugeben und versendet solche bis Ende Oktober oder Anfangs November bei baldiger Bestellung für 14 Fl. oder 8 Thlr das Paar, einschließlich Versandkäfige.

daß das Grundübel einer erfolglosen Züchtung in den allermeisten Fällen von dem Genuß schlechten, faulen Wassers herrührt. Doch sind auch andere Ursachen maßgebend, und, wenn ich Zeit gewinne, will ich später auch diese zur Sprache bringen.

Stuttgart, den 12. Septbr. 1874.

Martin.

Vogel-Versendung.

Kürzlich brachte d. Bl. den Nachweis, daß die Behandlung der auf die Post zum Versandt aufgegebenen Vögel sehr viel zu wünschen übrig lasse, und daß die Hoffnung, es müsse in Folge der Erhöhung der Frachtgebühren für lebende Thiere diesen auch eine bessere Fürsorge zu Theil werden, sich bis dahin nicht verwirklicht habe.

Das als „Sperrgut" betrachtete und danach bezahlte Federvieh verlangt und verdient aber zweifelsohne in den Postwagen Sperrsitze oder doch eine rücksichtsvolle Behandlung Seitens der Posterpeditionen. Auch der Thierschutz verlangt dies. Hoffen wir von dem Vorgehen des Herrn Dr. Ruß und der Einsicht des Oberpostdirektors Herrn Stephan guten Erfolg.

Ein einfacher Weg, auf welchem ein größeres Interesse der Postbeamten für unsere Lieblinge erreicht werden kann, ist den Vereinen an die Hand gegeben.

Als wir im Amte Usingen zu einem Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht zusammentraten, konnten wir Herrn Schneider, einen Postbeamten, zum Mitgliede und Sekretair unseres jungen Vereins gewinnen. Gar bald fanden wir unsere Erwartung bestätigt, daß sein Beitritt zum Verein diesem und unseren Lieblingen sehr zu Statten kommen werde. Herr Schneider machte uns in den Vereinsversammlungen aufmerksam auf diese und jene die Versendung von lebenden Thieren betreffende Instruktion, gab uns Mittheilung, wie durch zweckdienliche Verpackung und genaue Signatur unsererseits eine schnelle Beförderung der Postsendungen ermöglicht werden könne, sagte uns, mit welchen Posten und Zügen wir dahin, mit welchen dorthin die Sendungen abgehen lassen sollten u. s. w. Dann aber nahm Herr Schneider auf der Post der zum Versandt aufgegebenen Thiere sich auf das Beste an; die so empfindlichen Harzer Vögel, die Zug und Stoß nicht vertragen können, erhielten durch Fürsorge dieses Postbeamten vor ihrer Abreise oder nach ihrer Ankunft und in den Usinger Postwagen eine durchaus rücksichtsvolle Behandlung.

Als Herr Schneider, der als ein tüchtiger Postbeamter auch Seitens seiner vorgesetzten Behörde geschätzt wird, nach Langenschwalbach, dem weitberühmten Kurorte, versetzt ward, meldete sich dessen Nachfolger, Herr Postassistent Stahl, zu unserer Freude ebenfalls als Mitglied des Vereins. Auch dieser Postbeamte sieht strengstens darauf, daß die aufgegebenen lebenden Thiere schnell und bestens befördert werden, und es ist mehr als einmal vorgekommen, daß er selbst an Tagen, an denen er frei vom Dienst war, zu dem Zwecke aufs Bureau ging, um für schnellste Beförderung einer weithin adressirten Sendung lebender Thiere Sorge zu tragen. Ich möchte allen Vereinen anrathen, wo möglich in ähnlicher Weise, als der Usinger Verein, die Herren Postbeamten für unsere Liebhaberei zu gewinnen. Vogelfreunde giebt es überall unter den gebildeten Menschen; man suche sie aber namentlich unter den höheren und niederen Postbeamten für die Vereine zu interessiren.

Eschbach, bei Usingen.

C. Weygandt, Pfarrer.

Verschiedene Mittheilungen.

— Ueber 500,000,000 Millionen Eier, für die mehr als 2 Millionen Pfund Sterling gezahlt werden mußten, sind im vorigen Jahre von Frankreich nach England eingeführt worden. Man hat versucht, französische Hühner, die bekanntlich sehr viel Eier legen, nach Großbritannien zu verpflanzen, es aber aufgegeben, weil die französischen Hühner so patriotisch waren, in England nicht so viel zu legen, als in Frankreich. Aber unser materialistisches Zeitalter glaubt selbst an den Patriotismus französischer Hühner nicht. Man forschte nach den Ursachen dieser merkwürdigen und unvortheilhaften Erscheinung, glaubte dieselben in dem Klima gefunden zu haben, das wahrscheinlich die Hühner melancholisch machte, fand aber schließlich, daß der allerirdischste Grund die Erscheinung erklärte. Es stellte sich nämlich heraus, daß der Boden von Calais und Amiens, sowie an andern Orten, wo gute Eierleger sich befinden, sehr viel Kieselerde enthalte, und daß, wenn Hühner von Amiens oder Calais nur zwanzig englische Meilen entfernt werden, sie schon aufhören, so fruchtbar zu sein. Nachdem man so auf des Pudels Kern gekommen, will man versuchen, kieselhaltige Erde einzuführen und dann abwarten, ob man nicht die 2 Millionen Pfund jährlich im Lande behalten und obendrein immer frische Eier haben kann.

Anfragen und Auskunft.

Frage. Der Unterzeichnete bittet um die gefällige Beantwortung: Woran ist unter Perlhühnern der Hahn von den Hennen bestimmt erkennbar?

Gebhardt,
Kreisgerichts-Sekretair in Landeshut, Schlesien.

Antwort. In Oettels „Geflügelhof" heißt es: Schwierig gestaltet sich die Unterscheidung des Geschlechts; in der Regel hat der Hahn bläuliche Backen, die Hennen mehr rothe, doch kann man sich hierin auch täuschen, da die Backenfarbe bald mehr, bald weniger zu einer dieser Schattirungen hinneigt. Lenz sagt, daß sie nur am Benehmen zu unterscheiden seien. Friedrich sagt: Das Weibchen ist schwer zu unterscheiden, nur hat es ein etwas kleineres, stumpferes Horn, das auch gerader steht, und seine Glocken sind kleiner. Das wichtigste Abzeichen aber soll sein, daß die Glocken bei den Hühnern bläulich, bei den Hähnen roth sind.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Stettin.

Sitzung vom 26. August. Der Vorsitzende, Herr Ad. Creutz, hat aus seiner Vogelstube folgende Vögel im Hochzeitskleide ausgestellt, die durch ihre Farbenpracht allgemeine Bewunderung hervorriefen: 1. Paradiesvidah (Vidua paradisea), 2. Dominikaner-Witwe (V principalis), 3. Blutschnabelweber (Ploceus sanguinirostris), 4. Napoleonsvogel (P. melanogaster), 5. Feuerfink oder Orangevogel (P. oryx), 7. Eigentlicher Webervogel (P. textor), 8. 1 Pärchen Silberfasänchen (Am. cantans) und 9. 1 Pärchen Goldbrüstchen (A. subflava). Da die Mehrzahl dieser Vögel bereits in einer früheren Sitzung ausführlich beschrieben ist, macht der Aussteller nur auf ihre augenblickliche farbenprächtige Erscheinung aufmerksam, deren Wiederkehr erst in einem Jahre zu erwarten steht. Das Hochzeitskleid, welches die Feuerweber und Widahvögel jetzt, als in der Zeit des nahenden Frühlings ihrer Afrikanischen Heimat, bei uns angelegt haben, verdient ganz besondere Beachtung. — Herr A. Gatow berichtet über die von ihm besuchte Hamburger Vögel- und Geflügelausstellung und hat zur Ansicht seine daselbst mit der großen silbernen Medaille prämiirten weißen, 15 Wochen alten Italiener-Hühner, die durch ihre Größe und Rassenreinheit allgemeine Aufmerksamkeit erregten, ausgestellt. Das Italiener-Huhn ist für unser Klima unstreitig das nutzbarste, da es sich unglaublich schnell befiedert, mit 7 bis 8 Monaten vollständig ausgebildet ist und schon im November mit Legen beginnt. Er gibt ferner eine ausführliche Beschreibung der Hagenbeck'schen Handels-Menagerie in Hamburg, die er in ihrer jetzigen Umgestaltung als die bedeutendste des Kontinents bezeichnet. — Als Geschenk für die Bibliothek sind von Herrn J. Sengbusch in Leipzig eingesandt: Dr. E. Willibald. „Die Nester und Eier der in Deutschland brütenden Vögel" mit über 200 Abbildungen, und „Organ für Schützenwesen und Jägerei" Jahrgang 1874 Heft 1. und 2. — Die eingegangene Frage: Ist der Storch ein für den Naturhaushalt nützlicher oder schädlicher Vogel? konnte nicht genügend beantwortet werden, da die Meinungen der Anwesenden sehr getheilt waren und nur ausgesprochen wurde, daß er, gleich der Eule und dem Sperlinge, je nach Umständen nützlich oder schädlich ist. Eine ausführliche Beantwortung behält sich Hauptmann Boedicker bis zu einer späteren Sitzung vor. — Aufgenommen werden sechs neue Mitglieder.

Seitens des landwirthschaftlichen Ministeriums sind dem Komité zur Förderung der Lapins-Züchterei in der Provinz Pommern, zur Aussetzung von Ehrenpreisen für die bei Gelegenheit der hier stattfindenden Ausstellung des Gartenbau-Vereins beabsichtigte Beschickung mit Lapins, eine silberne und zwei broncene Medaillen für landwirthschaftliche Leistungen zur Verfügung gestellt.

Bücher- und Schriftenschau.

Deutsche Landwirthschaftliche Presse.

Mit dem 1. Oktober d. Jahres erscheint bei Wiegandt, Hempel und Parey in Berlin wöchentlich zwei Mal ein großes, landwirthschaftliches, illustrirtes Central-Organ unter dem obigen Titel.

Die Zeitung steht insofern im Mittelpunkt aller landwirthschaftlichen Bestrebungen, als sie von dem gemeinsamen General-Sekretair des Deutschen Landwirthschaftsrathes und des Kongresses Deutscher Landwirthe, Herrn Oekonomierath Hausburg redigirt wird. Ihr Programm ist zunächst die gediegene und von politischer Parteileidenschaft freie Erörterung und Vertretung der wissenschaftlichen Interessen des deutschen Grundbesitzes. Wie diese Abtheilung werden aber auch die praktische Landwirthschaft und ihre Hilfswissenschaften, der Gartenbau, das Forstwesen, die Fischerei, die Hauswirthschaft, Jagd und der Sport von bedeutenden und als solche bekannten Fachmännern in möglichst anziehender und, wo das Thema gestattet, auch unterhaltender Form behandelt werden. Ein reiches Feuilleton und gute Illustrationen dienen zur Unterstützung dieses Zwecks. Der Abonnementspreis der Deutschen Landwirthschaftlichen Presse beträgt vierteljährlich 1⅔ Thlr. — Die uns vorliegende Nr. 1. hat einen sehr mannigfaltigen Inhalt und eine recht ansprechende Ausstattung, gutes Papier, klaren Druck ꝛc. — Im Laufe der Zeit kommen wir bei Gelegenheit gern auf das Blatt zurück.

Mit Rücksicht darauf, daß wir zu unsern Lesern recht viele Landwirthe zählen, durften wir dies neue großartige Unternehmen hier nicht unerwähnt lassen.

D. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Russische 1874er Ameisen-Eier empfingen und empfehlen **Mey & Vengelsdorff**, Berlin. [584]

Vogelhandlung
von
Joseph Zuckerkandel,
Dresden, Wallstraße 8. I.
empfiehlt ein wohlassortirtes Lager exotischer Vögel, franz. Kanarien und die allgemein bekannten und renommirten fehlerlosen, reinen Kanarienvögel eigener Zucht, als Glucker, Hohlroller, Klingelroller mit Knurren, Roller mit jammernden Touren, ebenso beste reinste Zuchten Harzer Kanarienvögel. [585]

Große schwere Kaninchen
(Lapins bellier et garenne)
empfiehlt das Paar
a) von 1— 3 Monate zu 1½ Thlr.
b) „ 3— 6 „ „ 2 „
c) „ 6—12 „ „ 4 „
J. Hilgen
[586] in Elz bei Limburg a. d. Lahn.

Soeben erschien:
Die Taube
mit
Abbildung verschiedener Brieftaubenrassen
für jeden Taubenfreund
[587] von
J. G. Schreiber.
Preis 6 Sgr.
Neu-Ulm. Helb's Sortim.

Vom 15. Oktober ab verkaufe ich 80 Stück junge Harzer Kanarienhähne zum Preise von 2, 2½ und 3 Thlr. incl. Versandkäfig, auch 8 Stück 2jährige vollendete Harzer Schläger für 4 Thlr. incl. das Stück, ferner Weibchen pr. Stück 7½ Sgr. excl. Bestellungen erwünsche ich baldmöglichst und effectuire der Reihe nach.

Lapins, echte Normandiner, mit sehr langen Löffeln, von denen einer hängt, 4 Monate alte, 5 Pfd. schwere, pr. Paar 3 Thlr incl. Emb., einzelne Rammler 1 Thlr. 5 Sgr., 2 Monate alte, 2½ Pfd. schwere, pr. Paar 1 Thlr. 20 Sgr. incl. Lebende Ankunft garantirt!

Kindelbrück in Thüringen.
[588] **C. Gädeke,** Apotheker.

Sommerrübsen,

guter neuer Ctr. 6¼ Thlr., Hanf 5¼ Thlr., Kanariensaat 8¼ Thlr., Hirse, weiße, 8½ Thlr., Ameiseneier à Pfd. 20 Sgr., Sepia, à Pfd. 20 Sgr., Mehlwürmer, ½ Liter 1⅓ Thlr. offerirt

[589] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

Wachteln, Lerchen, Amseln, Drosseln, Schwarzköpfe, Grasmücken, Blaukehlchen, Rothkehlchen, Bachstelzen, Stieglitze, Hänflinge, Finken und Zeisige, sowie Lachtauben und Eichhörnchen versendet

[590] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

Papagei, grau, sehr zahm und gut sprech., zu verkaufen Gips-Str. 12a, 3 Tr. l. [591]

Zur Komplettirung von Pärchen gebe ab oder tausche gegen Vögel entsprechenden Geschlechts um: 2 Helenafäsänchen-W., 1 Schmetterlingsfinken-W., 1 Goldbrüstchen-M., 1 Amarant-M.

[592] **O. Richter** in Gräfenhainchen, Provinz Sachsen.

Echt französische zuchtfähige Kaninchen,

von der empfehlenswerthesten Rasse zur Fleischproduktion, besitzt in großer Auswahl und versendet unter Garantie lebender Ankunft Frau **Dürstling,** Kaninchenzüchterei, **Stettin,** Jacobi-Kirchhof 7. [593]

Vor Kurzem erschien die Volksausgabe von

Luise, Königin von Preußen.

Ihre Lebensgeschichte

von

Friedrich Adami.

Sechste Auflage. Mit gestochenem Titel.
15 Bgn. 16. in Leinw. geb. 15 Sgr.

„Das Leben einer großen patriotischen Frau in einer erbärmlichen Zeit unter zum Theil noch erbärmlicheren Kreaturen muß für jeden Patrioten eine treffliche Lektüre sein, besonders wenn es wie dieses — aus den besten Quellen geschöpft — so reich an lieblichen Zügen, wie an ergreifenden Momenten ist. Wir können dieses Buch als Volksbuch im höheren Sinne des Wortes nur bestens empfehlen, da es die weiteste Verbreitung verdient."

(Wegweiser der deutschen Volks- und Jugendschriften.)

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung
[594] (Harrwitz & Goßmann) in Berlin.

Junge diesjährige Kochins, Hähne, gelb und weiß, Stück 3 Thlr. Blutwechsel halber empfiehlt solche von schönen reinen Rein-Stämmen, 1—2 15 Thlr.

H. Hromada's Zoologische Handlung,
[595] Dresden.

Ich suche ein Männchen von Platyc. multicolor. Wegen Raummangel für den Winter kann ich einen zahmen Austral. Flötenvogel zu mäßigem Preise abgeben oder gegen Nymphen oder Wellensittiche vertauschen.

Karlsruhe (in Baden), Stephanienstr. 44.

[596] **Wilckens.**

Zu verkaufen:

1 oder 2 Paar Pecking-Enten (importirt), 30 Thlr. à Paar, auch Flandrische Riesenkaninchen von 6 bis 30 Thlr. pr. St.

Louis van der Snickt
[597] in Gent (Belgien).

In Tausch gegen feine gelbe und rothe Pfautauben, kann ich von meinen diesjährigen jungen Pfautauben noch abgeben:

2 bis 3 Paar Weiße, ganz klein und hochfein,
3 Paar Blaue,
2 „ Schwarze,
2 „ weiße Seiden-Pfautauben,
mehrere Paar Weiße mit schwarzen und blauen Schwänzen,
Schwarze und Blaue mit weißen Schwänzen,
einige Roth-, Blau- und Silberschilder, meistentheils ganz feine Exemplare.

Otto Pausch,
[598] Berlin, Ritterstraße Nr. 6.

Zu verkaufen ist ein schöner gelbhäubiger Königs-Kakadu, zahm und gesund, sowie mehrere Wurmvögel, als: 3 Stück Nachtigalen, 1 Plattenmönch, 1 kleine Grasmücke und 1 Spottvogel.

Traugott Brand, Uhrmacher,
[599] Naumburg a. S., Lindenstraße 715.

Abzulassen: Ein Hüttensänger-Weibchen (Sialia sialis) für 2 Thlr. Offerten sub **S. S.** an die Expedition franco einzusenden. [600]

Ein im vorigen Jahr neu erbautes, 10 Fuß tiefes, 50 Fuß langes, 12 Fuß hohes, mit einer gekuppelten Rotunde, die 20 Fuß hoch ist, mit 14 Abtheilungen versehenes Hühner- und Taubenhaus habe ich sofort zu verkaufen. Das Gebäude ist vorne vergittert, Zeichnungen stehen zu Diensten.

Villa Hullerbusch b. Feldberg, M.-Strelitz,
den 26. Sept. 1874.

[601] **Dr. P. M. Löper.**

Den Rest meiner schönen jungen rosenrothen Kakadus verkaufe ich à Stück 8⅔ Thlr.

[602] **Böttcher,** Oranienstr. 66.

Vorzüglich schöne, gut getrocknete Ameiseneier empfiehlt

Franz Aumeyer in Linz a/d. Donau,
[603] Landstraße 55.

Französisches Geflügel 2c.

Aus Frankreich zurückkehrend, erlaube ich mir, meinen verehrlichen Kunden anzuzeigen, daß ich bis Ende Oktober liefern kann:

Diesjährige fast ausgewachsene Frühbrut feinster Crève-Coeur, La Flèche, Houdan, Le Mans, Courte Patte, Crecen de France und Gold-Bantam-Hühner zu 50 Frcs. pro Stamm (von 1 Hahn und 2 Hennen) franco Zürich incl. Korb; Rouen-Enten, Toulouser Gänse, Lapins de Normandie, Leporiden, Belierris, sowie ganz weiße, sämmtlich zu mäßigen Preisen, je nach dem Alter der Thiere, Kalifornische Wachteln, in der Gegend von Le Mans im Freien gezüchtet, 26 Frcs. per Paar, Lieferungsfrist ca. 11 Tage nach Empfang des Auftrages. Acconto-Zahlung bei Ertheilung des Auftrages ist erwünscht.

A. Kumpf,
Außersihl bei Zürich.

[604]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 8. Oktober 1874. Nr. 41.

Inhalt:

Ornithologische Kuriosa. I. —
Zur Wellensittichzucht. —
Zebrafinkenzucht. —
Von Welchen, die keine Miethe bezahlen. (Schluß.) —
Ameisenkern. —
Verschiedene Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Berlin. —
Berichtigung. —
Anzeigen. —

Ornithologische Kuriosa.

I.

Der bedeutendste Vogeltobies hiesiger Stadt ist ein ehrsamer Maurergeselle. Freunde der gefiederten Welt können zu jeder Zeit die beliebtesten einheimischen Finkenarten in mehreren Exemplaren bei ihm sehen und für einen billigen Preis käuflich erwerben, denn unser Vogeltobies ist eine praktische Natur, die das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden weiß. Ganz besonders reich ausgestattet ist aber sein Vorrath im Spätherbst. In den Monaten Oktober und November ist der Fang seiner Lieblinge freigegeben, er hat nicht mehr zu befürchten, mit den Wächtern der heiligen Hermandad in bedenkliche Berührung zu gerathen, wenn er, wie er das nie versäumt, Sonntags in aller Frühe bei gutem oder schlechtem Wetter, je nachdem sichs gerade trifft, in Begleitung seines Söhnchens, des jungen Vogeltobies, auszieht, um auf Anger und Triften, an einem klaren Gebirgsbache oder in baumreichen Gärten und Wiesen seine Netze zu ziehen und seine Leimruten zu stellen. Seine Ausrüstung besteht aus einigen Lockvögeln aus der Zahl seiner Stieglitze und Hänflinge, vorsichtig eingenäht in einen kleinen ledernen Zaum und mit diesem an ein Drahtkettchen befestigt, aus einem oder einigen Ziehnetzen von ansehnlicher Größe, einigen Leimruten, einem leichten Transportkäfig für die Beute des Tages und aus einigen mächtig großen Butterstullen; denn bis zum Abend ist's gar lang und früher kehrt er schwerlich heim. Dafür prangt denn auch in der Regel am andern Tage eine stattliche Zahl kleiner Käfige mit den frisch gefangenen Wildlingen an seiner Behausung, zum großen Vergnügen Jung-Wetzlars, welches nicht müde wird, dem lebendigen Treiben der kleinen Gefangenen zuzusehen.

So hatte denn unser Vogeltobies um Neujahr dieses Jahres einmal wieder einige glückliche Züge gethan; eine hübsche Anzahl farbenprächtiger Stieglitze war eben in sauber geputzten und mit Sämereien und Wasser wohlversehenen Käfigen zu beiden Seiten des Fensters ausgehangen, als es einem Habicht, der just in der Nähe seine Kreise zog, einfiel, der bunten Gesellschaft seine Aufmerksamkeit zu schenken. Er mochte lange gefastet haben, denn Hühner und Tauben saßen seit Wochen sicher in Schlägen und Stellen; genug, der Strauchdieb beging den dümmsten Streich seines ganzen Lebens: er ließ sich mit edler Dreistigkeit an einem der Käfige nieder und bearbeitete die erschreckten Insassen mit Schnabel und Klauen, als ob er draußen in seiner Heimat wäre. Das Vergnügen währte indessen nur einen Augenblick; Vogeltobies jun. hatte ihn durch's offene Fenster kaum wahrgenommen, als er

auch seinem Vater schon zurief: „Vatter, kukt einmal, was ein großer Buggel!“ Der „Vatter“ übersah die Gefahr seiner Lieblinge mit einem Blick; leise, leise schlich er zum Fenster und im nächsten Momente hatte seine nervige Hand den kühnen Räuber beim Halse gefaßt. Dieser mochte ob des gewalsamen Eingriffs in seine Rechte Anfangs nicht wenig erstaunt sein, indeß ist es nicht Sache des kräftigen Gesellen, sich so gutwillig gefangen zu geben; er that nach der ersten Bestürzung sein Möglichstes, unserm Vogeltobies von der ganzen Größe seines Freiheitsdranges handgreifliche Beweise zu geben. Eine breite schmerzhafte Schmarre über der äußern Handfläche belehrte den Gegner von der Schärfe seiner Waffen; dieser indeß stand ebenfalls seinen Mann und ob sich der Gefangene noch so sehr sträubte: sein war er nun einmal und sein mußte er bleiben. Kurz und gut, Vogestobies trug in diesem denkwürdigen Kampfe den Sieg davon und der Habicht bekam vermuthlich aus Dankbarkeit dafür, daß er sich mit Einem Stiglitz begnügt hatte, einen recht hübschen Käfig. Als ich ihn kurze Zeit darauf kennen lernte, war er schon auffallend ruhig geworden. Wahrscheinlich hat er philosophische Betrachtungen über die Bosheit und Tücke der Menschen, die seine „berechtigten Eigenthümlichkeiten“ so sehr verkennen, angestellt. Gegenwärtig befindet er sich, meines Wissens, im zoologischen Garten zu Köln. — Ein anderer Vogeltobies, bzl. Liebhaber unserer einheimischen Sänger gewahrte um Weihnachten vorigen Jahres in dem Hollundergebüsch seines Gartens einen kleinen Vogel, der nach seinem äußern Aussehen und seinem Fluge zu urtheilen, nothwendig eine schwarzköpfige Grasmücke sein mußte. Es ist diesem eifrigen Vogelfänger auf seinen unterschiedlichen Streifzügen durch Wald und Flur schon Mancherlei vorgekommen und mancher Weichfresser, an denen er seine besondere Freude hat, ist durch seine Netze und Fallen berückt worden; ein Schwarzblättchen im Freien, zur Zeit der Weihnachten, das war ihm aber noch nicht vorgekommen. Als er mir Tags nachher den Fall mittheilte, habe ich selbst an einen Irrthum geglaubt; 24 Stunden später schickte er mir den eben im Nachtigalengärnchen gefangenen Vogel zu. Es war in der That ein altes Weibchen der schwarzköpfigen Grasmücke. Der Vogel war gut genährt, durchaus gesund und sein überaus schmuckes, untadelhaftes Gefieder bezeugte, daß wir es nicht etwa mit einem ausgebrochenen Stubenvogel zu thun hatten. Die gesammte Insektenwelt lag schon seit Monden im Winterschlafe; der Vogel hatte sich seitdem wol ausschließlich von Beeren ernähren müssen.

Ebenderselbe eifrige Verehrer eines guten Stubenvogels gewahrte in diesem Sommer in dem Garten eines hiesigen Ortsangehörigen einen Sänger, von dem er seines eigenthümlichen Gesanges wegen nicht sogleich zu bestimmen vermochte, ob es eine Nachtigal oder ein Schwarzplättchen sei. Lacht ihm schon das Herz im Leibe, wenn er einen vollendeten Grasmückengesang hört, — den Vogel mußte er haben, koste es, was es wolle.

(Schluß folgt.)

Zur Wellensittichzucht.

Da ich, wenn möglich, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden suche, so wirkte ein Aufsatz, in dem die Zucht von Kanarienvögeln sowie Wellensittichen, bei verständiger Leitung, als gewinnbringend geschildert wurde, in der Weise anregend auf mich ein, daß ich mich entschloß, einen Versuch mit dieser Züchtung auch meinerseits zu machen. In ein unbenutztes, nach Mittag zu gelegenes Zimmer von mäßigem Umfang brachte ich, nach Vergitterung der beiden Fensteröffnungen und nach Ausrüstung mit den nöthigen Aesten und meist selbst gefertigten Brutkästen, im vorigen Herbst 8 Paar von Herrn Zuckerkandel erworbene Wellensittiche. Leider erfreute ich mich, wenigstens vorläufig, keines günstigen Erfolges, denn die Jungen, welche mehrere Paare ausbrüteten, verkümmerten regelmäßig, weil die Alten stets zu früh zu neuer Brut schritten und die herumlaufenden Jungen verhungern ließen. Nur ein, noch dazu dürftiger junger Vogel entging dem allgemeinen Schicksale, um später bei einer kleinen baulichen Veränderung durch Entweichen seinen muthmaßlichen Untergang zu finden. Ich darf nicht verschweigen, daß mir mehrere alte Weibchen durch Legnoth, andere alte Vögel durch Beißerei, wieder andere durch Anrennen gegen die Fenstergitter und die Decke verloren gingen, so daß ich die gehoffte Freude in meinem Vogelzimmer durchaus nicht fand, und nahe daran war, Alles aufzugeben. Wieder war es Ihre Zeitung, die mich, nach gemachten Erfahrungen, zu erneuten Versuchen anspornte. Ich sagte mir, der Stamm möchte nicht gut gewesen sein; ferner erkannte ich das Unzweckmäßige selbstgefertigter Kästen aus faulem Holze, in deren durch die Vögel bewirkten Anhäufungen ich wiederholt Junge begraben fand. Kurz, ich bestellte mir bei gedachtem Händler 50 Paar frisch importirte Vögel, mit denen ich Anfangs April meinen großen, 1000 Kubikmeter haltenden Schloßsaal bevölkerte, den ich vorher ihrer Bequemlichkeit entsprechend hatte herrichten lassen. In demselben sind die hohen Fenster nebst Flügelthüren durch Drahtgeflecht ersetzt; zehn 8 Ellen hohe, oben untereinander durch starke Stangen fest verbundene Säulen, aus je 4 Brettern zusammengefügt und baumartig angestrichen, enthalten 80 Bruträume. Dürre Bäume sind nach allen Richtungen passend vertheilt, Zweige auf dem Boden für die noch nicht flugbaren Jungen angebracht. Zwei große Tafeln an den Fenstern bieten ihre Hauptnahrung: Glanz- oder Kanariensamen und Hirse; auch an Kochsalz und Kalkmasse ist kein Mangel, das Wasser nicht zu vergessen, dessen gänzlicher Mangel ihnen auf die Dauer gewiß schädlich sein würde. Hier in diesem

weiten Raume gedeiht meine Zucht ganz leidlich, und obwol auch dann und wann Verluste an Alten und Jungen zu beklagen sind, so glaube ich doch jetzt an 200 ausgeflogene Vögel zu besitzen, während noch viele Nester nicht flügge Jungen oder Eier enthalten. Ich hatte aber gleich anfangs, besonders durch Entweichen nach dem Boden zu durch emsig gebohrte Löcher und andere Unfälle einen Abgang von gewiß 30 Alten zu beklagen, wodurch das Ergebniß sich noch günstiger gestaltet. Eine große, gebauerartige Vorrichtung mit Fallthüre soll nun nächstens zum Fangen der Jungen verwendet werden und stelle ich mir dieses Geschäft schwierig und besonders zeitraubend vor.

Meinem Berichte füge ich die Bemerkung an, daß die noch weichen, an den Zweigen hängenden Früchte der Linde den Sittichen ein höchst angenehmes Futter bieten, das ihnen sicherlich auch dienlich ist.

Schließlich noch ein Kuriosum: Ein im Uebrigen kräftig entwickelter Wellensittich ersetzt die ihm völlig unbrauchbaren Füße geschickt durch seinen Schnabel, an dem man ihn stets an den äußersten Spitzen der Aeste hängend und baumelnd sieht. Hat er das Spiel lange genug so fortgesetzt, so ruht er eine Weile auf seinem Lieblingsplätzchen, um sich dann wieder auf seine sonderbare Weise den Uebrigen beizugesellen. Ich konnte mich bisher nicht entschließen, den sonst munteren Vogel von seinem scheinbar qualvollen Dasein zu erlösen.

Graf v. Hoffmannsegg in Dresden.

Zebrafinkenzucht.

Im Frühjahr 1872 kaufte ich vom Vogelhändler Mieth hier u. A. ein Paar Zebrafinken und brachte sie in einem etwa 1½ Quadratfuß großen Bauer unter.

Die Vögel fingen sofort an zu bauen, legten 6 Eier und kamen auch ebensoviel Junge aus, welche jedoch, da die Alten nicht fütterten, starben. Dies wiederholte sich auch bei zwei kurz hintereinander folgenden Bruten.

Ich war hierüber ärgerlich, brachte das Paar in einen in der Küche leer stehenden Glockenbauer, in welchem oben ein halb zugemachtes Körbchen war, und wollte sie, sobald sich Gelegenheit finden würde, fortgeben, bez. vertauschen.

Das Weibchen baute und legte sofort wieder und nach kurzer Zeit waren 6 Junge im Nest, die von den Alten großgezogen wurden. In demselben Jahre brachten sie trotz der ersten drei verdorbenen Bruten doch noch einige 20 Junge. Im Jahre 1873 hingegen, vom Februar bis Ende November 42, sage zweiundvierzig, und in diesem Jahre habe ich, obgleich 2 Junge schon ausgewachsen durch meine Schuld starben, bereits 21 ausgeflogene muntere Burschen, während die Alte bereits wieder auf 5 Eiern brütet. Ich habe demnach in etwa 26 Monaten von einem Paar einige 80 Junge erzielt.

Bei der Ausstellung der „Cypria" im Frühjahr 1873 hatte ich das Pärchen in einem großen Bauer, und da gerade Junge von etwa 8 Tagen vorhanden waren, nahm ich das Nest nebst Jungen heraus, brachte es in dem früheren alten Käfig an, steckte die Alten dazu und schickte sie in die Ausstellung. Trotzdem die Vögel hier zwischen, resp. auf Hühnerbehältern standen und vom Publikum in der Nähe betrachtet wurden, fütterten sie ruhig weiter und brachten die Jungen auf.

Seit einem Jahre stehen sie auf einem Tisch am Fenster und lassen sich in keiner Weise stören.

Ich habe zwei Nistkörbe angebracht, weil das Vögelchen, wenn die Jungen kaum flügge sind, immer schon wieder baut und legt und sie, wenn nur ein Korb angebracht, die Jungen, welche ins Nest wollen, hackt und selbst tödtet.

Die Brutzeit dauert bei ihnen vom Februar bis November ununterbrochen, das Gelege besteht aus 5—8, jedoch fast immer aus 7 Eiern. Sollte sich ein hiesiger Vogelliebhaber hierfür interessiren, so stehen solche gern zur Ansicht.

R. Straßner in Berlin.

Von Welchen, die keine Miethe bezahlen.

Von

Dr. Alfred Hansmann,

Mitglied des Ornithologischen Vereins in Stettin.

(Schluß).

Die Rauchschwalbe (Hirundo rustica, Linn.) hat daher ihren Namen, weil sie zuweilen in dem Rauchfange eines gemüthlichen Bauernhauses ihre Wohnung aufschlägt. Die Schornsteine unserer heutigen Miethskasernen, von der Höhe der Fabrik-Essen, verschmäht sie freilich. Ueberhaupt nisten unsere Schwalben am liebsten in einer Höhe von 30 bis 40 Fuß und am meisten hoch geht noch die Hausschwalbe (Hirundo urbica, Boie). Sie baut ihre Nester oft reihenweis unter dem niedern Dache eines Kuhstalles, aber auch manchmal unter das Kirchendach, oder oben zwischen die Stuckatur-Verzierungen der Paläste. Selbst im Freien, weitab von den Wohnungen der Menschen, hat Schreiber dieses einmal eine Kolonie dieser Schwalbe an einer gegen 700 Fuß aus dem Thale heraufragenden Felswand im südlichen Italien angetroffen.

Die Hausschwalbe ist bei weitem keine so fleißige Sängerin, als ihre Verwandte, die Rauchschwalbe. Man hört das Lied der ersteren nur selten, dann ist es aber ein volltönendes, melodisches, lang anhaltendes Zwitschern, freilich nicht so keck und jauchzend, als das aus der braunen Kehle kommende.

Der Zug der Schwalben währt lange. Sie sind vielleicht diejenigen Vögel, die ihren Weg mit am besten kennen. Wenn die letzte Brut zeitig flügge

geworden ist und sich genügend im ausdauernden Fluge geübt hat, so beginnt die Familie, zu der sich auch wol die Jungen der ersten Brut hinzugesellt haben, in der Gegend umherzustreichen. Je nach Wetter und vorgefundener Nahrung findet ein kürzeres oder längeres Verweilen an demselben Orte statt. Immer aber behält der des Weges kundige Führer die Richtung nach dem anzustrebenden südlichen Ziele im Auge. Allmählig kommen mehr der Auswanderer hinzu und die Flüge verstärken sich oft bis zur Zahl von mehreren hundert Köpfen. Dies findet jedoch erst im vorgeschrittenem Herbste statt. Ein solcher Schwarm hält sich dann auch nicht mehr lange auf, sondern ist gewöhnlich schon in der folgenden Nacht auf und davon.

Wie fast alle Zugvögel, ziehen auch die Schwalben das schützende Dunkel der Nacht dem sie an ihre Feinde verrathenden Tageslichte vor. Wenn es einem Baumfalken (Hypotriarchis subbuteo) auch nicht so leicht wird, eine einzelne Schwalbe zu schlagen, so dürfte es doch für ihn eine Kleinigkeit sein, aus dem ganzen Schwarme eine solche herauszufangen.

Die Frage, wie weit die Schwalben nach Süden gehen, läßt sich immer noch nicht mit Bestimmtheit beantworten. Einzelne Rauchschwalben überwintern bereits am diesseitigen Gestade des Mittelmeeres, während andere noch in der letzten Zeit von den beiden deutschen Afrika-Reisenden Dr. Lühders und Dr. Reichenow an der Goldküste, also etwa unter dem 6. Grade n. Br. angetroffen worden sind. Im Allgemeinen verfolgen auch die Schwalben die großen Heerstraßen der übrigen Zugvögel über die Alpen, den Splügenpaß, den großen St. Bernhard und den Bernhardin mit der Via mala.

Gewiß, lieber Leser, hat Dir schon lange die Frage auf der Zunge geschwebt, warum ich noch immer nicht des, besonders von den Kindern am meisten beliebten Haus- und Mitbewohners, des Storches, erwähnt habe. Nun, der bezahlt ja aber nach dem Volksglauben seine Miethe, während ich nur von denen sprechen wollte, die dies nicht thun. Im Volke ist nämlich der Glaube allgemein, daß der Storch im ersten Jahre eine Feder, im zweiten ein Ei und im dritten ein Junges als Hauszins entrichte. Welchen Ursprung dieser Glaube habe, ist aber wol nicht schwer zu deuten, und dürfte derselbe sicher in den aufgefundenen, herausgefallenen oder herabgeworfenen eben genannten Gegenständen zu suchen sein.

Da steht denn der langbeinige Gesell oben auf der First des Strohdaches, dessen Giebelenden der Erbauer überkreuz mit den altsächsischen Roßköpfen geschmückt hat, ohne wol deren Bedeutung zu kennen. Den Kopf in den Wind gedreht, den Hals tief eingezogen, das Auge halb geschlossen, so läßt sich unser Langbein behaglich von der Morgensonne den Nachtthau aus dem Gefieder trocknen. Ob sie unten dreschen, ob der Spitz die Hühner jagt, oder die breitstirnigen Rinder auf die Weide ziehen, was kümmerts ihn! Er hat keinen Theil an dem Treiben der Menschen, dem er vielleicht von allen Vogelnachbarn desselben am wenigsten zugethan ist. Denn glaube nur nicht, lieber Leser, daß Du es in ihm nur mit einem harmlosen Froschverspeiser zu thun hast. Der weiße Storch ist ein Mordgeselle der schlimmsten Art, besonders da der Schauplatz seiner Thaten, die weite Wiese und das Feld, der Entfernung wegen ein genaues Beobachten seines Thuns und Treibens oft fast zur Unmöglichkeit macht. Er verschmäht keine animalische Nahrung. Das Aas der Abdeckerei, die noch in seinem Kropf sich bäumende verschluckte Ringelnatter, die Eier eines Lerchennestes, die Dunenjungen der nestflüchtigen Wasservögel, eine gestrandete Muschel, Schnecken, junge Hasen und selbst Bienen müssen seiner Gefräßigkeit herhalten. Ja, in „Der Waidmann", Blätter für Jäger und Jagdfreunde, wird mitgetheilt, daß man den scheinheiligen Burschen dabei ertappt habe, wie ein Rehkalb von ihm getödtet worden sei. Den Bienenständen wird er besonders in den Kleefeldern gefährlich, indem er sich dort ruhig an den am reichsten mit Blüten bestandenen Stellen hinstellt, um mit dem sicher treffenden Schnabel eine Biene nach der andern fortzunehmen, und die zerquetschte in den gefräßigen Schlund hinabzusenden. Die jungen Hasen tödtet der Storch durch einen furchtbaren Schnabelhieb auf den Kopf, worauf er die Knochen des Rückgrats, des Beckens und der Läufe durch fortgesetzte Schnabelhiebe zu zerschmettern sucht, bis er zuletzt eine formlose Masse zusammengehämmert hat, welche sich nun ziemlich leicht in den dehnbaren Schlund hinunterschlingen läßt.

Nicht wahr, lieber Leser, das hättest du dir doch nicht unter dem frommen Vogel auf deinem Dache vorgestellt?

Uebrigens schont ihn auch die heutige Jägerei durchaus nicht mehr.

So wären denn diejenigen genannt, die bei uns keine Miethe zu zahlen brauchen — und Schreiber dieses wollte, er gehörte auch zu ihnen.

(Oder-Zeitung.)

Ameisenkern.

Neues Vogelfutter für Insektenfresser.

Bei Gelegenheit mehrfacher während der letztverflossenen Jahre in Oesterreich gemachten Ausflüge hatte ich Gelegenheit, ein vielleicht in Deutschland noch nicht allseitig verbreitetes Futter kennen zu lernen.

Es ist dies der sogenannte Ameisenkern, welcher dadurch gewonnen wird, daß die gedörrten Ameisenpuppen geschrotet werden und, auf diese Weise enthäutet, der Kern derselben zurückbleibt. Dieses Futter ist, wie mich angestellte Proben überzeugt haben, eine vortreffliche Nahrung für zarte Weichfutterfresser. Mit derselben habe ich in den jüngsten Jahren

z. B. die im Winter zur Mauser gelangenden Spötterarten, insbesondere den Schilf- und den seltenen Sumpfspötter (Sylvia phragmitis und S. palustris) ohne Schwierigkeit zur Mauser gebracht und überwintert.

Der Gebrauch des Ameisenkerns geschieht am besten dadurch, daß er einige Stunden, etwa über Nacht, etwas mit Wasser angefeuchtet, und sodann unter das gewöhnliche Nachtigalenfutter, gelbe Rüben mit Semmelmehl und gedörrten gewöhnlichen Ameisenpuppen, gemischt wird.

Im Gegensatz zu den gewöhnlichen gedörrten Ameisenpuppen braucht man nur kaltes Wasser zur Befeuchtung zu nehmen und die Probe wird ergeben, daß der Ameisenkern gleich dem bekannten Weißwurmfutter bei seiner porösen Beschaffenheit wegen der durch das Schroten bewirkten Enthülsung der öligen Bälge leicht das Wasser auffaugt und erheblich aufquillt.

In der bezeichneten Weise füttere ich ihn für alle Insektenfresser, und vielleicht dürfte er sich auch für kränkelnde ausländische Zuchtvögel empfehlen, worüber ich jedoch persönlich keine Erfahrungen habe.

Zu bekommen ist der Ameisenkern bei dem mir allseitig als reell empfohlenen und ebenso mir gleichfalls bekannt gewordenen Vogelhändler Franz Aumeyer in Linz an der Donau, dessen gedörrte Ameisenpuppen von vorzüglicher Güte ich bei diesem Anlasse auch rühmend erwähnen kann. Ob die Vorräthe an Ameisenkern so bedeutend sind, um größere Massen noch für die kommende Wintersaison abzugeben, bezweifle ich jedoch.

Freiherr von Stengel,
Staatsanwalt in Bamberg (Bayern).

Verschiedene Mittheilungen.

— Die Eröffnung der Birkhühnerjagd in England hat am 13. Septbr. die Herzen der Sportliebhaber nicht mit dem Hochgenuß erfüllt, mit welchem sie in sonstigen Jahren nach langer Pause zuerst wieder das Knallen ihrer Flinten vernahmen. Allgemein wird über die geringe Zahl der Hühner geklagt, welche am 12. vor den Jägern aufgingen. Dabei waren diese wenigen wegen der Witterung der Tage vorher außergewöhnlich wild und die Ausbeute des ersten Jagdtages fiel unter diesen Umständen sehr gering aus. Es scheint, daß die schonungslosen Schlächtereien, welche manche Jäger in den vergangenen Jahren angerichtet, um mit der Zahl der erlegten Hühner zu glänzen, schließlich doch ihre Wirkung gethan haben. In Wales sind die Aussichten für die Jäger bedeutend besser als in Schottland.

Anfragen und Auskunft.

Betreffs der Anfrage über Bandfinken-Zucht in Nr. 37 der „Gefiederten Welt" erlaube ich mir zu antworten daß gerade die Bandfinken zu meinen besten Nistern gehören, und fast regelmäßig auch ihre volle Brut groß ziehen; sie nisten dabei so fleißig, daß oft schon Eier wieder zu den noch nicht flüggen Jungen gelegt werden; nur gegen die Mauserzeit hin kommt es vor, daß die Bruten mißlingen, und in der Mauser ruhen sie einige Wochen. Ich glaube, daß das beregte Sterben der Jungen seinen Grund darin hat, daß die alten Vögel zufälliger Weise verwandt sind. Da an die Händler bereits sehr viele hier gezogene Vögel abgegeben werden, so kann dies sehr leicht vorkommen. Ich brauche stets die Vorsicht, alle Jungen nach 14 Tagen des Flüggeseins in einen kleinen Drahtbauer, in welchem, um sie einzugewöhnen, immer das Grünzeug gereicht wird, und dessen ganze eine Seite eine Klappe bildet, welche geöffnet in wagerechter Lage als Auftritt dient, und eventuell mit einem Faden vom Beobachtungspunkte aus zugezogen werden kann, herauszufangen, und mir, wenn ich dann dieselben weiter zum Nisten verwenden will, nur die Weibchen zu behalten und fremde Männchen einzutauschen. Inzucht taugt durchaus nicht.

Das Herausfangen ist auch schon deshalb zu empfehlen, weil die jungen Flüge sich noch so lange zusammenhalten, gerade wie unsere Spatzen und bei diesem Herumlungern, fallen sie auch in gerade unbewachte Nester ein und werfen Eier und Junge heraus. Es mag diese Schuld der Jungen sehr häufig den Alten zur Last gelegt werden.

Betreffs der Fütterung bemerke ich noch, daß ich, da in meiner Vogelstube nur Finken sind, Silberhirse, Glanzkorn, aufgedämpfte, getrocknete oder frische Ameiseneier mit hartem Gelbei zusammen gemischt und Mehlwürmer gebe, und zwar für etwa 70 Vögel täglich 2 Eier und 25 Stück Mehlwürmer zur Hauptnistzeit. Dazu kommt natürlich noch Kalk in verschiedener Gestalt und ein Näpfchen mit Kochsalz, sowie Grünzeug (Vogelmiere, Kreuzkraut oder Kopfsalat). Dabei habe ich sie, und theilweise recht dankbar, zum Nisten gebracht. Es nisteten bei mir Bandfinken, Zebrafinken, Muskatfinken, Helenafasänchen, Tigerfinken, Schmetterlingsfinken, kl. Elsterchen, zweifarbige Elstern, eine Nonne mit einem kastanienbrüstigem Schilffink, weißköpfige Nonnen, Grauedelfink mit Kanarien-Weibchen, Hartlaubzeisige, Silberfasänchen, Amaranten, Diamantfinken, Kubafinken, diese letzteren mit ausgezeichnetem Erfolge.

Ein amerikanischer Stiglitz (Fringilla — Chrysomitris — tristis) hat sich bereits 1½ Jahr in der Vogelstube bei obigem Futter und durchschnittlich 15° R. Wärme ganz gesund erhalten, ohne je Mohn zu bekommen, nur hat er jetzt nicht mehr so rein sein Prachtkleid erhalten, sondern große grüne Fleckchen bekommen. Das Weibchen ging leider vor wenigen Wochen am Eierlegen ein, und das neue scheint nicht ganz munter zu sein.

Vom Atlasfink muß ich noch erwähnen, daß das Männchen, welches ich besitze, sobald es im Prachtkleide ist, ein bösartiges Thier wird, und besonders den Schwachen gefährlich ist. So hat er mir in Zeit von 14 Tagen zwei Amarantmännchen und ein Orangebäckchen nach unausgesetzter Verfolgung getödtet und ihnen die Augen ausgehackt; dabei thut er keinem Andern etwas, sondern verfolgt nur den ihm besonders Mißfallenden. Ich habe ihm nun, als ich mich von seiner Bösartigkeit überzeugt hatte, abwechselnd die Hälfte aller seiner Flügelfedern ausgeschnitten, so daß er wol an seiner Schönheit nichts eingebüßt, aber doch schwerfälliger fliegen kann und leicht müde wird, und ihm die Verfolgten leicht entrinnen können.

G. Lincke, Fabrik-Direktor,
in Lanisch.

Aus den Vereinen.

Fünfte Ausstellung des Akklimatisations-Vereins in Berlin.

(Vom 23. bis 26. September).

Zu den wichtigsten Kulturbestrebungen aller Zeiten und aller Völker gehört die, welche wir Deutschen mit dem häßlichen fremden Worte Akklimatisation bezeichnen. Akklimatisirt, also aus fremden Ländern hergebracht, eingebürgert, eingewöhnt, uns zu eigen geworden, sind die meisten und wichtigsten aller Gaben der Natur, welche zur Befriedigung unserer unentbehrlichen Lebensbedürfnisse, zur Verbesserung oder Verschönerung unseres Daseins gehören. Darum hat das Fremdwort auch im ganzen Volke oder doch in allen gebildeten Schichten der Bevölkerung Fuß gefaßt und wohl Jedermann kennt und schätzt das Streben, welches uns wie früher so auch jetzt noch immerfort neue Nutzgewächse, Hausthiere und naturgeschichtliche Gebrauchs- und Luxusgegenstände aller Art zuführen will.

Die Ausstellung eines Akklimatisations-Vereins ist daher auch ein so volksthümliches Unternehmen, daß gewiß kein Gebildeter, kein Volks-, Natur-, Pflanzen- und Thierfreund es versäumen wird, ihr volle Aufmerksamkeit zu widmen. Der Berliner Verein erfreut sich der Beachtung in allen Schichten der Bevölkerung, und dies zeigt sich auch ganz besonders in seinen Ausstellungen, sowol in der Regsamkeit der Aussteller als auch in der Zahl und dem Interesse der Besucher. In der Reihenfolge der Katalog-Nummern führe ich die Leser daher durch die Ausstellung, voraussetzend oder vielmehr in der vollen Gewißheit, angesichts der oben berührten hohen Wichtigkeit dieser Kulturbestrebungen, allgemeine Theilnahme erwarten zu dürfen.

Neuerdings ist das Kaninchen gleichsam zu einem Stichwort hochwogender humaner Bestrebungen geworden. Kaninchenzucht „zur Erzielung billigerer Fleischpreise", das ist die Losung zahlreicher Vereine und Privaten in Deutschland. Ein eigenes Organ „Blätter für Kaninchenzucht" (herausgegeben von C. Rasch in Hildesheim) soll der Sache dienen und ihr zur Verbreitung in alle Volksschichten verhelfen. An sich hochachtungs- und schätzenswerth, ja, ohne Frage auch zukunftsreich — ist bis jetzt die Kaninchenzucht aber leider nichts weiter als Spielerei. Gleichwie sich die Hühnerliebhaberei leider meistens auf dem Gebiete der Luxusthier-Zucht umhertummelt, so ist dies bis jetzt durchgängig mit wenigen Ausnahmen bei der Kaninchenzucht der Fall. Noch schlimmer freilich, daß sich der an sich so wichtigen Angelegenheit leider nur zu unlautere Elemente bemächtigt haben, die durch Schwindel und Unreellität nicht wenige Anfänger für immer abkühlen. Hoffen wir, daß, insbesondere durch das oben erwähnte, durchaus sachgemäß geleitete, empfehlenswerthe Blättchen, immer mehr das Ziel der wirklichen praktischen Nützlichkeit der Kaninchen-Zucht erreicht werde.

Herr Dr. Bodinus hatte mehrere Rassen in tadellosen Exemplaren ausgestellt. Ihnen schließen sich die selbstgezüchteten Leporiden des Herrn G. Meyer auf Rutteln (Oldenburg) würdig an; dgl. Belgische Riesen und Widder von Herrn Tolle in Hannover, recht schöne Belgier, Widder, weiße Normannen, französische Normannen und belgische Riesen, Seidenhaarige, Afrikaner, englische Riesen und Brasilianer, theils in reinen Rassen, theils in Kreuzungen von den Herren Wettberg in Hannover, Sattler in Derenburg, Jäckel in Neunhausen, Purche in Halle und Uebelt in Steglitz. Auch Herr Loffow hatte ausgestellt. Nach meinem persönlichen, immerhin jedoch nur individuellen Urtheil erachte ich die deutschen Gehege-Kaninchen des Herrn Jäckel, trotz aller großen Varietäten, doch immer als die aussichtsreichste Rasse, und am schönsten dürften die Blauen und die Angora des Herrn Dr. Bodinus erscheinen, während die Widder allgemeine Verwunderung erregten. Wenn die Züchtung in dieser Weise fortschreitet, so werden wir in der That am Kaninchen ein Schlachtvieh vor uns haben, welches an massenhafter und billigster Fleischlieferung alle seine Konkurrenten übertrifft. Diese kolossalen Widder verdienen in der That die Aufmerksamkeit im hohen Maße.

Herr Dr. Hermes, Direktor des Berliner Aquarium, hatte auch diesmal eine beachtenswerthe Sammlung schöner Schmuckvögel ausgestellt. Die Webervögel und Widahfinken fallen immer durch ihren Farbenreichthum in's Auge, bei den ersteren waren zugleich kunstvolle Nester vorhanden und von mehreren Arten, z. B. Glanzdrosseln und Webern waren auch hier gezüchtete Junge vorhanden. Die Weber-Sammlung zeigte fast vollständig alle Arten, welche in den Handel gelangen, und größtentheils im Prachtgefieder.

Ueber meine Vögel brauche ich nicht viel zu sagen. Das Glück hat mich auch in letzterer Zeit recht reich begünstigt, denn ich habe Junge und Nester in einer großen Anzahl aufzuweisen. Vorzugsweise interessant dürften das Nest des Bengalenwebers und die jungen Sonnenvögel erscheinen. Die winzig kleinen Brillenvögel, Aurorafinken und Rosenpapageien haben wol die Aufmerksamkeit der Kenner gefunden.

Herr S. Böttcher hatte eine Brut des Hartlaubzeisigs ausgestellt, ein Nest voller Jungen, das der Beachtung aller Züchter im Kleinen besonders empfohlen ist, da die Vögel im kleinen Käfige bereits im zweiten Jahre nisten.

Die Händler von Berlin, sowie die Hagenbeck'sche Großhandlung in Hamburg haben in anerkennenswerther Weise dazu beigetragen, diese Ausstellung zu verschönern. Schmuck- und Ziervögel waren in überaus großer Reichhaltigkeit vorhanden. Auf die vorzugsweise gut gehaltenen und schönen Vögel des Herrn W. Mieth darf ich nur kurz hinweisen. Besonders beachtenswerth waren die neu eingeführten Barrabands-, Vielfarbigen, Königs-, Band-, Pennants- und Buntsittiche.

Große sprachbegabte und größtentheils bereits gut sprechende Papageien hatten die beiden Handlungen der Herren D. Dufour und F. Schmidt ausgestellt. Ein Prachtvogel ist der sprechende rothe Edelpapagei (Electus grandis), fälschlich rother Lori genannt, und ebenso wie Herr Mieth hatte auch Herr Dufour ein Paar der herrlichen Lori von den blauen Bergen aufzuweisen. Neben den stattlichen großen Papageien, Araras und Kakadus des Herrn Schmidt war ein selten schöner Vogel wiederum vorzugsweise interessant und zwar ein sprechender und schön flötender schwarzkäppiger Lori (Trichoglossus atricapillus).

Die Kanarienvögel des Herrn Pantzer (Nachfolger der bekannten Kanarienhandlung von Wwe. Wetzler) erfreuen sich eines guten Rufes. Ein eingehendes Urtheil über sie abzugeben, ist auf einer Ausstellung nicht wol möglich, weil man schlechterdings die Vögel in dem Lärm und der Unruhe nicht sachgemäß genug „abhören" kann, um zuverlässigen Anhalt zu gewinnen. Große sprechende Papageien, über die man ebensowenig berichten darf, weil sie hier schlechterdings ebenfalls nicht sich hören lassen, hatte Herr A. Seltman, ebenfalls in Berlin, ausgestellt. Sie sollen empfehlenswerth sein.

Die Vogelgroßhandlung des Fräulein Christiane Hagenbeck in Hamburg hatte in besonders bedeutsamer Weise zur Verschönerung dieser Ausstellung beigetragen. Die Aufmerksamkeit des Kenners nahm zunächst ein herrlicher Papagei, der Glanzsittich (Platycercus splendens) in Anspruch, dann folgte eine beträchtliche Zahl seltener sprachfähiger Kurzschwänze, ferner ein Paar Lori von den blauen Bergen, ein großer und ein kleiner schwarzer Pagagei, Bülbüls, Tangaren (im Katalog Indigovögel benannt), weiße und gescheckte Reisvögel, weiße und bunte japanesische Mövchen 2c.

Ueberblicken wir die ganze Vogelausstellung noch einmal, so kommen wir zu dem Ergebniß, daß die Leistungen der Herren Mieth, Schmidt, Dufour, sowie des Fräulein Hagenbeck und des Berliner Aquarium alle Anerkennung verdienten.

In der dritten Abtheilung haben wir zunächst wieder interessante Thiere aus dem Berliner Aquarium zu verzeichnen; in Paris gezüchtete und hier wohlgediehene Axolotls, gutgepflegte Alligatoren und ein allerliebstes Geschöpf, die Schaumfingereidechse (Anolis carolinensis), sind sehr bemerkenswerth für die Liebhaber dieser Thierwelt.

Die vom Generalsekretär des Vereins, Herrn Dr. L. Buvry, ausgestellten chinesischen Haarflosser (Macropodus), welche von Herrn Obergärtner König in einem Gewächshause der Ravene'schen Villa gezüchtet sind und sich von zwei aus Holland importirten Pärchen bis auf fünfzig Köpfe vermehrt haben, gehören zu den schönsten Bewohnern eines Aquarium und ihre Verallgemeinerung erscheint daher sehr wünschenswerth.

Vorzugsweise interessant und zugleich als Handelsartikel von nicht geringer Wichtigkeit sind die Goldfische und ihre Zucht, wie die letztere im großartigsten Maßstabe von Herrn Ch. Wagner in Oldenburg betrieben wird. Unter allen Besuchern der Ausstellung hatte Herr Wagner ganz entschieden das dankbarste Publikum. Er ließ es sich nicht verdrießen, von früh bis spät den aufmerksamen Zuhörern die Entwickelung des Goldfisches, vom Rogen bis zum stattlichen Fisch, in jeder Stufe der Gestaltung und in allen

Varietäten, zu erklären, und jedesmal die betreffenden Fischchen in den schönsten, munteren Exemplaren vorzuzeigen. Erst dadurch gewinnt man eine Einsicht von der Entwickelung einer Thierart durch rationelle Züchtung und zugleich von dem großartigen Werthe eines anscheinend bedeutungslosen Geschöpfes als Handelsartikel.

Mehr oder minder geschmackvolle und praktische Apparate auch für derartige Liebhaberei, als Goldfischvasen, Aquarien, Terrarien u. s. w., größtentheils gefüllt und entsprechend ausgestattet, waren ausgestellt von den Herren Herpich, vorm. Bolzani, W. Friedrich und Obergärtner Stegemann, sämmtlich in Berlin; ein kolossales, reich bevölkertes Aquarium des Herrn Friedrich (Berlin, am Alexanderplatz) ist besonders zu erwähnen.

Schöne und kunstvolle Dinge, aus Muscheln geformt, als Blumensträuße, sodann Glasvasen mit Meeresgrund-Arrangements, kurz und gut, Schmuck- oder Studiengegenstände, hatte die Naturalienhandlung des Herrn Umlauf in Hamburg, gesandt. Die Mehrzahl der Beschauer geht an dergleichen gleichgültig vorüber und doch hat eine einzige Muschel in solchem Kunstwerk einen Werth von mehreren Pfund Sterling.

Von vorzugsweise großer Bedeutung erschien die vierte Abtheilung. Herr J. A. Heese, dessen Handlung in Berlin und dessen Anlagen sich in Steglitz befinden, hatte in gewissem Sinne ein Gegenstück zu der Goldfischausstellung des Herrn Wagner geboten — jedoch ohne Frage etwas noch ungleich Wichtigeres, etwas, das die Leistungen und Gaben der Akklimatisationsbestrebungen im goldensten Lichte erscheinen läßt. Die Entwickelung des Seidenspinners nämlich, in den meisten bekannten Arten und mit ihren Erzeugnissen, vom Kokon bis zum herrlichsten Gewebe. Irren wir nicht, so waren diese Darstellungen der gegenseitigen Leistungen von Natur und Menschenkraft ursprünglich für die Wiener Weltausstellung hergestellt (wo sie wohlverdienten Beifalls sich erfreut haben) und nun kamen sie auch den Beschauern in Berlin zu gute.

Herr Dr. L. Buvry, der unermüdlich thätige General-Sekretär des Vereins, als Reisender und Forscher hochgeschätzt, bot eine Sammlung der innerhalb des Kreises der Vereinsmitglieder gezüchteten verschiedenen Seidenspinner an, ebenfalls in ihrer gesammten Entwickelung, vom eierlegenden Schmetterling bis zur kunstvoll verarbeiteten Seide; und zwar der japanesische Maulbeer-, der Ricinus-, Ailanthus-, japanesische Eichen-, chinesische Eichen- und der amerikanische Seidenspinner.

Auch Herr T. Keitel, Naturalist in Berlin, hatte interessante Gegenstände: Vogeleier, Seidenspinner, sowie Sammlungen nützlicher und schädlicher Insekten, mit Rücksicht auf die Land- und Forstwirthschaft zusammengestellt, aufzuweisen.

Naturgeschichtlich interessant und volkswirthschaftlich hochwichtig erscheinen wiederum die Ausstellungs-Gegenstände auf dem Gebiete der Bienenzucht, ein Bienenstock mit lebender Bevölkerung von Herrn Haucke in Waltringhausen (Hessen) und vier Stöcke ohne Einwohner von Herrn Thölke in Hannover, sodann sehr belehrende Präparate, arbeitende Bienen, Drohnenbrut, Königinzettel, Wachstafeln mit der zerstörenden Thätigkeit der Wachsmade, Königinnen, Arbeitsbienen, Drohnen und dergl. von den Herren Bornitz, Sekretär des märtischen Vereins für Bienenzucht in Lichtenberg, Stadtförster Specht in Schmetzdorf und Lehrer Simon in Buch bei Bernau. Letzterer hatte auch ein Wespennest gesandt, welches als naturgeschichtlich merkwürdig erwähnt sei.

In hohem Maße nahmen die Aufmerksamkeit der Bienenwirthe die Meliponen oder südamerikanischen Bienen (Melipona scutellaris) in Anspruch, welche von Herrn Bornitz und dann in einem lebenden Volk von Herrn E. Drory in Bordeaux eingesandt waren.

Die in den bis hierher besprochenen Abtheilungen thätigen Preisrichter waren: 1) für Kaninchen, die Herren Professor Dr. Robert Hartmann, Präsident Oppermann, Kameral-Direktor Rieloff in Muskau, Dr. L. Buvry; 2) für ausländische Schmuckvögel: Dr. C. Bolle, Professor Dr. Cabanis, Hauptmann A. v. Homeyer, Sekretär Wagenführ; 3) für Amphibien und Fische: Direktor Dr. Bodinus, Dr. Buvry, Präsident Oppermann, Sekretär Wagenführ; 4) für Bienen- und Seidenzucht: Dr. Buvry, Professor Dr. Gerstäcker, GartenInspektor Bouché, Oekonomierath von Schlicht, Gutsbesitzer von Türke. Dr. K. R.

Bei der am 25. September Mittags 2 Uhr stattgehabten Preisvertheilung in der Ausstellung des Akklimatisations-Vereins sind folgende Aussteller prämiirt worden: Mit der goldenen Medaille des Kaisers: Prinz Friedrich der Niederlande; mit dem Ehrenpreise des Kronprinzen: General-Sekretair Dr. Buvry (Bemühungen um den Verein); mit dem Pokal von Prinz Friedrich der Niederlande: Baumschulbesitzer Späth in Potsdam; mit dem silbernen Pokale des Herzogs von Coburg: Quasthoff u. Co. in Aschersleben (Gesammtleistungen); mit dem silbernen Pokale des Herzogs von Ratibor: Dr. Karl Ruß in Steglitz (Züchtung fremdländischer Vögel); mit zwei Alabastervasen vom Prinzen Handjery: Kommerzienrath Heese in Berlin; mit der Büste des Kaisers (von Herrn v. Karstenn): Fischzüchter Wagner in Oldenburg; mit den drei silbernen Medaillen vom landwirthschaftlichen Ministerium: Garten-Inspektor Bouché (Gespinnstpflanzen), Herr v. Gröling auf Lindenberg (Kartoffeln), Herr v. Jäckel auf Neunhausen (Kaninchen); mit den sechs bronzenen Medaillen vom landwirthschaftlichen Ministerium: Fräulein Hagenbeck in Hamburg (Vögel), Haage jun. in Erfurt (Ziergewächse), prinzl. Gärtner Jabusch in Düppel (Getreide), A. Reihlen in Stuttgart (Maiskultur), A. Gühler in Steinhöffel (Bienenzüchter), E. Kratz in Hochheim (Kartoffeln); mit den fünf silbernen Medaillen vom Akklimatisations-Verein: Ch. Hanus in Berlin (eingemachte Gemüse), Schiebler u. Sohn in Celle (Erbsen), Rittergutsbesitzer Busch auf Groß-Massow (Kartoffeln), Hofgärtner Reuter auf der Pfaueninsel (Gesammtleistungen), Madame Drory in Bordeaux (Bienen); mit der Vase vom Banquier Abel: Dr. Bodinus (Kaninchen); mit einem silbernen Kabaret: Herr Fritze in Werder (Pfirsiche); mit 50 Flaschen Cantenac: Sekretär Wagenführ in Berlin (mexikanische Früchte); mit vier botanischen Werken von Herrn v. Decker: Obergärtner Schröfeld in Muskau (ausländische Gehölze); mit 100 Mark: Dr. Bodinus (Fleischkaninchen); mit 50 Mark: Stegemann in Charlottenburg (Terrarien); mit je 25 Mark: Chemiker Deininger (Gespinnstfasern); Obergärtner Jabusch in Düppel (Baumpflanzen); Garten-Inspektor Bouché (Coniferen); Krüger in Lübbenau (Gemüse). Außerdem wurde eine Anzahl ehrender Anerkennungen zuerkannt, und unter diesen erhielten für Vögel je ein ehrendes Diplom die Herren Dr. Hermes; Kaufmann Böttcher, Oranienstraße; Vogelhändler W. Mieth, Friedrichstraße 68; Vogelhändler F. Schmidt, Friedrichstraße 93, und Kanarienhändler Pantzer.

Berichtigung.

In dem Aufsatz über **Spottdrosselzucht** muß es auf S. 312 Z. 27 v. o. anstatt Backenknochen richtig heißen: **Beckenknochen** (bei Tauben, Schnepfen, Kanarienvögeln ein fast untrügliches Merkmal). Auf derselben Seite Z. 7 v. u. wolle man anstatt gegebene lesen: **gewaschene** Korinthen; auf S. 313 Z. 4 v. o. anstatt pro Tag und Nacht richtig: **pro Tag und Stück**; auf derselben Seite Z. 21 v. o. anstatt zur Beobachtung richtig: **zur Beachtung.**

In dem Aufsatz „Zur Wellensittichzucht" in Nr. 37 S. 298, 2. Spalte, Z. 9 v. o. muß es heißen: **dürfte nach dem Gesagten nicht unrichtig sein.**

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarienvögel. [605]

Post-Versandt garantirt laut Preis-Courant.

R. Maschke, St. Andreasberg im Harz.

Die schönsten Stieglitze à St. 5 Sgr., Zeisige 4 Sgr. gebe ich in Tausch auf ausländische Vögel ab. Feste Preise! vielleicht blos kurze Zeit.

[606] **W. Langner,** Liegnitz, Neue Glogauerstraße Nr. 9.

---

200 Stück graue Papageien, an Wassersaufen gewöhnt, starke, junge, gesunde Vögel, empfiehlt à Stück 8 Thlr., Händlern bei Entnahme von mehreren noch billiger.

[607] **E. Gruyel-White,** Leipzig.

---

20 Stück diesjährige Kanarienweibchen, der besseren Harzer Rasse angehörend, à 10 Sgr., 4 Stück 1 Thlr., verkaufe oder vertausche gegen andere Vögel.

A. Lehmann, Belle-Alliance-Str. 88,

[608] Berlin SW.

Russische 1874er Ameisen-Eier empfingen und empfehlen **Mey & Bengelsdorff,** Berlin. [609]

Vogelhandlung
von
Joseph Zuckerkandel,
Dresden, Wallstraße 8. I.

empfiehlt ein wohlassortirtes Lager exotischer Vögel, franz. Kanarien und die allgemein bekannten und renommirten fehlerlosen, reinen Kanarienvögel eigener Zucht, als Glucker, Hohlroller, Klingelroller mit Knurren, Roller mit jammernden Touren, ebenso beste reinste Zuchten Harzer Kanarienvögel. [610]

Ein im vorigen Jahr neu erbautes, 10 Fuß tiefes, 50 Fuß langes, 12 Fuß hohes, mit einer gekuppelten Rotunde, die 20 Fuß hoch ist, mit 14 Abtheilungen versehenes Hühner- und Taubenhaus habe ich sofort zu verkaufen. Das Gebäude ist vorne vergittert, Zeichnungen stehen zu Diensten.

Villa Hullerbusch b. Feldberg, M.-Strelitz,
den 26. Sept. 1874.

[611] Dr. P. M. Röper.

Vorzüglich schöne, gut getrocknete Ameiseneier empfiehlt **Franz Ammeyer** in Linz a/d. Donau,

[612] Landstraße 55.

R. Ritter's
Thier- u. Naturalien-Handlung,
Hamburg, St. Pauli,
Spielbudenplatz No. 21,

hat in der letzten Sendung erhalten: Graue, Surinam-, Amazonen- und Portoriko-Papageien, blaue Gebirgslori, Pennantis, Rosella's Halsbandsittiche, Quäkersittiche, Rosakakadus, Nasenkakadus, gr. gelbhaubige Kakadus, einen sprechenden Müllerpapagei, 1000 Paar kleine Vögel, worunter Amaranthen, Muskatvögel, Zebrafinken, Atlasvögel, schwarzköpfige Nonnen, Goldbrüstchen, Astrilds, Orangebäckchen, Silberfasänchen, Blutschnabelweber, Paradieswittwen, Madagaskarweber, 4000 Goldfische, 10 verschiedene Arten Affen, 1 Paar asiatische Zibetkatzen, 1 Ameisenbär, 6 Shetland-Ponies, 3 Waschbären, für Sammler eine große Partie Kabinetmuscheln, sowie eine große Auswahl von gereinigten und ungereinigten Muscheln und Muschelarbeiten. [613]

---

[614] Frau Dr. **Langer,** Hildesheim Nr. 536, hat abzugeben 3 Stück zuchtfähige Zebrafinken, Weibchen à Stck. 2 Thlr.

Astrilden und Amadinen sind das Paar von 1⅔ Thlr. an zu haben bei **R. Hironymi,** Braunschweig. [615]

Ebendaselbst ist auch noch eine Parthie guter gebrauchter Nistkasten für Wellensittiche vorräthig. Auch sind Tirika-Sittiche oder Perekiten das Paar für 4 Thlr. zu haben.

Französisches Geflügel 2c.

Aus Frankreich zurückkehrend, erlaube ich mir, meinen verehrlichen Kunden anzuzeigen, daß ich bis Ende Oktober liefern kann:

Diesjährige fast ausgewachsene Frühbrut feinster Crève-Coeur, La Flèche, Houdan, Le Mans, Courte Patte, Coucou de France und Gold-Bantam-Hühner zu 50 Frcs. pro Stamm (von 1 Hahn und 2 Hennen) franco Zürich incl. Korb; Rouen-Enten, Toulouser Gänse, Lapins de Normandie, Leporiden, Béliers gris, sowie ganz weiße sämmtlich zu mäßigen Preisen, je nach dem Alter der Thiere; Kalifornische Wachteln, in der Gegend von Le Mans im Freien gezüchtet, 26 Frcs. per Paar, Lieferungsfrist ca. 14 Tage nach Empfang des Auftrages. Acconto-Zahlung bei Ertheilung des Auftrages ist erwünscht.

A. Rumpf,
Außersihl bei Zürich.

[616]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 15. Oktober 1874. Nr. 42.

Inhalt:

Ornithologische Kuriosa. I. (Schluß.) —
Aus dem zoologischen Garten von Hamburg. —
Ueber Kapaunen und Poularden. —
Neue Hülfsmittel für die Vogelzucht. —
Briefliche Mittheilungen: Ceresfink; Pflegekind; —
Anfragen und Auskunft: Flügellähmung; Krankheit, Legenoth. —
Bücher- und Schriftenschau.
Anzeigen. —

Ornithologische Kuriosa.

I.

(Schluß.)

Freilich war im Grunde die Aussicht, ihn zu fahen, gering; Tobies hatte zu andern Zeiten schon Wochen lang einer guten Nachtigal vergeblich nachgestellt und er wußte aus eigener trüber Erfahrung recht gut, daß sich um jene Zeit ein Schwarzplättchen noch schwerer berücken läßt, als eine Nachtigal. Das Glück war indeß diesem Vogeltobies diesmal seltsam günstig. Nach wenig Tagen saß der sehnlichst gewünschte Vogel im sichern Käfig. Hier habe ich denn acht Tage nachher mehrfach Gelegenheit gehabt, seine reichen Anlagen zu bewundern. Der Vogel sang ziemlich fleißig, leise zwar, wie es einem edlen Barden, der um den Verlust seiner Freiheit trauert, geziemt; aber sein Gesang verrieth eine vollständige Doppelnatur. Hatte er den ihm und seiner Art eignen, überaus hübschen Grasmückengesang rein und ohne alle Beimengung fremder Strophen vorgetragen, so folgte Triller auf Triller aus dem Nachtigalenschlage mit den meisten jener Flöten- und Gluckertouren, die uns diesen Gesang vor allen andern lieb und werth machen; alles in größter Reinheit und Pünktlichkeit vorgetragen. Der Vogel befindet sich noch im Besitze desselben Herrn, und ich bin wirklich gespannt auf seinen demnächstigen Frühjahrsgesang. —

Im Frühlinge 1871 brachte mir mein jüngster Sohn, der ein eifriger Verehrer alles Dessen ist, „was da fleucht und kreucht", einen halbflüggen jungen Dompfaffen, den er dem Neste entnommen. Das kleine Geschöpf war ein Männchen, und so beschloß ich es denn wegen des prächtigen Gefieders und der überaus großen Zuthunlichkeit, beides Eigenschaften, die dieser Art bekanntlich besonders eigen sind, aufzupäppeln. Er bekam alle zwei Stunden einige Federkiele voll gequetschten Rübsamens mit ein wenig Ei und hat nachher die geringe auf seine Verpflegung verwendete Mühe reichlich gelohnt; er wurde durch sein ebenso verständiges als zutrauliches Wesen gleichsam ein Glied unserer Familie. Sein kleiner Käfig wurde des Morgens, sobald es zum Kaffee ging, geöffnet, und nicht lange dauerte es, so saß der „Hans" mitten zwischen Tassen und Tellern auf dem Tische und las in sorgloser Sicherheit die kleinen Brosamen auf, die für ihn abgefallen waren. Nachdem dies wichtige Geschäft in wenigen Minuten verrichtet war, schüttelte er tüchtig sein Gefieder, was ungefähr so viel heißen mochte als: Wohl bekomm's! und im nächsten Augenblicke saß er auf der Schulter eines seiner Lieben, untersuchte und betastete mit seinem breiten Schnabel auf's An-

gelegentlichste bald die Haare, bald das Ohrläppchen desselben und schien sichtlich erfreut, wenn er sich mit meiner Brille zu schaffen machen durfte. Ruhig auf dem Finger sitzen, auf Verlangen Küsse auszutheilen, lernte er sehr bald; dagegen wollte es ihm nie so recht behagen, wenn er gestreichelt wurde. Zornwüthig wurde er aber, wenn man ihm neckend einen Finger vorhielt; er schrie dann, wie ein verzogenes Kind und biß eifrig auf den verhaßten Finger los. Da er ziemlich viel Freiheit in seinen Bewegungen besaß und es Stunden gab, wo er in irgend einem heimlichen Winkel stiller Beschaulichkeit pflegte, so hatten wir ihn oft aus den Augen verloren. Rief man ihn dann: „Hans, wo bist Du?", so erfolgte regelmäßig als prompte Antwort sein melodisches „Büb".

In dem Naturgesange seiner Art lernte er eine kleine, nicht bedeutende Strophe, und da er dies Wenige, was ihm die Natur verliehen hatte, sehr eifrig vortrug und damit seine reicher begabte gefiederte Gesellschaft zu verderben drohte, so wurde er schließlich in eine wenig besuchte Schlafstube gebracht. Diese Einzelhaft war nun aber gar nicht nach seinem Geschmack; er wußte sein Lied in dem einzigen Lockton so ausdrucksvoll zu klagen, daß er bald daraus erlöst wurde. Als er einmal versuchsweise in ein großes Heckgebauer gebracht wurde, in dem sich mehrere Kanarienweibchen befanden, benahm er sich zwar in der richtigen Erkenntniß, daß er hier bedeutend in der Minorität sei, als ein sehr verträglicher Bursche; nachdem aber wenige Tage darauf die Kanarien herausgefangen waren, fühlte er sich sichtlich erleichtert und einen kurz nachher gemachten Versuch, ihm ein Weibchen dieser Art als Gesellschafterin beizugeben, wies er mit aller Entrüstung zurück; er hackte so lange auf das unausstehliche Wesen los, bis er davon befreit wurde. In der Voliere der Wellensittiche war er ein ruhiger, langweiliger Geselle; sobald er sich aber mit seinen Pflegern beschäftigen konnte, war er die Liebenswürdigkeit selbst. Da gab es denn immer etwas zu nesteln und zu zerren und oft hat er bei meinen schriftlichen Arbeiten sich mit mir um die glänzende Stahlfeder gezankt.

Im nächsten Frühjahre erwachte auch bei ihm der Trieb zum Nestbau. Bald trug er uns ein Fädchen, oder was ihm sonst passend scheinen mochte, zu; bald reichte er uns ein Körnchen Samen zum Munde, wobei er eifrig sein kurzes Liedchen sang und sehr ausdrucksvoll sein Schwänzchen nach rechts und nach links beugte. Einmal fand er am besetzten Tische einen Faden, viel zu lang, um ihn so ohne Weiteres aufnehmen zu können und hier bewies er dann eine Ueberlegung und eine Geschicklichkeit, die Bewunderung erregen mußte. Zierlich und regelrecht, wie es die geübte Hand eines Menschen nicht besser hätte machen können, legte er den Faden nach rechts und links in kleinen Windungen zusammen, und trug ihn so, leise piepend und unter beständigem Beugen des Schwänzchens seiner Pflegerin zu. Ein unglücklicher Zufall machte bald darauf seinem Leben ein Ende; vergessen ist er aber bis heute noch nicht. —

Vor etwa zwölf Jahren hatte ich in einem auf dem Boden des Gerichtsgebäudes befindlichen Fachspinde für aufbewahrte Vormundschaften ein Aktenstück aufzusuchen. In einem Fache desselben auf kürzlich gebrauchten Akten hatte sich ein merkwürdiger Haufen gebildet, der mit Allem, was sonst in einer gerichtlichen Registratur zu finden ist, gar keine Aehnlichkeit hatte. Was mochte das sein? Ein Nest war es, ein Vogelnest in der Vormundschaftsregistratur! Da auf dem Boden und den zu beiden Seiten angebrachten Kammern sich die meisten niedergelegten Akten der Büreaux befanden, so war der Verkehr auf demselben nicht gerade sehr gering und überdies wurde er von dem Kastellan zu diesem und jenem Zwecke häufig betreten. Das hatte indeß ein Pärchen der Hausrothschwänzchen nicht abgehalten, in jenem Repositorium sein Heim aufzuschlagen, wobei es klüglich berechnet haben mochte, daß ihm die allezeit geöffneten Dachfenster freien Ein- und Ausflug gestatteten und es von den verständigen Insassen des Gebäudes nichts zu befürchten haben werde, eine Katze sich aber seit Menschengedenken nicht auf dem Boden habe sehen lassen. Die Vertrauensseligkeit erwies sich dann auch als gerechtfertigt; nur wenige Personen wußten um das kleine Geheimniß und das Pärchen brachte eine starke Nachzucht groß. Wie aber nachher, als diese ihre Wiege verlassen hatte, die betreffenden Vormundschaftsakten ausgesehen haben, wird der geneigte Leser leicht errathen. —

Vor etwa funfzehn Jahren bekam der oben erwähnte Vogeltobies Nr. 2 die Ordre, eine zehntägige Uebung als Landwehrmann mitzumachen. Ein eifriger Verehrer des Kriegsgottes war er nie gewesen, und die Gestellungsordre kam ihm um so weniger erwünscht, als er gerade einer wohlbesetzten Vogelstube, deren Insassen aus Kanarien jeglichen Alters bestanden, sich erfreute und Niemand aus seiner Familie dazu geeignet war, seine Lieblinge während seiner Abwesenheit zu verpflegen. Was war da zu thun? Das Eine unterlag keinem Zweifel: der ihm gewordene Befehl ließ sich in Ehren nicht abwehren. Nach kurzer Ueberlegung entschloß er sich denn für einen Plan, wie ihn das Gehirn eines andern besorgten Vogelzüchters so leicht nicht ausbrüten wird. Unser Landwehrmann und hoffnungsvoller Ornithologe schleppte alle Blumentöpfe herbei, über die er nur verfügen konnte; in seinem Garten befanden sich noch unterschiedliche Salatköpfe neben anderen für einen Vogelliebhaber sehr wichtigen Gewächsen, als da sind: Kreuzkraut, Vogelmiere ꝛc. Alles das wurde fein säuberlich mit der Wurzel ausgegraben, in die mit Erde gefüllten Blumentöpfe gesteckt und so in der Vogelstube an geeigneten Stellen aufgepflanzt. Da das Trinkwasser sich 10 Tage lang im gewöhnlichen Zustande nicht genießbar halten ließ, so wurde ihm eine kleine Masse Salz zugesetzt; Eifutter wurde auf 24 Stunden ver-

abreicht und zur Krönung der ganzen Einrichtung ein riesiger Vorrath von verschiedenen Sämereien herbeigeschafft und den Vögeln zur beliebigen Auswahl angeboten. Hiernächst schloß unser vogelkundiger Landwehrmann das Zimmer, steckte den Schlüssel in die Tasche und reiste getrosten Muthes zu dem Schauplatze seiner militairischen Thätigkeit ab. Nicht lange währte es aber, so stiegen in ihm unterschiedliche Bedenken ob der Zweckmäßigkeit seines Verfahrens auf; er konnte sich nicht helfen, er mußte seinem Feldwebel, mit dem er durch die gleiche Neigung verbunden war, in einer vertraulichen Stunde sein Herz ausschütten. Der Feldwebel tröstete gutmüthig: „Beruhigen Sie Sich, lieber M., Sie werden nach Ihrer Rückkehr keinen Schwanz lebend mehr antreffen; Sie haben also eine Anklage nicht zu befürchten." Ob dieser Trost nun gerade nach dem Herzen M.'s gewesen ist, will ich dahin gestellt sein lassen; jedenfalls erwies er sich in der Folge als nicht ganz zutreffend. Kaum war unser Landwehrmann nach Hause zurückgekehrt, als er eilenden Schrittes und mit hochklopfendem Herzen zu seiner Vogelstube eilte. Unheimliche Stille herrschte hier; als aber der Schlüssel sich kreischend im Schlosse drehte, flog die ganze Gesellschaft mit schwirrendem Flügelschlage auf. Ueber das sorgenvolle Gesicht des Heimgekehrten leuchtete ein behagliches Lächeln, als er in der geöffneten Thür mit raschem Blick die Stube übersah; es fehlte auch ihm kein theures Haupt und selbst in den Nestern hatte kein einziges Junge Schaden genommen. W. B.

Aus dem Zoologischen Garten von Hamburg.

Die sogenannte Papageien-Volière in der Nähe des Antilopenhauses beherbergt außer den berechtigten Bewohnern noch eine gar bunte Anzahl von Kletter- und Singvögeln. Die letzteren, die in Ermangelung eines eigentlichen Vogelhauses auch bei den Hühnern, bei den Raubvögeln, im Stelzvogelhause und in der großen Glasglocke in der Nähe des unteren Teiches ihren zeitweiligen oder dauernden Aufenthalt haben, sind neuerdings durch einige sehr interessante Arten vermehrt worden. Es sind dies Vögel aus der hübschen Meisengruppe, Thierchen, die so sehr Alles, was ein Vogel an Zierlichkeit der Gestalt, Anmuth der Farben, Lebhaftigkeit und Mannigfaltigkeit der Bewegungen aufweisen kann, in sich vereinigen, daß nicht nur ein begeisterter Thierfreund, sondern jeder Besucher und noch mehr jede Besucherin mit lebhafter Befriedigung und Freude vor den betreffenden Käfigen verweilen wird. Als alte Bekannte, die auch in früheren Jahren wie in diesem Sommer in größerer Zahl ausgestellt wurden, begrüßen wir die holländischen Bartmeisen, über die wir bereits früher berichteten. Zu ihnen gesellen sich augenblicklich einige allen Naturfreunden wohlbekannte Kohlmeisen, hamburgische Vögel, deren unruhiges Wesen, deren Behendigkeit, Possirlichkeit, Neugierde und — unter Umständen — Bosheit und Mordsucht so vielfach bei uns im Freien beobachtet worden ist, daß wir an ihre Schilderung nicht viel Worte verlieren dürfen. Ferner ein Pärchen der niedlichen Blaumeisen, ebenfalls gute Hamburger, die in den Gärten z. B. der ABC-Straße besonders zur Winterzeit häufig beobachtet werden können, wie sie gleich befiederten Mäusen jeden Winkel und jedes Schlupfloch durchstöbern, in die Brunnen kriechen, zwischen den Dachsparren der Gartenhäuschen herumsuchen, bald verschwinden, bald aus irgend einem Loche wieder zum Vorschein kommen und jeden Beobachter durch ihre stete Beweglichkeit und Emsigkeit erfreuen. Wir verdanken diese zierlichen gefiederten Gäste der Güte des Herrn B. Goos, dem wir für diese Gabe um so lieber unseren Dank aussprechen, weil wir dadurch in den Besitz interessanter deutscher Thiere gekommen sind und weil wir wissen, daß wirkliche Thierfreunde jeden neuen Erwerb des Zoologischen Gartens, namentlich an deutschen Singvögeln, die bisher bei uns zu den seltensten Erscheinungen gehörten, mit großer Freude begrüßen.

Zu den genannten drei Meisenarten ist endlich in dieser Woche noch eine vierte gekommen, eine Meise, deren eigentliche Heimat der Nordosten Europas, besonders aber Sibirien ist, und die nur in höchst seltenen Fällen sich einmal nach Deutschland verirrt. Es ist dies die Lasurmeise (Parus cyaneus). Wie die Bartmeise, gehört die Lasurmeise durch die angenehme Gestalt des Körpers, sowie durch eine nette Zeichnung und Vertheilung einfach schöner Farben zu den lieblichsten der in Deutschland vorkommenden Vögel. Obgleich nur zwei Farben sie zieren: lasurblau und weiß, so ist doch der Eindruck derselben ein überaus angenehmer. Schon in der Sammlung ausgestopfter Meisen in unserm Museum fällt die Lasurmeise besonders in die Augen, wie viel mehr nicht das lebende Thier, bei dem außer der großen Beweglichkeit noch das merkwürdige Aufblasen aller Federn, wobei das Thier fast einem Balg aus bunter Wolle gleicht, zu beobachten ist. Die letztgenannte Eigenthümlichkeit, die auch bei den übrigen Meisen, namentlich den Bartmeisen vorkommt, führt uns zu einem Hinweis auf die im Nachbarkäfig ausgestellten Vögel, die Sonnenvögel, (Liothrix luteus) Pecking-Nachtigallen oder auch, nicht ganz zutreffend, Meisendrosseln benannt, aus Indien und China, bei denen dasselbe zu beobachten ist. Diese zierlichen Vögel, die erst vor wenigen Jahren neu eingeführt wurden, dürfen den Vergleich mit den bestgeschätzten deutschen Singvögeln nicht scheuen. Sie sind lebhaft und schön gefärbt, haben einen aus vielen verschiedenen Strophen bestehenden Gesang, sind leicht an die Gefangenschaft zu gewöhnen, so daß sie dort auch brüten, und übertreffen jeden andern bekannten Vogel durch die überaus große Beweglichkeit, in der sie selbst den Meisen überlegen sind. Allerdings bedürfen sie, um diese Eigenschaft zu offenbaren, eines großen Käfigs. Dort

sie zu beobachten ist ein wahres Vergnügen. Sie hüpfen mit einer Schnelligkeit über mehrere, nur flüchtig berührte Sitzstäbe, als ob ein flacher Stein in fast wagerechter Richtung über ruhiges Wasser geworfen würde und mehrmals von demselben wieder aufspringe; sie springen mit den Füßen gegen die senkrechte Käfigwand und kehren zum alten Stand zurück, als ob ein Gummiball geworfen würde. Im engeren Käfig ist diese rastlose Beweglichkeit fast unheimlich. Dort nehmen sie Bewegungen an, welche sie im Freien gewiß niemals ausführen, ebenso, aber behender als die Stieglitze, indem sie, flüchtig die obere Wand mit den Füßen berührend, sich in der Luft völlig überschlagen. — Ein sechster, ebenfalls durch seine Zierlichkeit und Beweglichkeit höchst interessanter, dazu aus Indien neu importirter Vogel ist das Pärchen der Ganges-Brillenvögel (Zosterops palpebrosa), das Manchem aus der Geflügelausstellung her bekannt sein wird, bei uns vorläufig noch im Stelzvogelhause untergebracht.

Dr. D.

Ueber Kapaunen und Poularden.

Vortrag des Herrn A. Gatow, gehalten im Ornithologischen Verein zu Stettin.*)

Von Landwirthen, mit denen ich in Folge meiner Liebhaberei für Rasse-Hühner bekannt geworden, habe ich vielfach die Ansicht aussprechen hören, daß auf Gütern die Hühnerzucht nur dann als lohnend erachtet würde, wenn man hierbei nicht blos auf den Verkauf von Eiern und Hühnern angewiesen sei, sondern gleichzeitig die jungen Hähne, welche alljährlich unter den ausgebrüteten Küken in starker Mehrzahl vorhanden sind, zu Kapaunen verschneiden lassen könne, in welchem Falle sich solche nach erfolgter Mästung sehr gut verwerthen lassen, ganz abgesehen davon, daß die Kapaunen auch auf der gutsherrlichen Tafel selbst ein geschätzter Braten sind.

Andererseits wurde ich aber kürzlich auch von einem auswärtigen Mitgliede unseres Vereins, einem der bedeutendsten Grundbesitzer unserer Provinz, darauf aufmerksam gemacht, daß es in Pommern sehr an Leuten fehle, welche die erforderliche Sachkenntniß für diese immerhin nicht leichte Verrichtung besäßen, und zu einer sicheren Ausführung der hierbei nothwendigen Operation im Stande wären.

Ich bin deshalb aufgefordert, diese Angelegenheit im Ornithologischen Verein zur Sprache zu bringen, möglichst mit genauer Schilderung des besten Verfahrens, um dafür sich Interessirende in den Stand zu setzen, ihr bisher geübtes Verfahren nöthigenfalls zu vervollkommnen.

Vorausschicken will ich noch, daß von einer hiermit verübten Grausamkeit nicht die Rede sein kann, wenn man berücksichtigt, daß Ochsen und Hammel auf ähnliche Weise zur besseren Fleischerzeugung hergerichtet werden.*) Wenn die Operation richtig vorgenommen wird, so hat das Thier wenig Blutverlust und fast gar keine Schmerzen zu erleiden und geht dann die Heilung der Wunde schnell in natürlicher Weise vor sich.

In Anbetracht des Umstandes, daß in den nördlichen Provinzen Frankreichs die Zucht und Mästung von Hühnern für die Tafel mit dem glänzendsten Erfolge betrieben wird, wovon die weithin versandten sogenannten „Poularden" ein sprechendes Zeugniß ablegen, glaube ich das dort gebräuchliche Verfahren für die Herrichtung von Kapaunen als mustergültig erachten zu dürfen, was auch schon daraus erhellt, daß man hierbei auf 40 verschnittene Hähne nur 1 Todten zu rechnen gewohnt ist und dazu sind es oft fast noch Kinder, welche die Operation wie ein gewöhnliches Handwerk verrichten. Das französische Verfahren findet sich in dem zu Paris unter Autorisation des französischen landwirthschaftlichen Ministeriums herausgegebenen vorzüglichen Werke der Madame Millet-Robinet, betitelt „La Basse Cour", wie folgt beschrieben: Unter Kapaun versteht man einen zum Mästen bestimmten jungen Hahn, welcher des Zeugungsvermögens beraubt wurde. Derselbe läßt sich in diesem Zustande leichter mästen und liefert ein wesentlich zarteres Fleisch. Die Kastration muß im Alter von ungefähr 4 Monaten vorgenommen werden; bei jüngeren Thieren würde man die Entwickelung beeinträchtigen, während ältere in großer Zahl den Folgen der Operation unterliegen würden. Für die Zeit der Operation darf man durchaus keinen heißen Tag wählen, sondern muß solche bei kühlem, feuchtem Wetter in den Morgenstunden vornehmen, wenn die Thiere noch nicht gefressen haben.

Der Operateur hat sich mit einem sehr scharfen, kleinen, krummen chirurgischen Messer und einer krummen chirurgischen Nadel, in die ein in Wachs getauchter Faden gefädelt ist, zu versehen und läßt sich von einem Gehülfen das zur Operation bestimmte Thier auf dem Schoß halten. Der Gehülfe hält das Hähnchen, auf den Rücken mit dem Kopfe nach unten gelegt, so fest, daß gleichzeitig sein rechter Schenkel an den Leib gelegt ist, während der linke nach auswärts gerichtet wird, um die linke Weiche frei zu legen, auf welcher der Einschnitt zu machen ist.

Es werden hierzu die Federn vom Ende des Brustbeins bis zum After abgerupft und die Haut wird der Länge nach etwas aufgezogen, worauf ein Querschnitt von ungefähr 4 Centimeter vom After bis zur rechten Weiche unterhalb des Brustbeins gemacht wird.

Sobald dieser Schnitt in die Haut gemacht ist, entdeckt man einen Muskel, welchen man mittelst der Nadel oder eines stumpfen kleinen Hakens von den Eingeweiden abhebt und durchschneidet. Man

*) Dieser Aufsatz ist uns durch Herrn Prütz im Auftrage des Herrn Verfassers zugesendet und nicht etwa anderweitig entlehnt worden. (D. Red.).

*) Thierquälerei bleibt all' dergleichen immer; doch glaubt selbst der thierfreundliche Mensch in solchem Falle in seinem Rechte zu sein. (D. Red.).

sieht alsdann das Bauchfell, ein dünnes schlaffes durchsichtiges Häutchen. Hierin macht man wieder einen hinlänglich großen Einschnitt, um den Finger in den Bauch zu führen, wobei man etwa hervorbringende Eingeweide vorsichtig zurückzuschieben hat. Indem man jetzt den wohl eingefetteten Zeigefinger der linken Hand in die Oeffnung hineinbringt, geht man mit demselben unter den Eingeweiden weg bis in die Nierengegend, ein wenig nach rechts über dem Steißbein. Es ist ziemlich schwer bis dorthin zu gelangen, namentlich wenn der Hahn einer großen Art angehört. An der besagten Stelle trifft der Finger auf den ersten Testikel, einen glatten, beweglichen, lose anhängenden Körper, der bei einem vier-monatlichen Hahn die Größe einer kleinen Bohne hat. Man reißt denselben ab und führt ihn durch die Oeffnung der Wunde aus dem Körper heraus, wozu Geschicklichkeit und Erfahrung erforderlich ist. Zuweilen entgleitet der Testikel beim Hinausführen und es hält dann sehr schwer, ihn wiederzufinden. Wenn er wirklich abgerissen ist, so könnte er auch ohne große Beschwerde für das betreffende Thier in dessen Innerem verbleiben, besser ist es jedoch, wenn man ihn herausbringen kann. Auf gleiche Weise verfährt man mit dem zweiten Testikel, welcher sich zur Seite des ersten auf der linken Seite befindet. Hierauf wäscht man die Wunde mit etwas Kampherspiritus, was jedoch nicht unumgänglich nöthig ist, und bringt die Lippen der Wunde mittelst zwei bis drei chirurgisch ausgeführter Nähte zusammen.

Hinsichtlich dieser Nähte ist es erforderlich, jedesmal beim Hineinstechen der Nadel die Haut emporzuheben, um die Eingeweide nicht mit der Nadel zu berühren. Jede Verletzung der Eingeweide hierbei würde tödtliche Folgen haben. Die kastrirten Hähne werden an einem ruhigen Ort von anderen Hähnen abgesondert gehalten und giebt man ihnen in den ersten 24 Stunden nur ein wenig in Wein eingeweichtes Brot zu fressen. Auch dürfen dieselben in dem betreffenden Raum keine Gelegenheit zum Auffliegen haben, wodurch die Vernarbung der Wunde verzögert würde. Man macht ihnen deshalb für die Nachtruhe ein Lager von Stroh.

Drei bis vier Tage füttert man selbige dann noch mit nahrhaftem, leicht verdaulichem Futter und läßt sie hierauf wieder zu dem andern Hofgeflügel, wobei man sie nöthigenfalls vor den Angriffen der nicht verschnittenen Hähne zu schützen hat.

Sieht man einen Kapaun demnächst kränkeln, so muß man ihn greifen und die Wunde untersuchen. Findet man letztere entzündet, so nimmt man mittelst eines kleinen Schwammes oder eines weichen kleinen Läppchens eine Waschung mit laulichem Wasser vor und reibt die betreffende Stelle täglich zwei oder drei Mal mit Kampherfett*) ein. Zuweilen wird auch die Naht der Wunde mit Oel und Asche eingerieben, um die Fliegen abzuhalten, was jedoch nicht zu empfehlen ist, da in solchem Falle die Zusammenheilung erschwert wird. Sollten schon während der Operation Hähne todt bleiben, so muß man ihnen gleich die Kehle durchschneiden, damit das Blut fließen und das Fleisch genossen werden kann. Daß man den kastrirten Hähnen gleichzeitig auch die Kämme und Glocken abschneidet, ist eine unnöthige Grausamkeit und dürfte es wol genügend andere Kennzeichen geben, die Kapaunen von andern Hähnen zu unterscheiden.

Unter Poularden versteht man junge Hennen, welche man gemästet hat, bevor solche mit Legen begonnen haben.

Es ist ein weit verbreiteter Irrthum, daß man den jungen Hennen zu diesem Zweck vorher den Eierstock zerstören oder durchschneiden müsse. Wenngleich eine derartige Operation schon ausführbar sein würde, so erweist sie sich doch so schwierig, daß man selbst bei chloroformirten Thieren wenig Aussicht auf einen glücklichen Erfolg hat. Ueberdies dürfte auch die Aufzucht von Hennen als Eierproduzenten im Allgemeinen lohnender sein. Die Kapaunen behalten bis zum Alter von 18 Monaten bei genügender Pflege ihr zartes Fleisch und lassen sich, solange man sie nicht gerade der Mästung unterwirft, auch zum Führen von ausgebrüteten jungen Hühnern verwenden.

Behufs Auswahl von jungen Hähnen zu Kapaunen dürfte es sich empfehlen, dabei von Hause aus auf eine zur Fleischbildung geeignete Rasse Rücksicht zu nehmen, wozu sich namentlich auch eine Kreuzung von Landhühnern mit Dorking- oder Brahma-Hähnen eignen würde, wie ich sie seit Jahren neben meinen gesondert gehaltenen reinen Stämmen züchte. Die Mästung der Kapaunen, bzgl. Poularden geschieht in Frankreich auf ähnliche Weise, wie bei uns Gänse genudelt werden. Die betreffenden Thiere werden durch Einsperren in einen engen dunklen Raum zu fortwährender Ruhe genöthigt und bekommen täglich einige Male sogenannte Nudeln in den Hals gestopft. Die Nudeln werden aus Gersten- oder Buchweizenmehl geknetet, sind 1½ Centimeter im Durchschnitt dick und 6 Centimeter lang und werden vom Stopfer in Milch getaucht, damit sie besser hinuntergleiten können. Nach und nach wird mit der Anzahl dieser Nudeln bis auf 12 und selbst 15 Stück für jedes Thier und jede Mahlzeit gestiegen. Die vollständige Mast eines Exemplars erfordert durchschnittlich 20 bis 28 Pfund Mehl von Gerste und Buchweizen, was durch Anfeuchtung bis 30 Pfund betragen kann.

Betreffs Truthähne schließlich noch die Bemerkung, daß man solche in Frankreich niemals verschneidet, sondern sich auf deren einfache Mästung beschränkt.

*) Wol Kampheröl aus der Apotheke. Ebensogut dürfte verdünntes Glycerin sein. D. R.

Neue Hülfsmittel für die Vogelzucht.

Einen doppelten Nistkasten für die Zucht von kleinen Papageien hat Herr Frühauf, Inhaber der Holzwaaren-Fabrik in Mühlhausen, früher in Schleusingen i. Th., uns als Muster zugesandt. In Nr. 30 hatten wir unter andern den von Herrn Ministerialsekretär Schmalz in Wien eingeführten doppelten Nistkasten beschrieben, und diesen hat nun Herr Frühauf auch in seiner Fabrik nach eigener Einrichtung herstellen lassen und bietet ihn, mit nur 3 Sgr. Aufschlag gegen die früheren Kästen, den Liebhabern an. Unsererseits sei er angelegentlichst empfohlen. R.

Briefliche Mittheilungen.

Mit einem kürzlich erhaltenen Männchen Ceresfink (Aidemosyne modesta) habe ich trübe Erfahrungen gemacht, die seinem wissenschaftlichen Namen (bescheidene Bescheidenheit) nicht zur Ehre gereichen. Zuerst brachte ich es in den Käfig für die größeren Prachtfinken, von denen es als neuer Ankömmling unwirsch behandelt wurde. Muskatfink, weißköpfige Nonne, Bandfink u. a. pickten um sich herum und verleideten ihm den Aufenthalt. Still und sanft, wie dieser Vogel mir vorkam, vereinigte ich ihn mit den kleinsten Verwandten, von denen in wenigen Tagen aber seiner tückischen Laune mehrere zum Opfer fielen; zuerst ein ärmlicher weiblicher Tigerfink, dann ein lieblicher Amarant, ein Orangebäckchen und zwei graue Astrilde. Hetzerei war nicht zu bemerken und doch konnte es nicht anders sein. Mit starken Schnabelstößen mochte der Ceresfink die sich zur Nachtruhe an sie schmiegenden harmlosen Gesellen tödtlich verletzt haben. Jetzt, seitdem er wieder bei den ersteren größeren Prachtfinken untergebracht ist, hat das Unwesen aufgehört und auch ihm geschieht kein Leides. Ein Glück, daß mein prächtiger gelbgrüner Astrild (A. formosa) so heiler Haut davon gekommen; er ist die Perle meiner Sammlung. Dr. Luchs in Warmbrunn.

In diesem Sommer kam bei unserer Kanarienzucht der gewiß seltene Fall vor, daß das älteste Junge seine beiden Geschwister mehrere Tage gefüttert hat. Ich mußte nämlich wegen der Unart des Federausreißens den Vater aus der Hecke so frühe entfernen, daß nur das eine Junge soweit vorgeschritten war, um selbstständig zu fressen.

Fr. Wälde.

(Einen gleichen Fall kann ich aus meiner Vogelstube berichten. Ein kränkliches junges Männchen der Rothkopfamadinen (A. erythrocephala) wurde von seinem um zwei Tage jüngeren Schwesterchen gefüttert und groß gezogen, nachdem es von der Alten, der neuen Brut wegen, schon verlassen war. — Ueber Kakerlaken oder Albinos lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" noch. Eine Quelle für den Bezug derselben weiß ich nicht anzugeben. Dr. R.).

Anfragen und Auskunft.

Antwort auf die Frage in Betreff der Flügellähmung von Parkvögeln. Jeder Flügel besitzt zwei Spitzen, eine nach innen, eine nach außen. Von der inneren Spitze wird das vorderste Glied oder ein Stück in der Länge eines Fingergliedes in folgender Weise herausgelöst. Die obere Spitze wird zurückgebogen und alsdann die innere bis zur dazwischen liegenden Haut in der angegebenen Länge fortgeschnitten. Die Haut wird dann möglichst wieder über den blosgelegten Knochen zurückgeschoben. An dem Flügel eines größeren Vogels wird vermittelst einer Schere die innere Haut an beiden Enden eingeschnitten und dann der betreffende Knochen in gleicher Weise fortgenommen. Die Operation geschieht an kleineren Vögeln vermittelst einer gewöhnlichen Schere; für ältere, bezüglich größere Vögel, wie Gänse, Schwäne, Flammings, Reiher, Kraniche, Störche u. dgl. hat man eine für diesen Zweck eigens eingerichtete Schere. Bei Enten bedarf es keiner Verbindung; dieselben werden unmittelbar nach erfolgter Operation wieder auf das Wasser gesetzt und heilen von selber aus. Den genannten größeren Vögeln wird die Wunde aber vermittelst eines Hanffadens leicht verbunden und dann werden sie an einen solchen Aufenthaltsort gebracht, wo sie leicht, ohne besondere Beängstigung wieder eingefangen werden können, um sie im Verlauf des zweiten Tages vorsichtig von dem Verbande wieder zu befreien. H. W.

Frage. 1. Ich habe in meiner Vogelstube in der letzten Zeit ungewöhnlich viele Vögel verloren und übersende Ihnen daher einen Ringelastrild, mit der Bitte, denselben untersuchen zu wollen und den Befund in der „Gef. Welt" anzugeben. Ich kann die Ursache des Todes nicht begreifen; bei sämmtlichen gestorbenen Thierchen waren die Erkrankungserscheinungen die gleichen. Sie waren anscheinend ganz gesund, dann saßen sie mit aufgeplustertem Gefieder fortwährend am Freßnapf, fraßen mit Gier und waren nach wenigen Tagen todt. Der Auswurf war anscheinend normal. — Ich bin in der Pflege meiner Vögel sehr sorgsam, füttere nur beste weiße Hirse, trocken und eingeweicht, Kanariensamen mit etwas wenigem Rübsamen, gequellte Ameiseneier mit Eigelb, grünen Salat und Vogelmiere, und lasse es nie an Sepia und etwas Salz fehlen. Ich habe, außer andern, in diesem Sommer in 4 Bruten 14 junge Goldbrüstchen gezogen, die sämmtlich leben und munter sind. Es ist also zu verwundern, daß der Tod nur unter den älteren Vögeln aufräumt.

2. Ich hatte kürzlich ein Amarant-Weibchen, welches an Legenoth litt; ich fing es heraus, brachte ihm vermittelst eines Nadelknopfes etwas Oel in den After und setzte es allein. Am nächsten Morgen hatte es ein Ei gelegt, aber ohne Schale, nur mit einer dünnen Haut umgeben und das Thierchen war wieder ganz munter. — Nach einigen Tagen wiederholte sich derselbe Fall und ich wandte wieder Oel an, doch war das Vögelchen leider am nächsten Morgen todt. Ich schnitt es auf und fand mehrere Eier, ebenfalls nur in eine dünne Haut gehüllt. — Woran liegt dies, da doch Sepia nie fehlt? L. Gleim in Hamburg.

Antwort. 1. Ihre Vögel sind jedenfalls an Unterleibsentzündung gestorben; obwol ich an dem bereits zu sehr verwesten Körper dieselbe nicht mehr feststellen konnte, so ergeben dies doch die Krankheitserscheinungen. Als Ursache kann ich Ihnen nur entweder die Zugluft oder auch naß gefüttertes Grünkraut, besonders Salat angeben.

2. Ueber die Legenoth der Vogelweibchen lesen Sie in meinem „Handbuch der Vogelliebhaber" und dann auch namentlich in dem Aufsatze Stubenvogelzucht als Erwerb in Nr. 21 u. f. w. der „Gefiederten Welt" nach.

Bücher- und Schriftenschau.

„Unsere Sänger in Feld und Wald", von L. Martin (Verlagshandlung von Levy & Müller in Stuttgart). Wiederholt machen wir unsere Leser auf diese kleine Schrift aufmerksam. Dieselbe wurde neuerdings wieder auf der Hamburger Ausstellung mit dem ersten Preise gekrönt und wir empfehlen sie besonders zur Massenverbreitung bez. Vertheilung an Kinder in den Schulen, sowie auch in den Vereinen, angelegentlichst. R.

Briefwechsel.

Herrn **F. Lichterfeld** in Berlin: Ihre möglichst ausführliche Schilderung der Dolchstichtauben der Frau Prinzessin Karl von Preußen ist uns höchlichst willkommen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion.)

Russische 1874er Ameisen-Eier empfingen und empfehlen **Mey & Bengelsdorff**, Berlin. [617]

Vogelhandlung
von
Joseph Zuckerkandel,
Dresden, Wallstraße 8. I.

empfiehlt ein wohlassortirtes Lager exotischer Vögel, franz. Kanarien und die allgemein bekannten und renommirten fehlerlosen reinen Kanarienvögel eigener Zucht, als Glucker, Hohlroller, Klingelroller mit Knurren, Roller mit jammernden Touren, ebenso beste reinste Zuchten Harzer Kanarienvögel. [618]

Harzer Kanarienvögel. [619]

Post-Versandt garantirt laut Preis-Courant.
R. Maschke, St. Andreasberg im Harz.

Vorzüglich schöne, gut getrocknete Ameiseneier empfiehlt
Franz Ammeyer in Linz a/d. Donau,
[620] Landstraße 55.

Eine rothköpfige Amazone und ein Inka-Kakadu, für 18 Thlr. zu verkaufen Gitschinerstr.: 62, Hof II. [621]

---

1 Männchen **Coryllis galgulus** sucht zu kaufen oder ein Weibchen desselben zu verkaufen
[622] **H. Fiedler,** Buchhändler in Agram.

Zwei größere Vogelkäfige sind zu verkaufen. Die Zeichnungen dieser Käfige liegen in der Exped. d. Bl., woselbst auch der Name des Verkäufers zu erfahren ist. [623]

Zu vertauschen: ein vorz. Weibchen Singsittich, welches bereits Junge gezogen, gegen ein Paar fehlerfreie Tigerfinken oder eine einzelne importirte Nymphe.
[624] **F. Riedel,** Stolp i. Pomm.

Ich kann noch einige Paare Pfautauben in schönen Exemplaren abgeben.
Wismar i. M. [625] **P. Engel.**

Zwei Möpse, Männchen, 1½ Jahr alt, zwei dergl., Männchen und Weibchen, ½ Jahr alt, zwei Löwen-Spitze, Pärchen, verkauft
[626] **Franz Taatz,** Halle a. S.

Soeben empfing eine Partie importirter Wellen-Papageien (für richtige Paare garantirt), welche ich bestens empfehle, Grau-Papageien, verschiedene Loris, gehaubte Kakadus, auch eine große Auswahl kleiner exotischer Vögel, sowie sämmtliche hiesige Singvögel, eine Partie sehr zahmer Affen, trockene Ameiseneier und Mehlwürmer bester Qualität.
F. Reinhardt, Vogelhandlung,
[627] Hannover, Große Packhofstraße 7.

Harzer Kanarienhähne

edelster Race, in sehr schönen kräftigen Exemplaren à 2½ u. 3 Thlr. versendet unter Garantie
Friedrich Kieser,
[628] Carlsstadt a/M. Bayern.

Sehr schöne u. reine Ameiseneier, 74er, gedörrt, offerirt à Pfd. zu 20 Silbergroschen.
Friedrich Kieser,
[629] Carlsstadt a/M.

Abzugeben sind: weiße Trommeltauben à Paar 20 Sgr., Mövchen, Schwarz- und Blauflügel, à Paar 1 Thlr., ein Paar schwarze böhmische Kropftauben 1½ Thlr., rothe und gelbe Elstern und gespitzte (Weißschläger) Tümmler (Hochflieger) à Paar 1½ Thlr., von
[630] **August Dietz** in Burg bei Magdeburg.

Sehr schöne, gesunde Graupapageien à 10 Thlr.
Kalanderlerchen (Männchen) à 6 Thlr. incl. Embalage hat abzugeben die Vogelhandlung von
F. Zivsa,
[631] Troppau, Oesterreich.

Zu verkaufen eine Sammlung von ca. 20 Stck. sehr gut ausgestopften Vögeln in 31 Glaskasten sehr billig
Simon Seelig,
]632] Schwerin i/M., Gr.-Moor 5.

Gebe ab:
das Paar weiße doppelte Perückentauben (Primaqualität) zu 3 Thlr. 15 Sgr.,
1, 2 zwei—drei Monat alte gelbe Kochins, von Primastamm gezüchtet, an Wind und Wetter gewöhnt, mehrere Stämme, je nach Stärke 6—12 Thlr.
1 Silberbrabanterhahn, vorjährig, kleine Helmhaube, schöne Brustzeichnung, hell, 2 Thlr. 15 Sgr.
1 dito diesjährig, reine Brust- u. Schwanzzeichnung, 3 Mon. alt, 3 Thlr.
1 dito Henne, vorjährig, reinste Zeichnung, starke Helmhaube, 5 Thlr.
1 dito Henne, vorjährig, schöne Brustzeichnung, 3 Thlr.
1 dito Henne, diesjährig, schöne Brustzeichnung, 2 Thr.
Spanierhähne, 2½ Monat alt, kräftig, à 1 Thlr. 15 Sgr. Preise incl. Verpackung.
Engl. Schecken-Rammler in großer Auswahl, 3—6 Mon. alt, à 1 Thlr. 15 Sgr.
Eschbach bei Usingen.
[633] **E. Weygandt.**

Kalifornische Schopfwachteln, im Freien erzogen, à Paar 8 Thlr. bei
[634] **v. Hinckeldey** in Naumburg a. d. S.

Aus meiner Zucht habe ich abzugeben:
fünf Stück tadellose, einfarbig gelbe Trompeter-Weibchen, à 1 Thlr.,
einen einfarbig gelben Brüsseler Hahn, à 4 Thlr.,
einen einfarbig gelben Holländer Hahn, à 3 Thlr.,
sämmtlich durchgezogene edle Thiere.
A. v. B. Timmermann jr.,
[635] Apotheker.
Bunde in Ostfriesland.

Von **tadellosen** Wellensittichen **eigner Zucht** verkauft:
brütende à Paar 8 Thlr.,
½jährige à Paar 6 Thlr., und
1jährige Männchen à Stück 2¾ Thlr.
[636] **J. F. Engelhard** in Nürnberg.

Angebot für fortdauernde Lieferung von aller Art lebenden **jungen und alten Geflügels,** sowie auch von **Wildbret** 2c. wird gewünscht durch die Redaktion [637]

Ich offerire einige Paare echte Elster-Tümmler, à Paar 2 Thlr. [638]
Friedr. Bode in Lünen a. d. Lippe.

Andreasberger Kanarienvögel.

Hohlroller mit feinen Glucker- und Flötentönen, fehlerfrei, 4—5 Thlr. das Stück. Versandt per Post unter Garantie.
Alversdorf bei Offleben.
[639] **J. Günther,** Ziegeleibesitzer.

Einen **Beo-Beo** (Eulabes religiosa), Pracht-Exemplar, ganz zahm, auf einer der ersten diesjährigen Ausstellungen mit dem I. Preis prämiirt, ist zu verkaufen.
Reflektanten belieben sich an **A. Förster** in Cassel zu wenden. [640]

Die

Großhandlung exot. Vögel, Thiere und Naturalien

von

CARL GUDERA

Leipzig und Wien

offerirt:

(Preise für das Paar in Reichsmark.)

a. Prachtfinken-Arten, Weber ꝛc.: Astrilds, Geldbrüsteln, Silberbeck, Reis-, Atlas- und Bandfinken à Paar 6, Tiger- und Mustatfinken 8, Amaranten und Blutschnabelweber 8½, Orangebäckchen, Elstern 9, Atlas- in voller Farbe 10½, Zebra- 13½, rein weiße Reisfinken 75, gefleckte (sehr wenig) 45, rein weiße Mövchen 30, gefleckte 21, schwarzt. Nonnen 10½, desgl. dreifarbige 13½, Paradies- und Dominicanerwittwen, Feuer-, Napoleonsweber im Prachtgefieder 15, außer Pracht 7, Madagascarweber in voller Farbe 24, Ploceus textor 20, Ammer- und ind. Goldstirnweber 24, Pfäffchen 20, (Edel- 10½, einzelne Männchen 7, Zafran- 45, M. 9, Papst- (Nonpareilles) M. 10, Indigo- M. 7½, Purpur- M. 15 u. Kubafinken 24;

b. Drossel-, Staar-, Tangaren- und Taubenarten ꝛc.: Bül-Büls M. 36, chin. Nachtigallen oder Sonnenvogel 60, M. 36, grau gehaubte Kardinäle, lebhaft gefärbt, M. 11½, grüne Kardinäle 50, M. 30, Kalanderlerchen und Karmingimpel M. 15, Japan. Gimpel M. 30, Kappenammer M. 13½, Heuschrecken- M. 18, China- M. 24, Seiden- M. 27, Lerchen- oder Chilistaare oder rothbändige Kalanderlerchen 45, M. 24, Glanzdrosseln M. 36, kleine japan. Meine 32, M. 18, Jamaika- M. 36, und neu importirte Trupiale, noch ohne Namen, M. 45, Tanagra tricolor M. 45, grüne, blaue und Kronentanagra 65, M. 36, Organisten 45, M. 25, Sperlings- und Malakatäubchen 14, Wander- 18, Nicobar- 180, und afrik. Lachtauben 18, amerik. Halbmondspechte M. 30, Kalif. Wachteln 30, Pfefferfresser oder Toukan (R. discolorus) 160, M. 90, austral. Wanderelstern 80, M. 45, Beo, Gr. religiosa, M. 60, Flötenvögel, zahm, 90, M. 55.

c. Papageien, Wellenpapageien, importirt 22½, Sperlingspapageien 20, Grauköpfchen 42, Jakos Stck. 30—48, Vaza- Stck. 100, Amazonen- Stck. 36—60, Neuholländer- Stck. 27—36, Porterike- Stck. 24—30, Mehrentoxipapageien Stck. 24, Rosa- Stck. 30—36 und Nasenkatadu Stck. 36—42, rothe Araras Stck. 90—135, Karolina- 27, Halbmond 24, Kaktus- 24, große Alexander- 65, Stck. 30, kleine A.- 27, Mönchs- 15, Goldstirn- 24 und Blumenaupapageien 15, Königslori in Farbe Stck. 60, Rosellas 42, Pennants- 48, Beurty- 85, Sing- 27 und Nymphensittiche 26, Gebirgslori 75, grüne Lori 45, Pariser Kanarien hochfeine Race 30, Stck. 16;

ferner, um dieselben abzuschaffen, folgende amerik. Singvögel zu nachstehenden außerordentlich billigen Preisen: Rothe und graue Spott- 60 M. 36, Alicen- 32, M. 18, Wander- Katzen- und Blaudrosseln, Oriels oder Baltimorevögel 19, M. 10½, goldstirn. Grasmücken M. 36, Paperlinge und Kubstaare 13, M. 7, Epaulettenstaare 13½, M. 7½.

Affen. Mistitiäffchen 60, Stck. 34, Java- und Kronenaffen Stck. 36—45. Harlequin- und schwarze Macobaraffen Stck. 45—54, Mandrils Stck. 75.

Axolotls (merik. Olme) Stck. 7—10, Goldfische Stck. ¾—1½, Wasser- und Landschildkröten verschiedener Länder in allen Größen Stck. ¾—10, türk. Eidechsenschlangen (pseud. palasii) Stck. 5—10, Klapperschlange Stck. 60—75, sowie verschiedene andere Reptilien und Fische für Aquarien.

Sämereien. (Preise für 50 Kilo.) Ia Weißhirse 30, IIa 25½, algerische 39, Senegal- und indische Hirse 36, Kolbenhirse à Bund 2. (Letztere 4 Hirsearten gelten unstreitig als bestes Futter für Prachtfinkenarten, sowie für Sittiche ꝛc.) Canariensamen 25½, Sommerrübsen 21, Mohn 48, geschälter Hafer 30, Hanf 18, gemahlen, für Weichfresser 30, Weißwurm für Weichfresser pr. Ko. 2½, Ia Ameiseneier getr. 2½, Mehlwürmer Ko. 21, Ossa sepia (zur Eierschalenbildung) 60, 1 Ko. 1½, in großen Stücken Dtzd. ½, Großer weißer amerik. Pferdezahnmais 50 Ko. 18, Eberesche und Sonnenblumenkörner für Sittiche ꝛc. pr. Ko. 1½, Grassamen Ko. 1, Reis in Hülsen für alle Papageien- und größere Finkenarten 60, Ko. ¾, Kokosfasern Ko. 4, Agavefasern 2 (als Nistmaterial) für einzelne Kilo etwas erhöhte Preise.

Außerdem: Brütnester von Holz und Metall, Brütkasten für Papageien aus gedrechselten Baumstämmen, sowie aus Baumrinde, Volieren, Nist- und Luxus-Käfige, laut Musterbuch in über 200 verschiedenen Formen.

Papageien, Kletterstangen in 6 verschiedenen Arten, Pneumat. Trink- und Futtergefäße, Papageien-Ringe und Kettchen ꝛc.

Preisverbindlichkeit 8 Tage. Versandtbedingungen: Effectuirung nur gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme. Bei Sendungen nach Eisenbahnstationen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz werden die während des Transports, also vor Empfangnahme etwa gestorbenen Vögel, gegen sofortige Rücksendung des Kopfes und Beischeinigung des, die Vögel überbringenden Postbeamten, zur Hälfte ersetzt. Unter gleichen Voraussetzungen wird gegen eine im Voraus zu entrichtende Versicherungsprämie von 5 pCt. des Kaufpreises für etwa todt angekommene Vögel voller Ersatz geleistet. Mit Ablieferung der Sendung an den Adressaten fällt hinsichtlich jede Garantie auf. Sendungen selber Vögel, welche umgetauscht werden sollen, gehen auf alleiniges Risico des Absenders.

Besondere Preislisten sind verbanden über exot. und inl. Vogelbälge und ausgestopfte Vögel, Vogelgruppen unter Glasstürzen, Käfer und Schmetterlinge, Muscheln und Mineralien, Geweihe, Eier und Nester, Raubthiere und lebendes Wild, exot. Geflügel, Reptilien und Fische, Aquarien und Terrarien, sowie über verschiedene ethnographische Gegenstände, als Waffen, Anzüge, Figuren, Musikinstrumente, Kuriositäten ꝛc. überseeischer Völker. [641]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 22. Oktober 1874. Nr. 43.

Inhalt:

Jahresversammlung der deutschen ornitholog. Gesellschaft. —
Etwas über Dompfaffenzucht. —
Der Akklimatisationsverein in Cincimati. —
Zur Ernährung des grauen Reihers. —
Mittel gegen das Ungeziefer der Vögel. —
Zur Brieftauben-Liebhaberei. —
Briefliche Mittheilungen: Sittichzucht; Rebhuhn. —
Anfragen und Auskunft: Graupapageien; Schwalben; Eierbrot; Fasanenzucht. —
Verflogene Brieftaube. —
Zur Abwehr. —
Anzeigen. —

Die siebente Jahresversammlung der deutschen ornithologischen Gesellschaft in Berlin.

Wir leben augenblicklich in den Tagen wissenschaftlicher Kongresse, Versammlungen und Ausstellungen — sie sind gleichsam eine Krankheit unserer Zeit. Kaum ist die Abschiedsrede in dem Kongreß des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in der alten Hansestadt Danzig gehalten worden, so beginnt schon der Anthropologen-Kongreß in Dresden, und während man hier noch in persönlichem Streite die Frage des Lappenschädels und des Tertiärmenschen zu erörtern versucht, ruft bereits der 18. September nach Breslau zur Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. Und sind dann hier die Sektionssitzungen vorüber und hat man sich eben zugerufen: Auf Wiedersehen in Graz, dem Versammlungsorte des nächsten Jahres, so melden auch schon die Zeitungen wieder die alljährlich stattfindende Jahresversammlung der deutschen ornithologischen Gesellschaft in Berlin. —

Am Montag, dem 5. Oktober, Abends 7½ Uhr, wurde die Jahresversammlung vorgenannter Gesellschaft durch den derzeitigen Vorsitzenden derselben, Herrn Justizrath Dr. Golz, eröffnet. Ein günstiger Glücksstern waltete in diesem Jahre über diesen Kongreß. Die Präsenzliste, voller und namhafter denn je zuvor, zeigt uns eine Reihe von Namen, die in der ornithologischen Wissenschaft wohlbekannt sind. Da ist zunächst Prof. Dr. Cabanis, der Nimmermüde, der außerordentliche Kenner der Avifauna der Erde. Da ist Baron Eugen v. Homeyer aus Stolp, der gleich treffliche wie kenntnißreiche Förderer unserer Wissenschaft; Dr. Bodinus, der Direktor unseres berliner zoologischen Gartens, Dr. Karl Ruß und, damit das Triumvirat dreier erfolgreich thätiger Vogelzüchter gleich vollzählig sei, auch der als Oologe wohlbekannte Dr. Rey aus Halle a. S. — Hauptmann Alexander v. Homeyer aus Schweidnitz, der die früheren Versammlungen so würzig zu machen wußte, und Dr. Bolle, Letzterer von seinem buschumrandeten Scharfenberg im Tegeler See, sind ebenfalls gekommen, um alte Freunde wieder zu begrüßen. Da sind ferner die Herren Dr. Reichenow von hier, Ludwig Holtz aus Barth, Regierungsrath von Schlechtendahl aus Merseburg, Oberlehrer Fr. Schneider II. aus Wittstock und Andere. Freilich fehlen auch in diesem Jahre noch viele wohlbekannte Namen, und die Worte jenes Professors „ich sehe viele, die nicht da sind", haben auch noch heute dieselbe Berechtigung wie früher.

Herr Dr. Golz heißt zunächst alle Mitglieder in herzlicher Rede willkommen und schlägt dann,

nachdem er des Verlustes gedacht, den die Gesellschaft durch den Tod des Oberst v. Zittwitz erlitten hat, Herrn Eugen v. Homeyer zum ersten, Herrn Hauptmann Alexander v. Homeyer zum stellvertretenden Vorsitzenden vor, eine Wahl, die einstimmig angenommen wird. Alsdann ergreift Herr A. v. Homeyer das Wort. Er weist darauf hin, daß er, einem Rufe der afrikanischen Gesellschaft folgend, als Chef einer Expedition nach Afrika gehen werde, und daß es ihm daher für lange Zeit nicht vergönnt sein wird, an den Sitzungen hier Theil zu nehmen. Doch wenn er auch fern von der Heimath, an der Angolaküste und im Innern Afrikas weilen werde, so hoffe er dennoch, durch Sammlungen und gewissenhafte Beobachtungen die Sympathien zeigen zu können, die er für die ornithologische Gesellschaft hegt. Herr Prof. Dr. Cabanis legt hierauf die Tagesordnung der Jahresversammlung vor. Das Programm der Sitzungen wird festgestellt und die Vorträge werden angemeldet. Eine längere erregte Debatte über die Vereinigung der alten, seiner Zeit von Baldamus, Naumann und Anderen gegründeten ornithologischen Gesellschaft mit der unserigen nimmt den übrigen Theil des Abends in Anspruch.

Es hieße den Zweck dieser Zeilen weit überschreiten, wenn wir hier eingehender auf diesen Gegenstand zurückkommen wollten; wir möchten nur bemerken, daß allgemein eine Vereinigung beider Gesellschaften gewünscht wird, damit man dann vereint für die Förderung der Ornithologie arbeiten und wirken könne.

Von dem herrlichsten Herbstwetter begünstigt, versammelten sich die Mitglieder am folgenden Tage, dem 6. Oktober, früh um 9 Uhr im zoologischen Garten, um unter Führung des Herrn Dr. Bodinus den gewohnheitsgemäßen Rundgang durch den Garten anzutreten. Die neuesten Erwerbungen wurden dabei in Augenschein genommen und riefen naturgemäß Discussionen eingehendster Art hervor.

Unser zoologischer Garten scheint eine speciell reichhaltige Sammlung mit der Gruppe der Raubvögel begonnen zu haben. Seit dem vergangenen Jahre sind unter andern neu hinzugekommen der prächtige Haubenadler Afrikas (Spizaëtos bellicosus) und ferner der in seinem Gefieder so ungemein variirende Bussard Nordamerikas (Buteo borealis). Die afrikanischen Gaukler (Helotarsus ecaudatus und leuconotus) sind in schönen ausgefärbten Exemplaren vertreten. Die Eulen-Sammlung hat durch eine amerikanische Eule (Strix nebulosa) einen ebenso interessanten als schönen Zuwachs erhalten. Dreier Raubvögel möchten wir noch Erwähnung thun, die zum Theil zwar nicht selten, doch von einigem Interesse sein dürften, weil es Bewohner unserer Mark sind. Da ist zunächst der in zoologischen Gärten seltene Fischadler (Pandion haliaëtus). Die beiden Exemplare sind die Geschwister des auf Seite 206 dieses Jahrganges erwähnten Vogels. Da ist ferner die Rohrweihe (Circus rufus) in mehreren Exemplaren, die Hauptvertreterin der Weihenfamilie in den Rohr- und Schilfgegenden unserer Mark Brandenburg. Und schließlich noch ein schönes lichtes Exemplar vom Schlangenadler (Circaëtus brachydactylus).

Als neuen Stelzvogel nennen wir den asiatischen weißnackigen Kranich (Grus leucauchen); von den neuen Papageien den prächtigen australischen Barrabands-Sittich (Platycercus Barrabandi) und den sehr seltenen, nur ganz zufällig nach Europa gelangenden Glanzsittich (Pl. splendens) von den Fidschiinseln.

Obwol die letztgenannten Arten auch bei weitem nicht häufig zu nennen sind, so dürften sie doch Jedem, der die Thiergärten des Kontinents kennt, hier und da schon einmal begegnet sein. Nicht so die folgenden Vögel. Dieselben sind äußerst selten und werden wol, vielleicht mit Ausnahme der holländischen und niederländischen Gärten, nirgends weiter auf dem Festlande anzutreffen sein. Es ist zunächst ein Pärchen der farbenprächtigen Nashornvögel (Buceros plicatus) von den Sundainseln, alsdann die eigenthümlichen Pinguine Afrikas (Spheniscus palpebratus) und schließlich ein Pärchen der Maleos (Megacephalon maleo) von Celébes, jener eigenthümlichen Scharrvögel, die bekanntlich ihre Eier in den Sand einwühlen und durch die Sonnenwärme ausbrüten lassen. Drei höchst interessante Erwerbungen, mit deren Besichtigung der Rundgang schloß. Nach der photographischen Aufnahme begann das Festdiner, welches die versammelten Mitglieder bald in die heiterste Laune versetzte. Lange, nachdem die Tafel längst aufgehoben war, blieb man an dem heutigen Tage vereint.

Am 7. Oktober früh um 9 Uhr begann die Sitzung im gewöhnlichen Sitzungs-Lokale. Nachdem eine Anzahl von Herrn Grunack ausgelegter Bälge, Nester und Eier vom gemeinen Kukuk (Cuculus canorus), von den Goldhähnchen (Regulus flavicapillus und ignicapillus), von den Karmingimpeln (Pyrrhula erythrina) und den Weidenammern (Emberiza aureola) durchgemustert worden war, brachte der Vorsitzende, Baron Eugen von Homeyer, eine Frühjahrsversammlung in Anregung und begründete seinen Antrag in eingehender Weise. Bei der darauf folgenden Abstimmung wurde der Vorschlag angenommen und Braunschweig zum Versammlungsort für das nächste Jahr gewählt. Es folgte durch Herrn Prof. Dr. Cabanis die Verlesung einer Abhandlung des am persönlichen Erscheinen verhinderten Herrn Prof. Mewes aus Stockholm über: Brutplätze seltener europäischer Vögel. Alsdann gab der Verfasser dieses einige monographische Beiträge zur Kenntniß des Genus Otomela Bp. (einer asiatischen und afrikanischen Würgergruppe) gestützt auf eine von ihm geschriebene eingehende Arbeit über dieses Thema. Den Beschluß der offiziellen Vorträge bildeten die Notizen, welche Herr Hauptmann v. Homeyer über das Vorkommen einiger schlesi-

schen Vögel gab. Bevor man sich dann zum Diner vereinigte, besichtigte ein Theil der Mitglieder die von Herrn Maler Mützel ausgelegten Skizzen und Zeichnungen von Vögeln, während ein anderer Theil der Gesellschaft sich in das Palais des Prinzen Carl begab, um die daselbst befindliche interessante Dolchstichtaube der Philippinen (Phlogoenas cruentata) in Augenschein zu nehmen. Dem Diner folgten zwanglose Diskussionen, und der Abend sah die versammelten Mitglieder im Viktoriatheater, dessen Direktion die Gesellschaft auch in diesem Jahre auf das zuvorkommendste eingeladen hatte.

Den Schluß der Jahresversammlung bildete die Sitzung am 8. Oktober im Königl. zoologischen Museum. Wie in den Sitzungen der alten Gesellschaft eine Diskussion stets wiederkehrte, die Frage, ob Aquila pennata und minuta verschiedene Arten seien, so wird auch regelmäßig in unseren Versammlungen ein Thema durchgesprochen: über die verschiedenen Schreiadler (Aquila clanga, naevia und orientalis). Nach den eingehendsten Studien schilderte Herr Baron v. Homeyer mit größter Kenntniß die verschiedenen Formen. Daran reihte sich dann noch ein Vortrag des Herrn Professor Dr. Cabanis über den Bussard Nordamerikas, (Buteo borealis) und über die kleinen, dem Zwergkauz (Strix scops) nahe verwandten Formen Strix zorca und obsoleta.

Um 1 Uhr schloß der Vorsitzende die Jahresversammlung, mit herzlichem Händedruck trennte man sich allseits und mit den Mittagszügen verließen bereits einzelne Mitglieder Berlin. Auf Wiedersehen im nächsten Frühjahre in Braunschweig!

Berlin. Hermann Schalow.

Etwas über Dompfaffenzucht.

Da mir bisher über die Züchtung von Dompfaffen ausführliche Mittheilungen noch nicht zu Gesicht gekommen sind, und vielleicht andere Vogelfreunde sich in gleicher Lage befinden, so halte ich es nicht für ganz müßig, die Erfahrungen, die ich in Bezug auf die Dompfaffenzucht jetzt gemacht habe, mitzutheilen.

Im Herbst v. J. schaffte ich neben andern inländischen Körnerfressern auch ein Paar Dompfaffen an und brachte dieselben in die gemeinschaftliche Voliere, zu welcher ich einen Theil meines Zimmers verwendet habe. Den ganzen Winter über bis in das Frühjahr hinein habe ich zwischen dem Pärchen nicht die geringste Zuneigung wahrgenommen; von da ab bemerkte ich indessen, daß es sich mehr als früher beisammenhielt, ohne daß es jedoch den Anschein hatte, als ob ein innigeres Verhältniß zu Stande kommen sollte.

Als ich Ende Juli aus dem Bade zurückkehrte, fand ich die Dompfaffen nistend vor. Sie hatten in einer Höhe von noch nicht 3 Fuß ein von einem Kanarienweibchen in einem Büschel Rehhaide, mit der ich die Wände der Voliere bekleidet habe, gebautes und wieder verlassenes Nest als Brutstätte erwählt. In dem Neste befanden sich 5 Eier, welche von dem Weibchen eifrig gebrütet wurden. Anfangs August kamen 4 Junge aus, während ein Ei nicht befruchtet war.

Trotzdem sich in der Voliere das verschiedenartigste Körnerfutter, Quellfutter mit Semmel, Eifutter und anderes Weichfutter befand, ich auch dem alten Männchen, welches sich dem Fütterungs-Geschäft mit großem Eifer hingab, vielfach Mehlwürmer verabreichte, so starben doch die Jungen kurz nach einander, so daß das längstlebende nur 8 Tage alt wurde. Die Trauer über den Familien-Verlust währte indessen nicht lange. Bereits nach einigen Tagen schickte sich das Paar zu neuer Brut an. Diesmal wählte das Weibchen einen Rehhaide-Büschel ziemlich an der Decke des Zimmers, da aber hier kein Kanarienweibchen so freundlich gewesen war, die Brutstätte vorzubereiten, so war guter Rath theuer. Es trug sich zwar das Weibchen mit Stengeln herum und suchte dieselben in dem Büschel zurechtzulegen, aber es wurde nichts daraus. Dabei hielt es sich manchmal in dem Büschel eine Zeit lang in der unglückseligsten Stellung und that, als ob es im Neste säße. Etwa am dritten Tage, nachdem ich dieses Gebahren wahrgenommen, fand ich ein zerbrochenes Ei am Boden der Voliere vor, welches das Weibchen von oben hatte herabfallen lassen. Ich nahm nun gleich ein Korbnestchen, in welchem sich ein angefangenes Nest von Cocusfasern befand und befestigte dasselbe in dem Büschel. Mit Freuden wurde das Nest sofort angenommen und ohne daß das noch Geringste, etwa durch Ausfüttern oder sonst was, an demselben geschah, wurden 5 Eier hineingelegt. Am 6. September schlüpften 5 Junge aus, von denen gleich in den ersten Tagen eins starb; wahrscheinlich war es bei der nicht ganz ausreichenden Größe des Nestes von den andern unterdrückt worden. Es wurde von den Alten aus dem Neste entfernt. Die anderen Jungen entwickelten sich in den ersten 8 Tagen ziemlich langsam, um so schneller aber, nachdem sie sehen gelernt hatten, was am 10. Tage nach dem Auskriechen geschah. Am 16. Tage verließen sie bereits das Nest. Ein Junges war schon vorher durch Unvorsichtigkeit aus demselben herausgekommen und trieb sich am Boden der Voliere umher, es wurde jedoch nicht verlassen und ist, zwar langsamer als die anderen, jedoch ebenso groß geworden als diese. Obwol sie jetzt völlig ausgewachsen sind und allein fressen, haben sie die Fütterung durch die Mutter noch gerne. Das alte Männchen ist vor 14 Tagen entwischt. Bei der Fütterung sind die Jungen laut und wenden den Kopf nach Art der jungen Finken hin und her. Soweit ich die Geschlechter der Jungen beurtheile, sind es zwei Männchen und zwei Weibchen.

Die von anderen Züchtern gemachte Wahrnehmung, daß die Bruten der Dompfaffen häufig

dadurch verunglücken, daß das Männchen ungeduldig wird und dem Weibchen keine Ruhe läßt, habe ich bei mir nicht bestätigt gefunden. Weder in der ersten noch in der zweiten Brut ist das Weibchen, welches stets allein brütet, in dem Brutgeschäft gestört worden. Solange die Jungen noch klein waren und der Mutterwärme bedurften, fütterte das Männchen ganz allein. Bei seiner Annäherung erhob sich das Weibchen und ließ sich nach Beendigung des Futtergeschäfts wieder nieder. Nur wenn es selbst zu Futter ging, brachte es den Jungen eine Mahlzeit mit zurück. Als die Jungen von dem Weibchen gar nicht mehr bedeckt wurden, fütterten beide Alten gemeinschaftlich und zwar immer gleichzeitig, wobei sie zugleich den Unrath der Jungen in dem Schnabel mit fortnahmen.

Mit großer Vorliebe wurde bei der zweiten Brut — bei der ersten hatte ich ihn nicht geboten — der Samen von der Sonnenblume zur Fütterung verwandt; daneben Mohn, Grünkraut und Mehlwürmer. Quell- und Eifutter wurde gar nicht berührt, wol aber das Weichfutter der Nachtigal, und zwar wurde zu jeder Fütterung von Allem etwas genommen.

Auffallend bei diesem Züchtungsversuch bleibt der Umstand, daß die Vögel sich erst in so später Jahreszeit zur Brut entschlossen haben, während sie doch den Winter über genugsam Gelegenheit gehabt hatten, sich kennen zu lernen, um gleich im Frühjahr zur Brut gerüstet zu sein. Nicht minder auffallend ist es, daß die Mauser dem Paar keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Dieselbe ist jetzt beim alten Weibchen eingetreten, das entwichene Männchen aber, welches sich seit seinem Entkommen in benachbarten Gärten umhertreibt, befindet sich jetzt noch im schönsten Schmuck und hat nicht gemausert, so lange es in meinem Besitz gewesen ist.

Roßlau. E. Poetsch.

Der „Akklimatisations-Verein" in Cincinnati.

(Ohio).

Derselbe entwickelt eine lobenswerthe Thätigkeit in dem Import europäischer, namentlich aber deutscher Singvögel und Insektenvertilger nach Amerika. Die letzte von ihm aus Deutschland bezogene Sendung Vögel zählte 1500 Stück und umfaßte die bekanntesten und beliebtesten Garten- und Waldvögel, wie Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehlchen, Bachstelzen, verschiedene Drosselarten, Schwarzamseln, Staare, Buchfinken, Distelfinken, Grünlinge, Zeisige, Hänflinge, Dompfaffen, Sperlinge, Meisen, Kreuzschnäbel, Kernbeißer u. a. In New-Orleans ist man im Begriff, einen ähnlichen Verein zu gründen. Der Cincinnati-Verein hat schon anerkennenswerthe Erfolge erzielt.

Zur Nahrungsweise des grauen Reihers.

Es ist allerdings schon lange bekannt, daß die Reiher mancher Gegenden nicht allein vom Fischfang leben, sondern namentlich im Herbst sehr viele Feldmäuse verschlingen, weshalb dieselben in mäusereichen Jahren, dem Landwirth sehr nützlich werden können. So giebt es hier in dem Weiberthal einen kleinen Reiherstand, dessen Insassen regelmäßig die Felder nach Mäusen absuchten, daher natürlich auch manches junge Häslein oder Rebhuhn, Feldlerche u. a. mit verschlingen. Weniger bekannt dürfte dagegen ihre Liebhaberei für Kerbthiere sein. So habe ich dieser Tage einen jungen Reiher erhalten, welcher seinen Magen gestopft voll von kleinen Heuschrecken (mehrere Hundert an der Zahl) nebst zwei Feldmäusen hatte. Wir sehen aus dieser Thatsache, daß unter Umständen auch solche gemeinschädliche Fischreiher der Landwirthschaft von Nutzen sein können, obwol ich denselben dadurch das Wort nicht reden will. Es richtet sich hier wie in so vielen andern Fällen die Nutzbarkeit eines Thieres sehr nach den örtlichen Verhältnissen, wie z. B. die Nutzbarkeit der Staare für reine Getreideländer von unverkennbarem Werthe ist, so sind dieselben in den Weinberggegenden zur Herbstzeit entschieden sehr schädlich. In hiesiger Gegend, wo alle günstigen Lagen zum Weinbau benutzt werden und wo es in allen Gärten in und um die Stadt eine große Menge Amseln giebt, welche die Lieblinge des Publikums sind, ziehen diese gegenwärtig in die Weinberge und zerhacken die Trauben sehr. Dieser Umstand macht dem Weingärtner diese Vögel so verhaßt, und während sie im Winter fast von Jedermann gefuttert werden, werden sie jetzt in großer Menge von den Weinbergbesitzern todtgeschossen. So kreuzen sich leider die individuellen Interessen mit denjenigen der freien Natur und es ist sehr schwer zu beweisen, ob der Schaden an den Trauben den viel länger andauernden Nutzen dieser Vögel während der übrigen Jahreszeit wirklich überbietet oder nicht.

Stuttgart im Septbr. M.

Mittel gegen das Ungeziefer der Vögel.

Als ein ausgezeichnetes Mittel zur Vertreibung der Vogelmilben u. dgl. hat sich das äußerliche und innerliche Anspritzen der Vogelkäfige mit Benzin bewährt, worauf etwas Insektenpulver eingestreut wurde. Ich ließ mir hierzu eine Spritze mit einigen ganz kleinen Oeffnungen anfertigen und nahm die Reinigung vor, während sich die Vögel im Käfige befanden. Kürschner in Bamberg.

Zur Brieftauben-Liebhaberei.

Am verflossenen Sonntage fand der Schluß der in diesem Jahre von den Kölner Vereinen mit ihren Brieftauben veranstalteten Preisfliegen statt.

Seitens des Vereins „Germania" wurden am besagten Tage 11¾ Uhr Vormittags in Lüttich 64 junge Tauben aufgelassen, wovon mehrere nach Verlauf von ungefähr zwei Stunden ihre Heimath wieder erreichten. Die ausgesetzten Prämien erhielten die Herren Kaspar Pranghe, Anton Floßdoorf und Karl Menges. Obgleich bei sämmtlichen diesjährigen Wettflügen die Tauben von Berlin, München und Paris gleich gut zurückkehrten, herrscht unter den Liebhabern doch die jedenfalls richtige Ansicht, daß die Thiere besser, das heißt schneller von Westen als aus jeder anderen Richtung wiederkehren, weil nämlich bei dem im Sommer meist herrschenden Westwinde der Flug der Tauben durch diesen unterstützt wird. Im nächsten Jahre soll daher von den Vereinen „Columbia", „Germania", „Union" und „Concordia" bei den mit ihren Tauben vorzunehmenden Touren die Westrichtung eingeschlagen und ein General-Concurs von Tours aus veranstaltet werden.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Heute einige Mittheilungen aus meiner Vogelstube. Zuerst erfreute mich das Pärchen Nymphen mit einer Brut. Die Vögel waren so vorsichtig zu derselben geschritten, daß ich es erst bemerkte, als sie bereits fest brüteten. Sie zogen drei Junge, sämmtlich Männchen, ohne Zwischenfälle glücklich groß, die bereits vor drei Wochen ausgeflogen sind. Eins davon verunglückte, nachdem es bereits ausgeflogen, die andern beiden erfreuen sich des besten Wohlseins. Nach diesen schritten die Wellensittiche zur Brut. Die beiden zuletzt erhaltenen Weibchen waren augenscheinlich längere Zeit zusammen eingewöhnt, sie futterten sich, bezogen einen Nistkasten und benahmen sich ganz wie ein Heckpärchen, jede Annäherung eines Männchens wurde eifersüchtig abgewiesen. Da, siehe, in der elften Stunde paarten sich beide mit demselben Männchen, legten an einem Tage in denselben Kasten und brachten ein Gelege von acht Eiern zu Stande, auf dem sie zusammen brüteten. Wahrscheinlich weil sie sich gegenseitig beim Brüten störten, kamen nur drei Junge aus, die gestern schon auf der Flugstange des Kästchens erschienen. Mein altes Weibchen, das mich zwei Jahre hat vergeblich warten lassen, legte nun auch 5 Eier und hat jetzt vier etwa 14 Tage alte Junge, die es sorgfältig erzieht. Das vierte und letzte Weibchen, das ich Ostern erhielt, hat nicht geheckt, obgleich es mit einem Männchen gepart und prachtvoll im Gefieder ist. Immerhin aber habe ich doch die Freude gehabt, bis jetzt im Ganzen 10 Papageien, nämlich 3 Nymphen und 7 Wellensittiche zu züchten.

. . . Beim Herrn von Kalkreuth auf Weißensee, 1½ Meilen von hier, wurde vor einigen Wochen ein Rebhuhnnest ausgemäht. Die Schnitter fingen das brütende Weibchen und brachten es mit den hochbebrüteten Eiern zu ihrem Herrn. Man machte in einem Deckelkorbe ein Nest zurecht, setzte das Weibchen mit seinen Eiern hinein und schloß den Deckel. Gegen alles Erwarten blieb das Huhn, ohne Nahrung zu nehmen, fest auf dem Gelege sitzen, nach zwei Tagen kamen 14 Junge aus, und nun erst regte sich in der Alten der Freiheitstrieb, sie fing in dem Korbe an zu toben. Man trug sie mit ihren Jungen auf das Feld und gab ihr sammt diesen die wohlverdiente Freiheit. Die Kleinen, die später wiederholt gesehen worden sind, gedeihen unter der Pflege ihrer Mutter trefflich.

R. Genschen, Pfarrer in Gleißen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Apotheker A. Schuster in Rössel: Das Alter der Graupapageien ist an der Färbung der Augen und des Schwanzes zu erkennen. Junge Vögel haben schwarze Augen, ältere weißgelbe, und je voller gelb das Auge wird, desto älter ist der Vogel. Ebenso ist der Schwanz in der Jugend mattroth und wird mit dem zunehmenden Alter immer kräftiger und schöner gefärbt. — Ihr Gedicht wollen Sie an irgend eine der Thierschutz-Zeitungen senden, und unter denselben kann ich Ihnen die „Zeitschrift des Thierschutz-Vereins für das Großherzogthum Hessen" bestens empfehlen. — Eine Handlung, welche verzinnten Eisendraht für Vogelbauer preiswürdig versendet, wird sich auf diese Anfrage hoffentlich melden.

Frage. Bei dem Umbau eines industriellen Etablissements, welches 3 Jahre außer Betrieb gewesen war, fanden die Maurer unten im Fabrikschornstein eine große Masse Schwalbenleichen, zwei Viertelkörbe voll. Es war deutlich zu erkennen, daß ein Theil seit vorigem Jahr darin gelegen haben mußte, ein anderer Theil erst in diesem Jahr verunglückt sein konnte.

Durch welchen unglücklichen Zufall konnte eine solche Anzahl dieser Vögelchen in dem Schornstein seinen Tod finden?

Mein Urtheil darüber habe ich mir gebildet, möchte aber erst die Ansicht Anderer darüber hören.

Wilhelm Hilbert sen.

Frage. Bitte mir die Adresse, wo Eierbrot zu bekommen ist, nebst Gebrauchsanweisung anzugeben.

Ein Abonnent.

Antwort. Bereits mehrfach haben wir hier darauf hingewiesen, daß das vorzügliche Eierbrot aus Halle a. S. von Herrn Bäckermeister E. Krone, Leipzigerstraße zu beziehen ist. In Betreff des Gebrauchs sei Folgendes bemerkt. Ein Gemisch aus getrockneten und dann aufgequellten Ameisenpuppen, darüber Eierbrot gerieben, ist ein vorzügliches Hülfsmittel zur Aufzucht der jungen Prachtfinken u. a. Finkenvögel. Setzt man noch geriebene Mören und Mehl von blauem Mohn hinzu, so ist es ein treffliches Futter für Wurmvögel. In Wasser eingeweicht und gut ausgedrückt fressen es alle Prachtfinken, Weber-, Witwen- und andere Finkenvögel, sowie Papageien und besonders auch die Sonnenvögel, Tangaren u. a. sehr gern und erhalten sich dabei sehr gut.

Frage. Welche Anleitung zur Fasanenzucht halten Sie für die beste.

J. F. Engelhard in Nürnberg.

Antwort. Die in Nr. 30 d. J. empfohlene Schrift „Die Fasanenzucht" vom Oberförster Gödde (Berlin, Wiegandt, Hempel und Parey) ist durchaus empfehlenswerth.

Verflogene Brieftaube.

Vor etwa fünf Wochen wurde hierselbst am sog. Weinberge eine Taube, welche ganz matt und an einem Beine blutend heruntergefallen war, aufgefunden. Es ist zweifelhaft, ob die Verwundung durch einen Schuß oder durch Streifen an einem scharfen Gegenstande verursacht wurde. Bei genauer Betrachtung fand man unter einer Schwanzfeder ein Röllchen Papier, das der Finder aus Unkenntniß und Interesselosigkeit leider hat abhanden kommen lassen, ohne es untersucht zu haben. Einige Zeit nachher wurde mir die Taube geschenkt. Sie ist von weißer Farbe, ohne Abzeichen, glattköpfig und mit Glasaugen wie ein ächter Tümmler. Der Stempel der Schwanzfeder, an welche das Röllchen Papier befestigt war und welche ich der Redaktion übersende, findet sich auch unter den Flügelfedern. Da der Stempel sehr undeutlich ist, so gelang es bis jetzt nicht, denselben zu entziffern.*)

*) Auch wir vermögen denselben nicht zu enträthseln. Es ist eiförmig, in der Größe nahezu eines Taubeneies, innen mit Schrift oder Wappen ꝛc. und dieses mit einem Rande umgeben, zwischen welchem ein ziemlich weiter Raum freigeblieben. Aufgetragen ist er mit Oelfarbe. Die Depesche war mit schwarzem Hanffaden durch die Feder genäht. D. R.

Da mich nun die Sache sehr interressirt, so erlaube ich mir hiermit Nachfrage zu thun, ob vielleicht der Stempel beifolgender Feder irgend einem Brieftaubenverein eigen ist

F. Maltz, Federschmücker in Kassel.

Zur Abwehr*).

Kürzlich erhielt ich von befreundeter Seite eine Postkarte des Inhalts, daß mich Herr R. Maschke in seiner Schrift „Der Harzer Kanarienvogel", Seite 6, mitgenommen habe, und ob ich dazu schweigen werde. Ich habe hieraus Veranlassung genommen, das erwähnte Werkchen zu bestellen; bevor ich in den Besitz desselben gelangte, war der Herr Herausgeber der „Gefiederten Welt" bereits für mich eingetreten und hatte die mir Seitens des Herrn Maschke gemachten Vorwürfe als ganz entschieden nicht zutreffend zurückgewiesen. Gewiß würde ich diese Angelegenheit als abgemacht betrachten, wenn ich nicht annehmen müßte, daß die freundlichen Leser, welche sich im Besitze jener Schrift befinden und daher die Tragweite der gegen mich erhobenen Beschuldigung kennen, eine persönliche Entgegnung von meiner Seite erwarteten. Es möge mir daher gestattet sein, einige Worte zur Abwehr hier folgen zu lassen; ich werde mich dabei kurz fassen, da auch ich gleich dem Herausgeber dieses Blattes der Ansicht bin, daß dergleichen unerquickliche Reibereien nach Möglichkeit vermieden werden müssen. — Die fragliche Stelle in der Maschke'schen Schrift lautet wörtlich:

„Vielfach wird in neuerer Zeit versucht, den Werth der hiesigen Vögel herabzusetzen. Es thun dies gewöhnlich Leute, die ihr pekuniäres Interesse dabei haben; einestheils Solche**) die, außerhalb des Harzes wohnhaft, Kanarien-Vögel züchten, kaufen und verkaufen und auf sich die Aufmerksamkeit lenken wollen; anderntheils sind es Großhändler, die nach andern Erdtheilen importiren und denen daran liegt, die Vögel so billig als möglich hier zu kaufen. Wodurch ist der Kaufpreis einer Waare wol leichter herabzudrücken, als indem man ihren Werth öffentlich bemängelt!"

Man muß gestehen, Herr Maschke läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig; hätte er es nur ebenso genau mit der Wahrheit genommen, so würde er sich haben sagen müssen, daß meine Berichte in der „Gefiederten Welt" — und für ein anderes Blatt habe ich nicht geschrieben — auch nicht im Entferntesten einen Anhalt für eine so gehässige Verdächtigung geben können. Dieselbe des Weitern zu widerlegen, werden mir die geehrten Leser dieses Blattes sicher nicht zumuthen; ich bin gewiß, daß ihr gesundes Urtheil, ihr Sinn für Wahrheit und Recht auch ohne dies die Herzensergießung des Herrn Maschke nach Verdienst würdigen wird. —

Für diejenigen Leser aber, die keine Gelegenheit gehabt haben, eine Reise nach Andreasberg zu machen, möchte ich hier wiederholt bemerken, daß die Preise der dort gezüchteten Vögel, guter wie geringer, mit der Zeit stetig gestiegen sind, und daß dies ganz besonders der Fall ist, so lange die „Gefiederte Welt" die Aufmerksamkeit ihrer Leser auf die hohe Bedeutung der Harzer Kanarienzüchtereien gelenkt hat. Stämme, die vor 12 Jahren noch 1 Thlr. 10 Sgr. kosteten, werden jetzt mit 3 Thlr. bezahlt. Die Nachzucht aus den bessern Stämmen ist, Dank der regen Nachfrage, bereits zu einer Zeit in festen Händen, wo sie noch gar nicht existirt; die Händler, die durchgehends vorzügliche Kenner sind und wenig nach Zeitungs-Berichten fragen, bestimmen den Werth der künftigen Nachzucht nach den abgehörten Zuchthähnen. Warum nun die Klagen des Herrn Maschke über Bedrückung der Preise? warum die feindliche Gesinnung gegen „die Großhändler, die nach anderen Erdtheilen importiren?" Von diesen Großhändlern hat sich übrigens nur einer über die Harzer Kanarienvögel öffentlich ausgelassen; wen*) Herr Maschke mit seinen Angriffen treffen will und welchen Aufsatz er dabei im Auge hat, werden die Leser unschwer errathen. Jene Darstellung aber und insbesondere die männlich offene Erklärung des Herrn Verfassers, warum die Harzer Kanarien im Laufe der Zeit im Gesange zurückgegangen, hat sicherlich ihres guten Eindrucks nicht verfehlt; ganz unzweifelhaft aber ist es, daß grade Herrn Reiche die Kanarienzüchter in Andreasberg viel zu verdanken haben, da in erster Linie seine Nachfrage als die Ursache des steten Steigens der Preise ihrer Zucht angesehen werden muß. —

Noch Weiteres zu erwidern, wäre wirklich unnütz. Allein im Interesse der Sache sei es gestattet, noch einige Stellen der Maschkeschen Schrift zur Steuer der Wahrheit und der gedeihlichen Zucht der Harzer Kanarien zu widerlegen. Es heißt darin:

1. Seite 9. „Betrügerische Händler haben schon lange, obwol sie wissen, daß sie es, ohne unwahr zu sein, nicht dürften, ihren Harzer Vögeln die Bezeichnung „Nachtigalschläger" gegeben und wol gar behauptet, eine Nachtigal sei ihre Lehrmeisterin gewesen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, daß erwähnte Bezeichnung keinem Harzer Vogel zukommt; der Gesang unserer Vögel besteht fast durchweg aus Rollen, d. h. Trillern, und die Flötentouren, die denen der Nachtigal einigermaßen ähnlich, sind verhältnißmäßig selten und von Kennern weniger gesucht."

Es folgt nun eine Erörterung, warum es sehr schwer sei, Vögel zu ziehen, welche die erwähnte Bezeichnung verdienen und die, d. h. nach der Meinung des Herrn Verfassers, von der Nachtigal im Gesange ausgebildet seien; dieses beweist aber nichts für die behauptete betrügerische Absicht der Händler.

Die Bezeichnung „Nachtigalschläger" ist bei den Andreasberger Züchtern nicht gebräuchlich; auch Herr Maschke kennt sie nicht. Im Uebrigen aber weiß ein Jeder, der mit dem Gesange der Harzer Kanarien näher vertraut ist, daß man unter Nachtigalschlägern keine von der Nachtigal ausgebildeten Sänger, sondern Gluckvögel, d. h. Vögel mit vorherrschenden Glucker- und Flötentouren versteht. Derartige Vögel giebt es auch in Andreasberg, und die jetzt verstorbene Händlerin, Frau Dolitzel von dort, die man sicher nicht zu den betrügerischen Händlern zählen darf, führte dieselben unter der nicht unpassenden Bezeichnung Nachtigalschläger ein. Diese ist wahrscheinlich keine Erfindung der Händler, das kauflustige Publikum selbst scheint, nach den Aeußerungen zu urtheilen, die von ihm im Allgemeinen über den Gesang der Harzer gemacht werden, den Ausdruck erfunden zu haben und die Vogelhändler hätten ihn somit statt der weniger deutlichen Bezeichnung „Gluckvögel" angenommen.

2. Seite 29. Tadelt Herr Maschke — allerdings mit Recht — den oft von reisenden Händlern verübten Betrug, in Folge dessen der Käufer statt eines Männchens ein Weibchen erhält; er fährt dann wörtlich fort:

*) Der Herausgeber der „Gefiederten Welt" machte es sich von vornherein zum Gesetz, die Leser vor allen persönlichen Erörterungen, unerquicklichen Streitigkeiten u. dgl. möglichst zu bewahren. Die ihm selber, aus Skandalsucht vornehmlich aber aus Rivalität und Brotneid entgegengetretenen gehässigen Angriffe ließ er unbeachtet und zwar einerseits aus Rücksicht für die Leser und im Interesse der Sache, um zu vermeiden, daß die Liebhaberei sowol als auch die Wissenschaft Ornithologie durch Zank und Streit in den Augen der Gebildeten nicht widerwärtig erscheinen; andererseits aber in der Einsicht, daß solche Rohheiten als ein Schmutzfleck der betreffenden Literatur, doch nur auf den Urheber und seine Schriften selber zurückfallen. Die Zeit hat es gezeigt, daß z. B. der Berliner Vogelpapst früher seine Unfehlbarkeit, seinen Halt — und damit seine Freunde verloren, als er es sich träumen gelassen.

In dieser Einsicht und auf solchen Erfahrungen fußend, glaubten wir im eigenen Interesse unsers geschätzten Mitarbeiters, des Herrn Böcker, zu handeln, wenn wir die Aufnahme der folgenden Vertheidigung ablehnten, zumal wir unsere redaktionelle Abwehr für ausreichend erachteten. Allein die zahlreichen Freunde des Herrn B. verlangen auch eine persönliche Entgegnung und somit müssen wir dem Andringen nachgeben, indem wir die Leser dieses Ausnahmefalls wegen um Nachsicht bitten. D. R.

**) (Wie Controleur Böcker. Es ist auffällig, daß hiesige Vögel, oder der Handel mit ihnen in seinen Aufsätzen stets einen Hieb abbekommen. Weshalb kauft dieser Herr nur am hiesigen Orte Vögel, wenn seine selbstgezüchteten die unsern so weit überragen?)

*) Herr C. Reiche in Alfeld steht so hochgeachtet und allgemein bekannt als ein rechtschaffener und ehrenwerther Mann da, daß es gar nicht der Mühe verlohnt, auf solche unbedachten Redensarten zu antworten. D. R.

„Ein reeller Kauf ist nur allein bei fest ansäßigen Händlern zu machen, auch schon deshalb, weil sie den Vögeln eine viel bessere Pflege angedeihen lassen können, als die reisenden."

Da Herr Maschke in Andreasberg „fest ansäßig" ist, so hätte er, meine ich, besser gethan, diesen weit gehenden Schluß zu unterlassen. Das kauflustige Publikum wird sich zwar dadurch nicht beirren lassen, und wo es einen guten Vogel bei den reisenden Händlern hört, denselben zu schätzen wissen. Was werden aber die reisenden Händler zu solchen Behauptungen sagen, namentlich diejenigen, die Köln und die benachbarten größern Städte besuchen, und von denen einer wenigstens im Besitze der besten Stämme ist? Und was die „bessere Verpflegung" anbelangt, so glaube ich kaum, daß die Vögel irgendwo besser verpflegt werden, wie eben bei diesen Händlern.

Das Wahre an der Sache beschränkt sich darauf, daß es manchem reisenden Händler an dem erforderlichen Betriebskapital fehlt und er sich daher mit geringern Stämmen begnügen lassen muß, daher er Kenner eines guten Gesangs nicht befriedigen kann.

3. Seite 30, spricht sich Herr Maschke lobend über die „in den letzten Jahren ins Leben getretenen Vereine" aus. „Sie sollen ja auch den Zweck haben, der Thierquälerei, durch Mittheilung der bei den verschiedenen Vogelarten gemachten Erfahrungen und Schilderung ihrer Vorzüge, Schranken zu setzen." Er fährt demnächst wörtlich fort:

„Es giebt aber auch Vereine, die nicht nur dies, sondern auch gewerbliche Zwecke verfolgen, die besonders in der Art und Weise, wie sie ihre Kanarienvögel anpreisen, deutlich anzeigen, daß es ihnen weniger um die Hebung und Verbesserung der Kanarienzucht, als vielmehr um vortheilhaftes Unterbringen ihrer Vögel zu thun ist."

„Die Ausstellungen, die die Vogelzuchtvereine veranstalten, tragen sicher auch sehr viel zum Bekanntwerden der Vögel bei. Ob aber der Harzer Kanarienvogel dahin gehört, ist eine andere Frage."

„Wie vielfach werden die Ausstellungen benutzt, um Gelegenheit zu bekommen, dabei die Ehre oder den Vortheil eines prämiirten Vogels zu erhaschen! Auf das Conto eines prämiirten Vogels lassen sich ja später eine ganze Masse anderer sehr gut verkaufen."

Wenn man diese Sätze liest, so möchte man sich fast versucht fühlen, Herrn Maschke gegen seine eigenen Aeußerungen in Schutz zu nehmen; hat er doch selbst in einer seiner nicht gerade selten vorkommenden Annoncen, Seite 190 der „Gefiederten Welt" vom vorigen Jahre, deutlich darauf hingewiesen, daß einzelne Vögel seiner Stämme auf Ausstellungen prämiirt worden seien!

Daß Vereine vorherrschend zu dem Zwecke ins Leben gerufen worden, um die gezüchteten Vögel vortheilhaft unterzubringen, wird wol Niemand, Herrn Maschke allenfalls ausgenommen, glauben, und wenn dem wirklich so wäre, so müßte man immer noch zugestehen, daß die Züchtung der Harzer Kanarien ohne entsprechenden Absatz der Nachzucht auf die Dauer unmöglich wird. Vereine repräsentiren in der Gesammtzahl ihrer Mitglieder eine größere Intelligenz, mehr Kenntniß der Bezugs- und Abzugsquellen und ein größeres Betriebs-Kapital, als der einzelne Liebhaber und Züchter, und es erscheint daher nur natürlich, wenn sich solche Vereine bilden, die blos die Zucht der Harzer Kanarien, deren An- und Verkauf zum Gegenstande haben.

Ich bin nun zwar selbst der Ansicht, daß die Ausstellung der besseren Harzer Kanarien mit mancher Gefahr für den Eigenthümer verbunden sei; wenn dieser sie aber freiwillig übernehmen will, so meine ich, könnte man ihm nur um so mehr dafür dankbar sein. Dieserhalb gleich auf unberechtigte Ehrsucht oder auf eine eigennützige Absicht desselben zu schließen, möchte doch bedenklich sein.

Wie stimmen alle diese Aeußerungen des Herrn Verfassers mit dem ersten Satze seines „Vorworts", daß es nicht in seiner Absicht liege, in seiner „kleinen Schrift ein Seitenstück zu theoretischen, den Kern der Sache aber wenig berührenden Abhandlungen über den Kanarienvogel zu liefern"? Kann sich der Herr Verfasser irgend einen ihm günstigen Erfolg davon versprechen?

Es ist wol nicht zu bezweifeln, daß die vermehrte Züchtung der Harzer Kanarien, sei es in- oder außerhalb des Harzes, wiederum eine stärkere Nachfrage nach guten Vögeln zur Folge hat. Wie mancher Züchter zahlte nicht gern einen hohen Preis für einen oder einige gute Vorschläger, wenn er sie nur zur rechten Zeit bekommen könnte! Und wie klein ist im Grunde noch die Zahl der Liebhaber und Kenner der Harzer Kanarien! Giebt es nicht große Strecken, in denen kein einziger Harzer anzutreffen ist?

Auf der anderen Seite ist wiederum die Zahl wirklich guter, fehlerfreier Vögel so gering, daß es oft schwer hält, jeden Kenner zu befriedigen. Ich meine daher, Konkurrenzbefürchtungen seien unter den Händlern und Züchtern der Harzer Kanarien nicht am Platze, es müßte vielmehr deren Sorge sein, Alles aufzubieten, um die Zahl guter Sänger zu vermehren, und bei solchem Streben müßte ein freundschaftliches Zusammenwirken unter ihnen fast zur Nothwendigkeit werden.

Wetzlar. W. Böcker, Kontroleur.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

(Ohne Verantwortlichkeit der Redaktion).

Vogelhandlung
von
Joseph Zuckerkandel,
Dresden, Wallstraße 8. I.
empfiehlt ein wohlassortirtes Lager exotischer Vögel, franz. Kanarien und die allgemein bekannten und renommirten fehlerlosen reinen Kanarienvögel eigener Zucht, als Glucker, Hohlroller, Klingelroller mit Knurren, Roller mit jammernden Touren, ebenso beste reinste Zuchten Harzer Kanarienvögel. [642]

Harzer Kanarienvögel. [643]
Post-Versandt garantirt laut Preis-Courant.
R. Maschke, St. Andreasberg im Harz.

Vorzüglich schöne, gut getrocknete Ameiseneier empfiehlt
Franz Aumeyer in Linz a/d. Donau,
[644] Landstraße 55.

Zwei Möpse, Männchen, 1½ Jahr alt, zwei dergl., Männchen und Weibchen, ½ Jahr alt, zwei Löwen-Spitze, Pärchen, verkauft
[645] **Franz Taatz,** Halle a. S.

Einen **Beo-Beo** (Eulabes religiosa), Pracht-Exemplar, ganz zahm, auf einer der ersten diesjährigen Ausstellungen mit dem I. Preis prämiirt, ist zu verkaufen.
Reflektanten belieben sich an **A. Hörster** in Cassel zu wenden. [646]

Kanarienhähnchen sind zum Verkauf, à Stck. 3 Thlr., bei dem Vogelzüchter
Martin Dippe,
[647] Quedlinburg, Neuweg Nr. 3.

Italien. Hühner, 4 Monat alt, à 22½ Sgr., Wellenpapageien, 4—6 Monat alt, à Paar 5 Thlr., hat abzugeben
[648] **M. Bischkopff** in Wiesbaden.

Ich offerire noch:
2 Paar vollständig ausgewachsene junge Goldfasanen à Paar Thlr. 12.,
3 à 4 do. einzelne Hennen, Thlr. 8½., 3 Stück zusammen Thlr. 24.,
1 Paar jüngere Goldfasanen, ¾ ausgewachsen, 10 Thlr.,
4 Paar kalifornische Wachteln, à Thlr. 8.,
alles inclusive Emballage.
Dann suche ich:
3 Weibchen von grünen Astrilds oder Bengalisten.
[649] **Oscar Vetter**, Ludwigsburg.

Ein hübscher neuer **Flugkäfig**, vorne vergittert, 1,90 Meter lang, 0,60 Meter tief, 1,00 Meter hoch, mit 3 Schubladen, 3 Thürchen und Vorrichtung, um denselben nach Belieben durch Einschieben von Zwischenwänden in 3 Räume zu theilen, ist für 20 Thlr. verkäuflich und besonders für Wellensittich-Zucht zu empfehlen.
[650] **Oscar Vetter**, Ludwigsburg.

---

3 Paar Königsfasanen, Vénérée, 1874, so kräftig wie alte, 2 Hähne, nämliche,
3 Paar Lady Amherst, ½ Blut, 1874, so kräftig wie alte, 2 Hähne, nämliche,
50 Stück Goldfasanen, 1874,
10 Paar Egyptische Mövchen 1. Ranges sind abzugeben bei
[651] **Donny-Sapin**, Gent (Belgien).

Auf meinem Speditionslager befinden sich 20 Centner I. Hanfsamen, die à Thlr. 8½ per Centner abgegeben werden, Prima blauen Mohnsamen à Thlr. 21, Leinsamen Thlr. 9½ pr. Centner bei
[652] **M. Schaller**, Wertheim a/M.

Wegen Aufgabe meines Lagers von Tauben verkaufe folgende billig aus:
25 Paar Tauben, zusammen 30 Thlr., bestehend in blauen engl. Kröpfern, Mövchen, deutschen, englischen und französischen Kropftauben, Pfautauben, roth, blau mit weißen Schwänzen ꝛc. Der Preis ist so billig, daß man sie schlachten könnte. Ferner Hühner:
1 Stamm Jokohama, 15 Thlr.,
1 „ weiße Bakies, 10 Thlr.,
1 „ schwarze Kochin, 25 Thlr.,
1 Hahn helle Brahmas, 6 Thlr.,
1 Paar pommersche Gänse, 6 Thlr.,
1 blaue schwedische Ente, 2 Thlr.,
1 weiße haubige Ente, 1 Thlr.,
3 gelbe Kochin-Hennen, 10 Thlr.,
2 Houdan-Hennen, 10 Thlr.
Sämmtliches Geflügel ist gesund, tadellos und kostet mich 3 Mal mehr im Einkauf.
[653] **E. Geupel-White.**

Toulouser Riesengänse

von ganz besonderer Vollkommenheit importirt direkt
zu Fr. 45—50 für Maibrut,
„ „ 60—70 „ Februarbrut,
„ „ 80—100 „ Extra-Auswahl
pro Paar, franco Zürich mit Garantie gesunder Ankunft
A. Rumpf
[654] in Außersihl-Zürich.

Ein schöner gelehriger und gut sprechender **Graupapagei**, schon mehrere Jahre in Europa, ist nebst Käfig zum Preise von 50 Thlr. zu verkaufen. Eigenthümer durch d. Bl. zu erfragen. [655]

Eine prachtvolle

Hatzrüde (Hund)

seltener Schönheit, von gelber Farbe (Falbe), ohne sonstiges Abzeichen, 5 Jahre alt, vorzügliche Eigenschaften, mit Doppelnase, durchaus nicht bösartig, von ausgezeichneter Güte und Wachsamkeit, hat zu verkaufen
Georg Woerler,
[656] Flaschenhofstraße 32, Nürnberg.

Eine schöne systematisch nach Brahm geordnete ornithologische Sammlung, bestehend in ca. 1400 Exemplaren, ist unter sehr vortheilhaften Bedingungen zu verkaufen.
Bemerkt wird, daß die Vögel ganz rein und schön nach der Natur gestopft und in Glaskästen aufgestellt sind.
Kataloge werden auf Verlangen gratis zugesandt. Näheres bei **Georg Woerler**,
[657] Flaschenhofstraße 32, Nürnberg.

Russische 1874er Ameisen-Eier empfingen und empfehlen **Mey & Bengelsdorff**, Berlin. [658]

Harzer Kanarienvögel.

Mein Vorrath besteht fast durchweg aus St. Andreasberger Vögeln besten Stammes. Einen kleinen Posten gewöhnlicher Harzer Vögel gebe ich an Händler zu billigem Preise ab. Auch bei rauhestem Wetter geschieht der Postversandt unter Garantie gesunden Eintreffens bis auf 3tägige Entfernung. [659]
R. Maschke, St. Andreasberg im Harz.

Eine elegante Zimmer-Voliere mit Fontainen-Einrichtung ist billig abzugeben von **L. Amberg**, Luckau N/L. [660]

Gescheckte japanesische Mövchen,
Wellenpapageien,
Pfaffenfinken,
Sonnenvögel,
sämmtlich Junge meiner eigenen Zucht, sowie
Leopardenschlangen (Cölopol leopardinus),
Katzenschlangen (Ailuraphis vivax),
Sandvipern (Vip. ammodytes)
habe billig abzugeben. [661]
Agram, im October 1874.
M. Fiedler, Buchhändler.

Zwei sehr schöne

Bullterrière

Hündinnen, weiß mit gelber Kopfzeichnung, von der kleinsten Race, beide gut in der Zucht, mit Kindern ganz vertraut, werden wegen Nachzucht eines Männchens dieser Race à Thlr. 12. u. 14. abgegeben bei
Fr. Wälde, Stuttgart.
Derselbe sucht zu kaufen: weiße Kanarienvögel mit korallenrothen Augen, sogenannte Kakerlacken, und werden hierfür gute Preise bezahlt.
Unter Umständen werden obige Hunde auch gegen kleine Kanarienhähne vertauscht. [662]

C. Hagenbeck's Handelsmenagerie

Neuer Pferdemarkt 13, Hamburg,

[663] wünscht zu kaufen:
Kolkraben, Uhus, weiße Pfauen, weiße Schwäne, weißes und buntes Dammwild, sowie auch einen Dachs.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Großmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

III. Jahrgang. Berlin, den 29. Oktober 1874. Nr. 44.

Inhalt:

Die Dolchstichtauben der Frau Prinzessin Karl von Preußen. —
Bericht über die diesjährige Versteigerung in Antwerpen. —
Neue und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts: der Granatfink. —
Noch einmal Kapaunen. —
Ueber Fütterung der Kanarienvögel. —
Aus den Vereinen: Wien; Stettin. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.

Die Dolchstichtauben der Frau Prinzessin Karl von Preußen.

Von F. Lichterfeld.

Während des französischen Feldzugs lernte Prinz Karl auf dem Schlosse des Barons von Rothschild in Ferrières eine merkwürdige ausländische Taube kennen, nämlich die sogenannte Dolchstichtaube von den Philippinen, und er mag wol der Frau Prinzessin, deren Taubensammlung weithin berühmt ist, eine ebenso lebendige als zutreffende Schilderung von jener Narität und Kuriosität gemacht haben. Kurz, die Prinzessin setzte alle Hebel in Bewegung, um ein solches Taubenpaar zu erlangen; die Bemühungen waren nicht ohne Erfolg, denn sie ist jetzt Besitzerin eines Dolchstichtaubenpaares, das erste und einzige in Deutschland. Den auffallenden Namen führt die Taube von einem blutrothen Fleck auf weißer Brust, der einer Verwundung oder Bemalung so täuschend ähnlich sieht, daß es schwer fällt, ihn für natürliche Befiederung zu halten. Für die Objektivität dieser Anschauung spricht die französische Bezeichnung „Colombe coup de poignard“ und die spanische „Paloma de Punalada“, was mit der deutschen Uebersetzung „Dolchstichtaube“ identisch ist. Der wissenschaftliche Name war früher, so lange die Columbiden nur eine Gattung bildeten, Columba cruenta; seitdem man die Taubenfamilie aber in vielerlei Gattungen schied, heißt die Dolchstichtaube Phlogoenas oder Phlegoenas cruentata (von φλόξ Flamme oder φλέγω ich brenne und οἰνάς Weinstock: bei Aristoteles und Aelian eine wilde Taube von der Farbe der reifenden Trauben). Beide Bezeichnungen heißen auf Deutsch: die mit Blut befleckte Taube. Im Englischen heißt die Dolchstichtaube „bloodbreasted Pigeon“, also blutbrüstige Taube.

Es giebt eine weiße und eine graue Dolchstichtaube. Die erste Kunde über die weiße Dolchstichtaube rührt von dem Spanier Antonio de Morga her, der gegen das Ende des 16ten Jahrhunderts die Philippinen, Molukken, Siam, Cambodia, Japan und China bereiste. „Hier finden sich“, heißt es in dessen Bericht über die Philippinen, „verschiedene Tauben, Holztauben und andere von lebhaft grünem Gefieder, mit gefärbten Füßen und Schnäbeln; wieder andere sind weiß mit einem farbigen Fleck auf der Brust, wie beim Pelikan“, von dem bekanntlich die Sage ging, er reiße sich die Brust auf und fütere die Jungen mit seinem Blute. Einen zweiten Bericht über die Dolchstichtaube giebt der Pater Georg Camel, ein aus Mähren gebürtiger Jesuit, dessen Namen Linné in der Camelia verewigt hat. (Journal für Ornithologie von Dr. Cabanis, XIV. Jahrg. 1866, in der Vorbemerkung von Dr. v. Martens.) Der

Pater schickte im Beginn des vorigen Jahrhunderts Naturalien und handschriftliche Bemerkungen dazu von den Philippinen an James Petiver in London, welche dieser in den „Philosophical Transactions of the Roy. Zool. Soc." veröffentlichte, das die Vögel Betreffende unter dem Titel: „Georgii, Josephi Cameli Observationes de avibus Philippensibus" (Jahrg. 1702 u. 1703, Bd. 23, S. 1394 u. 1395). Das Verzeichniß des Paters enthält 71 Vogel-Specialitäten der Philippinen, die theils nur namentlich aufgeführt, theils mit kurzen Beschreibungen versehen sind. Ueber die Dolchstichtaube, welche er als Turtur Luzoniensis bezeichnet, äußert er sich irrthümlich dahin, daß nur das Weibchen jenen blutrothen, einer Wunde täuschend ähnlich sehenden Blutfleck auf der Brust trage. (Foemella in pectore plumas gerit Rosei coloris seu Sanguinei floridissimi, vulneris inflicti imaginem pereleganter a natura depictam ad vivum repraesentantes).

Die erste ausführliche und zutreffende Beschreibung der Dolchstichtauben giebt Sonnerat in seiner „Reise nach Neu-Guinea" (Paris 1776). „Die mit Blut befleckte weiße Turteltaube (la Tourterelle blanche ensanglantée)", heißt es daselbst Cap. 6, „hat ungefähr die Größe der weißen Turteltaube, die man in Frankreich in Volieren und bei den Vogelhändlern sieht; ihr ganzes Gefieder ist leuchtend weiß: aber sie hat auf der Brust, unten am Hals, rothe Federn, die einen großen Flecken von Blutfarbe bilden. Es scheint, als habe dieser schöne Vogel einen Dolchstich bekommen und als habe sein eigenes Blut die Federn rings um die Stelle, wo er getroffen wurde, gefärbt; die Füße und der Schnabel sind roth; die Iris ist violettröthlich. — Die graue mit Blut befleckte Turteltaube (la Tourterelle grise ensenglantée) ist etwas kleiner als die vorige; der Oberkopf ist grau, in Weiß übergehend; der Hinterhals ist violett, ins Grüne spielend; der Hals vorn ist weiß. Man sieht auf der Brust einen rothen Flecken von sehr lebhafter Blutfarbe in der Mitte, und weniger gesättigt an den Rändern, die verwaschen sind; der Bauch ist grau mit röthlichem Anflug; der Rücken, die großen Flügelfedern und das Ende des Schwanzes sind schwarz. Auf jedem Flügel befinden sich drei graue Querbinden, welche diesen in seiner ganzen Länge durchschneiden, und zwei schwarze Binden; der Schwanz ist an der Wurzel grau; der Schnabel ist schwarz, die Füße sind violett röthlich und die Iris ist rostfarbig." Zu dieser Beschreibung hat Sonnerat ziemlich gute Abbildungen gegeben. Sonnerat's „Reise nach Neu-Guinea" ist offenbar die Quelle, aus welcher Linné, Scopoli, Gmelin, Latham und andere Naturforscher ihre Beschreibungen der Dolchstichtauben entlehnt haben.

In Buffon's Naturgeschichte schlägt J. Virey aus den Dolchstichtauben mit nachstehenden Worten Kapital für die Revolution: „Sonnerat hat zwei Turteltauben beschrieben, welche einen blutigen Fleck auf den Brustfedern haben, als ob sie hier durch einen Dolchstoß zu Tode verwundet worden wären. Dieses Zeichen der Grausamkeit, gedrückt auf ein so sanftes, unschuldvolles Thier, erinnert den Menschen daran, daß der Schwache oft solche Wundenmale der Gewaltthat an sich trägt, während die mächtigen, räuberischen Geschlechter sich mit den Livreen des Vergnügens und den Decorationen des Ueberflusses umgeben."

Spätere Reisende, die sich zugleich mit der Fauna der Philippinen beschäftigen, erwähnen der Dolchstichtauben gar nicht oder nur flüchtig. J. Mallat (Les Philippines, Paris 1846) sagt nichts weiter darüber, als daß es daselbst grüne Turteltauben giebt, schwarze, graue, chocoladefarbige und noch andere, welche auf der Brust einen lebhaft rothen Flecken haben, welcher dem Male ähnlich sieht, „den ein Dolchstich zurückläßt." In F. Jagors „Reisen in den Philippinen 1859 und 1860" und in Prof. Dr. Sempers Beschreibungen „der Philippinen und ihrer Bewohner" ist von Wirbelthieren nur wenig die Rede, und von der Dolchstichtaube gar nicht. P. de la Gironnière ist der Einzige, welcher in seinen „Abenteuern eines bretagnischen Edelmanns auf den Philippinen" (Paris 1855) auch über die Lebensweise der Dolchstichtaube einige Auskunft giebt. Er beschreibt die Taube mit folgenden Worten: „Sie hat einen schieferfarbigen Rücken, weißen Bauch und Hals, und auf der Brust einen so natürlichen Blutfleck, daß derjenige, der ihn zum ersten Mal sieht, Mühe hat, ihn nicht für eine Wunde zu halten. Diese Species findet sich auf der Insel Luçon (Manilla), wohnt unter großem Gehölz und nistet auf der Erde." (Cette espèce se trouve dans l'ile de Luçon, habite sous les grands bois et fait son nid sur la terre). — Bis auf den Bauch, der nicht rein weiß, sondern, wie ihn Sonnerat schildert, röthlich grau ist, trifft de la Gironnières Beschreibung zu. Daß die Dolchstichtaube gleich den australischen Geophaben oder Erdtauben sich vorzugsweise auf dem Boden aufhält, deuten auch die längeren kräftigen Beine dieser Species an, und der mit Kopfnicken begleitete schnepfenartige Gang. Das Merkwürdigste und Auffallendste bleibt aber der Blutfleck auf der weißen Brust, dem die bisher nur äußerst selten nach Europa gebrachte Taube den Namen Dolchstichtaube verdankt.

Reichenbach unterscheidet in seiner Monographie der Tauben (7. und 8. Heft des Handbuchs der speciellen Ornithologie) 92 Gattungen von Columbiden mit 317 Arten. Die Dolchstichtauben stellt er unter die Gruppe der Phapinen oder Spiegeltauben (φάψ bei Aeschylus eine wilde Taube). Er beschreibt die Dolchstichtaube (Phlegoenas cruenta) wol nach einem ausgestopften Exemplare, bis ins Kleinste, aber über ihre Lebensweise schweigt er; er scheint das Wenige, was P. de la Gironnière darüber sagt, nicht gekannt zu haben. — Wie aus alledem hervorgeht, ist noch manche Lücke in der Naturgeschichte dieser merkwürdigen Columbiden auszufüllen, und

dazu werden die Dolchstichtauben J. K. H. der Frau Prinzessin Karl wol bald Gelegenheit bieten.

Bericht über die diesjährige Versteigerung in Antwerpen.

Als Besucher waren wie alljährlich so auch diesmal die Direktoren der bedeutendsten europäischen zoologischen Gärten, Besitzer von Menagerien, Groß- und Kleinhändler von Thieren, insbesondere von Vögeln, und Privat-Liebhaber erschienen. Trotzdem das Wetter während der beiden Verkaufstage schlecht war, hatten sich besonders viele Liebhaber und Vogelhändler aus Brüssel, Genf und andern Städten Belgiens eingefunden und daher zeigte sich die Erscheinung, daß im Durchschnitt gerade die Vögel zu den günstigsten Preisen verkauft wurden.*) Weniger glücklich war das Geschäft aber mit den großen Thieren, als 1 Paar Girafen, 2 Afrikanischen Elephanten, 1 Paar Yacks, ferner Bisons, Wapitihirschen und Andern, und unter den Vögeln mit den werthvollen Jabirus und Kranichen, denn alle diese fanden keine Liebhaber, und zwar wol aus der Ursache, daß in der letzteren Zeit diese Vierfüßler und Vögel so zahlreich anderweit eingeführt worden, daß jeder Garten Gelegenheit gehabt, sich davon nach Bedarf anzuschaffen.

Der Verkauf ergab ungefähr 96,500 Frcs., also 12,000 Frcs. mehr als im vorigen Jahre. Hätten indessen auch noch die zur Versteigerung gestellten größeren Thiere und Vögel verkauft werden können, dann würde der Betrag bis über 140,000 Franken gestiegen sein.

Hierzu ist auch noch zu erwähnen, daß zugleich privatim für mehrere Tausende von Franken, darunter meistens Fasanen, aber auch von obengenannten werthvollen Säugethieren, verkauft wurde.

Folgendes ist die Liste mit den Preisen der bedeutendsten verkauften Vögel und Thiere:

	Frcs.
1 männlicher und 2 weibliche diesjährige hiergezüchtete Löwen	3800
1 junger Malaischer Bär	500
3 Lippenbären	350—400
1 Stachelschwein	150
1 Ameisenbär	1350
1 Paar Bennet'sche Kängurus	330
1 Weibchen Riesen-Känguru	950
1 Paar diesj. hiergezüchtete rothe Kängurus	1450
2 Männchen diesjähr. hiergezüchtete Burchell's-Zebra	1650—1900
1 Paar diesj. hiergezüchtete Kanna-Antilopen	1450
1 Paar diesj. hiergezücht. Mouflons	600
1 weibl. „ „ „	380
1 Warzenschwein vom Senegal (Phacochaerus)	330
2 Durham-Kühe mit kurzen Hörnern (importirt und vollausgewachsen)	2200—2300
2 desgl. hiergezüchtete Ferfen,	550—775
1 desgl. vollausgewachsener Stier (importirt)	900
2 junge Stiere (importirt)	775—880
1 Paar goldgelbe Löwen-Aeffchen	450

Ferner zahlreiche verschiedenartige Affen, als Paviane, Mandrills, Rhesus (Macacus Rhesus) und Makaken, große indische Fledermäuse, Seehunde und andere kleinere Säugethiere. Ferner:

	Frcs.
1 Paar Strauße	1900
2 schwarze Kasuare	600—625
3 amerikanische Strauße	165—225
1 Bartgeier	660
2 Königsgeier	170—200
1 Paar Karunkelkraniche	850
1 Sekretär vom Kap	330
1 Senegalischer Jabiru	250
1 Paar Jungfern-Kraniche	330
3 Paar Flamingos	300—345
1 Paar Antigone-Kraniche	550
1 Abessinischer Nashornvogel	400
1 Rhinoceros-Nashornvogel	600
1 indischer Elster-Nashornvogel	130
1 Paar Turakos	180
5 Pinguins	240—250
1 Paar Pauxi-Hokkos	880
2 Paar Argus-Fasanen	2970—3300
1 Paar importirte ausgefärbte Lady Amherst-Fasanen	2800
1 Paar hiergezüchtete ausgefärbte Lady Amherst-Fasanen	2200
3 Paar hiergezüchtete diesjähr. Lady Amherst-Fasanen	1760—1980
1 Paar hiergezüchtete ausgefärbte $^3/_4$Blut Lady Amherst-Fasanen	770
2 Paar hiergezüchtete, junge, ausgef. $^1/_2$Blut Lady Amherst-Fasanen	330—590
2 Paar Prälaten	1540—1760
1 Paar Satyr-Hühner	1600
1 Paar Temminck's-Trapopane	900
1 Paar Spiegelpfauen (Polyplectron bicalcaratum)	1200
1 Paar Chinquis (P. chinquis)	930
1 Paar diesj. hiergez. Glanzfasanen von Kochinchina	770
1 Paar Fasanenhühner (Gallophasis Vieilloti)	2000
1 Paar Rothschweif-Fasanen	450
Königs-Fasanen, vorjährige	360
„ diesjähr. hiergez.	300—360
Versikolor-Fasanen	430

*) In dem Gasthause zum Elephanten, wo die fremden Händler fast sämmtlich einkehren, entwickelt sich jedesmal ein Privat-Vogelmarkt, welcher in diesem Jahre namentlich großartig emporblühte, und der, ebenso wie der rege Kauf auf der Auction, wiederum einen Beweis für den Aufschwung gab, welchen die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel in den letzten Jahren allenthalben gewonnen hat. D. R.

	Frcs.
Halsband-Fasanen	100—140
Swinhoë-Fasanen, ausgef.	235
" diesjähr. hiergez.	85—115
Kronen-Perlhühner	240
Rein weiße und die gewöhnlichen Perlhühner u. and. Hühnervögel.	
1 grauer Pelikan	275
3 gewöhnliche Pelikane	165—200
5 Paar diesj. hiergez. schwarzhalsige Schwäne	775—935
2 Paar diesj. hiergez. Trompeter-Schwäne	350—375
4 Paar diesjähr. hiergez. schwarze Schwäne	200—240
Gewöhnliche weiße Schwäne	75—90
3 Paar Höcker-Gänse, japanesische	80—100
6 Paar indische gestreifte Gänse	220—275
2 Paar Dorngänse (Sarcidiornis regia)	225—250
1 Paar Paradies-Enten (Casarca variegata)	360
1 Paar Enten von Chile (Mareca chiloensis)	300
1 Paar Fahl-Enten (Dendrocygna vagans)	200
4 Paar Mohren-Enten (Dendrocygna arcuata)	125—150
4 Paar Wittwen-Enten (Dendrocygna viduata)	75—100
1 Paar Herbst-Enten (Dendrocygna autumnalis)	125
Mehrere Pärchen Mandarin-Enten	100—115
Mehrere Pärchen Braut-Enten	40—50
Mehrere Pärchen Bahama-Enten	85—90
Mehrere Pärchen australische Wild-Enten	35—50
Mehrere Pärchen Fuchs-Enten	75—90
Mehrere Pärchen gelbschnäbelige Enten	90—100
Mehrere Pärchen gelbschnäbelige Kap-Enten (Anas xantorrhyncha)	
1 Paar japan. Knäk-Enten (Querquedula formosa)	230

und andere, wie Labrador-Enten u. s. w., 2 Männchen Anas rufina 175—200 Frcs.

Mehrere Tukane oder Pfefferfresser 80—115 Frcs., 2 Paar Glanzelstern (Uroleuca pileata) 160 bis 200 Frcs., mehrere Glanzdrosseln verschiedener Arten 90—150 Frcs., Bart-Kukuke (Bucco versicolor), Stirnvögel (Cassicus haemorrhous), Heherdrosseln (Garrulax chinensis) und andere große und kleinere Weichfresser. Mehrere große und kleine Meinaten 60—80 und 90—110 Frcs., theilweise sprechend. Einige Pärchen von den neu importirten orangeköpfigen Trupialen (Icterus ruber). Mehrere Pärchen von den gelben Trupialen (I. tibialis). Mehrere Pärchen von den Militär-Staaren mit rother Brust, grüne und graue Kardinäle (Paroaria) und eine seltenere kleine Art mit schwarzer Kehle (P. capitata, Mantelkardinal); allerlei senegalische und australische Vogelarten, in mehreren Pärchen, unter denen als die seltensten: Kubafinken, reinweiße, gelb- und schwarzbunte japanesische Mövchen, indische rothköpfige Sperlinge (Amadina erythrocephala) neu,*) weiße Reisvögel, gelbrückige Wittwenvögel (Vidua macroua), Goldkopfweber, kleine Art, (Ploceus personatus) neu,**) kleine brasilische Vögel mit rother Haube, neu,***) rothe und schwarzköpfige Zeisige aus Guyana, neu,†) 1 Paar Goldsperlinge (Passercula aureola), zahlreiche Pfäffchen (Sporophila lineola, intermedia, ornata), mehrere Pärchen von Coccothraustes melanura u. s. w., ferner: dreifarbige und scharlachrothe Tangaren, Bischofs-Tangaren (T. eveque), Teufelskopf-Tangaren (T. diable eurhumé), kleine Tangaren mit blauem Halsband, Sonnenvögel, amerikanische blaue Nachtigalen, indische Vögel mit Haube (Ixos pyrrhotis),††) und noch mehrere andere Tangaren- und dergleichen Arten. Sodann auch Masken-Papageien 250 Frcs., Bunt-Loris, 1 Paar rothbäuchige Sittiche (Conurus cruentatus), 1 Paar Stanley-Buntsittiche (Rosella Stanley), 1 Paar Blue bonnet-Perikiten, ferner die gewöhnlich im Handel vorkommenden und auch von den kleinen selteneren Perikiten, als Papageichen oder Fledermauspapageien (Ps. galgulus) in mehreren Pärchen, grauköpfige und gewöhnliche Inseparables u. s. w.

Von Hühnern: schwarze, weiße und Kuckuksperber-Kochinchinesen, Yokohama und andere und mehrere Exemplare von den wilden Arten als Bankiwa- und Sonneratshühner.

Von Tauben: Montaubans, Egypt. Mövchen, ferner Nikobar- und andere wilde Tauben und unter den Turteltäubchen, als ganz besonders selten 1 Paar Dolchstichtauben (Pigeon poignardés),†††) welches zu 650 Frcs. verkauft wurde, ferner Schopftäubchen u. s. w.

Ferner Riesen- und französische silberfarbige Kaninchen.

Zuletzt Python-Schlangen von 130—300 Frcs. das Stück.

Die Versteigerung erfreute sich, trotz der überall herrschenden ungünstigen Geldverhältnisse, doch wenigstens im Allgemeinen einer sehr regsamen Theilnahme, und in Hinsicht der Vögel war diese sogar, wie schon vorhin erwähnt, noch viel regsamer, als in früheren Jahren. Bedenken wir, daß die er-

---

*) Sind in meiner Vogelstube nicht nur vorhanden, sondern auch bereits gezüchtet. — **) Ebenfalls bei Herrn Oberlehrer Schneider in Wittstock und bei mir bereits vorhanden. — ***) Tachyphonus pileatus, Hartl., von dem wir nächstens eine Beschreibung geben werden. — †) Astragalinus cucullatus, sind in meiner Vogelstube schon längst vorhanden und, wie auch von Herrn Kreisgerichtsrath Heer in Striegau, gezüchtet. — ††) Eine Art Bülbül, dem rothbäckigen B. (P. jocosus) nahestehend. — †††) Vergleiche den Bericht des Herrn Lichterfeld in dieser Nummer.

Dr. K. R.

wähnten großen Thiere in der letzteren Zeit in wirklich staunenswerther Kopfzahl, in einem förmlichen Wetteifer der bedeutendsten Großhändler nach Europa eingeführt worden, so dürfen wir auf diese großartige Emporentwickelung des Thierhandels in Folge der immer zunehmenden Liebhaberei für die fremdländische Thierwelt, und insbesondere auf die immer allgemeiner sich verbreitende Theilnahme für die zoologischen Anstalten wol mit Staunen und großer Freude blicken. Eines ergiebt sich aus dem Andern: Der zoologische Garten von Berlin ist an manchen Tagen von 30 bis 40,000 Menschen besucht — die Großhändler wetteifern darin, selbst die am schwersten einzuführenden Thiere, z. B. Girafen, zu Dutzenden in den Handel zu bringen — die Antwerpener Versteigerung hat heuer 96,500 Frcs. ergeben, von Jahr zu Jahr eine Zunahme von mehr als 10,000 Frcs. — in Deutschland giebt es mehr als hundert großartig eingerichtete und reich bevölkerte Vogelstuben, die Züchtung hat sich in dem Maße emporgeschwungen, daß von Wellensittichen, Zebrafinken und andern Arten zusammen mindestens dreifach mehr gezüchtet als importirt werden — vor Allem aber sind wir bereits so weit, daß von allen Importeuren die seltensten fremdländischen Vögel, zu sehr hohen Preisen, vorzugsweise oder doch ebensoviel an deutsche Liebhaber als an englische oder niederländische verkauft werden! Hierauf beiläufig einmal aufmerksam gemacht zu werden dürfte für die Leser der „Gefiederten Welt" keinenfalls uninteressant sein. Dr. F. B.

Neue und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts.

Der Granatfink. (Astrilda—Mariposa—granatina).

Während der Schmetterlingsfink (A. phoenicotis) bekanntlich zu den gemeinsten Erscheinungen in unserer Liebhaberei gehört, war sein nächster Verwandter, der Granatfink, bis jetzt lebend nach Deutschland wol zweifellos noch gar nicht eingeführt. Zwar hat ihn der alte Bechstein mit beschrieben, doch giebt er als das Vaterland fälschlich Brasilien an und nennt ihn brasilischer Fink. Zuerst bekannt wurde der Vogel durch Edwards, welcher eben, und nach ihm Latham, den Irrthum verbreitete, daß er aus Amerika herstamme. Brisson giebt zuerst richtig Afrika als sein Vaterland an und beschreibt ihn auch sehr eingehend. Buffon benannte ihn Grenadin de la côte d'Afrique. Das Vögelchen ist röthlich kastanienbraun mit violetten Wangen, an Stirn, Bürzel und unterm Hinterleib glänzend kornblumenblau; Schnäbelchen blutroth. Er gehört zweifellos zu den schönsten Prachtfinken. In Gestalt, Wesen und Größe ist er dem Schmetterlingsfink durchaus gleich. Der erste lebende Vogel dieser Art wurde in der Mitte des vorigen Jahrhunderts nach Europa gebracht und zwar erhielt ihn die Marquise de Pompadour, welche bekanntlich eine begeisterte Anhängerin der Vogelliebhaberei war. Sie hatte das Vögelchen drei Jahre am Leben. Vieillot nannte diesen Prachtfink Le Grenadin und berichtigte den erwähnten Irrthum von Edwards u. A. ebenfalls. Auch er hält ihn für einen der schönsten und zierlichsten, aber auch weichlichsten aller Prachtfinken. Er hat ihn aber nicht gezüchtet. Reichenbach giebt auch wenig über ihn an, doch beschreibt er das Nest. Die Heimath des Vogels ist vornehmlich Westafrika, Angola, Damara u. s. w., doch ist er auch am Vorgebirge der guten Hoffnung eingesammelt. Der Händler Herr Fockelmann aus Hamburg überbrachte mir ein Männchen und zwei Weibchen und dies werden jedenfalls die ersten Exemplare sein, welche jemals lebend hier vorhanden, denn Dr. Bolle führt den Granatfink in dem Verzeichniß der fremdländischen Vögel, welche im deutschen Vogelhandel vorkommen (Naumannia 1858) nicht auf. Seitdem dürfte er aber schwerlich eingeführt sein. Eine eingehende Beschreibung und Schilderung werde ich in dem Buche „Die fremdländischen Stubenvögel" demnächst bringen. Dr. R.

Noch einmal Kapaunen.

Mit Bezugnahme auf den Vortrag des Herrn Gätow über „Kapaunen und Poularden" in Nr. 42 erlaube ich mir die Bemerkung, daß man seit längerer Zeit in Frankreich von dem infamen Verschneiden der Hühner allmählig zurückkommt und für den Gaumen auf menschlichere Weise dennoch ein sehr zufriedenstellendes Ergebniß zu erzielen weiß. Herr Max Emanuel, Freiherr v. Washington, Gutsbesitzer u. s. w. in Pöls, giebt in seinem offiziellen Bericht über die Geflügelzucht auf der Pariser Ausstellung (Oesterr. offizieller Ausstell.-Bericht X. Heft 2 p. 271, Wien 1868) Mittheilung über seine Ausflüge nach Mans-Gouttainville, woselbst größere Etablissements für Geflügelzucht und Geflügelmästung bestehen und bemerkt u. a. „Um die Hühner der Eierproduktion nicht zu entziehen, ist man von dem Brütenlassen der Hühner ebenso abgekommen, als man von dem Poulardisiren und Kapaunisiren nichts mehr wissen will. An die Stelle der Ersteren setzt man einfach Truthennen und an jene des Letzteren die Erziehung von Hähnen, die man nie zur Paarung zuläßt und von jungfräulichen Hennen (coq vièrge, poule vièrge)." Herr von Washington giebt dann sehr beachtenswerthe Fingerzeige über die Mästung dieser Thiere, für welche auf dem Markt ein Preis von 7—8 Frcs. erzielt wird und räumt „ungern ein, daß unsere berühmten steirischen Kapaunen mit einem französischen coq vièrge eine Concurrenz nicht aushalten können."

Da Ihnen, Herr Redakteur, daran gelegen sein muß, in Ihrem Blatt allen Niederträchtigkeiten, welche sich Homo sapiens *L.* gegen die übrigen Thiere erlaubt, energisch entgegenzutreten, so werden Sie gewiß dazu beitragen wollen, einen so erfreulichen

Fortschritt, wie er hier zu constatiren ist, in weiteren Kreisen bekannt zu machen, um dadurch vielleicht unselige Versuche „im Kapaunisiren sich zu üben", hintanzuhalten. Unsere hinterpommerschen Gutsbesitzer werden hoffentlich nicht einführen wollen, was man in Frankreich als überwundenen Standpunkt zu betrachten anfängt. O. D.

Ueber Fütterung der Kanarienvögel.

Ich lese vielfach von großer Sterblichkeit der jungen Kanarienvögel; dies kommt mir eigenthümlich vor, indem ich während des Jahres (bei jungen Vögeln) kaum 1 Prozent Verlust habe.

Ich füttere während der Heckzeit geriebene Eier, gebrühten und mit kaltem Wasser nachgewaschenen Sommerrübsen, 24 Stunden lang gequellten Kanariengrassamen, ferner Hafergrütze und Mohn und zwar derart, daß ich Ei und Sommerrübsen täglich gebe, mit Kanariensamen und Hafergrütze, sowie Mohn dagegen abwechselnd, dazu etwas Grünes täglich.

Für die schon selbst fressenden jungen und für die alten Kanarienvögel außer der Nistzeit reiche ich täglich gewaschenen Rübsen und hierzu noch im Wechsel Kanariensamen und Hafergrütze mit Mohn.

Hierbei kommt freilich in Betracht, daß sich die Vögel in einem sehr reinlich gehaltenen großen Flugraume befinden, Licht und Sonne, sowie täglich frische Luft haben, ohne jedoch dem Zuge ausgesetzt zu sein. Die Vögel bekommen täglich zweimal frisches Wasser in einem Gefäße, das sie nicht verunreinigen können. Der Boden des Käfigs wird wöchentlich ein- bis zweimal gereinigt und mit frischem Sand bestreut; etwas Salz darauf geworfen, wird von dem Vögeln begierig genommen, als Delikatessen betrachten sie Ameiseneier und Mehlwürmer, die sie hin und wieder bekommen — ein Zeichen, daß auch thierische Nahrung ihnen sehr wohl bekommt. Sepia fehlt ihnen nie.

Kürschner in Bamberg.

Aus den Vereinen.

Verein für Geflügelzucht in Wien.

Unter dem Präsidium des Landtags-Abgeordneten Baron Villasecca fand gestern im Saale der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft die Haupt-Versammlung dieses Vereins statt. Nach Eröffnung der Sitzung und Begrüßung der Versammelten durch den Präsidenten erstattet Ministerialrath G. v. Marenzeller namens des Direktoriums Bericht über die Wirksamkeit des Vereins. Demselben entnehmen wir Folgendes: „Der Zweck des Vereins, der nunmehr 143 Mitglieder hat, besteht darin, die Geflügelzucht in allen ihren Theilen zu fördern und zu veredeln. Zur Erreichung dieses Zweckes hat sich das Direktorium zunächst die Aufgabe gestellt, eine internationale Geflügel-Ausstellung in Wien ins Leben zu rufen, um das Inland einerseits mit den vorzüglichsten Geflügel-Rassen des Auslandes vertraut zu machen, andererseits um den inländischen Rassen Anerkennung und Absatz im Auslande zu verschaffen. Das Direktorium des Vereins hat sich deshalb an das Ackerbau-Ministerium mit der Bitte um eine Staatssubvention zur Durchführung einer internationalen Geflügel-Ausstellung in Wien gewendet und der Ackerbauminister hat hierzu und zur Dotirung der bei diesem Anlasse zu vertheilenden Staatsprämien einen Betrag von 1000 fl. aus Staatsmitteln bewilligt. Das Direktorium beantragt, daß die Ausstellung im kommenden Frühjahre abgehalten und daß die diesfalls nothwendigen Vorarbeiten unverweilt in Angriff genommen werden. Das Direktorium schlägt die Errichtung einer Geflügelzuchts-Anstalt als eine Art von Musterhof vor, wo die besten und gangbarsten Geflügelrassen zum Theil gezüchtet, jedenfalls aber, gleichsam in einer permanenten Ausstellung zur Besichtigung vorhanden sind und wo der Ankauf sowie Verkauf von Geflügel und Eiern vermittelt werden soll. Dieser Bericht wird genehmigend zur Kenntniß genommen, ebenso der Bericht des Kassirers Bruszkay, nach welchem 420 fl. ein- und 209 fl. 17 kr. ausgegeben, also 210 fl. 83 kr. Kassenrest verblieben. Bei der hierauf vorgenommenen Ergänzungswahl wurden Gütertaxator Deppen, Kaufmann Zeller, Gütertaxator Krska und Wirthschaftsdirektor Erhold in das Direktorium berufen. Nach einer Aufforderung zur kräftigen Förderung der Vereinszwecke wird die Sitzung geschlossen.

Ornithologischer Verein in Stettin.

Sitzung vom 1. Oktober. Herr Hauptmann Bödicker erstattet in einem längeren Vortrage Bericht über die bisherige Thätigkeit des Vereins auf dem Gebiete des Vogelschutzes, dem wir Folgendes entnehmen: Aus dem Bureau der Vogelschutz-Sektion gingen bis dahin 1162 Briefe und Zirkulare hervor, deren Bestimmungsorte zumeist unserer Provinz angehörten. Auf die an die Förster, Lehrer und Prediger gerichteten Einladungen, dem Verein als außerordentliche Mitglieder beizutreten, meldeten sich 57. Alle diese Herren zeigten in ihren Zuschriften eine Begeisterung für die Sache des Vogelschutzes, daß deren spätere Berichte für den Verein von großem Werthe sein werden. Auf Verlangen wurden nach 10 verschiedenen Orten Modelle von Nistkästen versandt. Von den Herren Dr. Riep und Maader waren mehrere Jagdpartien unternommen worden, welche die Verminderung der der Fischerei schädlichen Vögel zum Ziele hatten. Geschossen wurden 6 Fischreiher, 10 Kormorane, zerstört 70 Nester und 230 Eier erbeutet. Rechnet man, daß ein Reiher der Fischerei einen Schaden von täglich 2½ Thlr., ein Kormoran von 2 Thlr. zufügt, so ist mit der Vernichtung der 246 Reiher und Kormorane Seitens des Vereins von der Fischerei ein Jahresschaden von gegen 200,000 Thlr. abgewendet. Die Ausbeute an Raubvögeln war weit geringer. Von Herrn Förster Meyer in Ziegenort wurde ein schönes Exemplar vom Finkenfalk übersandt. Alle sonstigen erlegten Raubvögel sind präparirt und werden später den Landschulen überwiesen werden, um für sie zur bessern Belehrung der Jugend eine Sammlung dieser schädlichen Vögel zu schaffen. In der Raubvogelfalle des Vereins wurde 1 Habicht (Weibchen) gefangen, sodann 1 Elster, 2 Sperber, 2 große Würger, 1 Weihe und 4 Schleiereulen getödtet; von Säugethieren 2 Marder und eine Anzahl verwilderter Katzen. Während der Wintermonate wurden 1200 Nistkästen in drei verschiedenen Größen in den verschiedenen Vogelschutzsektionen an Bäumen angebracht, die bis auf einige zwanzig, deren Platz ungünstig gewählt war, ihre Bewohner fanden. Nach den Berichten der Sektionsvorsteher nisteten in den Kästen und brachten die Jungen glücklich aus: 9 Paar Staare, 28 Paar Kohlmeisen, 24 Paar Blaumeisen, 8 Paar Wendehälse, 1 Paar Baumrothschwänzchen, 2 Paar Hausrothschwänzchen, 5 Paar Spechte und 958 Paar Sperlinge, zusammen 1035 Paare. Muthwillig zerstört wurden 96 bewohnte Kästchen, 44 unbewohnte, unbenutzt blieben 25. Die Errichtung von Futterplätzen und Tränken hat sich im Allgemeinen trefflich bewährt. Schon im Herbste v. J. wurden 12 Futterplätze errichtet und den Winter über unterhalten. Besonders im vergangenen Früh-

jahr, in welchem durch eintretende rauhe Witterung und Schneegestöber der Vogelzug öfters zum Stillstand gebracht wurde, waren den bei uns einfallenden Vögeln die Futterplätze von großem Nutzen und retteten viele vor dem Untergang. Verfüttert wurden 728 Pfd. Sämereien, dazu gekochte Kartoffeln, diverse Pfund Fette und Hammeltalg und angefaultes Obst. Am meisten bemüht, die Futterplätze in Stand zu halten, waren die Herren Postinspektor Wernich, Hauptlehrer Schneider, Konservator Schweitzer und Kaufmann Wiegener. — Ein von Herrn Creutz ausgestellter Kuba-Papagei gelangt unter den anwesenden Mitgliedern zur Verloosung. Die alljährliche Gratisverloosung für alle hiesigen und auswärtigen Mitglieder findet im Laufe des Frühjahrs statt. — Ueber die in voriger Sitzung nicht endgültig entschiedene Frage: „Ist der weiße Storch ein für den Naturhaushalt nützlicher oder schädlicher Vogel?" bringt Herr Prütz das Gutachten von 19 Sachverständigen — Ornithologen, Förster, Lehrer, Landleute 2c. — zur Kenntniß der Versammlung, wonach ein übereinstimmendes Ergebniß ebenfalls nicht erreicht ist, da das Urtheil nicht nur beeinflußt wird durch den Standpunkt des Referenten, je nachdem er die Jagd oder die Landwirthschaft voranstellt, sondern auch die Oertlichkeit wo, und das Jahr, in welchem die Beobachtungen stattfanden. Die Zusammenstellung dieser 19 Urtheile zeigt, wie schwierig es ist, selbst bei einem verhältnißmäßig so bekannten Vogel zu einem sichern Ergebniß zu kommen. Jedenfalls aber giebt sie dem Naturfreunde einen erneuten Antrieb zur Vermehrung und Vervollkommnung seiner Beobachtungen. — Herr Tincauzer hatte die Nachzucht von vermeintlichen Zeisig- und Kanarienblendlingen ausgestellt, doch war die Ansicht der Versammlung, daß diese allerdings eigenthümlich gefärbten Vögel reine Rassevögel und keine Blendlinge seien. — Die eingegangene Frage: „Weshalb bleiben Hühnerfedern gewöhnlich unbenutzt, und wozu lassen sie sich überhaupt verwenden?" beantwortet Herr Reimer dahin: Hühnerfedern bleiben keineswegs unbenutzt, da sie alljährlich in großen Quantitäten aus Rußland importirt und zur Messe in Leipzig mit 20 Thlr. pr. Ctr. bezahlt werden. Wahrscheinlich werden sie als Ersatzmittel für verschiedene Zwecke verwendet, als Bettfedern werden sie jedoch aus dem Grunde nicht benutzt, weil sie sich zusammenballen und verfilzen und außerdem der Volksglaube herrscht, ein Kranker könne auf Betten von Hühnerfedern schwer sterben. — Als Geschenk für die Bibliothek war eingegangen: „Die Arten der Haustaube. Nach den Bestimmungen der Delegirten des ersten Deutschen Geflügelzüchter-Tages, beschrieben von G. Prütz. II. Auflage mit einem Anhange: die Krankheiten der Tauben, vermehrt." — Aufgenommen werden 4 wirkliche und 25 außerordentliche Mitglieder.

Briefwechsel.

Herrn Kaufmann Fritz Zeller in Wien: Ihren Bericht haben wir, wie Sie aus dieser Nummer ersehen wollen, sogleich aufgenommen und im Uebrigen werden wir Ihre Wünsche dadurch erfüllen, daß wir Ihnen verschiedene Programme u. dergl. zusenden.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

3 Paar Königsfasanen, Vénérée, 1874, so kräftig wie alte,
2 Hähne, nämliche,
3 Paar Lady Amherst, ½ Blut, 1874, so kräftig wie alte,
2 Hähne, nämliche,
50 Stück Goldfasanen, 1874,
10 Paar Egyptische Mövchen 1. Ranges sind abzugeben bei
[664] **Donny-Sapin,** Gent (Belgien).

Rheydter Kaninchenpark.
Mit Genehmigung der K. Regierung ult. November c.:
Große Verloosung
(3000 Loose à 5 Sgr.).
Es werden verloost:
Race-Kaninchen, Hühner, Enten, Tauben, Truthühner, Vögel 2c.
Gegen Franco-Einsendung des Betrages werden Loose franco versandt.
Die Gewinnliste wird durch diese Zeitung bekannt gemacht.
Rheydt, im October 1874.
Die Direction.
[665] **Peter Beines.**

Russische 1874er Ameisen-Eier empfingen und empfehlen **Mey & Bengelsdorff,** Berlin. [666]

Vogelhandlung
von
Joseph Zuckerkandel,
Dresden, Wallstraße 8. I.
empfiehlt ein wohlassortirtes Lager exotischer Vögel, franz. Kanarien und die allgemein bekannten und renommirten fehlerlosen reinen Kanarienvögel eigener Zucht, als Glucker, Hohlroller, Klingelroller mit Knurren, Roller mit jammernden Touren, ebenso beste reinste Zuchten Harzer Kanarienvögel. [667]

Zwei Möpse, Männchen, 1½ Jahr alt, zwei dergl., Männchen und Weibchen, ½ Jahr alt, zwei Löwen-Spitze, Pärchen, verkauft
[668] **Franz Taatz,** Halle a. S.

Zwei größere Vogelkäfige sind zu verkaufen. Die Zeichnungen dieser Käfige liegen in der Exped. d. Bl., woselbst auch der Name des Verkäufers zu erfahren ist. [669]

Harzer junge **Kanarienhähne** eines bedeutenderen Züchters gegen 100 Stück, à 2 bis 2⅓ Thlr., habe nach dem 1. October d. J. gegen Garantie des gesunden Ankommens zu verabfolgen. [670]
Brake, Oldenburg. **J. Seurla.**

2 Stück Männchen rothbrüstige Kernbeißer à Stck. Thlr. 7, zusammen für Thlr. 12,
1 „ Singdrossel, guter Sänger, Thlr. 2,
1 Paar rothe Kardinäle, Thlr. 6,
2 „ Hartlaubzeisige, à Paar Thlr. 3,
1 Weibchen Safranfink, Thlr. 1. 15 Gr.
zu verkaufen bei
C. Koch, Hoflieferant,
[671] Wiesbaden.

Eine Wanderdrossel, 3 Thlr., und vorzüglich schöne Ameiseneier giebt ab, à Lit. 6½ Sgr.,
[672] **Seehase,** Neu-Ruppin.

Ein gelber Spottvogel (gelbe Grasmücke) wird zu kaufen gesucht. Wo? sagt die Expedition. [673]

Wegen Todesfall sind preiswürdig zu verkaufen
3 Paar Nymphen-Papageien.
Dieselben haben bereits genistet und sind tadellose Exemplare.
G. Hoffmann in Olbernhau
[674] in Sachsen.

Russische Haken- und Karmingimpel und Waidenammer und Ameisencier pro Pfd. 15 Sgr., sind zu haben bei
Brune, Vogelhändler,
[675] Berlin, Gartenstraße 62.

Von **tadellosen** Wellensittichen **eigener Zucht** verkauft:
brütende, à Paar 8 Thlr.,
½jährige, à Paar 6 Thlr.,
1jährige Männchen, à Stück 2¾ Thlr.,
1 rosenbrüstiger Kernbeißer, guter Sänger, 9 Thlr.,
1 Paar Textor-Weber, 7 Thlr.,
1 Paar Orix (doppelter Orangevogel), 5½ Thlr.,
1 Paar dottergelbe Kernbeißer-Weber, 6 Thlr.,
sämmtliche Vögel in Pracht und gut akklimatisirt
(676) **F. F. Engelhard** in Nürnberg

Wellensittiche, incl. Verpackung pro Stück 2¾ Thlr., empfiehlt (677)
F. L. Paulus,
Cassel, Provinz Hessen-Nassau.

Durch den Ertrag meiner diesjährigen Zucht im Besitz sehr vieler Kanarien-Hähne, ächte Roller, Harzer Abstammung, offerire dieselben preiswürdig
G. Schüler,
(678) Nothfelden a. d. Rhein-Nahe Bahn.

Vertausche 3 Kanarienhähne und 9 Weibchen, vorzügliche Zuchtvögel, gegen 1 Paar zuchtfähige Wellensittiche.
L. Kürschner, Premierlt.,
(679) Bamberg (Bayern).

Auf meinem Speditionslager befinden sich 20 Centner 1. Hanfsamen, die à fl. 8½ per Centner abgegeben werden. Prima blauen Mohnsamen à fl. 22. — Leinsamen à fl. 9½ per Centner bei
(680) **M. Schaller,** Wertheim a/M.

Wegen Aenderung meines Vogelzimmers verkaufe ich: Wellensittiche, Zebrafinken, Diamantfinken, Gürtelgrasfinken, Tigerfinken, Goldbrüstchen, kleine Elsterchen, Malabarfasänchen, Schönbürzel, Mozambiquezeisige, Grauedelsänger, Orangebäckchen in je mehreren Paaren und fehlerlosen Exemplaren,
ferner eine große Zimmervoliere und eine Anzahl gebrauchter Nistkästen für Undulaten und größere Papageien.
Otto Ganzenmüller,
(681) Nürnberg.

Für Geflügelhändler.

Die Herren Geflügelhändler bitten wir, ihre Preiscourante dem **Verein Vogelfreunde** gef. einzusenden, mit dem Ersuchen, bei sehr schönen Exemplaren mäßige Preise zu stellen, indem gedachter Verein sich in schönen Geflügelraçen zu etabliren beabsichtigt.
Freo.-Zusendungen erbittet **David Schmidt, Comité-Vorsitzender, Nürnberg,** äußere Laufergasse. (682)

Ein schöner, auch außerhalb des Käfigs völlig zahmer **Rosakakadu** ist für 12 Thlr., und ein gutes Brutpaar **Sperlingspapageien** für 6 Thlr., beides zusammen für 16 Thlr. Nachnahme, zu verkaufen durch
Dönniges,
(683) Postdirektor in Gumbinnen.

Ich habe wieder eine Anzahl ausgezeichneter zuchtfähiger Zebrafinken (d. Paar elf Reichsmark) und Amaranten (neun Mark) abzulassen.
Dr. **R. Geißler** in **Berlin,**
(684) Schönhauser-Allee 167 a.

Hanfsaat per Centner 6 Thlr.,
Haferkerne per Centner 6½ Thlr.,
Canariensaat per Centner 8 bis 10 Thlr.,
Hirsen, franz. Milch-, per Centner 8 Thlr.,
Sommersaat, rothe, per Centner 8 Thlr.,
Sommersaat, schwarze, per Centner 6 Thlr.,
Mohn, blauer, per Centner 14 Thlr.,
sowie alle sonstigen Vogelfutterserten empfiehlt billigst
M. Siebeneck'sche Samen- und Pflanzenhandlung, Blumenzuchtgeräthe, Aquarien, Terrarien,
(685) **Mannheim.**

Von jetzt an habe abzugeben:
Kräftige junge Harzer Kanarienvögel in gelber, bunter und grüner Farbe, von 2 Thlr. pr. Stck. an.
Brake in Oldenburg. **J. Seurla,**
(686) Anstalts-Verwalter.

Prachtfinken-Nistkästchen, à 7½ Sgr., durch **C. Ackermann,** Hersfeld. [687]

Groß-Handlung überseeischer Vögel von Gebr. Zeidler
Halle a/S.

empfehlen ihr reichhaltiges Lager aller Arten **Vögel** und **Amphibien.** (Preislisten gratis.)
Dieselben haben auch 1 jungen afrik. Windsteppenhund (Hündin) zu verkaufen. [688]

Achtung!!!

Von meiner Reise retour aus Andreasberg, mache ich die geehrten Liebhaber aufmerksam, daß ich dies Jahr nur das feinste gekauft, als Hohl-, Klingel-, Wasserroller, Nachtigallen-, Gluck- und Klockentouren, und versende unter Garantie lebender Ankunft und fehlerfrei

ächte Pariser Kanarienvögel,

direkt von Paris, sehr groß und struppig, in Citronengelb, Strohgelb, Elbfahl (seltene Farbe), scheckig, von seltener Schönheit. Auch mache ich noch auf die billigen Preise meiner überseeischen Vögel in Nr. 39 der „Gefiederten Welt" aufmerksam und versende alles in nur gesunden und gut gefiederten Exemplaren unter Garantie lebender Ankunft. Hanf 50 Kilo 5½ Thlr., hiesiger 7 Thlr., Glanz 9 Thlr., Rübsen 7⅔ Thlr., Aloëfasern ½ Kilo 10 Sgr.

H. Hromada,
[689] **Zoologische Handlung, Dresden, Schießstraße Nr. 10.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 5. November 1874. Nr. 45.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: der Kronenfink. —
Zur Vogelzucht. —
Gefiederte Welt im Osten. —
Weiteres zur Zucht der Harzer Kanarienvögel. —
Militärische Brieftaubenstationen. —
Taubenkrankheit. —
Briefliche Mittheilungen: Vogelzucht im Freien; Trinkgefäß; Bastarde. —
Anfragen und Auskunft: Pommersche Gänse, Wellensittich. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Der internationale Kongreß der Land- und Forstwirthe, welcher im vorigen Jahre in Wien tagte, faßte bekanntlich den Beschluß, dahin zu wirken, daß der Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel durch internationale Verträge mit allen europäischen Staaten gesichert werde. Die österreichische Regierung hat, wie die Leser d. Bl. wissen, zu diesem Zwecke mit den größeren europäischen Staaten Verhandlungen angeknüpft und den betreffenden Regierungen einen Vertragsentwurf vorgelegt, nach welchem das Fangen und Tödten der Insekten fressenden Vögel, ferner der Vogelfang mit Schlingen oder Fallen irgend einer Art, sowie mit Leim, ebenso das Ausnehmen der Jungen und der Eier, das Zerstören der Nester, soweit es sich nicht um schädliche Vögel handelt, endlich das Feilhalten von nützlichen Vögeln gänzlich untersagt ist. Es wird beabsichtigt, im nächsten Jahre wiederum einen internationalen Vogelschutzkongreß zu berufen. In Oesterreich giebt es bereits ein Vogelschutzgesetz, und in Frankreich ist, angeregt durch die Schriften deutscher Ornithologen und Gelehrten schon seit Jahren eine lebhafte Agitation zu Gunsten der Vögel im Gange. In Preußen aber lassen die Bestimmungen des Allg. L.-R. geradezu die Einfangung und Vernichtung der nützlichen Vögel als gesetzlich erlaubt erscheinen, denn nach § 114. Tit. 9. Th. 1. bilden alle Thiere, die nicht dem Jagdrechte unterworfen sind, einen Gegenstand des freien Thierfangs, und der § 178 a. a. O. fügt ausdrücklich hinzu, daß Vogeleier und Vögel, soweit es die Polizeigesetze nicht verbieten, sich Jedermann aneignen kann. Es giebt allerdings zum Schutze der Vögel in fast allen Regierungsbezirken Polizeiverordnungen; allein diese haben niemals das Ansehen eines wirklichen Gesetzes. Bei den im Februar 1870 im Abgeordnetenhause stattgehabten Berathungen über den Gesetzentwurf, betreffend die Schonzeiten des Wildes, wurde von mehreren Seiten die Nothwendigkeit betont, auch denjenigen Vogelarten im Wege des Gesetzes einen Schutz angedeihen zu lassen, welche durch Verzehrung und Vernichtung von pflanzenfressenden Insekten und anderen der Landwirthschaft schädlichen Thieren der letzteren nützlich sich erweisen. Das Abgeordnetenhaus lehnte es damals aber ab, dem Vogelschutze näher zu treten; es wurde jedoch beschlossen, die Staatsregierung zu ersuchen, dem Landtage einen Gesetzentwurf über Schonung aller nützlichen Vögel vorzulegen. Im landwirthschaftlichen Ministerium ist längst ein derartiger Entwurf ausgearbeitet worden, und es ist nicht zu erfahren, weshalb derselbe bis jetzt nicht dem Landtage vorgelegt worden ist.

Voss. Ztg.

Neue und seltene Erscheinungen des Deutschen Vogelmarkts.

Der Kronenfink (Fringilla pileata, *Prinz Wied*).*)

Sehr gern komme ich Ihrem Wunsche nach und gebe eine Beschreibung dieses schönen von Herrn K. Gudera in Leipzig neu eingeführten Vogels. Obgleich eigentlich sehr einfach gezeichnet, ist er doch unbedingt als ein sehr schöner Vogel zu betrachten. Auf den ersten Blick wird ein Nichtkenner ihn ohne weiteres für ein Schwarzköpfchen halten, bei näherer Betrachtung aber auch alsbald die Bemerkung machen, daß das Grau des Schwarzkopfes ein viel mehr mausegraues ist, als bei diesem Vogel, dessen Farbe glänzend, von allen Nüancen der dunkelsten bis beinahe weißen Seide erscheint, und sich also so bedeutsam unterscheidet. Dazu kommt, daß der Schnabel etwas weniger gestreckt und stärker ist, als der des Insektenfressers, auch hat der Vogel entschieden höhere Beine. Soweit sind beide Vögel, d. h. Männchen und Weibchen, gleich; dagegen hat das Männchen eine schwarze Kopfplatte, die beim Weibchen weit weniger ausgedrückt ist, abgesehen davon, daß die schwarzen Kopffedern des Männchens nach hinten einen rothen Fleck durchscheinen lassen. Das Weibchen andererseits (und wol auch die Jungen) ist mit einer Anzahl verwaschener Längslinien am Unterkörper geziert, wie diese Striche ja ein allgemeines Erbtheil vieler Finken sind. In der Erregung pflegt nun der Mann seine Kopffedern zu stellen und wieder niederzulegen und zwar nicht so, daß die Federn eine einfache Bewegung nach vor- und rückwärts machen, sondern indem sie sich auf- und vorwärts stellen, machen sie zugleich eine rechte und linke Seitenbewegung; kurz gesagt, diese Krone spielt wie ein Fächer und nun zeigt sie sich als ein Zierrath ganz besonderer Art, indem durch das Auseinanderweichen der schwarzen Federn die rothen in ihrer ganzen glänzenden oder beinahe leuchtenden Farbenpracht sichtbar werden und mit dem Zusammenschlag des Fächers wieder verschwinden. Es ist immer nur ein Moment.

Anstalten zur Fortpflanzung haben die Vögel noch nicht gemacht, obwol der Mann gleich nach der Ankunft seiner Sinnlichkeit sich Befriedigung verschaffen wollte, aber abgewiesen wurde.

Eine genaue Beschreibung, wie der Systematiker es thut, habe ich vorläufig unterlassen, werde dieselbe aber gelegentlich, sobald ich vielleicht noch nähere Beobachtungen anfügen kann, hier gern nachholen. Dr. F. Franken in Baden.

*) In Nr. 6 als Scheitel-Ruderfink beschrieben. D. R.

Zur Vogelzucht.

Meine im Dachgeschoß nach Osten belegene Vogelstube ist 7½ Fuß hoch, 14 F. breit, 21 F. lang. Von dieser Länge sind 6 F. vollständig durch eine Drahtwand quer der Breite nach getrennt. Dieser getrennte Theil von etwa 84 Qu.-F. der Stube bildet meine Hauptvoliere, welche ich der Länge nach durch eine Drahtwand in 2 Abtheilungen getheilt habe. Die ganze Voliere ist mit Baumstämmen, Strauchwerk, Sitzstangen, Brutkästchen u. dgl. ausgerüstet. Der Fußboden ist etwa 1 Zoll hoch mit Mauersand bestreut und zur Brutzeit mit verschiedenem Nist-Material versorgt. Der übrige Theil der Stube ist zu beiden Seiten mit 12 großen Käfigen, theils Metall, theils Holz, besetzt, welche meistens von Kanarienvögeln bewohnt sind, etwa 40—50 Köpfen. Ferner ein Käfig, 4 F. lang, 4 F. hoch, 2 F. tief, ausgerüstet mit Strauchwerk, dient einem Pärchen rother Kardinale zum Aufenthalt. Mitten in der Stube steht auf einem runden Tische eine runde Voliere, 3 F. hoch und 2 F. Durchmesser. Letztere wird von jungen, selbstgezüchteten Zebrafinken, ferner 1 Paar schwarzbunten Japanesen, 1 Paar Helenafasänchen, 1 Paar Atlasvögeln und 1 Paar Hartlaubzeisigen bewohnt. Diese Gesellschaft befindet sich hierin recht gemüthlich.

Die große Hauptvoliere, Abtheilung I, enthält 1 Pärchen Buchfinken, 1 P. Bergfinken, 1 Weibchen desgleichen, 1 P. grüne Hänflinge (grüne Zeisige oder Grünfinken), 1 Paar kleine Zeisige, 3 Stieglitze, 2 graue Hänflinge, 2 Stück ostindische Wachteln, mehrere Kanarienweibchen und 1 Pärchen Dompfaffen.

Abtheilung II enthält 1 P. Rothrumpfsittiche, 1 P. Nymphen, 1 P. Wellensittiche, 1 P. Reisvögel, 2 P. Zebrafinken, 1 P. Bandfinken, 1 P. Muskatvögel, 1 P. Goldbrüstchen und drei Kanarienweibchen.

Dies ist mein ganzer Vogelschatz, den ich augenblicklich aufzuweisen habe. Es ist aber auch mit Recht mein Schatz, dem ich so manche Stunde widme, wenn es die Zeit erlauben will. Ich habe viele Freude daran gehabt und besonders in diesem Jahre manche Beobachtung machen können, welche ich wol hauptsächlich meiner jetzigen Oertlichkeit und Einrichtung verdanken kann.

Nun zu Abtheilung I, zu den Dompfaffen, überhaupt zu den Wildlingen. Schon im vergangenen Jahre hatte ich im Ornithologischen Verein über meine Dompfaffenzucht berichtet. Das Weibchen vorjähriger Zucht war ein sehr zahmes und konnte ein Liedchen halb pfeifen; es erbrütete von 4 Eiern zwei Junge, welche jedoch schon am zweiten Tage ins Jenseits gingen, weil ich nicht rechtzeitig mit Weichfutter diente. Ich tröstete mich aber damit, es in diesem Jahre besser zu machen. Ich pflegte dieses Dompfaffenpärchen auf das sorgfältigste, um es mir zur diesjährigen Zucht zu erhalten, dennoch starb das Weibchen im März dieses Jahres. Das Männchen mußte nun einstweilen als Strohwittwer im Kreise meiner übrigen Wildlinge leben. Endlich Anfangs Mai erhielt ich von einem Freunde ein anderes Weibchen, welches dann gleich in die Voliere gesetzt wurde.

Es währte gar nicht lange, so hatten sich Männchen und Weibchen einander lieb gewonnen. Die gegenseitige rührende Anhänglichkeit, ihr zärtliches Spiel und ihr Schnäbeln veranlaßte sie denn auch zu dem Rufe, „hier ist es schön, hier laßt uns Hütten bauen.“ Hierzu wurde ein in der äußersten Ecke, hoch an der Decke der Voliere angebrachtes Kanarienbrutkästchen auserwählt, ein niedliches, nicht kunstloses Nestchen wurde aus Moos, Heuhälmchen, innen mit Hundewolle und kleinen Federn muldenartig ausgepolstert, gebaut. Am 26 Juni wurde das erste Ei gelegt. Das ganze Gelege bestand aus fünf Eiern, wovon drei befruchtet waren, welche in 14 Tagen glücklich ausgebrütet wurden. Am 10. Juli war der erste Nachkomme des so friedlich lebenden Pärchens da. Jetzt war das Männchen auf dem Posten und kam seiner Pflicht als Familienvater getreu nach. Es fütterte bald das Weibchen, bald die Jungen und ließ dann auch inzwischen, während es von einem Zweig zum andern hüpfte, sein bekanntes „diü“ hören.

Außer Hanf, Mohn, Rübsen, reichte ich eingeweichte Semmel und frische Ameiseneier. Letztere wurden mit großer Vorliebe gefressen. Ueberhaupt zeigten die Alten eine außerordentliche Zärtlichkeit gegen ihre Jungen, aber leider die Freude sollte nicht lange währen. Trotz meiner größten Aufmerksamkeit und sorgsamster Pflege war am siebenten Tage der Erstgeborne in's Jenseits und am 9. und 10. Tage folgten ihm seine Geschwister. Mein Verdruß war selbstredend groß, aber ich beruhigte mich mit dem Bewußtsein, meine Schuldigkeit gethan zu haben. Die Ursache des Todes ist und bleibt mir jedoch unerklärlich. Sollten auch etwa Störungen und sonstige Neckereien der anderen Vögel, welche ich zwar nicht bemerkt habe, Schuld gewesen sein? Etwa 14 Tage darauf schritt das Pärchen zu einer zweiten Brut, die jedoch ganz ergebnißlos war. Das Gelege bestand aus drei unbefruchteten Eiern. Ueber die Bergfinken und grünen Hänflinge werde später Mittheilung machen.

Endlich ist es mir auch gelungen, junge Nymphen zu ziehen. Dieselben sind heute 4 Wochen alt, worüber nächstens Näheres.

Albert Mellin,
Mitglied der Ornithologischen Gesellschaft in Stettin.

Gefiederte Welt im Osten.

Palmyra.

Mit diesen Zeilen versuche ich zwar kein ganzes, sondern nur ein theilweises Bild der hiesigen gefiederten Welt zu entwerfen, wobei ich die Liebhaber von Sing- und Schmuckvögeln zu entschuldigen bitte, wenn ich auch solche Vögel mitunterlaufen lasse, welche nichts weniger als Ansprüche auf obige Eigenschaften zu machen haben. Ebenfalls bitte ich diese Mittheilungen nicht nach dem Maße, als von einem studirten Ornithologen geschrieben, beurtheilen zu wollen, sondern als die eines einfachen Vogel- oder überhaupt Naturliebhabers anzusehen.

Hier, im südlichen Rußland, trotz dem es nur wenige Waldungen giebt und dieselben je weiter nach dem Süden hin ziemlich ganz aufhören, um der Steppe allein Platz zu machen, kommen dennoch die meisten auch in Deutschland heimischen Vogelarten vor. In Auftreten und Aufenthaltszeit ändern jedoch klimatische, wie Oertlichkeitsverhältnisse manches. Die Sommermonate sind immer mehr als angenehm warm, wochenlang fällt, bei 30 G. R. im Schatten, kein Tropfen Regen, daher viele Arten, die in Deutschland zu den Brutvögeln zählen, nach dem kühlen Norden ziehen. Vielleicht mag nicht allein die Hitze Schuld daran sein, sondern auch der Umstand mag viel dazu beitragen, daß die von einer großen Menge der Vogelarten so beliebten Nadelhölzer, als Fichte und Tanne, hier ganz fehlen und blos im Norden zu finden sind. Der Winter hingegen treibt manche in Deutschland als Standvogel geltende Art nach dem tiefern Süden, da die oft strenge, mit Schneestürmen verbundene Kälte von 24 G. doch vielen Vögeln zu grimmig erscheint.

Seit bereits 10 Jahren mit der Leitung einer größeren herrschaftlichen Gärtnerei betraut, sammelte ich meine Beobachtungen mehrentheils in hiesigen Gärten, welche, da der Waldungen wenig, den meisten Vogelfamilien als Standquartiere, Brutplätze, wie als Stationen der durchreisenden dienen mußten und, wie es nach der Masse des sich darin aufhaltenden Federvolkes scheint, solchem sehr behaglich vorkommen. Unter diesen Gärten verstehe ich natürlich keine der Städte, sondern die der großen Güter, welche Oasen in der Steppe bilden, da sich oft meilenweit in der Runde sonst kein zusammenhängendes Baum- oder Strauchwerk zeigt. Die von fern prächtig aussehenden Gärten entpuppen sich bei näherer Betrachtung nicht immer als solche, sondern stellen eher oft einen Urwald en miniature vor, denn seit Aufhebung der Leibeigenschaft wurde die Arbeitskraft von Jahr zu Jahr theurer, wie das Geld vieler Edelleute knapper, somit war es für Manchen eine Unmöglichkeit, die Unterhaltungskosten der oft weit über 100 Morgen enthaltenden Parkanlagen zu bestreiten, in welchem Falle sich dann schnell aus diesen ehmaligen Wald- und Hainpartien, da keine kundige Hand mehr waltete, bei hiesiger unübertrefflicher Bodenkraft, eine Art Urwald bildete. Ebenso ging es den damit verbundenen großen Obstanlagen, welche sich zusammen dann zu Pracht-Tummelplätzen der Vogelwelt heranbildeten. Aber auch in denjenigen Gärten, die in ihrem Gesammt unter sorgfältiger Behandlung stehen, fehlt es leider, der meistens sehr umfangreichen Größe wegen, nicht an den vortrefflichsten Brut- und Versteckwinkeln für unzählbare Schaaren dieser leichtlebigen Genossen.

Dieses wäre also die Scenirung, in welcher unsere gefiederte Welt auftritt. Doch ehe ich zu näherer Schilderung komme, erlaube ich mir — da

ich, wie eingangs erwähnt, mich nicht an rein naturgeschichtliche Eintheilung halten kann — die Abtheilungen anzugeben, in welchen ich meine Lieblinge auftreten lasse:

1. Solche, die Sommer und Winter hier verweilen, also Standvögel; 2. Diejenigen, die blos ihr Liebes- und Eheleben feiern, also Sommergäste; 3. Die im Frühjahr und Herbst gleichsam blos Gastrollen geben, also Zugvögel; 4. Unsere Wintergäste, meistens Strichvögel.

Den Reigen der ersten Abtheilung beginne ich mit einem Paar tüchtiger Schreier, der Saatkrähe und der Dohle. Erstere siedelt sich hier überall, wo nur ein größerer Baumkomplex zu treffen ist, an, und interessant ist es dabei, das Leben und Treiben einer solchen Siedelung zu beobachten. Ende März, wenn keine schlimme Witterung mehr zu befürchten, fängt das Beziehen der Kolonien an, und daß sie die kommende Witterung besser als der hundertjährige Kalender voraussehen, haben mir meine Beobachtungen zur Genüge bewiesen, wofür nur ein Beispiel als Beweis dienen möge. Im Jahre 1867 herrschte von Ende Februar bis zum 20. März das angenehmste Frühlingswetter, so daß kein Mensch an eine Wiederkehr des Winters glauben mochte; trotzdem zeigte sich keine Krähe auf den Brutplätzen, obgleich ich früher schon einmal in der ersten Hälfte d. M. März den Nestbau beginnen gesehen. Am 24. März trat in Form des gräßlichsten Schneesturmes ein solches Unwetter ein, daß dadurch viele Menschen und Thiere um's Leben kamen, worauf noch bis 4. April bei starker Schneedecke eine ziemliche Kälte herrschte. Erst nach diesem Datum, bei winterlicher Landschaft, rückten die Krähen in ihre Siedelung ein. Beweisen sie mit dieser Thatsache nicht eine große Witterungs-Prophetengabe? Ist nun nach ihrer Voraussetzung der richtige Zeitpunkt gekommen, so machen sie sich durch vereinzeltes Zu- und Abfliegen nach den Nistbäumen gleich bemerkbar; die Besuche mehren sich in kurzer Zeit, und das bekannte Konzert hat seinen Anfang genommen. Bei allem kameradschaftlichen Zusammenleben, ist anfangs von inniger Freundschaft wenig zu sehen. Erst streiten sich die Männchen um ein bevorzugtes Weibchen; hernach spricht jedes Paar den besten Nistplatz für sich an, und das geht nicht allein mit großem Geschrei ab, sondern es kommt auch zu Thätlichkeiten, welche nicht immer sehr harmlos ablaufen, was die unten herum krächzenden, flügellahm gebissenen oder geschlagenen Koloniemitglieder beweisen, welche wahrscheinlich den Ausschuß zu repräsentiren haben. Hat endlich jedes Paar seinen Brutplatz erobert, oder ein altes, zwar defektes Nest eingenommen, so heißt es tüchtig gearbeitet! Mit schwerem Flügelschlag, man glaubt sie förmlich keuchen zu hören, werden jetzt Aestchen und Aeste angeschleppt, welches die um diese Zeit herrschenden starken Windströmungen oft bedeutend erschweren. Eines der Paare scheint sich nur mit dem Zutragen, das andere blos mit dem Bauen zu beschäftigen, das weniger Anstrengung erfordert, denn gerade ein Kunstbau wird nicht hergestellt. Solcher bildet einen mehrere Fuß im Quadrat haltenden Klumpen, deren von 10—30 Stück, je nach Größe des Baumes und Stärke der Aeste, sich auf einem solchen befinden. Sind die Umfassungswände von Reiserwerk beendigt, so erscheint die ganze Gesellschaft an erhöhten Wegerändern, hackt an denselben die Erde los, die im Schnabel nach den Bauten getragen wird und in Verbindung mit haarigen und faserigen Stoffen zur feinern Austapezierung des eigentlichen Nestnapfes dient. Endlich beginnt das Eierlegen, während welcher Zeit zwar immer noch an den Außenwandungen gearbeitet wird; erst wenn das Gelege voll — 4 bis 5 Eier —, setzt sich das Weibchen zum Brüten. Ob beide Gatten sich in diesem Geschäfte ablösen, konnte ich der Aehnlichkeit halber nie ermitteln. — Der gerade nicht brütende Gatte des Pärchens verbringt seine Zeit aber nicht im Müßiggang, sondern hat vollauf zu thun, dem im Neste Sitzenden Aetzung zuzutragen, während er beständig nach Futter kreischt und gleich einem jungen Vogel mit rüttelnden Flügeln sich den Schnabel vollstopfen läßt. Sind die Jungen ausgekrochen, so unterstützen sich beide Eltern im Fangen und Zuschleppen von fliegendem und kriechendem Gewürm, und wieviel ist dazu nicht nöthig, diese Nimmersatten zu befriedigen! Jetzt, wenn erst das feine Pipsen der Jungen in die Stimme der Mannbarkeit übergeht, erreicht das Konzert seinen Höhepunkt, doch dauert es dann nicht mehr lange; sobald wie möglich wird ausgeflogen, worauf sich die ganze Gesellschaft noch einige Zeit in der Nähe der Siedelung herumtummelt, später in der freien Steppe für Ende Sommer und den Herbst hindurch verschwindet. Wie viel wird dann von solchen Familien an schädlichem und auch an unschädlichem Gethier vertilgt! Kein vom Pfluge an's Tageslicht geförderter Kerf bleibt unaufgelesen; deßhalb muß man diesen Vögeln neben vielen unangenehmen Eigenschaften doch auch die einer großen Nützlichkeit zugestehen. Wir haben hier z. B. niemals über Maikäferschaden zu klagen, denn es ist hauptsächlich diese Krähe, welche die Larve — Engerling — dieses Kerfes als Leckerbissen aufsucht. Man muß daher schon ein Auge zudrücken, wenn hinter dem Säemann durch sie manch' Körnlein verschwindet und auch andere Räubereien getrieben werden. Daß das Ueberhandnehmen der Saatkrähe übrigens nicht zu stark werde, dafür sorgt Mutter Natur wohlweislich, und glaube ich nicht zu hoch zu greifen, wenn, nach meinen Beobachtungen zu schließen, von einer Siedelung kaum die Hälfte der Jungen flugfähig wird; denn die um diese Jahreszeit oft starken Stürme schütteln die Bäume tüchtig durch, wodurch, da die Nester meist an den Endpunkten der Aeste angelegt sind, so manches seines Inhaltes entleert wird. Außerdem sehen einige Raubvogelarten die Nester als einen für sie gedeckten Tisch an, während

noch so manche andere Feinde und Verhältnisse den Nestlingen den Garaus machen. Sodann erliegen auch nach dem Ausfliegen noch viele, ehe sie ihre Selbstständigkeit erreichten. Diese mit dem natürlichen Abgange der Alten in Rechnung gezogen, ergiebt, daß mit den Jahren keine zu hohe Vermehrung eintritt. Und nimmt auch einmal dieser für die Landwirthschaft doch immerhin nützliche Vogel in manchen Gegenden zu sehr überhand, so giebt es der Mittel genug, um seine Zahl wieder schnell zu verringern. (Fortsetzung folgt.)

Weiteres zur Zucht der Harzer Kanarienvögel.

Von W. Böcker in Wetzlar.

Unter den Krankheiten, denen die Harzer Kanarienvögel unterliegen, sind es namentlich zwei, welche den Liebhaber und Züchter der Letztern mit Aerger und Besorgniß erfüllen: die Heiserkeit und die Unterleibs-, oder Darmentzündung. Während jene nicht selten die besten Sänger zu einer Zeit befällt, wo man ihrer als Vorschläger für die jungen Vögel am meisten bedarf, kann diese den ganzen Bestand der Nachzucht in Frage stellen. Beide Krankheiten haben das miteinander gemein, daß sie fast gar nicht zu heilen sind; man muß sich zu allermeist darauf beschränken, die Ursachen zu ermitteln und sie für die Folge möglichst zu verhüten.

Die Heiserkeit kommt bei den Kanarien gemeiner deutscher Rasse fast gar nicht vor, höchstens aus Veranlassung einer Erkältung, und dauert dann auch nur wenige Tage; bei der Harzer Rasse ist sie leider nicht selten. So lange sie nicht von dem, den Züchtern nur zu bekannten nächtlichen Husten, dem sogenannten Schmatzen, begleitet ist, hat sie auch hier nicht viel zu bedeuten; sie beruht dann entweder auf Erkältung oder, was in größern Hecken nicht grade selten ist, auf zu lautem oder zu anhaltendem Gesange. Nach einer recht kalten Nacht ist nicht zu erwarten, daß die Vögel des Morgens gleich bei reiner Stimme sind; diejenigen namentlich, die den Fenstern und Thüren am nächsten hingen, werden in der ersten halben Stunde dann mehr oder weniger heiser singen, ebenso auch spät Abends beim Lampenlichte.

Man kann diese Art von Heiserkeit einigermaßen verhüten, wenn man sich sogenannte Kistenkäfige, die nur an der vordern Seite ein Drathgitter haben, anschafft; in großen Hecken nehmen dieselben zu viel Raum weg. Für diese möchten sich am besten kleine hölzerne Kasten, wie sie im Harz, namentlich in Andreasberg im Gebrauch sind, mit den dazu gehörigen hölzernen Einsatzbauerchen, den sogenannten Gängelkäfigen, eignen. Letztere liefert der Tischlermeister Lange in Andreasberg, Schützenplatz, in durchaus zweckentsprechender Konstruktion, und Erstere kann sich jeder Züchter selbst anfertigen. Er wende sich dieserhalb an einen Manufakturwaarenhändler seines Orts um Ueberlassung derjenigen dünnen kleinen Bretter, die er aus den ausverkauften Stoffen herausgenommen hat. (Sämmtliche Zeuge werden nämlich auf solche kleine Bretter aufgezogen). Aus dreißig solcher Bretter, einigen dünnen Latten und 10 Stück starker Pappendeckel habe ich 30 Stück solcher Kasten herstellen lassen. Dieselben kosteten zusammen etwa 3½ Thlr. und reichen wenigstens für meine nächstjährigen Zuchtvögel und die dazu gehörigen Vorschläger vollständig aus, während die übrigen jungen Vögel und ein Theil der Vorschläger mit ihren Gimpelbauerchen in Regalen stehen, welche zum Schutze der Vögel gegen Erkältung, und damit dieselben nicht zu laut singen, mit einem Vorhange versehen sind.

Die auf erblicher Anlage beruhende Heiserkeit kommt bei Weitem häufiger vor, wie die obenerwähnte vorübergehende; sie kann durch Erkältung begünstigt werden und tritt daher auch in der Regel während und unmittelbar nach der Mauser auf, ganz besonders dann, wenn es dem Vogel an der erforderlichen Wärme fehlte. Darum heizen auch die Züchter Andreasbergs um diese Zeit vorsorglich ihre Zimmer und lüften so wenig, als möglich; darum auch hört man bei ihnen selten einen heiseren Vogel. Allerdings wirkt hier noch eine andere Ursache mit: in Andreasberg findet man selten einen Vogel, der über zwei Jahre alt ist, und so lange hält bei zweckmäßiger Behandlung auch in der Regel ein lungensüchtiger Vogel aus. Etwas anderes als Lungenschwindsucht liegt aber durchweg dieser Heiserkeit nicht zum Grunde; wer sich davon überzeugen will, der untersuche die Lunge eines an dieser Krankheit eingegangenen Vogels unter der Loupe oder unter dem Mikroskope; ein gutes Auge kann auch ohne diese Hilfsmittel die kleinen Tuberkeln in derselben erkennen.

Außerhalb des Harzes fehlt es den mausernden Vögeln häufig an der erforderlichen Wärme; wollte man sich die Mühe geben und die geringe Auslage nicht scheuen, Morgens und Abends während der Mauser an kühlen Tagen einzuheizen, so möchte damit dem vorzeitigen Ausbruch der Krankheit vorzubeugen sein. Besonders nöthig scheint mir dies bei bei denjenigen Vögeln zu sein, die nicht zur Hecke verwandt werden. Diese mausern nämlich 4 bis 8 Wochen später, als die Heckvögel — wenigstens ist es die Regel — und bei manchen fällt die Mauserzeit sogar in die spätesten Herbstmonate. Diese leidige Verspätung der Mauser hat mich, beiläufig bemerkt, bisher dazu bestimmt, keine besonderen Vorschläger für meine jungen Vögel zu halten.

Reine Luft und demgemäß ein ausgiebiges Lüften der Zimmer während der Mittagsstunden ist übrigens auch in der Mauserzeit geboten, nur wolle man namentlich die alten Vögel während des Auslüftens verhängen, d. h. mit einem Tuche verdecken; ebenso nöthig ist reichliche Verabreichung von kalkhaltigen Stoffen.

Gegen die bereits ausgebrochene Krankheit kenne ich nur die in meinen früheren Berichten angegebenen Linderungsmittel; selten legt sie sich im Laufe der Zeit, vielleicht in Folge eines Naturheilungspro-

zesses; mir ist, soviel erinnerlich, nur ein Fall bekannt. Gewöhnlich wird der heisere Vogel gegen Weihnachten hin zum Singen fast ganz unfähig und geht selbst bei der sorgfältigsten Pflege innerhalb Jahresfrist ein. Die im Harze und namentlich auch in Andreasberg durchweg gebräuchliche Inzucht begünstigt offenbar die auf erblicher Anlage beruhende Heiserkeit in hohem Grade. Da die Züchter hier entweder in großen Flugbauern oder in Zimmerhecken ihre Jungen ziehen und zu den Zuchtvögeln fast ausnahmslos die selbstgezüchteten Jungen beiderlei Geschlechts auswählen, so läßt sich eine Paarung unter den nächstverwandten Vögeln, welche beiderseits mit einer derartigen erblichen, freilich noch nicht zum Ausbruche gekommenen Krankheit behaftet sein mögen, nicht vermeiden. Sehr wünschenswerth und für die betreffenden Züchter auch selbst lohnend wäre es daher, wenn dieselben alljährlich aus andern Hecken ihre Weibchen tauschweise entnehmen wollten.

Außerhalb des Harzes wird von vielen Züchtern häufig mit den Zuchthähnen gewechselt, schon um des Gesanges der Vögel willen, und diejenigen, deren Zuchthähne im Gesange nichts zu wünschen übrig lassen, haben in der Regel ihre Einrichtung so getroffen, daß sie theils in Heckkäfigen und theils in Zimmerhecken, oder auch in verschiedenen Zimmern oder Heckkäfigen züchten und danach die jungen Weibchen trennen, also im Stande sind, Inzucht zu vermeiden. (Schluß folgt.)

Militärische Brieftauben-Stationen.

Zur Unterhaltung der Militär-Brieftauben-Stationen in Köln, Metz und Straßburg sind zum ersten Mal 3600 Mark im Etat der Reichsmilitärverwaltung ausgesetzt.

Taubenkrankheit.

. . . Mit der Taubenzucht geht es in diesem Jahre sehr schlecht; alle Jungen sterben an Durchfall und an dem sogenanten Notze. Es ist ein Jammer, daß man noch kein Mittel dagegen kennt. Auch viele alte kostbare Tauben sind mir gestorben. Von den herrlichen Tauben aus Paris habe ich nur noch 3 von 13 Köpfen. Fünf Junge habe ich allerdings davon gezogen, ob sie aber groß werden, ist noch abzuwarten.

O. P.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Schon seit einigen Jahren bin ich Besitzerin von mehreren kleinen fremdländischen Vögeln, für die ich eine ganz besondere Vorliebe habe. Anfangs gelang es mir aber nicht, sie zur Brut zu bringen; ich denke, weil ihnen der große Drahtkäfig in meiner Stube doch noch zu eng war. — Da besuchte mich im vorigen Sommer ein langjähriger Freund unseres Hauses Pastor B. . . . aus R. . . . . *) und der rieth mir, die ganze kleine Schaar in eine große Volière im Garten zu setzen. Ich wollte es erst gar nicht wagen, aber da Herr B. sehr zuredete und da er ja selbst so große Erfahrung in der Behandlung der Vögel hat, so entschloß ich mich endlich dazu und kann nun von recht guten Erfolgen berichten, aber auch von betrübenden Erfahrungen.

Ursprünglich hatte ich nur ein Paar Diamantfinken, ein Paar Bandfinken, einen Zebrafink, einen Papstfink und ein Paar kleine graue Astrilde, dazu schaffte ich mir dann bald ein Paar Tigerfinken, ein Paar Amaranten, ein Paar Wellensittiche, ein Zebraweibchen und ein Papstfink-Weibchen an, und bekam ein Paar Nymphen von Herrn Pastor B. geschenkt.

Es dauerte auch gar nicht lange, so fingen meine Diamantvögel an, ein Nest zu bauen. Leider wurde es ihnen, wahrscheinlich durch die Halsbandvögel, zerstört, aber bald bauten sie wieder und nun ein sehr schönes großes Nest aus Fäden, Grashalmen, Federn und Haaren, mit kunstvoller, langer Schlupfröhre. Erwartungsvoll beobachtete ich ihr Thun und Treiben und es dauerte kaum 3 Wochen, so hörte man das Schreien der Jungen und sah man die Alten fleißig mit Futter in dem Nest verschwinden; bald auch konnte man, da die Schlupfröhre dicht am Gitter lag, die kleinen grauen Köpfe sehen, und endlich flogen, nach etwa fünf Wochen (seit Anfang der Brut), vier wohlgestaltete Jungen aus. Die Zebrafinken hatten unterdessen auch gebrütet und brachten fünf Junge aus, die gleich besonders lebhaft und in ihrem Benehmen den Alten sehr ähnlich waren und uns Allen durch ihr allerliebstes Wesen gefielen. Sie fangen jetzt auch schon an, sich zu verfärben. Schließlich haben die Halsbandfinken auch vier Junge glücklich erzogen und ein zweites Paar dieser Vögel nistet noch und zwar haben sie in einem großen Holznistkasten gebrütet. Mit den Bruten der Tigerfinken und Amaranten ist es mir nicht so geglückt. Ersteren sind die Jungen gestorben und Letztere haben lange vergeblich auf klaren Eiern gebrütet.

Leider sind mir in letzter Nacht zwei junge Diamantvögel gestorben und werde ich heute alle Vögel, außer den Papageien, die ja härter sein sollen, ins Zimmer nehmen; es ist draußen doch wol für die kleinen Vögel schon zu kalt. Sehr wundert es mich, daß die Papageien nicht gebrütet haben; vielleicht nisten sie erst später im Jahre.

Die jungen Vögelchen sind zu niedlich und machen mir eine ganz unendliche Freude. Ich kann sie immer wieder betrachten und muß mich immer wieder an ihnen erfreuen. Meine besonderen Lieblinge sind die Diamantvögel.

19. Oct. 1874. **Frau von Alvensleben,**
geb. von Schönborn,
auf Ostrometzko.

Nachschrift. Gestern blieb mein Brief liegen und da muß ich heute melden, daß nach dem gestrigen starken Nebel meine noch übrigen jungen Diamantvögel und sogar der Halsbandfink nebst Weibchen und den vier Jungen in der Nacht gestorben sind. Es hat mir schrecklich leid gethan, besonders um die vier jungen Diamantvögel, und ist es doch wunderbar, daß sie blos von der Feuchtigkeit erstickt sind, denn kalt war die Nacht gar nicht. Nun habe ich alle Vögel, außer den Papageien, ins Zimmer genommen und befinden sie sich jetzt ganz wohl.

(Die Erfahrung in Betreff des Nebels dürfte für die Vogelzucht im Freien, sowie für die Züchtung und Thierpflege überhaupt, besonders in den zoologischen Gärten, von großer Wichtigkeit sein. D. R.)

. . . Vielleicht ist es für Sie von Interesse, zu erfahren, daß neulich ein Bekannter von mir hier eine Ural-Eule (Surnia uralensis) erlegte; dieselbe kommt hier horstend vor und befinden sich mehrere Exemplare, darunter

*) Uns wohl bekannt und hochgeschätzt. D. R.

ein schöner Melanismus (schwarzes Exemplar) im Besitze des Herrn Kaufmann Milz hier.

F. Ruprecht,
Postamtsassistent in Zwiesel, Niederbaiern.

. . . Die Luftdruck-Trinkgefäße kennt man hier schon lange. Ich habe solche von Thon für Tauben und kleinere von Glas für Vögel. Die Glashändler nennen sie Fontänchen. Man füllt das Gläschen und dreht es um. Von Blech könnte man sie auch machen lassen, doch wenn der Versandkäfig umgeworfen würde, so dürfte das Wasser den Vögelchen schlecht bekommen — freilich nicht so schlecht als beim Postboten unter der Pumpe.

Meine Zeisige haben meist Männchen aufgezogen. Mein Bastard-Zeisig fängt an zu singen, doch wird er nicht so gut singen als ein Hänflings- oder Stieglitz-Bastard.

Es empfiehlt sich hochachtungsvoll
G. H. Möller in Ribbentrup.

Anfragen und Auskunft.

Frage. Können pommersche Gänse auch in der Gegend von Zwickau in Sachsen gezüchtet werden, und wenn es der Fall, wo kauft man am besten die größten Arten von pommerschen Zuchtgänsen?

Zwickau. Ernst Sorge, P.

Antwort. Meines Wissens werden in Sachsen bereits viele pommersche Gänse mit guten Erfolgen gezüchtet. Die größten Zuchtgänse sind in der Gegend von Rügenwalde, die billigsten aber wol in ganz Hinterpommern zu kaufen.

Frage. Wie sind bei jungen, noch nicht einjährigen Wellensittichen die beiden Geschlechter bestimmt erkennbar?

Hermes, Lehrer in Oberlahnstein.

Antwort. Für den scharfen Blick zeigt sich bald der Unterschied darin, daß die Nasenhaut der Männchen einen blauen Ton annimmt. Doch kommen Fälle vor, in denen selbst der tüchtigste Kenner sich täuschen kann, wie ich dies in dem Aufsatz „Stubenvogelzucht als Erwerb" (Nr. 20 bis 30) angegeben habe. Vor der vollen Verfärbung bleibt daher die sichere Unterscheidung der Geschlechter immer fraglich.

Briefwechsel.

Herrn Bank-Kassirer A. Mellin in Stettin: Rothe Kardinäle dürfen Sie ganz entschieden nicht zu kleineren Finkenvögeln, gleichviel ob einheimischen oder fremdländischen setzen. Zwar sind sie verträglicher als die grauen Kardinäle, aber sobald sie selber Junge haben, fressen sie die Jungen aus allen Nestern und tödten auch alle Vögel, um das Gehirn derselben zu verzehren. Nymphen sind nicht bösartig, doch verursachen sie durch ungeschicktes Umhertoben zuweilen Schaden und Verdruß. Pennants-Sittiche schreien nicht besonders und gehören auch nicht gerade zu den weichlichsten Plattschweifsittichen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Durch den Ertrag meiner diesjährigen Zucht im Besitz sehr vieler Kanarien-Hähne, ächte Roller, Harzer Abstammung, offerire dieselben preiswürdig

G. Schüler,
(664) Rothfelden a. d. Rhein-Nahe Bahn.

Kalifornische Wachteln,

Zuchtvögel, empfiehlt

E. Geupel-White,
[665] Leipzig.

St. Andreasberger Kanarienhähne.

Vögel, für die Herr Kontroleur und Kanarienvogelpächter Böcker in Wetzlar viel Geld bot, solche zu besitzen, der Züchter aber sein Wort hielt und nur mir seit Jahren verkauft, empfiehlt Stücke à 6—10 Thlr.

E. Geupel-White,
[666] Leipzig.

Graue Papageien, Stück à 8 Thlr., empfiehlt

E. Geupel-White,
[667] Leipzig.

Kanarienhähne, gelbe, isabellfarbene, graubunte und gehäubte à 2—3 Thlr., Kanarienweibchen, Bandfinken und Singdrosseln hat zu verkaufen oder gegen Nymphen zu vertauschen. [668]

Nicolaiken i. O.-Pr. v. Skotnicki.

Abzugeben 1 diesjähriges Bastardmännchen vom Stieglitz und Kanarienvogel, 3 Thlr. J. Lehmann, Muhliusstraße 79, Kiel. [669]

Dr. E. Baldamus.

Brief von Ihnen erhielt leider ohne Angabe der Stadt von Ihnen, Poststempel unleserlich. Lassen Sie mir gefälligst Ihre werthe Adresse zugehen, wonach gern Ihre wissenschaftlichen Anfragen beantworten werde.

[670] E. Geupel-White,
Leipzig.

Verschiedene Arten inländischer Vögel, als Körner- und Weichfresser, sowie alle Sorten Vogelfutter, Ameiseneier Pfd. 20 Sgr., Mehlwürmer ½ Liter 1⅓ Thlr. u. s. w. versendet **Rudolph Schmidt**, Erfurt. [671]

Lachtauben, Paar ¾—1 Thlr. sowie Bantamhühner. Tirika-Periquiten à Paar 3½ Thlr., bei Posten billiger, verkauft **Alwin Reiners.** [672]

Dogge (engl.),

Hündin, schw. u. grau getigert, 2 Jahre alt, kl. Rasse, hat zu verkaufen oder gegen exot. Vögel zu vertauschen

F. Schröder in Parchim,
[673] (Mecklbg.), Berlinerstraße 161.

Abzugeben 2 Stämme engl. Kampfbantam mit Silberbehang und Entenflügeln, 5 Monat alt, Preis pr. Stamm (1 Hahn und 2 Hennen), Thlr. 5. incl. Emballage. [674]

Naumburg a/Saale. O. Vogt.

Russische 1874er Ameisen-Eier empfingen und empfehlen **Arey & Bengelsdorff**, Berlin. [675]

Vogelhandlung
von
Joseph Zuckerkandel,
Dresden, Wallstraße 8. I.

empfiehlt ein wohlassortirtes Lager exotischer Vögel, franz. Kanarien und die allgemein bekannten und renommirten fehlerlosen reinen Kanarienvögel eigener Zucht, als Glucker, Hohlroller, Klingelroller mit Knurren, Roller mit jammernden Touren, ebenso beste reinste Zuchten Harzer Kanarienvögel. [676]

Aus meiner Vogelstube habe ich folgende Vögel abzugeben: Bronzetauben, australische Friedenstäubchen, Sperbertäubchen, Sperlingstäubchen, schneeweiße Reisvögel, ein Paar goldgelbe Trupiale, ein Alpenflugvogel, ganz kleine Schildwachteln, große goldstirnige Webervögel, alle vier Arten indische Weber; dann von gewöhnlichen kleinen Vögeln: Orangebäckchen, Schmetterlingsfinken, Goldbrüstchen, kleine und größte Elsterchen und Bronzemännchen. Alle diese Vögel sind im besten Gefieder und nistfähig. (677)

Dr. **Karl Ruß** in Steglitz bei Berlin.

---

1 Hartlaubszeisig, M., 2 kl. Elsterchen M., 1 Paar Silberfasänchen, 1 Astrild W., werden sofort abgegeben.

M. Furtwängler,
(678) Furtwangen, Schwarzwald.

Gelernte Gimpel suche zu kaufen. Angebot erbitte

E. E. Schneider,
(679) Zwickau, Sachsen.

Harzer Roller,

von den besten Stämmen in ausgesuchten Exemplaren, das Stück 4 bis 6 Thlr., im Dutzend bedeutend billiger, empfehle von meiner Züchtung.

Dessau. **A. Jensch,**
(680) Teichgasse Nr. 3.

Für die ersten 2 Jahrgänge der „Gefiederten Welt" gebe in Tausch Cabanis' „Journal für Ornithologie" (Jahrgang 1873. Preis 6⅔ Thlr.).
(681) Dr. **Lazarus** in Czernowitz (Oesterreich).

---

4 St. schön befied. junge Wellenpapageien von diesem Sommer, so stark und groß wie die Alten, sind für 9 Thlr. zu verkaufen. Verpackung 7½ Sgr.
(682) Adresse: **Hemsterburg,** Erfurt, Gartenstr. 32.

Zu verkaufen in Folge Lokalveränderung: 1 Wiener Spresser, 2 amerik. Blaudrosseln, 1 Nachtigall, 1 ältere vorzügliche Singdrossel, Steinröthel, Grasmücken, Schwarzköpfe, Fliegenfänger ꝛc. Sämmtliche Vögel sind ausgezeichnete Schläger und können mit oder ohne Käfige zu mäßigem Preis erworben werden. **Mehlwürmer in bester Qualität.**
Töppingen, Württemberg, bei Carl Dittus. (683)

---

2 Paar 2jährige weiße Schwäne, pr. Paar 18 Thlr., mehrere Pfauen, Männchen, pr. St. 6 Thlr., Steinröthel, Männch. (einsame Spatzen) à 5 Thlr., Kalanderlerchen à 1—6 Thlr., rothe Nachtigallen (überwinterte Nachtschläger) à 5 Thlr., rothe Kardinäle, in voller Farbe, à 5 Thlr., Tigerfinken, Goldbrüstchen, Silberfasänchen, Bandfinken pr. Paar 2 Thlr., junge Waldturteltauben, ganz zahm, pr. Paar 2 Thlr.

diesjährige, zahme Rehe à 6 Thlr.,
" Füchse à 6 Thlr.

Außerdem noch genügende Auswahl von Affen, Papageien (darunter gut sprecherde), in- und ausländischen Vögeln, Schildkröten, Goldfischen ꝛc. zu billigsten Preisen.

Zu kaufen werden einige Paar Silberfasanen gesucht.

F. Zivsa,
(684) Vogelhandlung in Troppau (Oesterr.).

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen folgende Thiere erhalten: Graupapageien, gelbhäubige und rothhäubige Kakadus, ein gelb und blauer Arara, blaustirnige Amazonen, große Alexandersittiche, Buntsittiche oder Rosellas, Pennantssittiche, große rothe Edelpapageien, kalifornische Wachteln, Rothhühner (Caccabis rufa) Nußheher, Meino, australische Raben, Tukans, amerikanische Rhea. Ferner von kleinen Vögeln: braunbunte Bengalisten, weiße Reisvögel, Zebrafinken, Schmetterlingsfinken, Goldbrüstchen, 70 Paar St. Helenafasänchen, Karmingimpel. Außerdem von Vierfüßlern: ein Aristoteles-Hirsch, ein weiblicher Puma oder Silberlöwe, ein schwarzer Wildhund, ein neuer, noch unbestimmter Wildhund, ein Binturong, zwei sibirische Doggen, ein fliegender Hund von Java und zahlreiche Affen in verschiedenen Arten.

Ausdrücklich sei bemerkt, daß diese Anzeige nur für die Herren Händler, nicht aber für den Privatverkehr bestimmt ist. (685)

Groß-Handlung überseeischer Vögel von Gebr. Zeidler
Halle a/S.

empfehlen ihr reichhaltiges Lager aller Arten **Vögel** und **Amphibien.** (Preislisten gratis.)
Dieselben haben auch 1 jungen afrik. Windsteppenhund (Hündin) zu verkaufen. [686]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 12. November 1874. Nr. 46.

Inhalt:

Ein rosenrother Kakadu. —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: der Brillenvogel. —
Bruten von Dompfaffen und Distelfinken. —
Gefiederte Welt im Osten. (Fortsetzung.) —
Weiteres zur Zucht der Harzer Kanarienvögel. (Schluß.) —
Anfragen und Auskunft: Wassertrinken der Graupapageien; Kanarienvogel; Taubeneinkauf; Alexandersittiche; Spottdrossel; Ueberwinterung. —
Anzeigen.

Ein rosenrother Kakadu.

Von Fräulein Hagenbeck in Hamburg kaufte ich vor ¼ Jahr einen rosenrothen Kakadu, weil diese Vögel mir damals billig erschienen und ich auch noch keinen dergleichen in der Gefangenschaft gehalten — und zwar in der freilich sehr unbegründeten Absicht, ihn zum Demosthenes zu erziehen. Der Ankömmling zeigte sich als sauberer, geleckter Bursche, der trotz der Transportunannehmlichkeiten sein Federkleid gut in Ordnung gehalten hatte. Er bezog ein völlig von blank gebeiztem Zinkblech neu erbautes achteckiges Haus von gehörigem Umfange, wo er sich im Anfang ruhig verhielt und nur mit dem Ordnen seines Gefieders sich beschäftigte. Nachdem aber tüchtig gefrühstückt worden, fing er plötzlich an, im Käfig umher zu toben, dann in einer gewissen Angst (wie es mir schien) an den Wänden desselben zu arbeiten und dann auch zu würgen; weiter schlang und bohrte er sich konvulsivisch zwischen Sitzstange und Futtertrögen hindurch, endlich verdrehte er den Kopf, daß der Schnabel buchstäblich wieder nach vorne sah und als ihm die Kräfte ausgingen, blieb er keuchend und mit aufgesperrtem Schnabel am Boden sitzen — es war kein Zweifel: dies waren die Symptome epileptischer Zufälle! Nun war meine Niedergeschlagenheit groß und wurden bereits im Geiste die verschiedenartigsten Kuren gegen diese „entsetzliche Krankheit" gemustert! Am nächsten Tage bei einem abermaligen „Anfalle" wurde zunächst die „kalte Douche" angewendet — aber nur mit momentanem Erfolg! So wiederholten sich die Anfälle mehrere Male. — Ich war einmal im Zimmer mit der Behandlung von Topfgewächsen beschäftigt, wobei mir ein biederer Landpostbote, auch ein Vogeltobias, an die Hand ging. Bei dieser Arbeit sahen wir denn, daß der Vogel eben wieder seinen „Anfall" bekam und machte ich meinen Tobias auch darauf aufmerksam, indem ich ihm zugleich in dem krampfhaften Anstemmen der Schultern, in dem blinden Umsichbeißen des Vogels in Alles, was ihm erreichbar, die Kennzeichen epileptischer Anfälle erklären wollte! Mein Tobias nahm aber meine „Weisheit" durchaus nicht auf, wie ich's erwartet, sondern behauptete das gerade Gegentheil, d. h. er erkannte das Gebahren des Vogels als Zeichen von Lebenslust, woran er den Schluß knüpfte, „'raus will er!" Nun muß ich gestehen, daß ich im ersten Augenblick schon versucht war, die gestellte Diagnose zu belächeln und, wenn Sie den Vogel gesehen hätten, Herr Doktor, wer weiß, ob Sie nicht ebenso geurtheilt hätten, als ich! Ich habe schon von meinen Knabenjahren an die verschiedenartigsten Vögel gehalten und namentlich auch ihre Krankheitserscheinungen mit besonderem Interesse verfolgt — so habe ich aber noch

keinen toben gesehen. Nur beispielsweise, mit dem Kopf, bezl. der Stirne stemmte er sich so auf den Boden, daß er, mehrere Minuten mit den Beinen in der Luft krampfhaft umhergreifend, buchstäblich auf demselben stand. Aus einem wenigstens 3 Linien dicken Glastrog brach er durch Aufschlagen desselben auf den Boden, die größten Scherben heraus — kurz, es war nicht zum Ansehen! Obgleich ich also überzeugt war von der unhaltbaren Ansicht des postlichen Vogelkundigen, so beschloß ich doch, es zu versuchen und die Thüre des Käfigs zu öffnen, indem ich zugleich allerdings riskirte, daß der herausstürmende Vogel an den Fensterscheiben das Genick bräche. Verloren war ja aber so wie so nicht viel — und zu allem Ueberfluß stellten wir uns noch mit gespannten Regenschirmen vor die Fenster auf. Wie groß war aber mein Erstaunen, als der Kakadu sofort nach dem Oeffnen der Thüre rasch heraus — aber nicht gegen die Fenster, sondern in sicherer Kurve an diesen vorbei, auf eine bereit gelegte Fahnenstange flog und hier im Vollgenuß der ersehnten Freiheit unter Haubenstellen und zahllosen Bücklingen ein solch' mörderisches Geschrei erschallen ließ, daß wir uns die Ohren zuhielten. Das Problem war also gelöst, der Anfall geheilt — und wirklich ist er auch seither nicht wiedergekehrt. Mein Tobias aber ist seither um einen Kopf größer geworden. Sein Urtheil über meine „Kenntnisse" mag nicht sehr schmeichelhaft ausgefallen sein. Das arme Thier — nicht den Tobias meine ich — war wahrscheinlich früher nicht im Käfig, sondern frei gehalten worden und daher kam auch seine „Verzweiflung" hinter den Eisenstangen; seitdem erfreut es sich des besten Wohlseins und habe ich aus seinem öftern heftigen Balzruf und aus einem weitern Umstande geschlossen, daß ihm eine Gefährtin nicht unerwünscht sein dürfte. In der jüngsten Zeit brachte ich nämlich auf dem Dach seines Hauses einen verspiegelten Glasknopf an; mit diesem äugelt und schnäbelt er nun den ganzen Tag; anfangs glaubte ich, er lecke den allenfallsigen feinen Staub an demselben ab, als er aber nach der ängstlichsten Reinigung desselben seine Aufmerksamkeiten fortsetzte, dachte ich erst daran, daß diese wahrscheinlich seinem Spiegelbild gelten könnten, und so scheint es in der That auch zu sein, da er in heftigsten Zorn geräth, wenn ich den Knopf entferne.

Ich glaube hiermit eine Bitte um Rathschläge für die etwa mögliche Züchtung genügend begründet zu haben und möchte sie nur noch darauf ausdehnen, daß Sie im Briefkasten ganz kurz gefälligst andeuten, ob dieser Kakadu in einem Nistkasten oder in Steinlöchern oder Zellen oder dgl. wol zum Brüten zu bringen sein dürfte.

F. Rupprecht, k. Forstamtsassistent.

(Beantwortung in der nächsten Nummer. D. R.)

Neue und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts.

Der **Brillenvogel** (Zosterops palpebrosa, *Temm.*). Die in letzterer Zeit förmlich überraschend dem Vogelfreunde entgegentretenden zahlreichen lebend eingeführten, unendlich zarten Arten geben den Beweis dafür, mit welcher Sorgfalt und welchem Verständniß jetzt bereits die Einfuhr betrieben wird — obwol allerdings gerade in dieser Hinsicht noch außerordentlich viel zu wünschen übrig bleibt. Wenn aber schon Honigsauger (Coereba cyanea), Zuckervögelchen (Daenis cayana) Brillenvögel und die zartesten Tangarenarten lebend herübergebracht worden, so ist dies doch gewiß ein Beweis dafür, welche überaus große Mühe man sich bereits giebt, um so sehr zarte und schwierige Vögelchen am Leben zu erhalten — und daß es andererseits doch wol recht lohnend sein muß, dieselben in den Handel zu bringen. Ohne alle Frage dürfen wir daher hoffen, daß die reiche Vogelwelt der Tropen uns im Laufe der Zeit noch unübersehbar viele herrliche Vogelarten senden werde.

Von Fräulein Christiane Hagenbeck in Hamburg brachte ich mir ein Pärchen Brillenvögel mit. Es ist einer der kleinsten aller lebend eingeführten Vögel und gleicht in der Größe und Gestalt etwa dem Amarantvogel. Dabei ist es jedoch kein Fink, sondern ein Pinselzüngler, welcher sich nur von Früchten und Insekten ernährt und in der Gefangenschaft mit eingeweichtem Eierbrot, gekochtem Reis, Mischfutter aus Ameisenpuppen und süßem Obst sehr gut erhalten läßt. Sie lieben insbesondere Weintrauben, Feigen u. dgl., sowie auch Mehlwürmer.

Hartlaub faßt über ihre Lebensweise Folgendes zusammen: Sie sind lebhafte, muntere, unruhige, äußerst behende Vögelchen, die gewöhnlich in kleinen Flügen, seltener einzeln oder paarweise, Wald und Busch beleben, zur Zeit der Reife mancher Früchte die Gärten und Anpflanzungen heimsuchen und streichend, zuweilen in Gesellschaft von anderen Vögelchen zu gewissen Zeiten ihren Aufenthalt wechseln. Dies letztere gilt indessen nur von einzelnen Arten. Zahlreiche andere sind Standvögel. Meisenartig schwärmen im Winter kleine oder größere Flüge von Baum zu Baum, jedes Aestchen sorgfältig nach Blattläusen und anderen zarten Kerbthieren absuchend (Journal für Ornithologie).

In der Vogelhandlung von Fräulein Hagenbeck fand ich nur zwei Pärchen der obengenannten Art. Es ist die bekannteste und verbreitetste von allen, von einfarbig angenehmen gelbgrünem Gefieder, unterhalb heller und am Unterkörper weißlich grau. Merkwürdig und sehr auffallend erscheint aber der breite, weiße Ring, welchen der Vogel um's Auge hat und der ihm den deutschen Namen gegeben.

Das erste Paar hatte der zoologische Garten von Hamburg erhalten, während bei dem zweiten, mir zugedachten, das Weibchen leider kränklich erschien. In meiner Vogelstube erholte es sich jedoch anscheinend einigermaßen und dies zeigte sich nach meiner

Meinung besonders dadurch, daß die bisher kaum bemerkbaren Augenringe sich vollständig ausbildeten. Das Vögelchen war in Hamburg daran gewöhnt, aus dem Käfige zu schlüpfen und frei umherzufliegen. Dies wußte es auch bei mir zu ermöglichen und zwar in der Weise, daß es zur Fütterung regelmäßig in den Käfig zurückkehrte. Endlich wußte auch das Männchen zu entschlüpfen und da sie draußen in der Vogelstube reichliche Nahrung fanden, so gingen sie jetzt nicht mehr zurück, sondern führten ein anscheinend sehr vergnügliches Leben, bei welchem mir zunächst die große, den Prachtfinken gleiche Zärtlichkeit der beiden Gatten des Pärchens auffiel.

Vor einigen Tagen ist mir das kränkelnde Weibchen nun leider doch gestorben. Hoffentlich wird es aber gelingen, ein anderes zum Ersatz zu beschaffen, so daß ich die vorzugsweise interessanten Beobachtungen über diese Vogelart noch erweitern kann.

Dr. K. N.

Auch etwas über die Brut der Dompfaffen und Distelfinken.

Schon mehrmals, und erst wieder in Nr. 43, lese ich die Beschreibung der Brut eines Dompfaffenpaares als Merkwürdigkeit besprochen und will deshalb auch meine Erfahrungen darin mittheilen.

Vor 2 Jahren setzte ich in die Volière zu Kanarienvögeln auch ein Dompfaffen- und zwei Distelfinkenpärchen. Erstere bauten sich schon nach ganz kurzer Zeit aus Charpie in ein gerade neben der Eingangsthüre befindliches Körbchen ein niederes Nest, das eigentlich nur eine Unterlage für die Eier genannt werden konnte und zogen in 3 Bruten nacheinander im gleichen Nest 13 Junge auf, die sie mit dem gleichen Futter, wie die Kanarienvögel — aber auch dazwischen mit Mehlwürmern — fütterten.

Von den Distelfinken, welche die höchsten Ecken der Volière unter den Dachsparren wählten, erzielte ich in jenem Sommer nur 7 oder 8 aufgewachsene Junge. Im vorigen Jahre brachte ich die alten Paare in eine größere Volière zu Prachtfinken und Wellensittichen. Mit Beginn des Frühjahrs begannen sowol Dompfaffen als auch Distelfinken wieder ihr Brutgeschäft; erstere an einem geschützten Platze in einem Nistkörbchen, das unter der Decke in einem offenen Harzerbauerchen angebracht war und als Nistmaterial dienten Fasern und einige Federn. Die Distelfinken hatten wieder in großer Höhe und unglücklicher Weise in der Nähe der Wellensittiche mit Charpie gebaut und obwol sie öfters ausgeschlüpfte Junge hatten, kam keines zum Ausfliegen, während das Dompfaffenweibchen auf der ersten Brut starb, so lange ich verreist war. Der Diener, der sie zu füttern hatte, kaufte sogleich ein anderes, das ich bei meiner Rückkehr Mitte Mai auch schon wieder brütend fand und von dem ich dann in noch 3 Bruten 11 Junge aufzog. Die Auffütterung geschah ganz wie in Nr. 43 beschrieben ist.

Wegen der verunglückten Distelfinken-Bruten hatte ich die Wellensittiche (über deren glückliche Züchtungserfolge ich ein andermal berichte) im Verdacht, weil ich sie erwischte, als sie mir in einem Neste 5 halbflügge Zebrafinken tödteten. Aber auch die Dompfaffen sind gegen andere Vögel Störenfriede und wurden oft beim Absuchen fremder Nester ertappt, weshalb ich sie im letzten Herbst ganz weg gab und zugleich den Wellensittichen eine andere Behausung anwies.

In diesem Jahre nun bauten die beiden Pärchen Distelfinken, die ich schon drei Sommer habe, sehr niedrig und zwar das eine Paar stets ein offenes Nest, das mit der Hand zu erreichen war, das andere in einem Harzer Nistkästchen. Sie erzogen zusammen 27 Junge, von denen nur eins starb; die andern sind heute noch gesund und munter in der Volière eines Bekannten. Den Distelfinken reiche ich, so oft sich Gelegenheit bietet, ganze Distelpflanzen, über deren Köpfe sie mit großer Gier herfallen und ich sehe dies als die Ursache an, daß diese Thiere heute noch dieselben glänzenden Farben haben, als die frisch eingefangenen, während sie sonst dieselben in der Gefangenschaft verlieren.

Oscar Vetter in Ludwigsburg.

(Diese Zucht ist ein sehr beachtenswerther Beweis für die Behauptung, daß unter Umständen jede Thierart, die in der Gefangenschaft zu erhalten, auch zu züchten ist — wenn man ihr nämlich nur die für ihr Dasein und ihre Ernährung nothwendigen Bedingungen in günstigster Weise zu bieten vermag. Bis vor Kurzem galt grade die Zucht der einheimischen Vögel als mit ganz absonderlichen Schwierigkeiten verknüpft; jetzt beginnt man die Sänger unserer Fluren bereits vielfach mit denselben Erfolgen, als die Fremdländer zu züchten. Jede solche Mittheilung erscheint daher aber auch um so interessanter — und wird von uns mit dem größten Danke aufgenommen. D. R.)

Gefiederte Welt im Osten.

(Fortsetzung.)

Palmyra.

Die Dohle lebt mit diesen Krähen, jedoch in bedeutend kleinerer Anzahl, in innigster Freundschaft, trennt sich von ihnen nur während der Brutzeit, zu welcher sie hohle Bäume, oder sonstige Höhlungen aufsucht, um später mit ihrer Aufzucht wieder zu den Krähen zu stoßen. Im Winter wird in Gemeinschaft in den Dörfern und auf der Landstraße herumgezogen, Abends mit großartigem Konzert auf vor Winden geschützten Bäumen sich zum Nachtlager niedergelassen. Auch ihre Nahrung besteht größtentheils aus Kerbthieren, woher sie immerhin ebenfalls zu den nützlichen Vögeln zu zählen sind. Ob die Dohle, wie ihr nachgesagt wird, sich gerne in den Nestern kleinerer Vögel zu schaffen mache, bezüglich deren Junge verspeise, bemerkte ich bisher noch niemals. Doch will ich es auch nicht durchaus in Abrede stellen, daß es sein kann*).

*) Wir bitten, die Mittheilung des Herrn Struve in Nr. 16 d. J. zu vergleichen.

Das eigentliche Haupt dieser Vogelfamilie, der große Kolkrabe, fehlt hier ebenfalls nicht; doch, seiner Herrscherwürde gemäß, schlägt in den Gärten immer nur ein einziges Paar seinen Sitz auf, von wo es nach Beendigung der Brut oft wochenlang verschwindet und erst wieder im Spätsommer und Winter dahin zurückkehrt. Zum Nistplatz wählt der Kolkrabe gewöhnlich einen der höchsten Bäume, und versteht dabei vortrefflich einen solchen auszusuchen, bei dem durch Ersteigen dem Neste nicht leicht beizukommen ist. Auch ist dieser Kunde schlau genug, sich vor einem Schuß zu wahren, welchen er oft verdiente, da er manchmal seine Sprossen, anstatt auf dem mühsamen Wege mit Hamstern und Mäusen, auf dem bequemeren mit jungen Hühnern u. a. Hausgeflügel zu versorgen pflegt. Sein Horst ist meistens nicht weit von einer Krähenkolonie angelegt, welche er, sobald dort Jugend vorhanden, öfters mit seinen Besuchen beehrt, und es nicht im Geringsten unrecht findet, seiner eigenen Brut, anstatt der Photographien dieses nahen Verwandten, von denselben kaum aus dem Ei geschlüpfte Junge zum Imbiß mitzubringen. Bei dieser Gelegenheit entsteht in der Kolonie natürlich jedesmal großer Lärm, den er jedoch ganz kaltblütig mit seinem rauhen „Kruk, Kruk!" beantwortet. Seine Brutzeit fällt ungefähr 14 Tage früher als die der Krähen, deßhalb ergänzen diese Besuche nur noch die Schlußfütterung seiner Jungen. Im Ganzen genommen ist dieser Vogel, trotz Mäuse- und Hamstervertilgung, mehr schädlich als nützlich, denn er macht sich ebenso gern über junge Hasen, Rebhühner u. dergl. her. Jung aufgezogen und gezähmt, giebt er einen recht possirlichen Gesellen ab, dessen scharfer Verstand hauptsächlich im Ausführen von Spitzbübereien nicht genug zu bewundern ist, und daher auch recht lästig werden kann.

Ferner kommt sehr häufig eine weitere Art von dieser Vogelfamilie, die Mantel- oder Nebelkrähe hier vor. Solche ist noch schädlicher als der Rabe, dem sie, trotz ihres harmlosen Aussehens, an Listigkeit nichts nachgiebt. Ist erst die Brut vorhanden, so sind junge Hühner und Enten nicht mehr sicher. Sie treibt es toller als manch' arg verfolgter Raubvogel, und es ist dann sehr schwer, der spitzbübischen Alten mit dem Gewehre beizukommen, während sie, wenn man dasselbe nicht bei sich führt, einem kaum ein Paar Schritte aus dem Wege geht. Dabei ist dieser Vogel schlau genug, niemals in der Nähe des Nestes zu mausen, das gewöhnlich besser versteckt, wie solches der andern rabenartigen Vögel, angelegt wird. Schon die Jungen bringen die Schlauheit mit auf die Welt, denn beim Füttern geht es so still ab, daß man niemals einen Ton dabei hört. Ich bemerkte einmal an einer Ente, die ihre Jungen im Wasser führte, eine starke Unruhe, dachte gleich, gewiß ist ein Raubvogel in der Nähe, denn die Ente umschwamm die Kleinen mit gesträubten Federn und fortwährendem Geschnatter. Ich versteckte mich daher hinter einen Baum, um der Dinge zu harren, die da kommen werden. Richtig, nicht lange, da löste sich aus dem Blätterwerk des mir gegenüber stehenden Weidenbaumes ganz geräuschlos eine Nebelkrähe, die von der Entenmutter bemerkt, und ihr vielleicht schon von einem bereits ausgeführten Raubzuge her bekannt war, und schoß blitzschnell auf die Schaar los. Die Ente stürzte sich ihr mit lautem Geschnatter und Flügelklatschen, daß das Wasser hoch aufspritzte, ebenso schnell entgegen, wodurch der erste Sturm abgeschlagen wurde. In dem genommenen Schwunge sauste die Krähe dicht über die Kleinen hin, die vor Angst nach allen Richtungen auseinanderstoben, welche Sprengung von der Krähe jedenfalls geplant war, denn dieselbe machte schnell kehrt — und mit einem zappelnden Entchen ging's davon.

Mit vorzüglichem Geruch und Gesicht ausgestattet, wittert sie augenblicklich, wenn irgendwo ein Stück Vieh gefallen, das hier zu Lande nicht eingescharrt wird. In kürzester Zeit versammelt sich ein halbes Hundert dieser Vögel, obwol vorher weit und breit in der Runde keiner zu sehen war, um ihr Mahl zu halten und zugleich als Sanitäts-Polizei zu wirken.

Noch ein Vogel dieser Sippe, die Elster, ist ebenfalls sehr zahlreich hier vertreten, und wol einer der Schmucksten, wie an Schlauheit, Keinem der Verwandten nachstehend. Sie treibt sich vom frühen Morgen bis Abend schäckernd und stehlend herum, im Winter einzeln, oder familienweise vereint, je nachdem die Bissen vorhanden. Abends, zum gemeinschaftlichen Nachtquatier, versammeln sie sich aus dem ganzen Umkreise zu großen Gesellschaften, jedesmal denselben Ort, gewöhnlich ein dichtes Gebüsch beziehend. So liegt z. B. im hiesigen Parke ein Gebüschwinkel, der regelmäßig jede Nacht einer bis über 100 Köpfe zählenden Schaar zur Nachtherberge dient, und es ist mir staunenswerth, woher sich diese große Zahl einfindet, da den Tag über nur wenige Paare in der Umgegend zu sehen sind. Diese Stelle muß mir oft als Futtermagazin für meine in Gefangenschaft gehaltenen Fleischfresser dienen, indem ich heranschleiche, und ein Paar Schüsse unter das auffliegende Raubgesindel sende. Doch um dieses zu erreichen, kann nicht vorsichtig genug angepürscht werden, sonst hebt sich die ganze Gesellschaft unter großem Geräusch empor, lange bevor man in Schußnähe kommt, und läßt sich dann auch durchaus nicht mehr ankommen. Beim Nestbau zeigt die Elster ebenfalls das vorsichtigste Benehmen, indem sie sich damit nur in den frühesten Morgenstunden beschäftigt, so daß ja kein menschliches Auge sie entdecke; doch wird gewöhnlich mit dieser Schlauheit sehr wenig bezweckt, denn wenn die Erbauer auch nicht gesehen, fällt desto mehr das, bald im Gipfel der Bäume, bald im niedern Gebüsche angelegte, große, ganz bis auf's Schlupfloch mit Reisig umhüllte Nest in die Augen und, wenn

man will, der Vernichtung anheim. Verminderung dieser Vogelart muß überall, wo sie viel auftritt angestrebt werden, denn der geleistete Nutzen im Insektenvertilgen steht in keinem Verhältniß zu dem von ihr an den Bruten kleiner Singvögel angerichteten Schaden, den oft gerade die nützlichsten Kerffresser zu leiden haben. Ja sogar kleine Hühnchen werden von ihr wegstibitzt. Ebenfalls macht sie sich in den Obstgärten an den Früchten als recht schädlich bemerkbar, da sie gewöhnlich die Schönsten auf einem Baume für sich aussucht, und durch Anhacken unbrauchbar macht; sie scheint solches übrigens nicht allein zur Sättigung vorzunehmen, sondern sogar aus muthwilliger Spielerei.

(Fortsetzung folgt.)

Weiteres zur Zucht der Harzer Kanarienvögel.

Von W. Böcker in Wetzlar. (Schluß).

Wenn in einer Hecke eine Krankheit epidemisch auftritt, in Folge derer eine junge Brut nach der andern theils nach 3 bis 5 Tagen, theils in halbflüggem Zustande eingeht, so wird man fast in allen Fällen auf Unterleibsentzündung — Darm- oder Eingeweide-Entzündung, auch Brand oder Bruch genannt — schließen können.

Die Kennzeichen dieser fürchterlichen Krankheit sind Seite 261 der diesjährigen „Gefiederten Welt" angegeben, wiederholen möchte ich hier nur, daß die gestorbenen jungen Vögel sehr leicht in Fäulniß übergehen.

Man hält allgemein und, wie ich glaube, mit Recht dafür, daß die Ursache in zu massenhaft dargereichtem Weichfutter zu suchen sei; läugnen läßt sich dabei allerdings nicht, daß Fälle vorkommen, wo die jungen Vögel eines frühern Jahrgangs bei demselben Futter ganz gesund blieben. Ein solcher Fall ist uns in den Nummern 24 und 26 der „Gefiederten Welt" von diesem Jahre mitgetheilt und von einem anderen Falle weiß ich aus der mündlichen Erklärung eines Gießener Züchters, der an der erwähnten Krankheit in diesem Jahre viele junge Vögel verloren hat, obgleich er eine Aenderung in der seit Jahren mit gutem Erfolge beobachteten Fütterung nicht vorgenommen hatte. Möglich, daß derselbe einige nicht ganz gesunde Weibchen eingesetzt hatte, möglich auch, daß Zugluft oder eine niedrige Temperatur mehr wie in den vorhergehenden Jahren nachtheilig eingewirkt haben. Der schädliche Einfluß kühler Tage und Nächte ist nicht zu verkennen. Die jungen Vögel bekommen danach Durchfall, die Zuchtvögel sind sonach nicht wol im Stande, das Nest rein zu halten. Dieses wird sehr bald von den flüssigen Entleerungen vollständig überzogen und wird nun seinerseits die Ursache zu fortwährenden neuen Erkältungen.

Die jungen Vögel, deren Verdauung gestört ist, magern in Folge dessen ab, zeigen aber, so lange keine Entzündung der Eingeweide hinzugetreten, einen sehr regen Appetit und werden daher von der Alten überfüttert. Die Folge hiervon ist ein stark aufgetriebener, übrigens magerer Unterleib bei eingefallener Brust, welcher nach wenigen Tagen in Entzündung übergeht. Die Eingeweide sind hierbei ersichtlich aufgebläht, anscheinend verwickelt, sie bekommen im letzten Stadium der Krankheit eine schwärzliche Farbe und diese erstreckt sich häufig auch über den ganzen Unterleib.

Bei den alten Vögeln stellt sich während dieser Zeit nicht selten ebenfalls Durchfall ein, da dieselben bekanntlich aus dem Kropfe füttern, so kann dieses nicht wol ohne Nachtheil für die junge Brut bleiben und diese erscheint dann um so mehr gefährdet.

Bei zu reichlich gefüttertem Weichfutter, namentlich, wenn dieses zu naß gehalten ist, gedeihen die Jungen in den ersten acht Tagen in der Regel sehr gut, bis dahin haben sie dasselbe noch verdauen können, wie denn junge Vögel überhaupt in den ersten Tagen ihres Daseins vorherrschend auf weiche Nahrung angewiesen sind. Später und namentlich im halbflüggen Zustande verlangen dieselben schon trockenere Stoffe, und wenn sie nun fortgesetzt und reichlich mit stark eingeweichtem Samen oder zu feuchtem Eifutter gefüttert werden, so zeigen sich als nächste Folge große weiche Exkremente, meist von grünlicher Farbe, wenn die Nahrung vorherrschend aus eingeweichtem Samen bestand. Diese Entleerungen werden von den alten Vögeln nicht selten wieder zum Füttern verwendet und beschleunigen so die Krankheit, welche im Uebrigen den oben erwähnten Verlauf nimmt.

Die Krankheit kann nicht so leicht geheilt werden; ihr fallen alljährlich viele Nestlinge zum Opfer. Wärme sowie trockne Fütterung, sparsame Verwendung des Eifutters können dieselbe wenigstens verhüten. Diese Erfahrung habe ich noch in diesem Jahre in der eignen Hecke gemacht und erlaube ich mir, zu Nutz und Frommen der Züchter den Fall nachstehend mitzutheilen:

Ich füttere in meiner Hecke genau so, wie dies in den meisten Züchtereien Andreasbergs gebräuchlich ist: guten Sommerrübsen und eine Mischung von hartgekochtem Ei und geriebenem Weißbrot mit einem Zusatz von Mohn. Der Samen war Abends vorher mit heißem Wasser übergossen, dann aber getrocknet, so daß er nach etwa 10 Minuten wieder rollte. Beim Beginn der Hecke und bis zum Eintritt der warmen Jahreszeit wurde die Heckstube geheizt. Sobald die ersten Jungen ausgeschlüpft waren, wurde das Eifutter so oft gereicht, daß nie Mangel daran war; mehr als ein Ei nebst drei Vierteln eines Dreierbrötchens wurde auf einmal nicht gegeben. Da das häufige Füttern aber mit der Zeit zu lästig fiel, so wurde später in größeren Pausen die doppelte Portion verabreicht und damit das Eifutter nicht zu trocken werde, mehr Wasser wie früher zugegossen, wobei dasselbe aber immer noch die Pulverform behielt. Zugleich blieb in warmen Tagen das ver-

gitterte Fenster stets offen, selbst zur Nachtzeit, obgleich die Nächte hier gemeiniglich kühl sind. Von nun an zeigten sich in einigen Nestern die ersten Spuren der Darmentzündung. Dieselbe erstreckte sich später auf noch andere Bruten, so daß ich damals in wenigen Wochen die Hälfte der Nestjungen verlor.

Da verschiedene Weibchen und auch einige Männchen zu gleicher Zeit an Durchfall litten, so vermuthete ich, daß sich die Vögel an dem offenen Fenster eine Erkältung zugezogen. Dasselbe wurde nun früh Nachmittags geschlossen; die Krankheit aber wollte sich immer nicht ganz legen. Woran mochte das nur liegen? Zu kalt war es nicht in der Heckstube und in der Fütterung war, von dem reichlichern Wasserzusatze abgesehen, keine wesentliche Aenderung eingetreten. Sollte das Eifutter zu feucht, sollte es zu reichlich gegeben sein? Anders ließ sich die Sache nicht gut erklären.

Statt der bisher gefütterten 10 Eier wurden daher in den nächsten Tagen 9 bis 7, dann nur 6 Eier nebst dem zugehörigen Weißbrot gereicht. Der Wasserzusatz wurde ganz weggelassen und unter das Eifutter eine große Dosis von Mohn gemengt, so daß auf ein Ei eine kleine Handvoll davon kam. Die Folgen dieser Maßregel waren durchaus erfreulich. Von einem Verluste eines einzigen schlecht gefütterten Jungen abgesehen, gedieh die Brut in allen Nestern ganz vortrefflich; sie wuchs rasch und kräftig heran und war durchgängig nach 14 Tagen flügge. Von der gefürchteten Krankheit keine Spur! Ich hatte nur zu bedauern, daß die kurz darauf eintretende Mauser weitern Beobachtungen ein Ende machte; der Umstand aber, daß grade die letzte Brut der Weibchen gegen die Regel so gut gedieh und die Krankheit mit der bewährten Aenderung in der Fütterung völlig verschwand, dürfte zu dem Schlusse berechtigen, daß die Ursache dazu eben hierin zu suchen ist.

Die Frage, ob Käfighecke oder Flughecke, ist unter den Züchtern gewiß vielfach erörtert worden. Ob die eine oder andere zu wählen, wird nicht immer von dem freien Willen der Züchter abhängen. Diesem fehlt die Zeit zu der mit der Käfighecke verbundenen Einzelfütterung, Jenem ein passendes Zimmer zur Hecke; davon abgesehen wird sich eine Uebereinstimmung der Meinungen für die nächste Zeit wol noch nicht erzielen lassen. Der in Nr. 34 der „Gefiederten Welt" abgedruckte Artikel über die beste Zucht von Kanarienvögeln beweist jedenfalls, daß auch die Käfighecke sehr lohnend sein kann. Da indeß der Ertrag einer Hecke wesentlich von dem dargereichten Futter abhängt, so wäre es mir und vielleicht auch andern Züchtern sehr erwünscht gewesen, wenn dasselbe in jenem Aufsatze näher beschrieben worden wäre. Vielleicht ist der Herr Verfasser so freundlich, dies zu gelegener Zeit nachzuholen.*) Die bezüglich der Verabreichung des Badewassers ausgesprochenen Ansichten stimmen mit meinen eignen Erfahrungen vollkommen überein; ich glaube dies hier anführen zu sollen, weil öfter, sogar in einer ausführlichen Anleitung zur Zucht, Wartung und Pflege der Kanarienvögel vor dem Darreichen von Badewasser während des Brütens der Weibchen gewarnt worden ist.

Das Ueberwintern der Harzer Kanarienvögel im ungeheizten Raume, wie es bei dem Herrn Verfasser des erwähnten Artikels gebräuchlich ist, beschränkt sich bei den Züchtern meiner Bekanntschaft und bei mir selbst durchweg auf die Weibchen; es würde daher von Interesse sein, zu erfahren, ob der Gesang der Hähne unter der Kälte nicht leidet. Vielleicht ist der Herr Verfasser so freundlich, an dieser Stelle seine desfallsigen Erfahrungen ebenfalls mitzutheilen. Als ich vor fünf Jahren von einer mehrmonatlichen Krankheit befallen wurde, blieb ein Theil meiner jungen und alten Vögel bis kurz vor Weihnachten im ungeheizten Heckraum. Während die bei Zeiten in eine geheizte Stube gebrachten Vögel um jene Zeit vollständig im Gesange ausgebildet waren, waren jene Vögel während der letzten 10 Wochen fast gar nicht voran gekommen; die Stimme entbehrte der nothwendigen Rundung und die Strophen waren durchweg sehr kurz. Auch der alte Vorschläger war erheblich zurückgegangen. Was später aus diesen Vögeln geworden ist, habe ich mit Sicherheit nicht erfahren können. Einige Jahre vorher mußte ich einen jungen Vogel, der sich einen schlimmen Fehler im Gesange angewöhnt hatte, in eine kalte Stube bringen, der Gesang ging hier wieder bis zum Dichten zurück.

Denjenigen Liebhabern, die in gleicher Lage dieselbe Maßregel treffen wollen, möchte ich übrigens anrathen, dabei mit Vorsicht zu verfahren. Vögel, die einmal ein warmes Zimmer gewohnt sind, erkranken in kühlerem Raume leicht an Lungenentzündung.

Als Gegenstück zu den von dem mehrerwähnten Herrn Verfasser mitgetheilten erfreulichen Züchtungserfolgen möchte ich hier noch bemerken, daß ein Gießener Züchter in diesem Jahre in der Käfighecke von fünf Hähnen und ebensoviel Weibchen nur sieben Hähne gezogen hat, während eine Dame daselbst zu gleicher Zeit in der Zimmerhecke von einem Hahne und drei Weibchen 21 junge Vögel, darunter 12 Hähne, erzielte. —

Die Paarung der Kronvögel untereinander anlangend, so habe ich bei meiner diesjährigen Anwesenheit in Andreasberg die Ansicht eines der erfahrensten Züchter darüber eingeholt. Derselbe wollte aus eigener Erfahrung wissen, daß von zwei gehaubten Vögeln zuweilen Junge mit ganz untadelhafter, besonders starker Haube fallen, daß aber in den meisten Fällen Kahlköpfe aus einer solchen Paarung hervorgehen.

Die Bildung einer dicht geschlossenen Krone scheint übrigens noch von anderen Ursachen abzuhängen. In diesem Jahre fielen in einer Käfighecke

*) Wir bitten ebenfalls darum! D. R.

meines Freundes D. von einem glattköpfigen Hahne und einer schön gehaubten Henne zwei Kronvögel, welche beide einen kahlen Flecken im Nacken haben, während die zu derselben Zeit in meiner fliegenden Hecke von gleich gefiederten Eltern gefallenen Jungen eine fehlerlose Holle zeigen. Vor etwa 4 Jahren besaß ich ein gehaubtes Weibchen, welches im ersten Jahre eine schöne Krone hatte. Nach der Mauser änderte sich die Sache; es hatte während des ganzen zweiten Jahres einen ziemlich großen kahlen Nackenflecken, der sich auch im dritten Jahre nicht ganz verlor. Der Federwechsel hatte in der Zimmerhecke zu gewöhnlicher Jahreszeit stattgefunden.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Wie verhält es sich eigentlich mit dem Wassertrinken der Graupapageien? Die Händler bieten oft welche aus, mit dem Bemerken: „an Wassertrinken gewöhnt"; gleichwol, wenn man einen Vogel kommen läßt, steht auf dem Geleitschein: „kein Wasser zu trinken geben!" Nun bietet man ihnen Badewasser, was in Ihrem „Handbuch" so sehr empfohlen wird, sie trinken davon, haben andern Tags den Durchfall und man hat, trotz aller Pflege, in kurzer Zeit ihren Verlust zu beklagen. Auch möchte ich wol Ihre Ansicht darüber hören, ob in einem Käfig, in dem ein Papagei gestorben, sich etwas Ansteckendes erhalten könnte, welches den Nachfolger ebenfalls den Tod bringen müßte? Ich habe Erfahrungen gemacht, welche mich in diesem Glauben bestärken müssen.

Antwort. Diese Frage ist im Laufe dieses Jahrgangs bereits mehrmals, unter Anderm von Herrn Lintz, Jamrach, Dr. Reichenow u. A. erörtert worden. Lesen Sie also gefälligst nach. Demnächst bringen wir auch noch mehrere Erkrankungs- und Sektionsberichte. Für Sie insbesondere ist es aber beachtenswerth, daß man allen gekauften Vögeln — gleichviel welcher Art — in der Regel nicht früher Badewasser bieten darf, als bis sie völlig eingewöhnt sind. Ob die Krankheit eines Vogels nach seinem Tode noch ansteckend sein kann, das kommt darauf an, an welcher Erkrankung er gestorben. Die Graupapageien sterben fast regelmäßig an Krankheiten, die Folgen des Transports und gewöhnlich nicht ansteckend sind. Selbstverständlich muß der Käfig aber nach jedem Todesfall doch immer sorgfältig gereinigt werden. —

Antwort. Herrn W. Langner in Liegnitz. Das sehr schöne Kanarienhähnchen war an Darmentzündung gestorben. Zugluft, Naßkälte oder verdorbenes Futter können die Ursachen der Erkrankung sein. —

Herrn Conr. Glauert in Bremerhaven: Der Nachweis von Quellen zum Einkauf ist zuweilen ein recht schwieriger, besonders wenn es Tauben, Hühner u. dgl. Bewohner des Geflügelhofes betrifft, namentlich in gewissen feinen und selteneren Rassen. Der beste Weg zur Beschaffung dürfte dann wol immer die Annonce sein. Eine große Sammlung von Tauben wurde übrigens von Herrn Th. Thiel in Bromberg ausgeboten. Vielleicht befinden sich unter denselben die von Ihnen gesuchten. —

Herrn Dr. E. Schütz in Calw und Herrn Apotheker von Rosenberg in Kruschwitz: Ihre Alexandersittiche zeigten dieselbe Krankheit in zwei verschiedenen Formen. Bei dem einen erschien sie als eine pilzartige Wucherung, ähnlich dem Schwamm der Obstbäume, zu beiden Seiten des Schnabels, an der oberen Seite der Rachenhöhle sich hinaufziehend bis zum Schlunde, wo sie den Tod nicht sowol durch Erstickung als vielmehr durch Hineindringen in die Gehirnmasse bewirkt hat. — In dem zweiten Falle erstreckte sich die ebenfalls zellenartige Wucherung über den ganzen Vorderkopf, hatte den Schädelknochen ganz mürbe gemacht und war theilweise zum Gehirn durchdrungen. Wir bitten in beiden Fällen um einen näheren Erkrankungsbericht. —

Herrn Apotheker Neuß in Essen: Ihre Spottdrossel ist an einer krankhaft entarteten, weich und schmierig gewordenen Leber gestorben. Vielleicht liegt es an der Fütterung. Schade um den herrlichen Sänger! —

Ist es wol erfolgversprechend, mit Mönchs- und Quäker-Sittichen und mit Halbmond-, sowie Grassittichen und auch Grauköpfchen, ferner Buntsittichen und Pennantsittichen einen Ueberwinterungsversuch in ungeheiztem Raume zu machen, bezgl. mit welchen von diesen Arten am ehesten?

Dönniges.

Antwort in der nächsten Nummer.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Rheydter Kaninchenpark.

Mit Genehmigung der K. Regierung ult. November c.:

Große Verloosung

(3000 Loose à 5 Sgr.).

Es werden verloost:
Race-Kaninchen, Hühner, Enten, Tauben, Truthühner, Vögel 2c.

Gegen Franco-Einsendung des Betrages werden Loose franco versandt.

Die Gewinnliste wird durch diese Zeitung bekannt gemacht.

Rheydt, im October 1874.

Die Direction.

[687] Peter Beines.

Gelernte Gimpel suche zu kaufen. Angebot erbitte

C. E. Schneider,

(688) Zwickau, Sachsen.

Kanarienhähne, gelbe, isabellfarbene, graubunte und gehäubte à 2—3 Thlr., Kanarienweibchen, Bandfinken und Singdrosseln hat zu verkaufen oder gegen Nymphen zu vertauschen. [689]

Nicolaiken i. O.-Pr. v. Skotnicki.

Russische Haken- und Karmingimpel und Waidenammen und Ameiseneier pro Pfd. 15 Sgr., sind zu haben bei

Brune, Vogelhändler,

[690] Berlin, Gartenstraße 62.

Leporiden, zuchtfähig, graue wie auch blaue Thiere, im Freien gezüchtet, per Paar . . . . . Thlr. 5.
2 Paar zahme diesjährige Rehe, per Paar . . „ 25.
1 Steinmardermännchen, sehr groß, aufgezogen „ 8.
1 Edelmardermännchen, „ „ „ 9.
sowie mitunter Uhu's, Eichhörnchen 2c., empfiehlt

H. W. Schaible,

[691] Hüfen, Württemberg.

Wellensittiche	pr. Stck.	2	Thlr.	22½ Sgr.
Mönche	„ „	2	„	— „
Turteltauben	„ „	1	„	— „
Lachtauben	„ „	—	„	20 „
Singsittiche	pr. Paar	9	„	— „
Rothbr. Portorico-Papageien	pr. Stck.	8	„	— „
1 junger Pirol, Männchen . . .		3	„	— „

versendet unter Nachnahme

F. L. Paulus,

[692] Hessen-Cassel.

1 Multicolor-Weibchen und 1 Paar Rosellas giebt billig ab

[693] Wilckens, Karlsruhe, Stephanienstr. 44.

Harzer Kanarienvögel.

Mein Vorrath besteht fast durchweg aus St. Andreasberger Vögeln besten Stammes. Einen kleinen Posten gewöhnlicher Harzer Vögel gebe ich an Händler zu billigem Preise ab. Auch bei rauhestem Wetter geschieht der Postversandt unter Garantie gesunden Eintreffens bis auf 3tägige Entfernung. [694]

A. Maschke, St. Andreasberg im Harz.

Ein kerngesundes junges Weibchen rother Kardinal verkauft incl. Verpackung um Thlr. 4.

Sigmund Büchele, Kürschner,
[695] Memmingen (Bayern).

Etwa 120 der feinsten Harzer Hohlroller eigner Zucht, mit fehlerlosem, herrlichem Gesange, werden zu 4—8 Thlr. per Stück abgegeben.

Fr Wiegand, Lehrer,
[696] Anspach, Amt Usingen.

Zu verkaufen:

Zebrafinken, à Paar 4 Thr.,
Indianertauben in roth, à P. 4 Thlr.,
Indianertauben in schwarz, à P. 3½ Thlr.,
Mövchen in gelb, à P. 3 Thlr.,
Mövchen in weiß, à P. 2 Thlr.,
Harzer Roller, à St. 3 Thlr.
Nürnberg, äußere Laufergasse.
[697] **K. Th. Hauser.**

Einen 1 Jahr alten getigerten Boseer Hund mit Doppelnase verkauft [698]
Braunschweig. **Alwin Reiners.**

20 Stück **Brieftauben,** meist alte Paare, seit Jahren nach verschiedenen Richtungen bewährt, z. Zucht zu benutzen, und 2 aufgezogene **Schleier-Eulen,** schön gefiedert, wegen Umzug preiswerth zu verkaufen. D. Exp. sagt wo. [699]

Russische 1874er Ameisen-Eier empfingen und empfehlen **Metz & Bengelsdorff,** Berlin. [700]

Vogelhandlung
von
Joseph Zuckerkandel,
Dresden, Wallstraße 8. I.

empfiehlt ein wohlassortirtes Lager exotischer Vögel, franz. Kanarien und die allgemein bekannten und renommirten fehlerlosen reinen Kanarienvögel eigener Zucht, als Glucker, Hohlroller, Klingelroller mit Knurren, Roller mit jammernden Touren, ebenso beste reinste Zuchten Harzer Kanarienvögel. [701]

Kaninchen.

Englische Schecken und Kreuzung von diesen mit Normandienern empfiehlt in schönen Exemplaren, im Alter von 6 Wochen, das Paar mit 1 Thlr. 5 Sgr. incl. Verpackung.

Julius Schück
[702] in Marschallshagen bei Lichtenau in Westfalen.

2 bis 3 Ctr. Fierbret werden zu kaufen gesucht. Billigste Offerten wolle man an die Großhandlung exot. Vögel. Leipzig, Markt 3. II. richten. [703]

Für Kanarienzüchter!

Empfiehlt solide gearbeitete Nisttäften à Dtzd. 1 Thlr. 18 Gr., große Flugbauer, in welchem circa 25—30 Vögel bequem Raum haben, à Stück 2½ Thlr. Auch Kanarien-Hähnchen feinster Rasse.
[704] **C. Lange** in Andreasberg am Harz.

Harzer Kanarienvögel,

diesjährige, gesunde reine Vögel, habe ich 6 Paar, oder auch einzelne, billig abzugeben.

Friedr. Weber beim Hirsch,
[705] Leutkirch, Württemberg.

Christiane Hagenbeck's
Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

hat vorrätbig: hell- und dunkelrothe Araras, Rosa-Katadus, große und kleine Schwarzpapageien, doppelte und kleine Gelbkopf-, rothstirnige, weißstirnige und gewöhnliche Amazonenpapageien (Chrysotis amazonica), Maximiliianspapageien (Pionias maximiliani, Pionias violaceus, Pionias fuscicapillus), ferner Glanzsittiche, (Platycercus splendens.) rothbalsige Perlerike, blaue Gebirgsleri, Pennantis, Rosellas, Katadillen, Wellenpapageien, grautöpfige Inseparables, Sperlingspapageien, Halbmondsittiche, Gelbwangensittiche, Grassittiche, Quäkerpercquiten; Weibchen von: gelbstirnigen Neuseeländer-, Paradies- und Vielfarbsittichen, rothe, graue und Dominicaner-Kardinäle, rothe und schwarze Tanagra, amerikanische Blaubeher, gelbschnäblige Elstern, -amerikanische und chinesische Spottvögel, Katzenvögel, Baltimorevögel, Gartentrupiale, weißbrüstige und schwarze Büll-Büll, Sonnenvögel, Gelbkopfweber (Ploceus bengalensis und hypoxantus), Flammenfinken, Orange- und Napoleonsweber (letztere nicht in Farbe), Madagascarweber, weiße, gescheckte und gewöhnliche Reisvögel, bunte japanische Mövchen, dreifarbige Nonnen, Zebrafinken, St. Helena-Fasändchen, Bengalisten (sehr schön in Farbe), Astrilde, kleine Elsterchen, Silberbecks, Atlasvögel, Paradieswittwen, Safranfinken, Graupfäffchen, Bronzemännchen, Bandvögel, Indigovögel (schlecht im Gefieder), Muscatvögel und Männchen von kalifornischen Wachteln, auch ein Paar Nicobartauben, die hier schon brüteten. [706]

Soeben mit Segelschiff eingetroffene sehr schöne, kräftige Graupapageien das Stück 12 Thlr. Außerdem auch die beliebten Bartmeisen.

Groß-Handlung überseeischer Vögel von Gebr. Zeidler
Halle a/S.

empfehlen ihr reichhaltiges Lager aller Arten **Vögel** und **Amphibien.** (Preislisten gratis.)
Dieselben haben auch 1 jungen afrik. Windsteppenhund (Hündin) zu verkaufen. [707]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 19. November 1874. Nr. 47.

Inhalt:

Noch einmal die Dolchstichtaube. —
Zur Zucht der Wellensittiche. —
Beitrag zur Kenntniß des Harzer Kanarienvogels. —
Gefiederte Welt im Osten. (Fortsetzung). —
Briefliche Mittheilungen: Zur Wellensittichzucht; Tigerfink und Schmetterlingsfink; Legenoth; Grauedelfink. —
Anfragen und Auskunft: Rosenrother Kakadu; Ueberwinterung; Brutöfen; Lungenkatarrh. —
Aus den Vereinen: München; Stettin. —
Entgegnung. — Anzeigen.

Noch einmal die Dolchstichtaube.

Als Nachtrag zu dem Aufsatz über die Dolchstichtauben kann ich Ihnen sagen, daß ich dieselben in jedem Jahre seit 1871 züchte. Im laufenden Jahre habe ich 8 Junge gezogen. Die Züchtung ist eine sehr leichte. Die Tauben verlangen ein geräumiges Vogelbauer; ist der Raum zu beengt, so plagt das Männchen das brütende Weibchen und dies verläßt die Eier. Die Tauben scheinen auch animalischer Nahrung zu bedürfen, denn mit wahrer Gier fallen sie über Mehlwürmer und selbst Regenwürmer her. Ein Paar Grad Kälte (2—0 R.) scheint sie nicht zu belästigen, ich glaube aber doch nicht, daß sie in Deutschland im Freien überwintert werden können. Ich schicke morgen an Herrn Dr. Bodinus ein Pärchen ab.

J. Cornely, Schloß Beaujardin bei Tours.

Zur Zucht der Wellensittiche.

Meine Wellensittiche wollen weder grüne Erbsen in oder außer den Schoten, noch auch alte gequellte Erbsen anrühren, dagegen fressen sie Weizen gequellt sehr gern und halbreife, in der Milch stehende Weizenähren zogen sie jeder anderen Getreideähre, selbst der halbreifen Hafergarbe, die nächstdem ihr Lieblingsfutter spendete, vor. Niemals habe ich übrigens unter den Futterresten ein einziges angebissenes oder zerschrotetes Ameisenei finden können, darum habe ich gedörrte sehr reichlich beigegeben; stets waren die unberührten Ameiseneier auf dem Grunde des Napfes zurückgeblieben, ganz gleich, ob sie vorher gequellt oder trocken waren. Nunmehr zerschrote ich die Ameiseneier und gebe unter das Quellfutter ein Gemisch dieses Schrotes nebst Eierbrot. Die Jungen sind dabei vorzüglich gediehen. Außerdem stecke ich von Zeit zu Zeit in der Vogelstube frische Bäumchen von Flieder und Akazie (einer gelbblühenden Art) auf, welche letztere die Sittiche immer schleunigst nagend entrinden, bis nur die blauen Zweige ohne Rinde übrig sind. Das Fehlen der letzteren — Baumrinde nämlich — mag wol in den meisten Fällen die Ursache von Degeneration der hier gezüchteten Wellensittiche sein!

Jaenicke, Apotheker in Hoyerswerda.

Beitrag zur Kenntniß des Harzer Kanarienvogels.

Der vorzüglichste unter allen Finken ist als Sänger der Harzer Kanarienvogel. Man unterscheidet beim Harzvogel: 1) Kollervögel, 2) Hohlroller, 3) Gluckervögel, 4) Rollvögel oder gewöhn-

liche Roller. Die Kollervögel sind seit mehreren Jahren in der Abnahme begriffen, der reine Gluckervogel ist fast gänzlich ausgestorben, dagegen werden auf Kosten jener jetzt fast nur Hohlroller und Roller im Harze gezüchtet. Ein vorzüglicher Harzvogel leistet durch sein herrliches Lied Erstaunliches. Die Erfahrung hat mich bis jetzt belehrt, daß unter den Vogelliebhabern noch Tausende sind, welche den feinen Gesang der besten Stämme der Harzvögel gar nicht kennen, ferner sind viele unter denen, die ihn gehört haben, welche ihn nicht genug würdigen und besonders nicht wissen, welche Forderungen von dem feinen Kenner an den vorzüglichsten Harzvogel gestellt werden. In Folgendem will ich es versuchen, den Gesang eines der besten Harzvögel zu beschreiben.

Der Lockton eines feinen Sängers muß zart und flötenartig sein; er darf denselben aber nur selten hören lassen. Lockt der Vogel, ehe er sein Lied vortragen will, 6—8mal, so ist dies fehlerhaft; lockt er 2—3mal zart und leise, so läßt sich dies das Ohr des feinen Kenners schon gefallen, lockt der Vogel aber vor Beginn seines Liedes gar nicht, so ist der höchsten Anforderung Genüge geleistet. Der Gesang selbst muß mit einer zarten, langen Hohl- oder Lispelrolle beginnen, wol auch mit einer feinen Flöte oder Hohlpfeife, wie hü, hü, hü, 3—6mal. Im letzten Falle muß stets eine schöne edle Rolle auf die Flöte folgen. Beginnt das Thierchen mit einer edlen, leisen Rolle, so ist es dem Kenner am erwünschtesten, wenn dieselbe etwas angeschwellt wird; doch solche Vögel sind selten, welche diesen Anfang stets hören lassen. Unter meinen besten zehn Kollervögeln und Hohlrollern habe ich nur drei, welche so beginnen, die anderen sieben beginnen auch fast nur mit einer Hohlrolle oder Lispelrolle, (einer mit der Hohlschnatterrolle), aber kein einziger jener sieben schwellt die Anfangsrolle an. Auf die Anfangsrolle müssen zwei bis drei andere edle Rollen folgen und dann darf ein feiner Pfiff, oder auch eine Hohlflöte oder auch ein Glockenton, wie dü, dü 2c., oder tü, tü 2c., oder du, du 2c., oder tzü, tzü 2c., oder tzu, tzu 2c. folgen. Sechs bis zehnmal müssen letztere Töne angeschlagen werden und nicht *hastig* auf einander folgen, sondern langsam, gemessen, getragen. Am schönsten ist jetzt der Fortgang des Liedes, wenn auf diese Nachtigaltöne eine ganz tiefe, lange Baßrolle folgt; nach dieser darf eine Hohlrolle, eine Hohlpfeife, oder eine Koller folgen. Folgt auf die Baßrolle eine feine Hohlrolle, so klingt nach dieser die Koller am schönsten. Auf die Koller soll eine schöne, tiefe Hohlpfeife folgen und in dem Fortgange des Liedes müssen Hohlrollen, Schnatterrollen, nur wenige feine Triller, Klingelrollen, Gluckertöne, Schwirrrollen mit der Koller oder Baßrolle und den Hohlpfeifen in anmuthigen Verbindungen mit einander abwechseln. Der Schluß ist am schönsten, wenn ein tiefer Nachtigalenton einmal angeschlagen wird, wie tzü, oder tzu. Doch solche Vögel sind wieder selten; nur drei habe ich meines Wissens so gehört, wiewol ich schon über sechszig der besten und geringeren Stämme seit 13 Jahren kennen gelernt habe. Die Länge der Touren bedingt ebenso sehr die Güte und den Werth des Vogels, wie die Feinheit des Sangorgans und die Schönheit und Vielsättigkeit der Touren. Die Touren müssen so lang gezogen werden, daß man mindestens bis 12 und höchstens bis 25, allenfalls bis 30 zählen kann.

Ferner darf der Sänger nicht in seinem Gesange abbrechen, wenn er etwa 3—6 Touren gesungen hat, sondern er muß „durchschlagen", d. h. er muß sein ganzes Lied ruhig und ohne Erregung, d. h. leidenschaftslos und ganz im Zusammenhange vortragen. Er darf nicht zu viel und nicht zu wenig singen. Behandlung und Fütterung treffen hier beim Kenner das Richtige.

Der Käfig des Kanarienvogels darf niemals sehr groß sein; er muß so hängen, daß der Vogel nicht zum Fenster hinausschauen kann; dadurch wird er zerstreut und singt fast *niemals* durch. Am besten ist es, man gewöhnt den jungen Vogel im November, da er sein Lied völlig erfaßt hat, an's „Zudecken"; d. h. man deckt ein dünnes blaues oder grünes Tuch so über den Käfig, daß das Thierchen an keinem Plätzchen herausschauen kann. In dieser Weise behandelt, singt er ruhig und nicht zu viel, zieht auch die Rollen länger und singt Abends bei der Lampe gewöhnlich bald, wenn er aufgedeckt wird. Das Futter besteht in gutem Sommerrübsamen und täglich gebe man ihm einen Theelöffel voll hartgesotten Eies und trocken geriebenen Weck (Weißbrot), beides gut und fein zerhackt. Salat, Zucker und sonstige Erfrischungen schaden der Stimme und verderben den Magen. Frisches Wasser reiche man täglich 1—2mal, ebenso wöchentlich frischen Sand und zerstoßene Eierschalen.

Damit der Leser und besonders der Liebhaber noch wissen kann, welches etwa alle die technischen Ausdrücke für Benennung der einzelnen Touren beim Kenner und Züchter im Harze und bei uns sind, will ich dieselben noch anführen:

Triller, grobe Rolle, Schnarrrolle, Krachrolle, Wasserrolle, Lispelrolle, Schwirrrolle, scharfe Schnatterrolle, feine Schnatterrolle oder Hohlschnatter (Herr Bergmann in Wiesbaden nennt letztere feine Schnätter), Baßrolle, Hohlrolle, (gerade Hohlrollen, abwärtsgebogene und aufwärtsgebogene Hohlrollen), Klingelrolle, Kollerrolle, Gluckerrolle, Pfiffe, Hohlpfeife, Glockentöne oder Nachtigallentöne, Gluckertöne oder Glucker, Wasserflöte, Wasserglucker, Schnatterglucker, Koller, Gluckerkoller.

Ich habe so ziemlich mit den minderschönen Touren im Aufzählen begonnen und so steigend die schönern nachfolgen lassen. Am herrlichsten klingt eine tiefe lange, abwärts gebogene Koller. Meine Kollervögel singen zwei verschiedene, lange, tiefe Kollern und sind völlig fehlerlos. Ebenso habe ich bei Herrn *Böcker* in Wetzlar völlig fehlerlose, sehr feine Hohlroller gehört, ebenso ganz vorzügliche

fehlerlose Kollervögel bei Herrn Bergmann in Wiesbaden. Die meisten Stämme, welche die Händler vom Harze zu uns bringen, haben gewöhnlich einen oder mehrere Fehler, wie zeze ꝛc. oder teptep ꝛc. oder zit, zit ꝛc. oder japp, japp ꝛc. ꝛc. ꝛc. Dieses armselige Geschrei darf kein edler Vogel hören lassen, der dem feinen Kenner vollständig genügen soll. — Die Koller, die Meistertour des edlen Gesanges, habe ich am schönsten bei einem Kollervogel gehört, den ich vor 3 Jahren besaß; sie klang wie wu wu wu wu ꝛc. oder bu bu ꝛc. und war schöner, als die Nachtigalkoller. Meine jetzigen Kollervögel haben eine sehr ähnliche Koller, dieselbe ist aber etwas leiser und feiner als jene und nicht so volltönend, sonst aber ebenso schön; die andere Koller meiner Vögel ist eine sogenannte Doppelkoller, indem der Hörer beim Vortrag derselben zwei verschiedene Töne vernimmt, welche mit einander klingen. Letztere ist großartiger als die erste, aber nicht so fein und lieblich. Nach meinem Dafürhalten ist ein feiner, fehlerloser Kollervogel mit tiefer schöner Koller (oder besser noch mit zwei verschiedenen Kollern), der beste Sänger unter den Harzvögeln; andere Kenner stellen den feinen Hohlroller obenan.

In Heckstuben, nach der Sonnenseite gelegen, zieht man bessere Sänger, als in Kastenhecken. Nur in zwei verschiedenen, geräumigen, warmen Heckstuben züchte ich meine Vögel. Kollervögel und Hohlroller halte ich getrennt und setze zu 30 Weibchen 10—12 Männchen.

Die Feinheit der Stimme und der edle Ton des vorzüglichsten Kollervogels und des feinen Hohlrollers übertrifft jeden anderen Sänger der Lüfte, selbst die Nachtigal, diese Königin des Gesanges. Im Wohnzimmer, selbst im Studirzimmer kann man den feinen, leisen, anmuthigen Gesang eines solchen Harzvogels ertragen. Selbst wenn die Nerven des Besitzers etwas überreizt sind und ihm die Töne des gewöhnlichen Kanarienvogels unausstehlich sein würden, so ruft der feine Harzvogel gar oft durch sein herrliches, edles Lied neue Freude, neue Lebenslust selbst in dem kranken Herzen hervor. Daher hat der Liebhaber seine Vögel wie Kinder lieb und bietet Alles auf, um sie gesund zu erhalten. Der Kenner und Züchter aber sorgt unverdrossen dafür, daß er seinen Stamm vervollkomme und so weit durch alle „Schulen" und „Stufen" bringe, daß derselbe zu den besten Stämmen zu zählen ist — und das ist seine Freude, sein Stolz!

Fr. Wiegand, Lehrer in Anspach, Amt Usingen, Regierungsbezirk Wiesbaden.

Gefiederte Welt im Osten.

Palmyra.

(Fortsetzung.)

Jung aus dem Neste genommen kann sie, — wer Liebhaber von Vögeln ist, die zum Aus- und Einfliegen gewöhnt sind — zu einem recht angenehmen Genossen angezogen werden, doch leider nehmen meist derartig gezähmte Vögel ein so trauriges Ende, daß die gehabte Freude am Liebling den Schmerz beim Verlust nur vergrößert. Ich selbst besaß längere Zeit eine äußerst zahme Elster, welche sich den ganzen Tag, außer den gewissen Essensstunden im Freien herumtrieb, und durch ihr munteres, drolliges Wesen sich zu Jedermanns Liebling machte, obgleich sie neben vielen Tugenden, auch recht viele Unarten besaß, die sie jedoch so geheim als möglich zu entfalten bestrebt war und blos erstere glänzen ließ. So verschwanden mir unter anderm im Taubenschlag die Eier aus den Nestern, was ich mir lange nicht erklären konnte, bis endlich die Elster als Uebelthäterin ertappt und ihr zur Strafe die Flügel verkürzt wurden, damit sie nich mehr so hoch im Reiche der Lüfte sich tummeln und dem Taubenschlage keine ferneren Besuche abstatten könne. Leider fand der arme Hans nicht lange darauf sein Ende, und zwar als Selbstmörder, indem er, während ich Kaffee trank, um welche Zeit er nie im Zimmer fehlte, ein vor mir auf dem Tische liegendes Streichhölzer-Päckchen entführte, und ehe ich es ihm abnehmen konnte, sich damit durch's offene Fenster flüchtete. Der bösen That folgt gewöhnlich die Strafe; denn einige Stunden später wurde er in der Nähe des Zimmers in einer Gehölzgruppe todt gefunden; todt durch Vergiftung von Phosphorköpfchen, die er aus Uebermuth abgeknabbert hatte.

An größeren Vögeln sind sodann zunächst noch einige Tag- und Nachtraubvögel zu verzeichnen. Von ersteren kommt der gewaltige Fisch-Adler manchmal von den Sümpfen aus der Steppe in die Gärten herein, besonders zur Winterszeit, wo es ihm oft an Nahrung mangelt. Sein Anzug wird aber gleich durch keinen geringen Skandal von Elstern und Krähen angekündigt, welchen Empfang sie überhaupt jedem herbeikommenden Raubvogel entgegenbringen. Diesem Adler an Größe nachstehend, doch immer noch ein mächtiger Kunde ist der mehr nützliche Bussard, welcher oft auch in den Gärten seinen Horst aufschlägt, wenn in der Nähe derselben ein Teich oder doch sumpfige Stellen sind, damit es ihm zum Fraß nicht an Amphibien mangelt; auch scheinen ihm Krähenansiedlungen erwünscht zu sein, um deren kleine Insassen zur Beilage seines Mahles zu verwenden. Große und kleine Weihen finden sich ebenfalls ein, wo günstige Oerlichkeiten vorhanden. Ferner noch ein grauer, dunkelgestrichelter Falk, kaum größer als eine Misteldrossel, hier unter dem Namen „Spatzenfänger" bekannt, der überall zwischen den Gebäuden und in den Gärten zu finden ist und dessen Geschicklichkeit im Fangen kleinerer Vögel, besonders der Sperlinge, man täglich zu bewundern Gelegenheit hat. Wo ein Schwarm Spatzen sich zu einem Fraße gemüthlich zusammengefunden, kommt er, man weiß nicht woher, pfeilschnell, wie die Kugel aus dem Rohr, dazwischen gestoßen, und ehe man es recht sieht oder begreifen kann, die Sper-

linge erst schwerfällig davonschnurren, sitzt er schon auf dem nächsten erhabenen Gegenstand mit dem Kröpfen seiner Beute beschäftigt.

Von den Nachtraubvögeln sind als die gewöhnlichsten zu erwähnen der kleine Uhu (Fuchseule), die gemeine Nachteule und das kleine Käuzchen. Erstere beiden verrichten ihr Brutgeschäft in den dichten Gebüschen und Bäumen der Gärten; das Käuzchen hingegen zieht Niststellen unter den Strohdächern, den im Grünen gelegenen vor. Fuchs- und gemeine Nachteule sind sehr zärtliche Eltern, besuchen, wie ich einigemal Gelegenheit wahrzunehmen hatte, ihre aus dem Nest genommenen Jungen auch auf weitere Entfernung hin, um Atzung zuzutragen. Die Schleiereule wird sehr selten getroffen.

Von den reinen Körnerfressern sind Standvögel das Rebhuhn, die Haubenlerche und der bald in der ganzen Welt nicht fehlende Spatz.

Für Rebhühner ist das hiesige Terrain ausgezeichnet, die Gärten als Brutplätze, angebaute Felder, wie die Grassteppe zum späteren Aufenthalt, aber überall Feinde genug, sonst müßten sie bei ihrer Fruchtbarkeit in ungeheurer Anzahl vorhanden sein. Der schlimmste aller Feinde bleibt schon ein strenger Winter, d. h. mit starkem Schneefall, wo es ihnen dann nicht allein schwer wird, sich vor dem verschiedenen Raubzeug zu verbergen, sondern genug Nahrung zu finden, um nicht zu verhungern. Die Steppe muß dann verlassen werden, die Brutstellen, überhaupt die Nähe der menschlichen Wohnungen werden aufgesucht. Die Ketten kann man dann mitten in den Dörfern oder auf den Gehöften treffen, aber dadurch fallen sie auch meist der Vernichtung durch den Menschen anheim, indem sie dann so wenig scheu, oder richtiger gesagt, vor Hunger so dumm sind, daß sie sich in die Vorplätze der Bauernhütten locken lassen, von wo es kein Entrinnen mehr giebt. Hiesige Jagdgesetze erlauben allerdings vom 29. Juli (Petri und Pauli) an so ziemlich Jedem freies Jagdrecht, wodurch der Wildstand nicht vermehrt werden kann, weil es eine nur zu große Zahl sogenannter Aasjäger giebt. Diese Leute können zwar den Rebhühnern nicht viel anhaben, da es ihnen an dem Vorstehhund fehlt, wie das Schießinstrument meist derartiger Konstruktion und Verfassung ist, daß der Jäger vor dem Losdrücken nicht bestimmen kann, ob ihm nicht selber der Schädel durch Zerspringen des Gewehrs eingeschlagen wird, und wenn es am Ende richtig los- und abgeht, ist ihm das schon genug, auf einen feinen Schuß kommt es nicht an, denn auf Fliegendes oder Laufendes wird nicht gepürscht; er kennt schon seine schönen Jagdgründe, die ich weiter unten Gelegenheit anzuführen haben werde. Natürlich giebt es unter diesen Leuten auch ausgezeichnete Schützen, welche dann mit besseren Mordinstrumenten versehen sind, doch der Hühnerhund fehlt immer, somit tappt er blos aus Zufall auf eine Kette Hühner, und das auch blos kurze Zeit, so lange die Hühner noch gut halten; er wird aber auch dann nur selten einen jagdgerechten Schuß anbringen, so daß die Kette gesprengt und noch einige gute Schüsse gethan werden können. Der verständige Jäger dagegen, an denen es hier auch nicht fehlt, wird in seinem Interesse keine Verminderung durch zu starken Abschuß anstreben.

Die Hauptbeute nimmt sich das verschiedene vierbeinige und fliegende Raubzeug.

Der Haubenlerche begegnet man Sommer und Winter in den Gehöften und Dörfern auf Schritt und Tritt, einzeln, wie in kleinen Partien zusammen; dicht vor den Beinen herumhuschend, oder auf den Boden duckend, von welchem sie durch ihre Färbung kaum zu unterscheiden, daß man sich wundert, nicht einmal eine zu zertreten. Im Winter vereint sie sich gerne mit den Sperlingen, besucht dreist mit denselben die Stallungen, um zwischen den Pferden die zerstreuten Körner aufzulesen. Bei Beginn des Frühjahrs lösen sie sich zu Paaren auf, und wird dann auch in Nähe der menschlichen Wohnungen das einfache Nest hinter einem Unkrautbusch angelegt. Das Männchen läßt um diese Zeit seinen gar nicht unangenehmen Gesang hören, den es meist vom Erdboden, oder einer wenig erhöhten Stelle vorträgt, wobei oft recht gute Sänger zu vernehmen sind.

Nun zu den Letzten, zwei recht schwerfälligen, täppisch aussehenden Gesellen, die aber desto mehr Scharfsinn entwickeln, dem Haus- und Feldsperling, welche sich hier zu Lande so recht auf der Macht befinden, denn am Futter, dem besten, ist Sommers und Winters kein Mangel. Das geerntete Getreide wird nicht, wie in den meisten Gegenden Deutschlands, in Scheunen eingefahren, sondern im Freien auf Feimen gesetzt, und bei der Masse desselben das Ausdreschen durch mancherlei Unterbrechungen von anderen Arbeiten, oft bis zur Heuernte des anderen Jahres oder noch länger hinausgezogen. An diese Feimstellen muß man im Winter gehen, um einen Begriff von der Zahl der hier weilenden Spatzen zu bekommen; ein solcher Trupp aufgescheucht, bringt ein wirklich betäubendes Surren und Schnurren hervor. Schaden durch Verzehren an diesen Stellen bringen sie immerhin genug, doch wenn genau betrachtet wird, was durch den nicht im Geringsten sorgfältig zu nennenden Wirthschaftsbetrieb an Körnern verschleudert wird, so reicht dieses allein schon dazu hin, Tausende dieser Vögel auf's vortrefflichste zu ernähren. Der Schaden, den sie auf dem Felde am stehenden Getreide, besonders an der Hirse, anrichten, ist bedeutend größer; liegt eine solche Ansaat in der Nähe der Gehöfte oder Dörfer, so wird wenig mehr zum Einheimsen übrig bleiben. In mächtigen Schwärmen und geschlossenen Kolonnen wird vorgerückt und Alles kahl gefressen; hingegen wagen sie sich niemals weit ins offene Feld, wo nicht Baum oder Busch in der Nähe ist, denn der Schlingel ist klug genug zu verstehen, daß er im Falle eines Raubvogelangriffs bei seiner nicht sehr

ausgezeichneten Flugkraft, die, wenn er sich noch recht vollgepfropft, um einige Prozent vermindert ist, verloren wäre. Für seine Nistangelegenheiten ist auch auf's beste gesorgt, da die gewöhnlichen Gebäude meist mit Stroh bedeckt sind, in welches er sich ordentliche Tunnels, nicht nur zum Brüten, sondern auch zum Nächtigen einarbeitet, wodurch, wenn es nicht mit größter Energie verhindert wird, großer Schaden entsteht.

Ueber den Nutzen und Schaden der Sperlinge ist schon viel geschrieben und gestritten worden, der Eine nennt ihn einen sehr nützlichen Kerbthierfresser, der Andere stellt dies in Abrede. Um sein Verhältniß genau kennen zu lernen, indem dies mir in meinem Fache von besonderer Wichtigkeit ist, stellte ich Beobachtungen an, denn was man sieht, glaubt man! Und gesehen habe ich, daß Haus- und Feldsperlinge zur Atzung der noch kleinen Jungen hauptsächlich Kerbthiere verbrauchen, daß sie besonders große Liebhaberei für Blattläuse an den Tag legen, die ihrer Nachkommenschaft in der ersten Jugend überaus gedeihlich sein müssen. Während der Ernte und auch zur Winterszeit, wenn er Körner im Ueberfluß findet, glaube ich kaum, daß er an Insekten geht, vielleicht hier und da, zur besseren Verdauung seines meist überladenen Magens, einen Kerf nebenzu verspeist. Fast alle Körnerfresser reichen ihren Jungen nebenzu Kerbthierkost, und fressen selbst manch' Püppchen und Lärvchen hinunter, dabei fragen diese ebensowenig, wie die eigentlichen Weichfresser nach einer Klassifikation „schädlicher" oder „nützlicher" Insekten, sondern nehmen eben die, welche ihnen gerade vor den Schnabel kommen, wenn sie nur zu den verzehrbaren gehören. Zu welchem Gesangskünstler der Sperling durch sein Gedudel und Gezerrr sich erhoben, kennt Jedermann, doch ein Ton von ihm gefällt mir immer ganz besonders, der nämlich, welchen er nach des Winters trauriger Zeit, wenn der Schnee zu schmelzen anfängt, erschallen läßt, als ob auch er mit großer Begeisterung den nun bald erscheinenden Lenz begrüße.

Ich gehe nun in meiner Schilderung zu den Sommergästen über.

Der erste Bote des kommenden Frühlings ist die Feldlerche, die machmal schon Mitte Februars, doch meist erst zu Anfang des März über der noch gar nicht frühlingsmäßigen Erde ihre herrlichen Triller hören läßt, welche Jubeltöne des Wetters Unbill gar oft noch verstummen machen. Unsere landschaftlichen Verhältnisse sind ganz dazu angethan, den Lerchen die angenehmste Sommerherberge zu bieten. Außer der Feldlerche stellt sich noch eine zweite Art, die Spiegellerche, ein, die jedoch in Färbung wie Gesang mit jener nicht verwechselt werden kann. Auch weicht sie in der Lebensweise von ihrer Verwandten sehr ab, indem diese ihre Nistplätze gewöhnlich in Getreidefeldern oder wenigstens an den Rainen derselben aufschlägt, die Spiegellerche hingegen lange liegende Brachfelder, wie sie in hiesigem Wirthschaftssystem (Koppelwirthschaft) vorkommen, zum Aufenthalt und Nisten vorzieht. Diese Ländereien bringen durch eigene Besamung eine einjährige Unkrautpflanze, zu den Beifußarten (Artemisiae) gehörend, hervor, und zwar so dicht, daß von einem Nichtkenner diese Ländereien auf den ersten Anblick für Wachholderanpflanzungen gehalten werden können. Der Samen dieser Pflanze muß den Spiegellerchen ungemein munden, da man sie von Ende Juli bis spät in den Herbst auf diesen Stellen in Ueberzahl findet. Auch die Rebhühner lieben diesen Samen so sehr, daß man auf der Suche daselbst gewöhnlich eine Kette findet. Will man eine ergiebige Jagd auf Hühner haben, so darf hier kein junger, noch nicht ganz ferner Hund dazu verwendet werden, der gerne die Unart annimmt, alle Augenblicke vor den Lerchen zu stehen. (Fortsetzung folgt.)

Briefliche Mittheilungen.

Zur Wellensittichzucht.

Nachdem ich schon früher hier berichtet, daß von meinen Wellensittichen zwei Weibchen ein Männchen erkoren und das andere ebenfalls im Käfig befindliche garnicht beachteten, hat das eine Weibchen 5, das andere 3 Junge erbrütet und erzogen. Das erstere Männchen hat nun in beiden Nistkästen fleißig gefüttert, bis ich es eines Tages vermißte. Als ich darnach sah, fand ich es in einem Nistkasten neben den 3 Jungen todt; die Weiber fütterten nun allein ihre Jungen auf und diese sind auch bereits längst ausgeflogen.

Ich that nun wieder ein anderes Männchen dazu, aber siehe da, die Weiber wählten wieder beide nur eines von den beiden vorhandenen. Da ich befürchtete, daß sich dieses wieder todt füttern würde, so habe ich noch einen Heckkäfig angeschafft und das eine frische Männchen mit dem einen Weibchen hineingethan mit noch mehreren Jungen nebst den passenden Nistkästen.

Das alte Paar hat auch bereits wieder 5 Junge, das andere Paar will sich jedoch nicht vereinigen. Seit etwa 10 Tagen ist aber an jedem Morgen das alte Männchen aus dem Käfig herausgeschlüpft und bemüht sich, in den neuen zu kommen; ich habe Alles nachgesehen und konnte kein Loch entdecken, trotzdem ich ihn öfter einfing, ist er immer wieder da, geht aber auch immer wieder in seinen Behälter zurück und hilft die Jungen füttern. Ich nahm mir nun vor, der Sache auf den Grund zu kommen. Vorgestern stand ich um 4 Uhr früh auf, setzte mich in dem Vogelzimmer hinter die Gardine und bemerkte Folgendes:

Das alte Männchen schlüpft wie eine Maus zwischen dem Draht (trotzdem er sehr eng ist) durch, geht auf demselben Weg in den untern großen Käfig, begattet das Weibchen, hält sich noch ein Weilchen auf und kehrt dann auf dieselbe Weise wieder in den andern Käfig zurück.

Bemerken muß ich noch, daß die Vögel das ganze vorige Jahr in demselben Käfig gewesen sind, und nie einer herauskam. Bis vor 10 Tagen hatte ich auch immer die Fenster der Stube geöffnet.

Gestern hat das eine Weibchen das erste Ei gelegt und nun bin ich gespannt, ob der Liebhaber in beiden Käfigen seine Vaterpflichten weiter erfüllen wird.

Wenn Sie mich besuchen, können Sie selbst sehen, wie er seine Reise unternimmt, denn jetzt genirt er sich gar nicht mehr. Bemerkt habe ich aber noch, daß das Weibchen im untern Käfig stets lockt, bevor das Männchen seinen Behälter verläßt. In der Stube selbst macht er sich gar nichts zu schaffen.

Ich kann also Jedem, der einen Käfig für Wellensittiche anschafft, nur rathen, daß er die Drähte ja recht eng flechten lasse.

Man muß es mit eigenen Augen sehen, um zu glauben, wo das kleine Kerlchen überall durchklettert. Otto Pausch in Berlin.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Forstamtsassistent Rupprecht: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" habe ich auch einige Anleitungen zur Züchtung größerer Papageien gegeben. Selbstverständlich beschränkt sich dergleichen nur auf Versuche — obwol hier und da doch bereits einzelne Erfolge auch in solcher Züchtung erzielt worden sind. Ich würde den rosenrothen Kakadus folgende Einrichtung bieten. Ein Kämmerchen oder besser eine Stube, in jedem Falle ein Raum, in welchem sie frei fliegen, ausgestattet, wie im „Handbuch" beschrieben und mit mehreren verschiedenen großen Nistkasten, einem hohlen Baumstamm u. dgl. versehen, sodann auch mit einem Gitterfenster, in welchem sie vom Frühjahr ab und auch jetzt schon bei mildem Wetter in freier Luft sitzen können. — Herrn Postdirector Dönniges: Der aus Nordamerika herstammende Mönchs- oder Quäkersittich läßt sich ohne Frage im ungeheizten Raum überwintern; schwieriger dürfte dies beim Halbmondsittich und den kleinen Brotogerys-Arten sein, doch sind noch keine Versuche veröffentlicht worden. Keinenfalls rathe ich dazu, daß Sie es mit Grauköpfchen wagen, weil diese zweifellos zu Grunde gehen würden. Die meisten australischen Plattschweifsittiche ertragen die Ueberwinterung im kalten Raum sehr gut.

Frage: 1. Ist es vortheilhaft, zur Zucht von Hühnern und Enten Brütöfen zu benutzen?

2. Wo sind Brütöfen bester Art zu haben?

Th. Dreher.

Diese Fragen stellen wir zunächst unserm geehrten Leserkreise zur Beantwortung. D. R.

Frage: Sollte Ihnen in neuerer Zeit, außer den in Ihrem „Handbuch" angegebenen Mitteln gegen Lungenkatarrh bei Schönsittichen u. a. ein wirksameres bekannt geworden sein, so würden Sie mich zu besonderem Dank verpflichten, wenn Sie es mir mittheilen wollten. Ich habe diese schönen Vögel schon seit etwa 4 Wochen in diesem Zustand zugesandt erhalten, und ist seit dieser Zeit ihr Befinden ein wechselnd bald besseres bald schlimmeres. Ich halte sie im abgesonderten Käfig im etwas feuchtwarmen Zimmer, bespritze sie selbst und ihre nächste Umgebung bei erhöhter Temperatur täglich einige Male vermittelst eines Rafraicheurs mit Wasser und füttere Hirse, Kanarien- und Salatsamen, sowie hin und wieder etwas Eifutter. Es sollte mir recht leid thun, wenn ich die Thierchen nicht am Leben erhalten könnte, fürchte aber fast, es wird mir nicht gelingen.

Theodor Bechler.

Antwort: Halten Sie die Schönsittiche fortdauernd ebenso warm, aber vermeiden Sie bei ihnen die Nässe. Auch geben Sie niemals eiskaltes, sondern Trinkwasser, welches mindestens eine Stunde in demselben Zimmer gestanden hat. Eifutter lassen Sie ganz fort und geben Sie nur Kanariensamen, Hirse und Hafer. Die Temperatur darf niemals sehr schwanken.

Aus den Vereinen.

Das Verzeichniß der zum Münchener Oktoberfeste 1874 angemeldeten Ausstellungsgegenstände hat eine beträchtliche Anzahl von allerlei Hofgeflügel und Stubenvögel aufzuweisen. Die meisten Aussteller sind Mitglieder des **Münchener Geflügelliebhaber-Vereins.** Mit Freude haben wir aus dem Verzeichniß ersehen, daß die Geflügelliebhaberei, welche sich dort also nur auf bayrische Aussteller beschränkte, doch bereits eine lebhaftere ist, als man im Allgemeinen anzunehmen pflegt. Jedenfalls hat dieselbe in nicht geringer Weise dazu beigetragen, das Oktoberfest zu verschönern.

Ornithologischer Verein in Stettin.

Sitzung vom 14. Oktober. Herr Kaufmann Freese eröffnet die Sitzung mit der Mittheilung, daß Herr Creutz den Vorsitz niedergelegt, und daß statutgemäß vorläufig der Vorsitz auf ihn, als zweiten Vorsitzenden, übergegangen sei. — Hauptmann Bödicker hatte eine Anzahl seiner zum ersten Male in Deutschland gezüchteten Blendlinge vom Goldzeisig oder amerikanischen Stieglitz (Fringilla tristis) mit Harzer Kanarienweibchen ausgestellt, wovon er in zwei Gehecken 7 Junge erzielte. Diese Bruten sind außerordentlich interessant und bereits in Nr. 34 der „Gefiederten Welt" beschrieben. Die jungen Bastarde gleichen in der Gestalt dem Kanarienvogel, in der Farbe und Zeichnung dem Goldzeisig im Winterkleide, bei einigen nur mit geringen gelben Abzeichen auf der Platte. Interessant wird es sein, in welcher Weise sie sich weiter verfärben; arten sie mehr nach dem Männchen, so dürften es prachtvolle Vögel werden. — Herr Bernhardt schildert die diesjährigen Ergebnisse seiner Geflügelzucht und ertheilt auch er den schon früher ausführlich beschriebenen Italiener-Hühnern, die sich in unserer Provinz immer mehr einbürgern, hinsichtlich der Schnelligkeit ihres Wachsthums und ihrer Befiederung, ihres frühzeitigen und anhaltenden Legens, sowie ihrer Enthaltsamkeit vom Brüten, den ersten Preis vor allen übrigen Rassen. Die ausgestellten, sechs Monate alten Thiere waren in jeder Beziehung vorzüglich, ebenso die jungen Aylesbury-Enten, von denen der Erpel bereits ein Gewicht von 6 Pfd. erreicht hat. Die im Laufe der Verhandlung gestellte Frage: worauf der Glaube vieler Landleute beruhe, daß Enten, die durch Hühner erbrütet sind, niemals brüten, glaubt Herr Reimer dahin beantworten zu können, daß Enten, wenn sie zu legen beginnen, in der Regel sehr scheu sind und das, am liebsten an versteckten und sumpfigen Stellen hergerichtete Nest den Blicken zu entziehen suchen. Nimmt man ihnen, wie dies gewöhnlich geschieht, wenn sie im Stalle legen, fortwährend die Eier fort, so verlieren sie sehr bald die Neigung zum Brüten, und dazu zwingen, wie es bei Hühnern geschieht, läßt sich die nur schlecht gezähmte Ente nicht. Wie sorgfältig sie übrigens ihr selbst angelegtes Nest hütet, geht daraus hervor, daß, wenn sie es verläßt, um Nahrung zu suchen, sie jedesmal die Eier mit Federn bedeckt und das Stroh ringsherum aufwühlt. Da die Enten oft einige Monate fortfahren zu legen und häufig bis 1 Schock Eier liefern, so ergiebt sich schon daraus, daß sie nicht im Stande sind, sämmtliche Eier auszubrüten, und daher benutzt man fast überall Hennen dazu, woraus wol obige Annahme entstanden ist. Eine eigenthümliche Erscheinung ist es allerdings, daß von Hühnern erbrütete Erpel häufig eine große Zuneigung zu Hennen zeigen, so daß diese oft Mühe haben, die Zudringlichen fern zu halten. Interessant würde es sein, die Gegenprobe zu machen und Hühner von Enten ausbrüten zu lassen, um zu prüfen, ob seitens der auf diese Art

erzogenen Hähne eine gleiche Zuneigung zu den Enten stattfinde. Die in der vorigen Sitzung vom Redner ertheilte Auskunft betreffs Benutzung der Hühnerfedern, ergänzt er nach den „Industrie-Blättern" dahin, daß man in Frankreich die eigentlichen Federtheile mit einer Scheere von den Kielen und Rippen trennt, in einen Beutel schüttet und eine Viertelstunde lang tüchtig mit den Händen knetet. Dadurch trennen sich die Federn und bilden einen dichten Flaum von großer Weichheit und Leichtigkeit, der darin sogar die Eiderdunen übertreffen soll, weil diese doch immer noch Rippen enthalten. Die Verwendung des Flaums geschieht ganz wie bei den Dunen zum Ausstopfen von Betten u. s. w. Sie lassen sich aber auch zu Kleiderzeugen verweben und soll dieser Stoff fast unzerstörbar und wasserdicht sein, und sich schön und leicht färben lassen. — Herr Gatow verliest eine Verfügung der hiesigen königlichen Regierung, nach welcher die Schulvorstände und Lehrer des Bezirks angewiesen werden, der Schuljugend durch entsprechende Belehrung ꝛc. den Vogelschutz dringend an's Herz zu legen. — Herr Bredow-Westend hat dem Verein ein Paar seiner prachtvollen blauen Gebirgslori (Trichoglossus Nowae-Hollandiae, Gm.; nach Finsch der blaubäuchige Keilschwanzlori) mit dem Wunsche geschenkt, sie unter den anwesenden Mitgliedern zum Besten der Vereinskasse zu verloosen, was in der gewünschten Weise geschieht, und wofür der Vorsitzende dem Geber den Dank der äußerst zahlreichen Versammlung darbringt. Diese Papageienart, die bisher bei den deutschen Vogelfreunden noch recht selten war und von der Gould behauptet hatte, sie werde in der Gefangenschaft gar nicht zu halten sein, ist eine der prachtvollsten und kostbarsten von allen. Jetzt befinden sich blaue Gebirgslori bereits in dem Besitz der meisten wohlhabenden Vogelzüchter — vor 4 Jahren kostete das Pärchen 70 Thlr. — und da schon glückliche Zuchtergebnisse erzielt sind, so wird es nicht mehr lange dauern, daß man sie ebenso allgemein züchtet, wie Wellensittich, Nymphe, Sperlingspapagei u. A.; jedenfalls nisten sie leichter als die meisten Plattschweifsittiche, wenn man ihnen eine ausreichende Befriedigung ihrer natürlichen Bedürfnisse gewährt. — Aufgenommen werden 8, angemeldet 3 neue Mitglieder.

Entgegnung auf den Angriff des Herrn Böcker.

Fortlaufende Geschäfte hinderten mich bisher daran, eine Entgegnung auf die „Abwehr" des Herrn Kontroleur Böcker zu bringen, und auch jetzt habe ich weder Zeit noch Lust dazu, auf jeden darin berührten Punkt näher einzugehen. Folgendes ist meine Antwort:

Ein Jeder, der öffentlich auftritt, als Händler, Züchter oder Schriftsteller, hat naturgemäß seine Freunde und seine Widersacher; so ist es mit Herrn Böcker, mit mir und mit manchem Andern. Ich war lange Zeit ein Freund des Herrn Böcker, selbst nachdem ich seine „Reise nach Andreasberg" und verschiedene andere Aufsätze gelesen hatte, in denen er die hiesigen Verhältnisse in der Kanarienvogelzucht oft und recht erheblich angreift. Ich habe bei gelegentlichen Anfragen in uneigennützigster Weise mehrmals Herrn Böcker mit seinen Vögeln in Vorschlag gebracht. Wenn ich auch nicht ein Gleiches von Herrn B. erwartete, so war meine Freundschaft doch selbstredend zu Ende, als geschäftliche Verhältnisse eintraten, die späterhin zu den Aeußerungen in meiner Schrift Anlaß gegeben. Ich glaube also, in meiner Schrift keine Behauptung aufgestellt zu haben, welche durch „Brotneid" oder „Furcht vor gefährlicher Konkurrenz" hervorgerufen ist; was ich gesagt, dürfte vielmehr nur eine berechtigte Zurückweisung sein. Ebensowenig habe ich eine „feindliche Gesinnung" gegen Herrn Reiche, der in meinen Augen stets sehr achtungswerth dagestanden hat. Frau Dolitzel kenne ich nicht näher, kann sie daher auch nicht unter den „betrügerischen Händlern" gemeint haben. Was ich in Betreff mancher Vogelvereine gesagt, möge Herr B. nur beherzigen. Besser wäre es übrigens gewesen, er hätte die Stelle nicht anders wiedergegeben, als ich sie geschrieben, denn ich habe nicht gesagt, daß *vorherrschend* die Vereine geschäftliche Zwecke verfolgten, sondern daß es *einige* giebt. Herrn B., der sich für hiesige Verhältnisse so sehr interessirt, wird ja wol die Thatsache nicht unbekannt sein, daß Jemand hier seine sämmtlichen zum Verkauf ausgebotenen Kanarienvögel, auch die diesjährigen, als „auf mehreren Ausstellungen prämiirt" öffentlich bezeichnete. Wenn ich dergleichen in meiner Schrift geißelte, so glaubte ich keinem Freunde der Sache zu nahe zu treten; im Gegentheil dürfte ich mir damit wol mehr Dank als Undank verdient haben.

R. Maschke in St. Andreasberg.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelhandlung
von
Joseph Zuckerkandel,
Dresden, Wallstraße 8. I.

empfiehlt ein wohlassortirtes Lager exotischer Vögel, franz. Kanarien und die allgemein bekannten und renommirten fehlerlosen reinen Kanarienvögel eigener Zucht, als Glucker, Hohlroller, Klingelroller mit Knurren, Roller mit jammernden Touren, ebenso beste reinste Zuchten Harzer Kanarienvögel. [708]

Nur für Händler!

Graupapageien oder **Jakos**, gesund und stark, à Stück 6 Thlr., **Zebrafinken** à Paar 3½ Thlr. empfing und empfiehlt unter Garantie des mobilen Eintreffens **F. Sennhenn, Zool. Handlung** in **Cassel**. [709]

16 kräftige, im Freien gezogene, Anfang Oktober ausgeflogene Wellenpapageien, werden bei sofortiger Abnahme Abnahme von mindestens 8 St., à St. zu 2½ Thlr., abgegeben. Offerten an die Expedition. [710]

Kräft. Harzer Kanarienv., reine Nachzucht vorzüglicher Stämme des berühmten Züchters Herrn Böcker in Wetzlar, mit sehr schönen Hohl-, Baß-, Bogen-Rollen ꝛc., versendet unter Garantie des lebenden Ankommens zum Preise von 3½ Thlr. an

[711] **J. A. Snoek,**
Detern, Ostfriesland.

Russische 1874er Ameisen-Eier empfingen und empfehlen **Mey & Bengelsdorff**, Berlin. [712]

Harzer Roller,

von den besten Stämmen in ausgesuchten Exemplaren, das Stück 4 bis 6 Thlr., im Dutzend bedeutend billiger, empfehle von meiner Züchtung.

Dessau. **A. Jensch,**
[713] Teichgasse Nr. 3.

Abzugeben: 1 überwinterter Sprosser 6 Thlr., 1 Nachtigall, überwinterte, 3 Thlr., 1 P. gr. gef. Kardinäle 6 Thlr., 1 altes Wellensittich-M. 2½ Thlr., 1 P. Papstfinken 4½ Thlr., 1 Würger 1 Thlr. In Tausch angenommen: 1 P. nistf. Zebrafinken und 1 P. Schmetterlingsfinken.

Lingen, Prov. Hannover.
[714] **O. Ohlendorf.**

Ein sehr kräftiges, nistfähiges Wellensittichweibchen ist gegen ein altes Männchen Papstfink zu vertauschen. Näheres in der Exped. [715]

Einen Hühnerhund, 1 bis 2 Jahr alt, ferm, sucht
C. E. Schneider,
[716] Zwickau, Sachsen.

Sommerrüben 6½ Thlr., Kanariensaat 9½ Thlr., Hanf 5½ Thlr., Hirse, weiße 8 Thlr., Mohn, bl. 12 Thlr., Buchweizen 5½ Thlr. pro Ko., Ameiseneier 20 Sgr., Sepia 20 Sgr., Mehlwürmer, ½ Liter 1½ Thlr., offerirt
[717] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen folgende Thiere erhalten: Doppelte Gelbkopf-Amazonen, Müller-, Graupapageien, große und kleine Alexandersittiche, Liebesvögel oder Inseparables, ein rothgelber Arara, Wellensittiche, indische und braune Meino, Bandfinken, Atlasvögel, Schmetterlingsfinken, Schwarzköpfige Nonnen, Jalariinfinken; außerdem 30 Goldfasanen, 6 seltene indische Enten, 8 desgleichen Gänse, 4 Herbstenten, indische Adjutanten, eine indische Weihe; ferner an Vierfüßlern 1 Gnu, 1 russischer Bär, 1 Paar gefleckte Hyänen, 1 afrikanische Zibethkatze, 1 javanisches Stachelschwein und zahlreiche verschiedene Affenarten. [718]

Mein Guthaben an dem

Creuznacher Geflügel-Verein

vom 16. Juli a. c. von Thlr. 11. abzl. 10%, für geliefertes Geflügel, wird zum Kaufe angeboten.

[719] **E. Paffrath** in Solingen.

Leporiden, zahmtraurig, gem. wie auch Ulan. Stare, im Freien gezüchtet, per Paar . . . . . Thlr. 5.
2 Paar zahme diesjährige Iltisse, per Paar . . " 25.
1 Steinmardermännchen, sehr groß, aufgezogen " 8.
1 Edelmardermännchen, " " " 9.
sowie mitunter Uhus, Sibirische Ziesel, Murmelthiere

H. W. Schaible,

[720] Süßen, Württemberg.

Kanarien-Vögel.

Ich suche

8—12 Stück Weibchen,

kleine Rasse und rein **Dunkel** gelb. Offerten bitte mit Preis zu richten an

[721] **C. Koch**, Hofjäger und Wildhändler, Wiesbaden.

Wellensittiche	pr. Stck.	2	Thlr.	22½	Sgr.
Mönche	" "	2	"	—	"
Turteltauben	" "	1	"	—	"
Lachtauben	" "	—	"	20	"
Singsittiche	pr. Paar	9	"	—	"
Rothbr. Perlerice-Papageien	pr. Stck.	5	"	—	"
1 junger Pirol, Männchen . . .		3	"	—	"

versendet unter Nachnahme

F. L. Paulus,

[722] Hessen-Cassel.

Der Verein für Geflügel- und Singvogelzucht in Hochheim hat schon seit Jahren besondere Aufmerksamkeit darauf verwandt, durch Ankauf feiner und gut schlagender Roller die Zucht von Kanarienvögeln zu veredeln.

Durch den Verkauf der Zuchtpaare und von jungen, feinen Vögeln noch eine Anzahl zu billigem Preise zu liefern.

Für die Section:

[723] **Fr. Hennecke.**

Harzer Kanarienvögel.

Mein Vorrath besteht fast durchweg aus St. Andreasberger Vögeln guter Stämme. Gegen kleinen Preis gewerbsmäßiger Harzer Vogel gebe ich an Händler zu billigem Preise ab. Auch bei raubem Wetter geschieht der Versand unter Garantie gesunder Ankunft bis auf jede Entfernung. [724]

R. Maschke, St. Andreasberg im Harz.

Sehr wünsche, um meiner Zucht reines Blut zuzuführen, 10 Stck. junge Wellenpapagei-Weibchen diesjähriger Zucht zu kaufen, oder gegen solche meiner eigenen Zucht umzutauschen und habe paarweise abzugeben ziemlich ausgewachsene diesjährige hellgelbe Kochin-China und schwarze La flèche-Hähne reiner Rasse, sowie auch importirte hellbraune Italiener und sehr schöne große Kreuzung von Kochin-Hahn und Spanier-Henne.

Theodor Bechler,

[725] Langenfeld i. Voigtl.

Kanarienhähne eigener Zucht, mit fehlerfreiem angenehmen Gesange, von edlen Harzer Vögeln abstammend, offerire ich zu 3 Thlr. das Stück. — Verpackung berechne zum Kostenpreise.

Hannover, den 15. November 1874.

H. Busse,
Mitglied des Vereins für Geflügel und Singvögel-Zucht,
[726] Lammstr. Nr. 3.

Amseln, Drosseln, Staare, Schwarzköpfe, Nachtigallen, Wachteln, Lerchen Gimpel (einzeln und in Paaren letztere), Finken, Zeisige, Hänflinge, Zeisige, Grünlinge, Kreuzschnabel, Lachtauben, sowie andere feine Tauben und Eichhörnchen, Harzer Kanarienvögel in großer Auswahl, ferner einen feinen Dachshund und andere feine Racenhunde, empfiehlt

[727] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

---

1 Männchen und 2 Weibchen blaue amerik. Hüttensänger verkaufe zusammen für 5 Thlr. oder vertausche dieselben gegen ausländische Finken.

F. Domasch, Danzig,
[728] Paradiesgasse.

St: Andreasberger Kanarienhähne

eigener Züchtung, 4 Thlr. pro Stück, Zuchtweibchen 10 Gr., Emk. 8 Gr für 1—2 Vögel. Die Verpackung geschieht gut, so daß die Vögel auch bei der rauhesten Witterung unbeschadet eintreffen.

Ein Gimpelkäfig zum Einzelleben der Kanarienvögel, welche Herr Kentzelmann Berlin in Nr. 45 der „Ges. Welt" empfehlen, das Stck. 2 Thlr., sind ebenfalls zu haben gegen Einsendung des Betrages oder Postnachnahme bei

C. Lange in St. Andreasberg
[729] am Harz.

Zu verkaufen: 1, 3, Spanier, 2jährig 9 Thlr.; 1, 2 silberfarbige Kampfbantam 5½ Thlr.; 1, 1, Houdan 4½ Thlr.; 1, 3, weiße Brahma 6 Thlr.; 0, 4, gelbe Brahma 6 Thlr.; 1, 0, hell Brahma, sehr kräftig und groß, 4 Thlr.; 0, 1, weiße Crève-Cœur, 2jährig imp. 4 Thlr.; 1, 1, verj. imp. Houdan 10 Thlr.; 3, 0, edel Aylesbury, à 3 Thlr. Zu kaufen oder in Tausch gesucht: 2—3 diesjährige Silberfasanenhennen. Anfragen befördert die Exped. d. Z. unter Nr. 8, 11. [730]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 26. November 1874. Nr. 48.

Inhalt:

Beobachtungen über einige der besten einheimischen Sänger. —
Seltene Schlaglust einer Nachtigal. —
Tagebuchnotizen aus der Vogelstube. —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: gelber und blaumackiger Organist; gelbe Tangara. —
Mäuse in der Vogelstube. —
Entflogene Nymphe. —
Gefiederte Welt im Osten. (Fortsetzung.) —
Anfragen und Auskunft: Kranke Kanarien; Fasanenhühner. —
Aus den Vereinen: Stettin. —
Anzeigen.

Beobachtungen über einige der besten einheimischen Sänger.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz (Oesterreich).

I. Der Sprosser.

Ich stelle den Gesang eines guten Sprossers über den Gesang aller anderen Singvögel — ja sogar über den der amerikanischen Spottdrossel. Vortreffliche Sänger sind noch immer zu haben. Es kommt dabei blos auf die Gegend, aus welcher der Sprosser stammt, an. Die vorzüglichsten Sänger lernte ich im nordöstlichen Galizien, in Ungarn längs der Ufer der Donau und Theiß kennen. Ein gewöhnlicher Sprosser aus der Bukovina, den angrenzenden Theilen Rußlands und der Moldau verhält sich zu solchem Meistersänger wie 1 : 10. — Als bestes Erkennungszeichen eines guten Sprossers ist die Schattirung der Brust anzusehen. Dieselbe ist gewöhnlich bei den vortrefflichen Sängern deutlich gewellt und viel dunkler gefärbt, als bei den Dutzendvögeln. Auch die rostbraune Farbe an Flügeln und Schwanz ist voller und dunkler beim guten Sänger. Je älter ferner ein Vogel ist, ein desto besserer Sänger pflegt er gewöhnlich zu sein. Das Alter beim Sprosser erkennt man mit Bestimmtheit aus folgendem Merkmale. Bei einem einjährigen Sprosser wachsen die Schwanzfedern auch außer der Mauserzeit regelmäßig nach, wenn man sie ihm ausrupft. Bei einem mehrjährigen dagegen erneuern sich ausgerupfte Schwanzfedern blos in der Mauserzeit. — Das Geschlecht der Sprosser ist an der sichtlich hervorragenden Steißspitze, besonders im Frühjahre deutlich zu erkennen. Man untersuche ein Männchen und Weibchen eines Kanarienvogels während der Paarungszeit. Der Unterschied in der Steißspitze ist da so ein auffallender, daß dann Jedermann aus diesem Merkmale das Geschlecht aller gleichgefärbten Vögel wird mit Leichtigkeit erkennen können. Wie gesagt, ist dieses Unterscheidungszeichen besonders im Frühjahre während der Paarungszeit und bei wenigstens einjährigen Vögeln zu erkennen. — Recht alte Sprosser, mit besonders dicken Beinen, sind gewöhnlich auch Nachtschläger. Ein Sprosser, der im Käfige erst Ende März oder im April zu schlagen beginnt, ist sicherlich ein Nachtschläger. Während der Singzeit wechsele man nie mit dem Futter bei einem Sprosser. Als bestes Futter ist eine Mischung von gleichen Theilen geriebenem (abgekochtem) Herz, trockenen Ameiseneiern und gelber Rübe anzusehen. Statt der Ameiseneier kann auch hart gekochtes und fein zerhacktes Hühnerei gereicht werden. Die gewöhnlichsten Krankheiten, an welchen Sprosser zu Grunde gehen, sind die Auszehrung und die Fettsucht. An diesen beiden Krankheiten erliegen die Sprosser vor-

nämlich zur Frühjahrszeit. Um diese Krankheiten zu vermeiden, untersuche man seine Vögel im Monate November. Ist der Bauch fett, von speckartigem Aussehen, dann bringe man den Vogel in eine Stube, welche des Abends nicht beleuchtet wird. Die 15 bis 16stündigen langen Winternächte, in welchen der Vogel nichts ißt, werden ihn schon mager machen und mit dem Größerwerden des Tages wird der Vogel fleißig schlagen. Findet man aber im Monat November, daß der Vogel mager ist oder nur gewöhnliche Beleibtheit zeigt, dann muß er in eine Stube kommen, die des Abends bis 10 Uhr beleuchtet ist, damit er zum Essen sehen kann, sonst wird er den Winter über stets magerer und geht im Frühjahre zu Grunde. Bei dieser Behandlungsweise habe ich Jahre lang meine Sprosser gesund erhalten. — Da der Zug der Sprosser nicht in einem meilenweiten Gesammtzug, sondern vielmehr in einem Herumstreichen einzelner Individuen von Strauch zu Strauch bis zum Bestimmungsorte besteht, so kann man im Herbste während der Zugzeit ausgezeichnete Sänger auch in solchen Gegenden fangen, in welchen sie sonst nicht vorkommen. So kommen regelmäßig während der herbstlichen Zugzeit Vögel in die Bukovina, welche viel dunkler gezeichnet sind, als die im Sommer erbeuteten, welche wahrscheinlich aus den nördlichen Gegenden Galiziens stammen, und diese Vögel erweisen sich dann im nächsten Frühjahre als ausgezeichnete Sänger. — Nur muß man beim Herbstfange sicher sein, einen alten Vogel erhalten zu haben, denn junge von der Maibrut bleiben gewöhnlich, selbst bei einem guten Vorschläger Stümper; sie sind im Gegentheile geeignet den besten Vogel zu verderben, da derselbe sich viel lieber bequemt, leichte Weisen nachzusingen, als seine schweren wundervollen Strophen zu dichten. Bei keinem Vogel ist ferner die Mauserzeit so verschieden als beim Sprosser; ich sah Sprosser in den Monaten Mai, Juni, Juli, August und September mausern, ja sogar vor der Singzeit im Monate März mauserte vor einigen Jahren ein Sprosser bei mir. Dieser Vogel hatte also ein ganzes Jahr im Gesange ausgesetzt und erst im nächsten Februar wieder zu schlagen angefangen. — Man überwintere niemals einen Sprosser in einem ungeheizten Zimmer, sondern sorge vielmehr dafür, daß die Temperatur wenigstens 14 bis 16 Grad Réaumur betragen soll, da er bestimmt dann um so früher und fleißiger zu schlagen anfangen wird. Es giebt Sprosser, die ihre Gesangszeit vom Oktober bis August ausdehnen. Die meisten schlagen von Mitte Januar bis Ende Mai. — Dasselbe, was ich vom Sprosser gesagt, gilt auch mehr oder weniger von der Nachtigal, nur ist eine gut schlagende Nachtigal leichter zu erhalten, als ein ausgezeichneter Sprosser. Der Preis der Sprosser beträgt bei uns im Monat Mai und besonders im August 1—2 fl. ö. W. für das Stück, bei Wildfängen. Ausgezeichnete und bewährte Sänger bezahlt man auch hier mit 15—20 fl.

(Wird fortgesetzt).

Seltene Schlaglust einer Nachtigal.

Der Amtsrath Rasch in Hildesheim besitzt seit d. J. 1865 eine Nachtigal, welche in diesem Jahre ungewöhnlich fleißig ist, indem sie seit dem 1. Januar, mit Ausschluß der Mauserzeit, den Besitzer täglich durch ihren lieblichen Gesang erfreut. Gegenwärtig beginnt sie Morgens 11 Uhr und schlägt dann mehrere Stunden. Es würde dem Besitzer von Interesse sein, zu erfahren, ob ein solcher Fleiß öfter vorkommt.

C. R.

Tagebuchnotizen aus der Vogelstube des Herrn Graf Yorck von Wartenburg auf Schleibitz.

15. September.

In letzterer Zeit waren in meiner Vogelstube an jungen Vögeln folgende ausgeflogen: 4 Bastarde vom Japanesischen Mövchen-Männchen und kleinen Elsterchen-Weibchen, 4 Schmetterlingsfinken, 4 Reisvögel, 4 Wellensittiche, 1 Amarantvögelchen. Außerdem befinden sich in den Nestern nachfolgende Jungen: von Diamantvögeln, Madagaskarwebern, Bastarde von dem Mövchen mit Elsterchen in zweiter Brut. Dagegen sind mir in diesem Jahre alle Bruten (drei) der Kubafinken zu Grunde gegangen. Die erste wurde aus dem Neste geworfen. Die zweite flog aus, fiederte sich auch aus und war ganz munter, doch ganz spät noch ist einer nach dem andern (es waren 4 Köpfe) gestorben.

2. Oktober.

Die bunten Japanesischen Mövchen brüten auf 5 Eiern, aus denen die Jungen bald auskriechen müssen. Gerade diese Vögel sind meine großen Lieblinge. Meine Grauköpfchen brüten auch wieder; ich hoffe auf Erfolg, weil sie sehr fest sitzen. Sobald ich dieser Tage einmal mehr Zeit habe, theile ich Ihnen wieder Einiges über diese interessanten Vögel mit, die sich bei mir ein Nest*) aus Stroh in einem Kasten zusammengetragen haben, und von denen das Männchen während das Weibchen brütet, eifrig eine Brut junger Diamantvögel mit deren Alten gemeinsam großfüttert.

20. Oktober.

... Eine Brut Diamantvögel, eine dgl. Amarantvögel, zwei junge Kubafinken und die zweite Bastardbrut der Mövchen und Elsterchen sind in diesen Tagen ausgeflogen. Tigerfinken, Fasänchen, Schmetterlingsfinken, Grauköpfchen, Japanesen und Reisvögel brüten gegenwärtig.

21. Februar.

... Ich wollte Ihnen gern gleich mittheilen, wie sich die neuerhaltenen Loris von den blauen Bergen, prächtige, aber in meiner Vogelstube eigentlich doch zu große Vögel, freifliegend eingewöhnen. Deshalb habe ich bis heute einen Bericht verschoben. Jetzt kann ich aber nur Gutes sagen. Zuerst war

*) Vergl. Nr. 17, Seite 133.

etwas Aufruhr unter der übrigen Gesellschaft, besonders wenn die Loris flogen; auch sie selbst waren etwas in Angst. Aber diese hat sich schon sehr gelegt. Die Gesellschaft gewöhnt sich immer mehr an einander. Als für die anderen Stubenbewohner gemeingefährlich, sei es durch Bissigkeit oder durch Nesterzerstören, zeigen sich die Loris bis jetzt nicht. Sie sind sehr schön, munter und haben sogleich Futter und Wasser angenommen. Ich hoffe auch, daß es ein richtiges Paar ist, da sie sehr schön mit einander thun und unzertrennlich sind. Meiner Frau gefallen sie auch sehr gut, aber sie erkennt doch den Paradiessittichen den Preis zu, und wahr ist's, die Färbung derselben ist doch ungleich mannigfaltiger, zarter, harmonievoller. Indeß bin ich recht froh, diese beiden schönen Pärchen zu haben, denn auch die Paradiessittiche zeigen sich ebenso munter als schön, trotzdem sie jetzt mausern. Es ist ein reizendes Paar und ich würde mich ungemein freuen, wenn auch sie sich bei mir zum Nisten entschließen möchten. Aus dem Kropfe füttern sie sich bereits jetzt bisweilen, doch jagt das Männchen das Weibchen noch meistens fort, wenn es ihm naht, mit seltenen Ausnahmen, in denen es dieses dann eben aus dem Kropfe füttert.

... Das Männchen Bourksittich ist mir auf eine merkwürdige Art erkrankt. Es ist, als ob es auf der einen Seite Krämpfe bekam oder gelähmt ist, denn beim Aufhüpfen auf die Stange kann es diese mit dem einen Fuße nicht festfassen, sondern fährt damit umher, fällt dann wieder herunter und konnte dann auch beim Laufen diese ganze Seite nicht gebrauchen, so daß es immer hinfällt. Wenn es ihm endlich gelingt, auf die Stange zu kommen, hält es den Kopf nach dieser Seite schief und zappelt wieder, bis es festen Fuß fassen kann. Im Uebrigen aber erscheint es ganz gesund, frißt ganz gut, hat gesunde Augen und singt auch.

... Ich bitte Sie, mir den eigentlichen Namen der sogenannten Kap'schen Maneken oder Maniken,*) sowie ihr Vaterland mitzutheilen. Meine Liebe haben sich die kleinen Dinger durch den niedlichen, muntern, zwitschernden Gesang, den sie fleißig hören lassen, erworben.

... Jetzt ist in dem Nisten meiner Vögel eine große Pause eingetreten und nur meine beiden alten Heckpärchen, die Wellenpapageien und die Diamantvögel brüten weiter; ob aber letztere etwas aufbringen werden, bezweifle ich. Die Grauköpfchen haben diesmal, obgleich die Eier befruchtet waren, nichts ausgebrütet. Sie paaren zwar schon wieder, ich glaube aber, daß ihre Brütezeit vorüber ist. Dagegen scheinen die Schönsittiche Brut- und Paarlust zu bekommen, auch gebe ich jetzt die Hoffnung noch nicht auf, daß meine Kaptäubchen zur Brut schreiten werden. Sie rufen sich viel und das Weibchen fliegt immer dem Täuber nach, dieser aber scheint noch zu spröde zu sein, denn er hackt stets nach ihr. Doch ist auch dies schon ein Fortschritt gegen die bisherige gänzliche Gleichgiltigkeit. Sonst giebt es jetzt aus meiner Vogelstube eigentlich nichts zu melden. (Forts. folgt).

*) Gelbbürzeliger Graugirlitz (Fringilla — Crithagra — canicollis), beschrieben in Nr. 4. Seite 29.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der Organist (Euphona violacea, *Licht.*), gehört gegenwärtig bereits zu den bekanntesten Erscheinungen des Vogelmarkts. Es ist ein harmlos liebliches Vögelchen, das außer seiner Schönheit und Zutraulichkeit freilich keinerlei Vorzüge zeigt. Denn der von manchen Schriftstellern gerühmte Gesang besteht lediglich in einem Geschwirr von mehr wunderlichen als angenehmen Tönen. Der Vogel gehört zu den stärksten Fressern und da er nur Weichfutter verzehrt, auch zu den übelsten Schmutzern. Dazu ist er insofern schwierig zu erhalten, als er durch eine verdorbene Frucht leicht und unrettbar dem Tode verfallen kann. Am besten erhält man ihn mit gekochtem Reis, in Wasser geweichtem und gut ausgedrücktem Eierbrot und süßen Früchten, Birnen, Weintrauben und, in Ermangelung dieser beiden, Feigen. Ein Birnenstück höhlen sie so aus, daß die Schale wie feines Seidenpapier zurückbleibt. Mit ihrem komischen Liede und ihrem jubelnden Ruf, sobald neues Futter kommt, sind diese unterhalb schön gelben und oberhalb violett-blau-schwarzen Vögelchen aber immerhin ein angenehmer Schmuck eines Gesellschaftskäfigs. In der Vogelstube sie frei fliegen zu lassen, rathe ich ganz entschieden ab, denn die übrigen Bewohner derselben fressen das für diese Weichfresser bestimmte Futter nur zu leicht völlig fort — und Hunger können diese kleinen Gefräßigen durchaus nicht ertragen, ohne daß sie sogleich ernstlichen Schaden nehmen. Wer diesen Organist zuerst eingeführt, weiß ich nicht mehr zu sagen. Bei Fräulein Hagenbeck sind Pärchen zu mäßigem Preise zu haben.

In meiner Vogelstube befinden sich in dem für solche Gäste bestimmten Käfige auch zwei Männchen einer andern, noch ungleich schöneren Art, welche ich kürzlich von Herrn Naturalist Lintz in Hamburg erhielt. Ich will den Vogel blaunackiger Organist (Euphona cayana, Cab.) benennen. Er ist ungleich schöner als der vorige, ihm sonst im Wesen aber ganz gleich. Leider sind es zwei Männchen und die Aussicht, daß Weibchen dazu eingeführt werden, ist wol vorläufig nicht vorhanden.

Die gelbe Tangara (Tanagra — Callispiza — flava, Cab.) gehört jedenfalls zu den seltensten Erscheinungen des Vogelmarkts, wenn sie bereits überhaupt lebendig eingeführt worden. Ich erhielt zwei Männchen und ein Weibchen wiederum von Herrn Lintz und hoffe auch über diesen sehr schönen Vogel demnächst Näheres mittheilen zu können. Dr. K. R.

Zur Fütterung.

. . . Sie erwähnen in Nr. 36 meiner früheren Fütterungsweise. Seit etwa 1 1/4 Jahr habe ich aber für die Erbsen halbweich gekochten gelben Mais gesetzt, den die Vögel noch lieber und mehr vollkommen aus den Hülsen herausfressen. Ich koche alle Tage eine frische Portion, spüle dann den weichgekochten Mais mit reinem Wasser noch einmal vermittelst des Durchschlags ab und bleibt dennoch etwas übrig, so spüle ich diesen des andern Tags noch einmal mit Wasser ab, dem ich ein wenig doppelt kohlensaures Natron zugesetzt. Mit eben solchem Wasser wasche ich alle Tage zweimal die Gefäße aus, worin der Mais und die Milchsemmel (die zweimal täglich frisch gebrühet wird) den Papageien und kleinen Vögeln gereicht werden. Diese Arbeit überlasse ich dem Burschen nicht, sondern mache sie selbst. Ich habe deshalb die Erbsen fortgelassen, weil ich bemerkte, daß die meisten Papageien nur den gequellten Keim fraßen, die beiden Hälften der Erbsen aber fallen ließen, so daß unten eine Parthie Hühner oder Fasanen Nahrung gehabt hätte, die ich aber des üblen Geruchs halber, den der Koth verbreitet, nicht halten mag, so faulten und stockten die unten liegenden Erbsen-Hülsen, verdarben die Luft, wenn ich nicht alle drei Tage ausräumte, bis ich auf den Ersatz durch halbgekochten Mais kam. Die australischen Sittiche fressen im allgemeinen lieber den Mais so zubereitet, die anderen Papageien lieber die aufgebrühete Milchsemmel, welche ich in folgender Weise herstelle. Einer großen Portionstasse voll kochender Milch setze ich einen Theelöffel voll guten, schwarzen Kaffee und 1—2 Messerspitzen voll Zucker zu. Ich weiß, daß viele Vogelfreunde dies nicht billigen oder gar belächeln; ich füttere aber schon seit 5 Jahren so und nach kurzer Zeit fraß (durch das Beispiel der anderen belehrt) jeder Neuankömmling dies Futter gern. Sie sollten nur sehen, wie meine Papageien darauf warten; am begierigsten die blauen Gebirgslori (die Mörenfresser), dann auch die Afrikaner und Amerikaner.

Mittheilung des Herrn Apotheker Jacnicke.

Mäuse in der Vogelstube.

. . . Soeben geht mir eine interessante Mittheilung zu, die, da sie für Inhaber größerer Vogelzuchten von allgemeinem Interesse, sich wol zur Veröffentlichung in der „Gefiederten Welt" eignen dürfte und deshalb füge ich mit Erlaubniß des Verfassers die betreffende Briefstelle bei:

Jeder Vogelliebhaber und Züchter weiß, daß in der Voliere die Mäuse der Schrecken aller Schrecken sind. In der meinigen waren deren nicht wenige. Fallen, Gift u. s. w. waren ohne merklichen Erfolg. Ich kam nun auf den Gedanken, es auf andere Weise zu versuchen, füllte eine ziemlich tiefe Porzellanschüssel dreiviertel voll Wasser, streute etwa einen Zoll hoch Hülsen von Glanz und Hirse darauf, legte einige kurze etwa einen Zoll dicke Holzstäbchen dazu, maskirte die Schüssel von außen mit Holzstücken u. s. w. der Art, daß sie den Mäusen leicht zugänglich, legte ein schmales Brett darüber und entfernte gegen Abend sowol Wasser, als auch alles Futter aus der Voliere. Andern Morgens lagen schon sieben Stück darin. Seit etwa 4 Wochen haben sich in dieser Weise über dreißig Mäuse gefangen, so daß ich eben nichts mehr von dieser Plage verspüre. Nur ist dabei zu beachten, daß Morgens früh, ehe die Vögel zum Futter und zur Tränke kommen, beides wieder eingesetzt und die Fangschüssel gut zugedeckt wird, da sonst manch' unerfahrener junger Vogel leicht das Schicksal der Mäuse theilen dürfte.

Eberstadt bei Darmstadt. J. Hilsz.

Eine entflogene Nymphe.

Eines Tages war ein Nymphenmännchen, trotz gezeigter Zahmheit aus dem Käfig entwischt und trieb sich in der Nachbarschaft herum. Leider war, als ich dort hinkam, der Vogel schon verschüchtert, ließ Niemand mehr in seine Nähe kommen und wich allen Fallen u. dgl. mit großer Schlauheit aus, so daß zuletzt beschlossen wurde, ihn im Schlafe zu berücken. Leider wählte er sich hierzu die äußerste Spitze einer jungen Pappel, wohin nur ein ganz leichter Junge, ohne den Baum merklich zu rütteln, gelangen konnte. Die Leiter wurde bei Tag angestellt; der Vogel bezog seinen Schlafplatz; der Junge kam glücklich hinauf und griff wacker zu. Plötzlich ein Schrei, der Junge kam mit halb durchgebissenem Finger ohne Vogel herunter, welch' Letzterer verschwand. Vorgestern Abend wird mir ein unbekannter Vogel, der bei einer Treibjagd erlegt worden war, zum Feststellen gebracht; es war der entwischte Nymphensittich, auffallend wohlbeleibt. Nach Aussage des Schützen soll der Vogel durch die Treiber erschreckt, in pfeilschnellem Fluge hoch über ihn weggestrichen und nur der im Verhältniß zum Körper auffallend lange Schwanz die Ursache gewesen sein, weshalb er überhaupt nach demselben schoß.

Georg Hilsz.

Gefiederte Welt im Osten.

Palmyra.

(Fortsetzung.)

Eine andere Art, die Kalanderlerche, kommt in unserer Nähe schon seltener vor, und zeigt sich erst einige 100 Werst weiter nach dem Süden, wo die Steppe halbe Tagreisen lang weder von einem angebauten Felde, noch von menschlichen Wohnungen unterbrochen ist, häufiger.

Den Lerchenfang, wie er in vielen Gegenden Deutschlands betrieben wird, kennt man hier nicht. Hingegen wird die Wachtel, die ebenfalls aufs reichlichste, doch etwas später sich einstellt, mit der Lockpfeife gefangen, wie auch vor dem Hühnerhunde ge-

schossen. Mit der Pfeife bekommt man gewöhnlich nur die Hähne. Diese Fangart verlangt besondere Kunstgriffe, die nicht gleich ein Jeder losbekommt; denn der Fänger muß sich genau auf die verschiedenen Tonarten verstehen, welche die verliebte Henne von sich giebt, wenn sie sich bereit erklärt, den feurigen Liebhaber zu empfangen. Wer dieses auf dem Instrument recht täuschend nachzuahmen versteht, dem wird der verrückt werdende, die Henne suchende Hahn bis vor die Füße rennen, wo dann, statt daß er die Henne deckt, ein Netz über ihn gedeckt wird. Ein Paar Töne falsch angeschlagen, ehe er vom blinden Liebeseifer ganz toll ist, machen ihn stutzen, und surr, fort ist er! Beim Mähen der Steppe, wie beim Kornschneiden werden viele Wachteln von ihrer Brut, oder vielmehr von den Eiern getrieben, solche schreiten dann zu einer zweiten Brut, die oft ziemlich spät hinausfällt, so daß mit dem Hunde zu Ende Septembers manch' noch recht kleines Volk gefunden wird, und man sich wundern muß, wie jene zum Abzuge noch reif werden. Auch trifft man genug Nachzügler von Alten an, die sich so herangemästet haben, daß sie keine Möglichkeit finden, mit dem Schwarm davon zu fliegen, und sich überhaupt so dumm benehmen, daß viele mit den Händen gefangen werden können.

Kurze Zeit nach den Lerchen kommen Trappen, Kraniche, Störche, Reiher, Enten, nebst einer Anzahl verschiedener kleiner Sumpfvögel.

Die große Trappe, eigentlich in günstigen Wintern zu den Standvögeln zählend, treibt sich nach Ankunft einige Zeit in großen Trupps umher, bis dann später die Hähne, des schönen Geschlechts wegen, mit einander in Uneinigkeit gerathen und sich gleich dem Auerwild, befehden sollen, wovon ich freilich noch niemals Augenzeuge gewesen.

Bald vereinzeln sich dann die Hennen, um ihren Brutangelegenheiten obzuliegen. Große Grassteppen mit angrenzenden Weizen- und Buchweizensaaten sind zur Brütung die bevorzugten Stellen. Das Nest ist eine blos in die Erde gescharrte Vertiefung, in welche die zwei großen bräunlich-grün marmorirten Eier gelegt werden, auf welchen die Henne sehr fest sitzt und sich ganz nahe ankommen läßt. Sind die Jungen ausgeschlüpft, so werden sie von den Alten in die angrenzenden Getreidefelder geführt, hauptsächlich in den am längsten stehen bleibenden Buchweizen, und dann ist die Jagd auf diese vorsichtigen, weit witternden Vögel mit gutem Vorstehhund erfolgreicher, als später, wenn sie sich zu großen Trupps von 20—50 Stück zusammengeschlagen haben. Die Jungen werden trotz ihrer Schnellfüßigkeit sehr oft lebend eingefangen, indem sie sich bei der Verfolgung, wenn sie sich von der fliegenden Mutter verlassen sehen, nicht auf ihre Laufgeschwindigkeit verlassen, sondern platt auf die Erde hindrücken und ergreifen lassen. Mir werden jedes Jahr einige Stück lebend zugebracht; ich habe aber immer mit der Eingewöhnung entschieden Mißgeschick, denn entweder wollen sie durchaus nicht fressen, oder sie brennen mir wieder durch. Auch sind sie unangenehm — oder thun Einem vielmehr leid — durch das fortwährend ausgestoßene Gestöhn.

Im Herbste halten die großen Trupps sich meist auf den Wintersaaten und lassen den arbeitenden Landmann ganz nahe ankommen; hingegen der mit dem Glase sie auf einer Werst entdeckende Jäger muß die beste Taktik anwenden, um glücklichenfalls zum Schuß zu kommen. Ist der Winter gut, d. h. schneelos, so bleiben sie und sind regelmäßig in der Nähe der in der Steppe aufgesetzten großen Heufeimen zu finden. Was der Mensch an ihnen weniger Beute macht, fällt desto mehr den Füchsen und Wölfen anheim.

Die kleine Trappe kommt hier seltener vor, doch ist sie immer vereinzelt zu treffen; in unserm Nachbargouvernement Cherson ist sie in desto größerer Anzahl vertreten.

Kraniche, so lange die Witterung noch ungünstig, ziehen auf den Wintersaaten herum, lösen sich bei dem bessern Eintritt derselben in einzelne Paare auf, um die Brutorte zu beziehen, die sie jedoch nie, wie verschiedenes anderes Sumpfgeflügel, in den gewöhnlich bei den Gärten und Dörfern gelegenen in Sümpfe auslaufenden Teichen aufschlagen, sondern nach den mehr entlegenen, wie sie die Flußthäler — hier z. B. des Dniepr — bieten.

Enten, Reiher, Rohrdommeln u. dgl. nisten, ziemlich furchtlos wegen der Nähe der Menschen, in den erstgenannten Sümpfen. Enten kommen in mehreren Arten vor, aber in welcher Anzahl! So, daß wer ihre Schwärme nicht gesehen, sich keinen Begriff davon machen kann. Bei diesem Geflügel lohnt sich die Jagd, sie wird auch arg betrieben, und die Schaaren werden so gelichtet, daß man sich darüber wundert, im nächsten Jahre dennoch keine Abnahme zu spüren. Die Entenjagd bildet dann auch die schönen Jagdgründe, wo oben geschilderte Aasjäger ihre Hauptbeute machen. Bei der frühen Eröffnung der Jagd sind die meisten jungen Enten noch nicht flügge, so daß ein schlechter Schütze mit noch schlechter schießender Flinte, doch nicht leer ausgeht. Derartige Jäger setzen sich gut verborgen am Ufer eines Teiches fest, warten unverdrossen Stunden, ja den Tag lang, bis die Alte mit ihren Dutzend Kinderchen, eines dicht hinter dem Andern ins offene Wasser hinausschwimmt. Bautz, gehts los, und zwei, drei der Kleinen überpurzeln auf dem Wasser! Ist der Kerl schnell im Laden, so kann er die Mutter auch noch schießen, da sie, wie manch' andere Vogelart, die List gebraucht, wenn die Jungen in Gefahr sind, scheinbar flügellahm auf dem Wasser herumzuflattern, um den Kleinen Zeit zu lassen, sich ins rettende Rohr zurückzuziehen, die aber, wenn das erste Mal im Feuer, ganz verdutzt hin und her tauchen, und an Flucht gar nicht denken.

Diese Art Jagd dauert jedoch nicht lange, denn

die Enten lernen recht bald ihre Verfolger kennen, und zeigen sich dann äußerst vorsichtig. Im Spätherbst hingegen, geht für diese Jäger, welche keine Ente im Fluge herunterschießen können, noch einmal diese leichte Fuscherei los, wenn wolkenartige Entenschwärme der Hirse und dem Buchweizen ihren Besuch abstatten. Buchweizen namentlich ist deren Lieblingsnahrung, und dies kommt daher, daß dies Getreide hier die letzte Aussaat (Juni) ist, deshalb auch den Schluß der Ernte macht, und dann nach dem Schnitt in Garben zum halben Schock zusammengestellt, oft bis Mitte Oktobers auf dem Felde stehen bleibt. Wo sich nun derartige Aufstapelungen finden, ziehen Abends vor Sonnenuntergang die Enten weit und breit aus der Runde dahin, um sich vor Eintritt des Winters noch gütlich zu thun. Zwischen diesen Schoberchen angestellt, und mit einer Flinte, die derart streut, daß der Hagel seine 6 Meter deckt, in einem sich niederlassenden Schwarm gehalten, bringt kein geringes Ergebniß. Als Beispiel möge Folgendes dienen: Auf einer derartigen Stelle anstehend, sah ich einen Bauern mit seinem Knaben ankommen, und ebenfalls sich aufstellen. Da dieses nun herrschaftliches Feld war, ging ich auf seinen Platz los, um ihm seinen einzunehmenden Standpunkt klar zu machen; doch rührte mich sein Bitten, ihn auch die Jagdfreude genießen zu lassen, wie mich auch bei näherer Betrachtung sein Mordinstrument, das ich von höchst primitiver Art fand, zu dem Wunsch bestimmte, die Handhabung desselben näher kennen zu lernen. Die Flinte bestand aus einem alten schwedischen Musketenlauf, der seiner Zeit auch einmal ein Feuersteinschloß hatte, doch gegenwärtig auf einem von dem Bauern selbstverfertigten Schaft mit der Pulverpfanne allein genagelt war. Das Ding war schon geladen und im Zündloch steckte ein Holzzapfen, welcher des Verlierens wegen an einer Schnur am Laufe befestigt war. Dieses war die ganze Mechanik und machte mich sehr begierig, wie denn die Geschichte losgelassen werde. Der Herr des Geschosses rühmte dasselbe beständig, wobei ganz verachtungsvolle Blicke meinen Doppellauf trafen. Endlich ließ sich das längst ersehnte Thitt, thitt, thitt des Entenfluges vernehmen, erst einzeln, dann in kleinen Schaaren kamen sie angezogen, bis auch mächtige Schwärme anrückten und in immer enger gezogenen Kreisen im Buchweizen einfielen. Obgleich ich einige Mal zu Schuß hätte kommen können, blieb ich dennoch ruhig, um mich ja nicht um den Genuß des Schauens der Abfeuerung und Wirkung der beschriebenen Flinte zu bringen. Der Jägersmann fühlte auch seine Stunde gekommen, die mit dem Ausrufe eingeleitet wurde: Nun, Junge, machen wir uns fertig! Der zum Büchsenspanner erhobene Knabe zog darauf einen zu einer Lunte präparirten Strick nebst Stein und Stahl aus der Tasche und entzündete dieselbe, sie darauf recht vorsichtig verbergend, daß den Enten keine Witterung zukommen möge. Der Alte schüttete unterdessen aus einer Tabaksdose zerriebenes Kanonenpulver auf die Pfanne und los konnte es gehen. Doch dauerte es noch zehn Minuten. Die Dämmerung sank immer mehr herein, und ich sah mich schon um das Schauspiel, wie um meine Jagdbeute betrogen. Endlich zog ein Schwarm auf uns direkt los, der Alte gab dem Jungen einen Wink und trat in Anschlag. Etwa 30 Schritte vor uns zog der Schwarm immer engere Kreise, sich dann in einem wirren Durcheinander von Flügeln auf die Schober stürzend. Brenn! ertönt's und mitrailleusenähnlich schlug's in den dicht gedrängten, sich niederlassenden Schwarm. So, Herr! war der Ausruf des Scharfschützen, jetzt wollen wir die gefallenen Enten zählen und dann sagen Sie mir, ob Ihr Ausländer-Gewehr besser schießt, als meine von Ihnen verlachte Flinte! Fünf Enten lagen todt, zwei flügellahm geschossene wurden noch gefangen, und das Lachen war allerdings nicht mehr auf meiner Seite. Für mich war die beste Zeit der Jagd an diesem Abend schon vorüber, also nichts besseres zu thun, um nicht mit leeren Händen heimzukommen, als — für das Stück ungefähr 3 Silbergroschen zu bezahlen und die ganze Zahl mitzunehmen.

Da im Winter bereits sämmtliche Gewässer zufrieren, sogar die großen Flüsse meist zugehen, so ziehen die Enten zuerst nach den letzteren und bei Eintritt stärkeren Frostes nach dem schwarzen, wie asovschen Meere, um von dort im Februar zurückzukehren. Meinen frühern Glauben, daß alle Enten ihre Gelege auf Binsenkaupen oder am Ufer der Teiche setzen, fand ich zum Theil nicht immer bestätigt, sondern ich traf die Nester oft bis 1 Werst vom Wasser entfernt in der Steppe.

Wie schon gesagt, nehmen noch manch' andere Sumpfvögel, als Reiher, Rohrdommeln, einige Schnepfenarten, Uferläufer u. dgl. ihren Sommer-Aufenthalt in den bei den Gärten und Dörfern liegenden Teichen, und dann lassen sie, im Vereine mit dem Gequarr verschiedener Froscharten, sowie dem einer blos in einer Art vorkommenden Schildkröte, ein recht mannigfaltiges, wenn gleich nicht besonders angenehm tönendes Konzert erschallen.

(Fortsetzung folgt.)

Anfragen und Auskunft.

Es sterben mir aus unerklärlicher Ursache meine Harzer Kanarienhähne. Seit Anfang Oktober d. J. sind mir bereits 65 Stück Harzer Hähne abgestorben, und abgesehen davon, daß der Schaden für mich höchst schmerzlich ist, da ich das Stück mit 3 bis 5 Thlr. bezahlte, so ist es doch ewig schade um die schönen, braven Vögel. Ich habe bereits Alles, was ich nur wußte, angewendet, jedoch ohne Erfolg; die Vögel, welche heute noch lustig singen, tragen sich morgen dick, haben dabei meist Durchfall, wippen bei Entleerung mit dem Steiß und sind Tags darauf eine Leiche. Auch bemerkte ich bei mehreren Exemplaren eine röthliche, fast blutige Entleerung. Dabei haben die Vögel Hunger, fressen bis zum letzten Augenblick, springen, so lange noch möglich

sehr hastig im Käfig herum, bis sie schwach werden, und dann meist am Futternapf sitzen bleiben und verenden. Ich füttere schönen Sommerrübsamen nach beiliegender Probe bezog selben erst kürzlich von Herrn Capelle aus Hannover, und finde ihn für vollkommen gut. Zu dem Rübsamen gebe ich etwas Glanz bei, zum Trinken reiche ich Flußwasser. Ich halte die Harzer Hähne einzeln, theils in Harzer Bauerchen, theils in größeren Käfigen, und gebe täglich einmal Futter und zweimal frisches Trinkwasser. Ferner halte ich die Kanarien in demselben Raume, wo ich meine fremdländischen Vögel habe, und wo stets eine Temperatur von 13—16° R. + gehalten wird, daher eine Erkältung nicht zu befürchten. Unerklärlich ist es mir, daß von den Weibchen, von welchen ich etwa 100 Stück in einem nicht zu großen Käfig zusammen sitzen habe, und auf deren Pflege ich wenig Sorgfalt verwende, und dieselben ganz dasselbe Futter erhalten, wie die Hähne, mir noch kein einziges zu Grunde ging; im Gegentheil haben sich mehrere krank angekommene Weibchen dort vollkommen erholt. Sollte Ihnen nun der oberwähnte Krankheitszustand bekannt sein und wäre Ihnen irgend ein Mittel oder wenigstens die Krankheitsursache bekannt, so ersuche ich höflichst, mir hierüber, wenn möglich umgehend, gefälligen Rath zu ertheilen.

F. Zivsa in Troppau.

Antwort: Die Untersuchung des mir gesandten Vogels zeigte eine sehr heftige akute Unterleibsentzündung, an welcher zeitweise auch viele fremdländische Vögel sterben und deren Ursachen in Folgendem beruhen. Erstens Zugluft oder sonstige Unterleibserkältung, zweitens eiskaltes Trinkwasser, drittens irgend welches verdorbenes Futter, viertens auch zu reichliches Eifutter. Die Erkrankung ist auch ansteckend, d. h. dadurch übertragbar, daß die wässerigen Entleerungen irgendwie mit dem Futter in Berührung kommen und dann artet die Krankheit auch leicht zur Epidemie aus — wie dies wol bereits jeder Vogelzüchter im Laufe der Jahre mehr oder minder schmerzlich erfahren hat. Lesen Sie gefälligst nach, was Herr Kontroleur Böcker darüber hier veröffentlicht hat, und dann suchen Sie in jedem Falle die bei Ihnen auftretende Ursache zu ergründen und abzustellen.

Herrn Lehrer J. J. Linder in Wallenstadt (Schweiz): Wo Fasanenhühner gegenwärtig zu haben sind, wissen wir Ihnen nicht zu sagen: Wenden Sie sich jedoch an Herrn A. Rumpf in Zürich oder an Herrn Marten in Linden bei Hannover; Beide werden Ihnen dieselben sicherlich beschaffen.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Stettin.

Sitzung vom 28. Oktober. Herr R. Grimm hatte die in der Vogelstube des anwesenden Mitgliedes Hinz aus Silligsdorf, eines eben so bedeutenden Vogelkenners als glücklichen Züchters, erbrüteten Blendlinge des afrikanischen Grauedelfink (Fringilla musica) mit Harzer Kanarienweibchen ausgestellt und schildert die dabei gemachten interessanten Beobachtungen. Die Blendlinge zeigen sich dem Edelfink sehr ähnlich und obgleich die Körperfülle etwas größer als bei jenem, würde eigentlich doch nur der gelbe Hauch, der über dem natürlichen Silbergrau liegt, sowie einzelne gelbe Federn die Bastardirung kennzeichnen.*) Der Gesang der Jungen erinnert ebenfalls stark an den Grauedelfink, wenn sich auch mancher Kanarienton harmonisch damit vereinigt. — Auf Antrag des Hauptmanns Bödicker bewilligt die Versammlung zur kräftigen Handhabung des Vogelschutzes für den Winter 1874—75 die Summe von 300 Mk., und stellt gleichzeitig für die in der Provinz Pommern von Nichtmitgliede erlegten Raubvögel folgende Schußprämien fest: für Uhu (Bubo maximus) 20 Mk., Steinkauz (Surnia noctua) 1 Mk., Flußadler (Pandion haliaëtos) 10 Mk., Seeadler (Haliaëtos albicilla) 6 Mk., Schreiadler (Aquila naevia) 3 Mk., Wanderfalk (Falco peregrinus) 3 Mk., Zwergfalk (Falco aesalon) 3 Mk., Lerchenfalk (Falco subbuteo) 3 Mk., Königsmilan (Milvus regalis) 2 Mk., schwarzer Milan (Milvus niger) 1 Mk., Habicht (Astur palumbarius) 6 Mk., Sperber (Accipiter nisus) 3 Mk., sämmtliche Weihen (Circi) à Stück 2 Mk., großer Würger (Lanius excubitor) 50 Pf., kleiner Würger (Lanius rufus) 50 Pf., Neuntödter (Lanius collurio) 50 Pf., Kolkrabe (Corvus corax) 3 Mk., Elster (Pica caudata) 1. Mk., Eichelheher (Garrulus glandarius) 50 Pf. Bedingung ist, daß die eingelieferten Vögel sich in einem zur Präparation brauchbaren Zustande befinden, für in Verwesung begriffene Leichen oder auch bei Einsendung der Fänge wird nur die Hälfte obiger Schußprämien gezahlt. Einzusenden sind die Vögel an den Konservator des pommerschen Museums, Herrn Schweitzer. Die Auszahlung resp. Uebersendung der Prämiengelder erfolgt am Schlusse jeden Monats. — Herr Reimer spricht über den Flug der Tauben und schildert die in Stettin gehaltenen Tümmler, unter denen sich in erster Reihe neben den weißen glattfüßigen Stralsunder-Tauben, namentlich auch die Prager Eulen hauptsächlich durch brillante Schwenkungen und die Gewandtheit, womit sie dem Raubvogel blitzschnell entweichen, auszeichnen. Das Gefieder dieser Art ist hellgesperbert, der Körperbau edel, das feurige Auge mit bräunlicher Iris, der Kopf charakteristisch, fast eckig, wie bei den Indianer-Tauben, der Schnabel im Vergleich zu den übrigen Tümmlern sehr kurz, die Füße sind unbefiedert. In der Zucht sind die Prager Eulen vorzüglich und werden darin von keiner andern Rasse übertroffen. Der Preis des Paares stellt sich auf 1 Thlr. Zur Ansicht hatte Redner mehrere Paare und auch schwarze Indianer-Tauben ausgestellt. Erstere gelangen zur Verloosung. — Herr Prütz beschreibt unter Vorzeigung eines dem pommerschen Museum gehörigen Exemplars den Tsiankar oder Wumbi, Paradiesvogel benannt (Paradisea papuana). Der gerade, zwölffedrige Schwanz ist durch drahtartig verlängerte Federn ausgezeichnet, von denen die beiden mittleren sich bei der dritten Mauser in kahle 15 Zoll lange Schäfte verlängern, worauf dann erst die schönen gelben Federbüsche über den Weichen hervorbrechen und eine Länge von 50 Zoll erreichen. Nur die Männchen haben das prachtvolle Gefieder und die langen zerschlissenen Federn, welche beliebig von ihnen ausgebreitet und zusammengelegt werden können. Das Vaterland der Paradiesvögel ist der nördliche Theil Neu-Guinea's. Interessant ist die Thatsache, daß die Bälge früher immer ohne Füße importirt wurden, woraus die bekannte Sage entstanden, daß die Paradiesvögel nie zur Erde kommen, und beständig in der Luft leben, ja, daß das Weibchen die Eier auf dem Rücken des Männchens erbrute. Die Bälge sind im Allgemeinen höchst ungenügend präparirt, weil die Bewohner Neu-Guineas das Präpariren nicht verstehen, und die Holländer sich darum, so wie überhaupt um die Vögel nicht im mindesten kümmern, woraus auch unsere Unkenntniß betreffs des Lebens der Paradiesvögel herrührt. — Redner bringt ferner eine ihm von Professor Bastian, Vorsitzenden der afrikanischen Gesellschaft zugegangene Aufforderung, der deutschen Gesellschaft zur Erforschung des äquatorialen Afrika als Mitglied beizutreten, zur Kenntniß der Versammlung und ersucht diese wahrhaft nationale Sache nach Kräften zu unterstützen. Der Vorstand wird aus seiner Mitte ein Sammel-Komitee bilden und weitere Beitrittserklärungen auch aus anderen hiesigen Vereinen entgegennehmen. Von den Anwesenden verpflichteten sich durch Namensunterschrift sofort 21 zur Mitgliedschaft. — Herr Bernhardt hatte fünf helle junge Brahmahähne von kolossaler Größe und schöner Charakterzeichnung, sowie getigerte Brünner Kropftauben, Lieutenant v. Dankbahr einen australischen Penants-Sittich (P. Pennanti) ausgestellt und gaben beide Herren die betreffenden Beschreibungen. — Von Herrn Quandt war der schriftliche Antrag eingegangen, in der zweiten Hälfte des Monats Dezember unter den Vereins-

*) Späterhin, wenn diese Vögel älter werden, tritt das Gelb rein und deutlich an der Kehle und auf dem Bürzel hervor. Herr Dr. Franken in Baden hat diese Bastarde zuerst schon vor einigen Jahren gezüchtet.

mitgliedern bei freiem Eintritt für das Publikum eine Ausstellung von selbstgezüchteten Harzer Kanarienvögeln, verbunden mit Gesangsprämiirung zu veranstalten. Der Antrag geht zur weiteren Beschlußfassung an den Vorstand. — Herr Dr. Ant. Reichenow, Afrikareisender und Kustos am zoologischen Museum in Berlin ertheilt die Zusage, bei freier Wahl der Zeit, hoffentlich jedoch noch im Laufe des Winters, im hiesigen Verein einen Vortrag zu halten; ebenso haben schon früher zugesagt die Herren Dr. Karl Ruß in Steglitz und Professor Altum in Neustadt. — Aufgenommen werden 3, angemeldet 5 neue Mitglieder.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Zu verkaufen in Folge Lokalveränderung: 1 Wiener Sprosser, 2 amerik. Blaudrosseln, 1 Nachtigall, 1 ältere vorzügliche Singdrossel, Steinröthel, Grasmücken, Schwarzköpfe, Fliegenfänger ꝛc. Sämmtliche Vögel sind ausgezeichnete Schläger und können mit oder ohne Käfige zu mäßigem Preis erworben werden. **Mehlwürmer in bester Qualität.**
Töppingen, Württemberg, bei Carl Dittus. [731]

Kanarien-Vögel.

Ich suche
8—12 Stück Weibchen,
kleine Rasse und rein **dunkel** gelb. Offerten bitte nebst Preis zu richten an
[732] **C. Koch**, Hoflieferant, Wiesbaden.

Zu verkaufen.

Zur Bluterneuerung:
7 Monate alte Spanierhähne à 3 Thlr.
7 " Putenhähne, vom wilden abstammend, à 7 Thlr. " incl. Verpackung gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung.
Oberförster v. Marschall
[733] zu Bretterode bei Schmalkalden.

Harzer Kanarienvögel.

Mein Vorrath besteht fast durchweg aus St. Andreasberger Vögeln besten Stammes. Einen kleinen Posten gewöhnlicher Harzer Vögel gebe ich an Händler zu billigem Preise ab. Auch bei rauhestem Wetter geschieht der Postversandt unter Garantie gefunden Eintreffens bis auf 3tägige Entfernung. [734]
N. Maschke, St. Andreasberg im Harz.

Russische Haken- und Karmingimpel und Waidenammen und Ameiseneier pro Pfd. 15 Sgr., sind zu haben bei
Brune, Vogelhändler,
[735] Berlin, Gartenstraße 62.

Ein Pärchen **Birkhühner,** welche verflossenes Frühjahr von einer Haushenne ausgebrütet worden, also ganz zahm sind, wird um 12 Thlr. excl. Transportkäfig abgegeben von
Theod. Mayer,
[736] Nr. 46 in Streitberg in Bayern.

Junge Nymphen und Wellenpapageien, im Freien gezogen und deshalb besonders kräftig, hat zum Preise von 3½ Thlr. resp. 2½ Thlr. pr. Stück abzugeben.
[737] **Otto Wiegand in Zeitz.**

Zu verkaufen.
Ueber ein Jahr gehaltene, schöne Alpendohlen, Alpenbrünetten und Schneefinken; wie ächte Holländer Kanarien, oder gegen Graupapageien und Wellensittiche zu vertauschen.
S. Stauffer's Museum in Luzern
[738] (Schweiz).

Harzer Kanarienvögel, Roller (ohne Fehler), empfiehlt zum Preise von 2 Thlr. 20 Sgr. unter Garantie die Vogelhandlung von
F. Reinhardt,
[739] Hannover, Gr. Packhofstr. 7.

Gleich den im vorigen Jahre bezogenen, haben auch die heuer von Herrn Lehrer **Wiegand** in Ansbach, A.-Ussingen, erhaltenen feinen Hohlroller, ein so herrliches fehlerloses Lied, daß sie den Anforderungen eines jeden Kenners entsprechen.
Kaufmann **Weiglein,**
[740] Zellingen (Bayern).

Einen Alexander- (Halsband-) Sittich, M., wünscht zu verkaufen, event. gegen kl. Exoten zu vertauschen.
[741] **G. Teucher Meyer** in Winterthur.

1 Paar Nilgänse (Chenalopes aegyptiacus) und 1 Paar Brandenten (Vulpanser tadorna) wünscht zu kaufen
[742] **Ed. Fritze**, Rittergut Tiefensee bei Düben.

Abzugeben sind für billigen Preis:
Ein schöner junger weißer Italiener Hahn,
Ein Hahn, 2 Hühner Silberbrabanter, diesjährig,
zu besehen Berlin, Friedrichstraße 104, bei
[743] **C. Barnewitz.**

Habe wieder einige Vogelarten zu den bekannt billigen Preisen zu verkaufen: Lachtauben à Paar 20 Sgr., Zeisige à Paar 6 Sgr. Suche in Tausch, schwarze und weiße Lachtauben, auch gegen Baar zu kaufen.
W. Langner,
[744] Neue Glogauerstr. Nr. 9.

Gegen diesjährige feine Harzer Kanarienhähne und Weibchen suche ich ausländische Finken oder Sittiche in Tausch. **Hugo Arpert** in **Nordhausen a. Harz.** [745]

Zu verkaufen.
Goldamsel, Steindrossel und Nachtigalen bei **Joh. Schreck**, Neustadt a. Harz (Rheinpfalz). [746]

Vorzügliche Harzer Kanarienvögel werden abgegeben von
W. Boecker,
[747] **Controleur in Wetzlar.**

Unterzeichneter versendet unter Garantie Harzer Kanarienvögel zum Preise von 3—8 Thlr. à St. Reelle Bedienung wird zugesichert, da ich seit 32 Jahren das Geschäft betreibe und den Gesang der Vögel zu unterscheiden weiß und auch stets nur gute Vögel halte. Selbst einer der berühmtesten Liebhaber und Züchter hat mir bei seinem Hiersein für das Stück 3½ Thlr. geboten, aber keine bekommen, indem ich den Herren Liebhabern meiner Kanarienvögel stets nur die feinsten liefern will.
W. Wiegand,
[748] Naturalist, St. Andreasberg a. H.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 3. December 1874. Nr. 49.

Inhalt:

In Sachen eines Kongresses der deutschen Geflügel- und Stubenvögel-Liebhaber und Züchter. —
Uebt die Umgebung der Thiere einen Einfluß auf ihre Färbung aus oder nicht? —
Wie man im Alterthum Vögel zur Bereitung von Heilmitteln verwendete. —
Tagebuchnotizen aus der Vogelstube. —
Gefiederte Welt im Osten. (Fortsetzung.) —
Welches sind die besten Brütapparate? —
Aus den Vereinen: Stettin. —
Ausstellungen: Cypria in Berlin. —
Anfragen und Auskunft: Silberfasane; Eierbrot; Käfige für Wurmvögel. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —

Allgemeiner deutscher Kongreß der Geflügel- und Stubenvogel-Züchter und Liebhaber.

Erste Veröffentlichung des Vororts.

In Folge der Aufforderung, welche die betreffenden Zeitschriften gebracht haben, sind bis jetzt Mittheilungen eingegangen von dem „Geflügelzüchter-Verein zu Wiesbaden", durch Herrn Carl Schmidt, ferner von den Herren Dr. Ney in Halle a. S., Jos. Steinmetz jr. in München, Rob. Klewitz in Styrum bei Mühlheim a. d. Ruhr.

Indem ich dies vorläufig veröffentliche, danke ich für das mir zugekommene werthvolle Material, besonders für die ausführlichen Propositionen aus Wiesbaden, und bitte recht dringend um weitere Betheiligung durch Zuschriften, damit das von mir zu entwerfende Programm über die zur Berathung zu stellenden Gegenstände, sowie über die Zeit und den Ort doch möglichst allen Wünschen entgegenkomme.

Stettin, den 25. November 1874.

Adolf Creutz.

Uebt die Umgebung der Thiere einen Einfluß auf ihre Färbung aus oder nicht?

Die obige Frage drängte sich mir bereits vor einigen Jahren auf. Schon damals beschloß ich, Versuche in dieser Richtung mit meinen Kanarien aufzustellen; ich kam jedoch erst im Frühjahr und Sommer des Jahres 1872 dazu, und auch damals waren meine Beobachtungen, die viele Störungen erlitten, ziemlich ungenügend. Im genannten Jahre verwandte ich nur rein mattgelbe Hähne und Weibchen zur Zucht.

Zur Hecke hatte ich eine lehmgelb angestrichene Kammer hergerichtet und in derselben nur Sitzstangen, aber durchaus keine Büsche angebracht um die Anwendung von Grün oder überhaupt jeder andern Farbe zu vermeiden. In diesem Raume hielt ich zehn Weibchen und drei Hähne, in einem grün angestrichenen mit vielen Tannenzweigen durchflochtenen Gebauer hingegen zwei Weibchen mit einem Hahn. Wie schon vorhin erwähnt, waren sämmtliche Vögel rein gelb ohne Abzeichen. Das Ergebniß zeigte nun in der Kammer einige 40 Junge, darunter nur 3 schwarzkappige, 1 schwarzflügliger und 1 ganz bunter Vogel, der Rest von einigen 30 Köpfen war reingelb. Die zwei Weibchen im Heckbauer hatten 11 Junge großgezogen, sämmtlich mit Ausnahme von 3 Vögeln bunt, theilweise fast grüngelb. Dies Ergebniß sprach nun zwar zu Gunsten der Bejahung der aufgestellten Frage. Im Jahre 1873 mußte ich leider ganz auf weitere Beobachtungen verzichten, da meine Räumlichkeiten zu sehr beschränkt waren, und in diesem Jahre scheiterten alle Beobachtungen daran, daß ich überhaupt, wol eine Folge der schlechten Witterung oder schlechter Zuchtweibchen, gar keine Jungen züchtete. Ich hoffe jedoch im nächsten Jahre, wenn mir größere Räumlichkeiten zu Gebote stehen, umfassendere Versuche anstellen zu können, vorausgesetzt, daß es mir gelingt, reine Rassevögel zu erhalten, zu deren Erlangung ich bereits Schritte gethan. Noch

mehr bestärkt wurde ich im Jahre 1873 durch die Ergebnisse der Hecken mir befreundeter Züchter, die sämmtlich viel Grün in ihren Heckräumen angebracht hatten, und demgemäß auch ausnahmsweise viel bunte Vögel züchteten, was Herr Rud. Schöbel, der im Herbste den größten Theil dieser, durch mich aufgekauften Vögel erhielt, wird bezeugen können. So auffallend nun auch solche Thatsachen zu Gunsten der angeregten Frage sprechen, so möchte ich es doch kaum wagen, diese Behauptung öffentlich auszusprechen, bevor nicht vielerfahrene Züchter, welche seit Jahren im Besitz reiner Zuchtvögel sind, ihre Erfahrungen, bez. Ansichten ausgesprochen, oder bis sie zur Anstellung ähnlicher Beobachtungen sich veranlaßt fühlen,*) denn so übereinstimmend auch im ganzen Thierreiche die Farbe und insbesondere die der Vögel mit ihrer Umgebung ist, so finden sich doch vereinzelte, unerklärliche Ausnahmen vor, und demgemäß wird eine solche Behauptung, wenn sie nicht durch die mannigfaltigsten Beobachtungen unterstützt würde, von verschiedenen Seiten angefochten werden.

Daher möge die Anregung dieser Frage zunächst nur dazu dienen, daß dieselbe unter den erfahrenen Züchtern weiter erörtert werde; hauptsächlich aber dazu, daß von möglichst vielen verschiedenen Seiten im nächsten Frühjahr derartige neue Versuche angestellt und dann die Ergebnisse solcher Beobachtungen verglichen werden können.

Karl Schnelle.

Wie man im Altertum (nach Plinius) verschiedene Vögel zur Bereitung von Heilmitteln gegen Krankheiten verwendete.**)

Die nachstehenden Rezepte stammen zum Theil aus den ältesten Zeiten; im Mittelalter und selbst noch bis Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden dieselben selbst von Aerzten verordnet:

1. Bei rothen oder trübe werdenden Augen Elsternfleisch zu Asche gebrannt, entweder genossen oder übergeschlagen. Gegen blutunterlaufene Augen Schwalbenblut. Wachtelfett in die Augen gestrichen gegen Dunkelheit der Augen. Gegen grauen Staar Galle und Fett der Nachteulen.
2. Gegen Brustdrücken das Fett der Turteltauben, von der Bratensauce abgenommen und damit die Brust eingerieben.
3. Gegen Blutflüsse die Asche einer gebrannten Turteltaube eingenommen.
4. Gegen Kolik das gekochte Fleisch des Wiedehopfes.
5. Gegen Fieber Kukuksasche oder Schwalbenfleisch (innerlich).
6. Gegen Flecken im Gesicht, Blatternarben und Sommersprossen Staarenmist (ins Wasser gelegt, ausgedrückt und damit das Gesicht bestrichen).
7. Gegen das Gekreisch der Kinder Schwalbenherz in Wasser, oder Wasser worin Schwalben abgesotten, eingenommen. Nach dem alten Geßner.
8. Gegen verschiedene Gifte das Hirn des Zaunkönigs in Hollunderbeerensaft eingenommen.
9. Gegen die Gelbsucht die Asche von Sperlingen in Bier gesotten.
10. Gegen Leibgrimmen das Amsel-, Lerchen- und Meisenfleisch.
11. Gegen Darmgicht gebrannte Stieglitzen.
12. Gegen ausfallende Haare Spatzenmist mit Schweinsfett vermengt; um schwarze Haare zu bekommen, Rabenfett ausgelassen, und damit der Kamm bestrichen.
13. Gegen Halsentzündung die Asche vom Zaunkönig.
14. Gegen den Biß eines wüthenden Hundes Kukuks- oder Schwalbenkoth mit Wasser genommen.
15. Gegen Kopfschmerzen Wiedehopffedern auf den Wirbel gelegt (auch schlafbefördernd).
16. Bei Epilepsie Wachtel- oder Rabenhirn genommen.
17. Zur Erhöhung der Mannbarkeit öfters Elsternfleisch genossen.
18. Gegen Melancholie Elsternfleisch zu Pulver verbrannt und 3 Tage nacheinander zu nehmen.
19. Zur Milchbeförderung und gegen Unfruchtbarkeit der Weiber der Genuß von Wachteleiern.
20. Gegen das Podagra Schwalbenblut; auch eine Salbe aus zerriebenem Schwalbenmist mit Nesselsamen und Seife vermischt.
21. Gegen Ruhr Amseln mit Myrrtenbeeren gebraten.
22. Gegen Schlagfluß der Genuß des Eulenfleisches.
23. Gegen den Stein mit den Federn verbrannte Bachstelzen, Zaunkönige, Meisen oder Schnepfen (eines von diesen). Auch Meisenhirn unter Butter gemengt und auf Brot gestrichen.
24. Gegen die Wassersucht, den Absud (Brühe) von Schwalbenfleisch längere Zeit getrunken.
25. Gegen Würmer der Kinder das Blut des Wiedehopfs mit Essig eingegeben.
26. Beim Zahnen der Kinder und gegen Zahnweh die Asche von jungen Sperlingen mit Weinessig vermischt und damit das Zahnfleisch eingerieben.

---

*) Wozu wir hiermit angeregt haben möchten. D. R.

**) Selbstverständlich nehmen wir diese Mittheilung hier nicht etwa zur Nachahmung, sondern nur um des kulturhistorischen Interesses willen auf. D. R.

Tagebuchnotizen aus der Vogelstube des Herrn Graf Yorck von Wartenburg auf Schleibitz.

(Fortsetzung.)

28. Februar.

Nachdem ich die Loris von den blauen Bergen fliegen gelassen, ging es die ersten Tage ganz gut;

auf einmal schienen sich aber diese Papageien einzubilden, daß sie keinen andern Vogel mehr zum Futter herankommen lassen dürften, und sobald einige kleine Vögel dasselbe doch durch List zu erreichen suchten, fingen sie an, ohne alle weitere Veranlassung die gesammte Bewohnerschaft der Vogelstube und zumal die übrigen Papageien, wüthend zu verfolgen. So blieb mir nichts Anderes übrig, als sie eilends herauszufangen und abgesondert einzusperren, wobei sie sich jedoch ebenso munter befinden.

In meiner Vogelstube ist jetzt im Brüten Stillstand eingetreten; nur die Diamentvögel scheinen Junge zu haben und die Wellenpapageien haben diesmal von fünf Eiern nur ein Junges erbrütet; sie haben sich, wie ich fast glaube, durch das anhaltende Nisten erschöpft. Ich will jetzt die Pause, bevor die Schönsittiche und die wundervollen Paradiessittiche sich zum Brüten einrichten, da beide wol in einiger Zeit ebenfalls damit beginnen werden, dazu benutzen, um die gesammte Bewohnerschaft der Vogelstube einmal wieder einzufangen und die Stube aufräumen und reinigen zu lassen und neu einzurichten. Die allzueifrigen Brüter, als Diamantfinken und Wellenpapageien, will ich dann eine Zeit lang im Käfig halten, damit sie ausruhen und erst wieder völlig erstarken. Aus der letzten Brut der Bartfinken und bunten Japanesen-Mövchen ist übrigens nichts mehr geworden; die Eier waren unbepaart. Die Grauköpfchen haben auch die letzte Brut nicht ausgebrütet und scheinen jetzt wieder eine Pause machen zu wollen, was mir auch ganz lieb, weil es naturgemäß ist.

Durch Herrn Wenisch in Breslau erhielt ich gestern ein Paar allerliebste Mozambique-Zeisige, die ich bis jetzt noch nicht besessen. Meine Wachteln (Helmwachteln) will ich versuchsweise im Frühjahr in ein wundervoll geeignetes Gehege im Park aussetzen. Graf Noedern, der ein ebensolches Paar besitzt, das bei ihm gelegt hat, aber nicht brütet, will mir dieses zu gleichem Zweck hierhergeben und wir sind begierig zu beobachten, was aus den Wachteln wird.

(Wird fortgesetzt).

Gefiederte Welt im Osten.

Palmyra.

(Fortsetzung).

Langbein Storch — nur der weiße — darf auch nicht vergessen werden, indem er jedes Jahr in einigen Paaren als Frühjahrsverkünder sich einstellt, doch seinen Wohnsitz nicht auf den Dächern, sondern hier nur auf den trockenen Gipfeln hoher Bäume bezieht. Gewöhnlich horsten in einem kleineren Bezirke höchstens 2—3 Paar, und es kommt unter denselben während der Einzugszeit zu gehörigen Schnabelduellen, bis jedes Paar in seiner Behausung sich festgesetzt hat. Nach dem Ausfliegen der Jungen bleibt die zusammenhaltende Familie nicht mehr lange, meist nur bis Ende August hier, und dann zieht sie erst nach den größeren Sümpfen der Flußthäler sich mit anderen in große Gesellschaften zusammenschlagend, um dann etwas später die Reise nach dem Süden gemeinschaftlich zu machen.

In der Krähenkolonie ist der Storch kein gern gesehener Gast, da er, so lange dort noch ungefiederte Jungen zu haben, täglich regelmäßig erscheint, und gleich so ein halbes Dutzend auf einmal aufspießt, um die Magen seiner fortwährend wie junge Gänse hitschernden Sprößlinge zu stopfen. Ueberhaupt, meiner Beobachtung zufolge, halte ich den Storch für einen großen Räuber, der neben vielem schädlichen Zeug sich auch kein Gewissen daraus macht, die Enten, — d. h. kleine — vom Teiche, wie Rebhühner und junge Hasen zu stehlen. Aufgezogen wird er dem Menschen sehr anhänglich. Ich besitze einen solchen schon sechs Jahre, welcher den Sommer über frei herumspaziert, und immer die mit Erdarbeiten beschäftigten Arbeiter aufzufinden weiß, da er es wol weiß, daß von diesen mancher Leckerbissen zu Tage gefördert wird. Im Winter bekommt er seinen Aufenthalt in einem Gewächshause, wo er manchmal recht mißlaunig gestimmt ist, und fremd Eintretende mit Schnabelhieben begrüßt. Am lächerlichsten nimmt er sich aus, wenn er auf seinen Spaziergängen mit den Truthühnern zusammentrifft, welche ihn augenblicklich neugierig umringen, kollernd einen immer enger werdenden Kreis um ihn ziehen, so daß er bald steif wie ein Stock in ihrer Mitte steht. Nun wirds ihm doch zu toll und er geräth in große Angst, da die Truthühner Schnabelhiebe an ihm versuchen, und in der größten Noth fängt er an zu klappern, so daß Jene aufs Höchste erschreckt, kollernd auseinanderstieben, worauf Langbein durch den geöffneten Kreis so schnell als möglich Fersengeld gibt. Vor seinen im Frühjahre ankommenden Verwandten hat er gewaltigen Respekt, läuft in der ersten Zeit hinter den Menschen gleich einem Hunde her, um ja nie allein zu bleiben; wahrscheinlich wurde er von einem wilden Storche bereits einmal zerzaust.

Wie überall, so ist der Staar auch hier ein früh eintreffender Gast. In ungeheuren Zügen rückt der lustige Geselle an, doch lassen sich nur selten, trotz der besten Nistgelegenheiten einige Paare zu einem Eheleben hier nieder, sondern ziehen nach den Niederungen des Dnipers, um in den dort so viel vorhandenen hohlen Bäumen ihre Bruten in Gesellschaft abzumachen. Sind die Jungen gehörig flügge, so wird dieser Ort mit der freien Steppe vertauscht, wo sich nicht zu weit entfernt ein Sumpf findet. Im August bis Oktober fallen bei Sonnenaufgang wolkenartige Schwärme mit einem heillosen Geschrei und Gesurr auf den Bäumen der Gärten, wie auf den Strohdächern der Dörfer ein, um nach kurzem, tollem Geschmatz, das Gleiche einige hundert Schritt entfernt zu wiederholen. Den Tag über verbringen sie auf der Steppe in der Nähe und zwischen weidenden Schaf- und Viehheerden, mit dem Fangen des

Mistkäfers beschäftigt, oder spazieren ganz dreist auf dem Rücken eines Schafes umher, das sehr erfreut scheint, dadurch von den lästigen Zecken befreit zu werden. Abends werden zu Schlafstellen die mit Schilf bewachsenen Ufer der Sümpfe gewählt, hier kündigen sie ihre Anwesenheit, durch das bis tief in die Nacht dauernde Geschmatz und Geschnarr, auf weite Entfernung an.

Ihr Nutzen, den sie durch Vertilgen vieler der Landwirthschaft und dem Gartenbau schädlichen Insekten leisten, ist immerhin ein sehr wesentlicher; allerdings machen sie sich auch wieder durch den Schaden, den sie in Kirschpflanzungen und Weinbergen anrichten, oft recht lästig. Ueber das feste Urtheil, ist Nutzen oder Schaden größer? werden, glaube ich, niemals alle Ansichten einig werden.

Für den Liebhaber von munteren, geistig begabten Vögeln bleibt der Staar ein sehr schätzbarer Genosse, und ich werde später einmal über ihn wie über noch einige andern Insassen meiner Vogelstube Verschiedenes mittheilen.

Als den ersten wahren Frühlingsverkünder — denn die Obgenannten bringen nach ihrer Ankunft nichts weniger, als bestimmte, dauernde, gute Witterung mit, haben im Gegentheil oft noch mit sehr bösem Nachwinter zu kämpfen, — der durch sein Kommen den Abschied des letzten winterlichen Hauches anzeigt, betrachten wir hier eine kleine Falkenart, die in großer Zahl zu gleicher Zeit mit den Schwalben eintrifft. Den naturgeschichtlichen. Namen dieses niedlichen Falken kenne ich leider nicht, habe ihn auch früher nie in Deutschland gesehen und beschreibe ihn daher genau. Von der Größe einer Taube, Flügel lang, spitz, schwalbenartig, der Kopf rund, Gesicht etwas platt, eher eulenähnlich. Männchen: Kopf, Rücken, Hals und Bauch schiefergrau; Schwingen, die etwas über das Schwanzende ragen, oben weißlich, unten schwarzgrau; Schwanz braunschwarz; Schenkelfedern (Hosen), After und untere Schwanzdeckfedern dunkelrostroth; Augen, Wachs- und Fußhaut korallroth; Schnabelspitze blauschwarz. Weibchen: Oberkopf und Nacken braunroth; Rücken schiefergrau, schwarz gewellt; Kehle und Backen weißlichgelb mit schwarzem Backenstreifen; Brust, untere Flügeldeckfedern am Oberarm, Bauch und After hellrostfarbig, mit drosselartigen, dunklen Längstropfen; Schwingen grau, Innenfahne mit großen, weißen, runden Flecken regelmäßig gezeichnet; Schwanz schiefergrau mit schwarzen Querbinden, von denen die am Ende stehende die breiteste ist; Augen-, Wachs- und Fußhaut orangeroth; Schnabelspitze blauschwarz. Die Jungen ähneln dem Weibchen, nur in Färbung etwas blasser, wie das Grau des Rückens mit Braun gemischt ist. Hier heißt er Kostschick.

Also als sicheres Zeichen des Beginnes der schönen Jahreszeit, hört man erst einzelne dieser Vögel sich durch ihr im Fluge, wie auch im Sitzen fortwährend ausgestoßenes Geschrei bemerkbar machen, das sich mit den Tönen gih, gih, gii, gii ausdrücken läßt. Bald rücken sie in großen Schaaren an, und segeln schwalbenartig, denn er ist ein ausgezeichneter Flieger — schreiend uns über und um die Köpfe herum. Während der Begattungszeit sind die Männchen gegen einander äußerst eifersüchtig, zerzausen sich im Fluge und kollern in blinder Wuth oft bis vor die Füße der Menschen; überhaupt legen diese Vögel sehr wenig Scheu vor den Menschen an den Tag und siedeln sich meistens blos in den Gärten, niemals aber in weit von den Wohnungen entfernten Stellen an. Um die Raufereien der Männchen scheint das Weibchen sich gar nicht zu kümmern, sondern es hat genug an den zärtlichen Huldigungen des Erwählten. Lustig wird herumgesegelt, gekost und geschrien, kein Theil denkt an die Zukunft, wie es einem jungen Ehepaar geziemt, wenigstens für die Wiege der erwarteten Jungen zu sorgen. Verlegenheit scheint nicht ihre Sache zu sein, denn fühlt das Weibchen seine Zeit gekommen, so muß der Gatte mit einer brütenden Elster oder Krähe Streit anfangen und die Gemalin fliegt unterdessen in das Nest derselben und ohne Ceremonie werden Eier oder sonstiger Inhalt über Bord geworfen, und für die eigene Nachzucht ist die Wohnung fertig. Bei der Einmiethung kommt es gar nicht darauf an, liegt das Nest hoch auf einem Baume oder niedrig im Gebüsch, dem Auge verborgen oder ganz offen, wenn es nur die richtige Größe hat. Jetzt wird das leichtsinnige Paar auf einmal ganz tugendhaft, kümmert sich um nichts mehr, sondern brütet eifrig, sich gegenseitig abwechselnd, wie später mit der zärtlichsten Liebe für die Kleinen gesorgt wird. Die Jungen sehen in der ersten Jugend in dem schneeweißen Flaumkleide, mit den klugen Aeuglein recht niedlich aus, sind desto unartiger, wenn man ihnen Liebkosungen angedeihen lassen will, indem sie sich dann auf den Rücken werfen und mit den scharfen Krallen nach der sie berührenden Hand fuchteln, daß man gerne davon absteht. Sind sie flügge, so füttern sie die Alten noch eine Zeit lang, und recht possirlich ist es mit anzuschauen, wenn sie mit einem etwas großen Bissen — Frosch oder dergleichen — versorgt werden, den sie nicht auf einmal schlucken können, und ihn dann mit einem Fuße erfassen, handartig nach dem Schnabel führen, um davon abzubeißen. Lange Zeit hatte ich diese Vögel im Verdacht, daß sie sich an kleineren Vogelarten vergreifen, doch meine Beobachtungen an den Alten, wie der untersuchte Magen mehrerer Jungen, belehrten mich, daß sie hauptsächlich Kerbthiere, wie kleinere Amphibien verzehren, welches zwar nicht ausschließt, daß manchmal ein warmblütiges Thier mit unterlaufen wird, was ich an den von mir gepflegten Jungen sehen konnte, die allen Fleischarten nicht abhold, und überhaupt Alles annahmen, was nur eßbar ist. Den Bienen ist er sehr gefährlich, und kann man ganze Schaaren dieser Vögel über den blühenden Esparsettfeldern, wo die Bienen sammeln, herumstreichen sehen; hingegen erweist

er sich in gewissen Jahren, wo Kohl- und Baumweißling wie Schneeflocken umherwirbeln, sehr nützlich durch das Wegfangen derselben. Ueber seinen Nutzen oder Schaden möchte ich daher kein endgültiges Urtheil aufstellen. Anfang Septembers mit den Schwalben, verläßt er uns wieder und scheint dieses in großen Gesellschaften zu thun, denn eines Morgens ist keiner mehr zu hören und zu sehen. —

Ein um dieselbe Zeit ebenfalls ankommender Gast ist der Kukuk, von welchem immer ein oder zwei Paare sich in den Gärten ihre Bezirke absondern, und auf die bald zu erwartenden Ammen ihrer Nachkommenschaft lauern. Diesen Vogel könnten wir hier in größerer Menge gebrauchen, indem er sich durch das Vertilgen gewisser behaarter, oft so verheerend auftretender Raupen, die sonst von keinem Vogel angegangen werden, große Verdienste erwirbt.

Neben dem Rufe des Kukuks ertönt auch das „U, du, duh" des schön gezeichneten Wiedehopfs, von dem mehrere Paare in dem Garten ihren Wohnsitz aufschlagen, wenn beziehentlich der Nahrung, wie Brutstelle, Alles nach Wunsch ist. Zu letzterer muß er nothwendig eine Höhlung in irgend einem alten Baume, wenn nahe am Wasser desto besser, haben, in welche auf dem am Grunde liegenden Mull seine 6—9 Eier gelegt werden. Solche Höhlen sind meist sehr tief und enge dabei, wodurch seine reichlich gesegnete Nachkommenschaft, bei fortschreitendem Wachsthum, arg an Platzmangel leidet und eines auf dem andern gedrückt sitzen muß, die Reinlichkeit somit auch nicht aufs Beste gehandhabt werden kann, und ganz natürlich, aus diesen Röhren kein sehr feiner Duft steigt. Wahrscheinlich entstand dadurch das Sprüchwort vom stinkenden Wiedehopf; doch ist dieser Ruf, wenn er als Stubengenosse gehalten wird, garnicht stichhaltig, da manch' anderer Insasse der Vogelstube den Geruchsnerven so bemerkbare Eigenschaften in weit höherem Grade besitzt. Der von ihm hauptsächlich im Frühjahr oft ertönende Ruf, führt über seinen Aufenthalt gewöhnlich irre; bald scheint er unter der Erde, bald aus den Gipfeln der Bäume zu kommen, bis man sich dann genau beobachtend auf die Lauer legt, und ihn endlich mit vorgestrecktem Kopfe in einem Baumloch, oder hinter einem Baumstumpf entdeckt, von wo aus er seine Bauchrednerei treibt. Possirlich ist es, wenn er auf Rasenplätzen oder Gartenbeten, nach Nahrung suchend, umhertrippelt. Auf einmal wird stille gestanden, der kakaduartige Kamm entfaltet, einige recht komische Verbeugungen werden gemacht, wieder flink ein paar Schritte vorgerannt, der Schnabel bis an die Wurzel in die Erde gestoßen, beim Zurückziehen einen Kerf zu Tage fördernd, welcher noch einige Schnabelhiebe bekommt, und mit einem Wupp, den Hals zurückschleudernd, verschluckt wird. Hauptsächlich gelten diese Jagdzüge der so schädlichen Maulwurfsgrille, die seine Lieblingsnahrung zu sein scheint, von welcher er aber meist blos die Weichtheile verzehrt, Rückenschild und Kopf liegen läßt. Dadurch allein, daß er dieses den Gärtner oft zur Verzweiflung bringende Insekt vorzüglich wegfängt, und nicht minder viele andere in der Erde wohnende Larven und Würmer, muß ihm schon der erste Platz unter den nützlichen Vögeln eingeräumt werden.

Wie ich den Wiedehopf so oft in seinem Freileben zu beobachten Gelegenheit habe scheint er mir äußerst vorsichtig zu sein, ich glaube daher, daß in Gegenden, wo sich keine passenden Nistgelegenheiten vorfinden, er schwerlich sich niederlassen und mit aufgestellten Brutkasten vorlieb nehmen wird. Darum sollte man nicht immer gleich bei der Hand sein, da, wo sich ein kränkelnder Baum vorfindet, denselben wegzusäbeln, und somit manchem der nützlichsten Geschöpfe sein Heim zu nehmen.

Nach meinen Erfahrungen hat das Aufziehen, bezüglich die Aetzung der jungen Wiedehopfe, — es scheint mir, daß nur junge Vögel sich gut eingewöhnen — manche Schwierigkeiten, welche zwar dem Liebhaber, der einen solchen Vogel zu seinem Genossen wünscht, durch das anschmiegende zutrauliche Wesen desselben später reichlich vergolten wird. Dabei kann ich nicht umhin eines Umstandes zu erwähnen, den ich hiermit zugleich als Frage aufwerfen möchte, nämlich: Trinkt der Wiedehopf niemals Wasser? Bei meinem bis jetzt gepflegten konnte ich wenigstens noch nie ein Trinken wahrnehmen, hingegen wol, daß er vor Wasser die größte Furcht und Abneigung zeigt, folglich seine Federn auch nie mit Wasser einnetzt; dagegen das größte Wohlbehagen zeigt, sich in trockener Erde paddeln und sein Gefieder so recht gründlich einstäuben zu können. —

Endlich ist der schöne Lenz ganz eingezogen, die Knospen sind gesprungen, und Baum und Busch stehen in ein freudiges Grün gekleidet da, herausgeschmückt zum Empfang der nun nach und nach einziehenden kleinen Edelsänger.

(Schluß folgt).

Welches sind die besten Brütapparate zum künstlichen Ausbrüten der Eier?*)

Um Beantwortung dieser Frage bin ich schriftlich und mündlich vielfach angegangen; ich will daher in Folge meiner mehrjährigen Versuche mit künstlichem Brüten diese Frage nach meiner Ansicht zu beantworten suchen.

Die meisten dieser geehrten Fragesteller sind nun der irrigen Meinung, daß das Gelingen des künstlichen Brütens in der Form des Apparats liegt, und ganz besonders, wenn der Apparat ein selbstthätiger ist, das heißt, es soll eine Vorrichtung an dem Apparat vorhanden sein, wodurch soviel heißes Wasser aus einem Reservoir in den Apparat gelassen wird, daß immer eine gleiche Temperatur vorhanden ist.

*) Als Antwort auf mehrere Anfragen hier aufgenommen. D. R.

Ich muß nun zunächst behaupten, daß beim künstlichen Brüten die richtige Anwendung der Wärme die Hauptsache ist und daß diese Wärme vom Anfang bis zu Ende nicht immer gleich hoch sein darf, vielmehr im Anfang höher und gegen das Ende der Brütezeit niedriger sein muß; ferner behaupte ich, daß ein Apparat schon dann als brauchbar betrachtet werden kann, wenn im Eierraum die Wärme sich ziemlich gleichmäßig vertheilt, wenn die Eier die größte Wärme von oben erhalten und die Konstruktion eine solche ist, daß die Wärme ohne große Mühe und Kosten und ohne fortwährende Beaufsichtigung dauernd zu erhalten ist. Man muß des Abends zu Bett gehen dürfen und wenn man des Morgens aufsteht, muß die Wärme noch ziemlich dieselbe sein. Daß die Form der Brütöfen und Brütapparate nicht die Hauptursache ist, beweisen uns die Aegypter und Chinesen, da die ersteren in gemauerten Oefen, die letzteren in Tonnen brüten. Beide haben es aber in ihren Leistungen bei den von einander so grundverschiedenen Einrichtungen zu einer großen Vollkommenheit gebracht, da sie beiderseits die Wärme richtig anzuwenden verstehen; ihre Einrichtungen sogar ohne Thermometer blos nach dem Gefühl behandeln. Daß solches Verfahren eine große Aufmerksamkeit erfordert, wird gewiß Jedem einleuchten. Diese Leute erlernen und betreiben das Brutgeschäft handwerksmäßig, und darin liegt eben die Sicherheit des Gelingens.

Es ist nun ganz richtig, daß das Brüten mit kleinen Apparaten reine Spielerei ist; große Apparate aber, worin mit einem Male 500 bis 1000 Eier bebrütet werden können, sind erst recht nicht zu empfehlen. Wer mit einem kleinen Apparat längere Versuche gemacht und sich Verständniß verschafft hat, wird am besten beurtheilen können, ob es sich lohnt, aus der Spielerei Ernst zu machen und eine größere Brüterei einzurichten.

Da nach meiner Ansicht es jedenfalls am zweckmäßigsten ist, wenn man mit einem kleinen Apparat sich einübt und Verständniß verschafft, so lasse ich hier eine Zeichnung eines von mir hergestellten Brütkastens mit Wärmeflasche folgen.



In einem solchen Brütkasten erhalten die Eier die Wärme naturgemäß nur von oben durch die Wärmeflasche.

Der Kasten ist aus starkem Holz, damit die kalte Luft von außen nicht einwirken kann.

Will man nun in solchem Kasten brüten, so wird derselbe vorher mit kurzem Häcksel gefüllt, über dem Häcksel kommt ein passendes Stück Fries und hierauf die Eier zu liegen. Die Eier werden nun wieder mit einem dünnen Stück Fries bedeckt, und hierauf wird dann die Wärmeflasche zwischen die hochstehenden Seitenwände gelegt. Durch behutsames Auflegen der Wärmeflasche drücken sich die größeren Eier tiefer in den Häcksel hinein, so daß alle Eier gleichen Druck und gleiche Berührung durch dieselbe erhalten, mithin auch alle gleichmäßig erwärmt werden. Die nähere Beschreibung und Maßangabe ist in meiner „Anleitung über das künstliche Brüten“ (Berlin, Louis Gerschel Verlagshandlung) enthalten.

Zur Erwärmung eines solchen Apparats für 60 Eier gebraucht man in 3 Wochen ungefähr für 7½ bis 10 Sgr. Petroleum.

Der Preis für Holzkasten, Wärmeflasche und Thermometer wird 5 Thaler nicht übersteigen.

Alle kleinen Apparate, die blos von Blech sind und keine starke Holzumkleidung haben, wodurch Kälte abgehalten und die innere Wärme festgehalten wird, sind wegen des starken Verbrauchs an Heizmaterial zu verwerfen.

Zu größeren Brütereien werden immer gemauerte Lokalitäten mit doppelten Mauern nöthig sein, damit der Brütraum von außen keiner Einwirkung der kalten Luft ausgesetzt und eine gleichmäßige Wärme ohne große Mühe und Kosten herzustellen ist. In solchem Brütraum müssen aber wieder kleine Abtheilungen für je 80 bis 100 Eier hergerichtet sein, in deren jeder für sich höhere oder niedrige Wärme gegeben werden kann.

Das Verfahren, 1000 Eier in einem Apparat, die zu verschiedenen Zeiten eingelegt, mit gleicher Wärme zu behandeln, wird immer ein ganz ungünstiges Ergebniß liefern.

In dem vorstehend beschriebenen Apparat kann man alle Gattungen Eier ausbrüten.

J. H. Krantz.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Dürfen Silberfasanen im Freien in einer Voliere überwintert werden, auch wenn Schnee und Regen theilweise in dieselbe dringen kann? Ferner, kann man mit Silberfasanhahn und Kupferfasanhenne, sowie gewöhnlicher kleinen Haushenne, Bastarde ziehen? Endlich, brüten Silberfasanen im geschützten Raume auch im Winter, wenn der Hahn jetzt Versuche macht, sich mit der Henne zu begatten?
Antwort demnächst. D. R. Ed. Fritze.

Herrn Carl Gudera in Leipzig: Wer außer dem Herrn Bäckermeister E. Krone in Halle Eierbrot liefert, wissen wir nicht anzugeben, und wenn Herr K. wirklich durch Krankheit an der ferneren Herstellung dauernd behindert wäre, so würden dadurch wol recht viele Vogelliebhaber in Verlegenheit gerathen. Hoffentlich können wir schon in einer der nächsten Nummern bestimmte Auskunft, sei es über die fernere Lieferung des Herrn Krone, sei es über eine neue Quelle, machen. —

Herr C. E. Schneider in Zwickau: Wo Sie die in Nr. 24, Jahrgang 1872, beschriebenen Käfige für Nachtigalen und andere Wurmvögel beziehen können, vermögen wir augen-

blicklich nicht zu sagen. Freundliche Auskunft wird Ihnen aber wol Herr Freiherr von Stengel in Bamberg geben. Auch läßt die Holzwaarenfabrik von Frühauf in Schleusingen Ihnen dieselben vielleicht herstellen.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Stettin.

Sitzung vom 11. November. Herr Dr. Winkelmann spricht in einem längeren Vortrage über den Wanderzug der heimischen Vögel.*) Die in der vorigen Sitzung eingegangenen Fragen, den Instinkt der Brieftauben betreffend, werden dahin beantwortet, daß nicht dieser, sondern ein bewundernswürdiger Orientirungssinn (der jedoch nicht in der ganzen Rasse liegt, sondern als eine Befähigung jedes einzelnen Vogels zu betrachten ist) und eine geregelte Dressur diese Tauben zur Auffindung des Heimweges befähigen. Die Taube wird unbedingt durch ihr Auge und die sich diesem darbietenden Gegenstände geleitet, und je nachdem sie befähigt ist, sich diese zum Zurechtfinden zu merken, ist sie eine gute oder schlechte Reisetaube. Um den Orientirungssinn auszubilden, ihrem Gedächtnisse zu Hülfe zu kommen, um sie mit dem Wege und der Richtung vertraut zu machen, findet die Abrichtung statt. Daß die Brieftauben nur nach Süden dressirt werden können, ist ein Vorurtheil. Möglich, daß dieser Aberglaube auch mit dem Glaubenswahne vom unerklärlichen Instinkte bei den Zugvögeln zusammenhängt. Es bleibt sich vollständig gleich, von welcher Richtung her die Tauben ausgesandt werden, gute Brieftauben kommen unter allen Umständen aus jeder Richtung zurück. Vortheilhaft ist es aus verschiedenen Ursachen, nur männliche Tauben reisen zu lassen, obgleich ein Pärchen, zu gleicher Zeit aufgelassen, ebenfalls die Heimat erreicht. Die beste Reisezeit sind die Monate Mai bis September. Daß die zärtliche Zuneigung eines Paares mit ein Hauptgrund zur Rückkehr bildet, ist zweifellos, da, wie bei den Schwalben, so auch bei den Tauben der an den häuslichen Heerd fesselnde Sinn so bewunderungswürdig entwickelt ist. Die natürliche Gemeinsamkeit der Pärchen ist die wesentliche Grundlage und durchaus unerläßliche Bedingung zur Erziehung von Brieftauben. — Herr R. Schöpperle hatte der Versammlung 1 Stamm Italiener-Hühner mit dem Wunsche geschenkt, den dafür aus der Verloosung erzielten Betrag der Vereinskasse zu überweisen, was nach Wunsch geschieht. Ebenso gelangt ein Paar dem Verein gehörige Pariser Kanarien unter den anwesenden Mitgliedern zur Verloosung. — Die eingegangene Frage: „Können Weichfresser, namentlich die Drosselarten mit Hanfsamen gefüttert werden?" wird von verschiedenen Seiten bejaht, und Beispiele wo und von wem dies geschehen, werden angeführt.

Ausstellungen.

In der letzten Sitzung des **Vereins „Cypria"** in Berlin wurde der Beschluß gefaßt, im Beginn des nächsten Jahres eine möglichst großartige Ausstellung zu veranstalten. Als die größte Schwierigkeit bei den Berliner Ausstellungen hat sich bisher immer die Beschaffung eines geeigneten Lokals gezeigt. Diesmal ist solchem Uebelstand aber gründlich abgeholfen, denn die damit betraute Kommission hat die großen, eleganten Räumlichkeiten in der Kaisergallerie gemiethet. Indem wir dies vorläufig veröffentlichen, haben wir die Absicht, alle Geflügel- und Stubenvögelliebhaber und Züchter in ganz Deutschland zur Theilnahme an dieser Ausstellung anzuregen, damit hier, wenn irgend möglich, einmal eine so großartige Ausstellung in's Leben gerufen werde, als sie dem jetzigen Aufschwunge des deutschen Vaterlandes nach jeder Richtung hin entspricht. Zur Eröffnung der Ausstellung ist der 5. Februar (Freitag) gewählt und alles Nähere wird demnächst bekannt gemacht.

*) Da wir hoffen, den Vortrag unsern Lesern zugänglich machen zu können, so kürzen wir diesen Bericht soweit, als er denselben behandelt. D. R.

Bücher- und Schriftenschau.

„Blätter für Kaninchenzucht".

Wol selten ist ein Blatt in's Leben gerufen, welches sich vom ersten Anfang seines Erscheinens an einer so allgemeinen und regen Theilnahme erfreut hat, als die seit dem 1. Januar d. J. vom Kammer-Assessor Rasch, Sekretair des Land- und Forstw. Provinzial-Vereins für das Fürstenthum Hildesheim herausgegebenen „Blätter für Kaninchenzucht", Verlag der Gerstenberg'schen Buchhandlung in Hildesheim. Dies zeigt nicht bloß die große, täglich wachsende Zahl der Abonnenten, die weit über die Grenzen des deutschen Reichs hinausreicht, sondern es wird auch besonders bekundet durch das lebhafte Interesse, welches die hervorragendsten Männer der Wissenschaft und Praxis auf diesem Gebiete, wie Professor Dr. Zürn in Leipzig, Forstjunker v. Hirschfeld in Bückeburg, Dirigent der Züchtereien des Prinzen Hermann von Schaumburg-Lippe, Universitäts-Gärtner Hochstetter in Tübingen und viele Andere, dem Unternehmen geschenkt haben, indem sie durch lehrreiche Beiträge fördernd gewirkt haben. Dadurch ist das Blatt in den Stand gesetzt, fortwährend belehrend und anregend für einen Erwerbszweig zu wirken, dessen Wichtigkeit noch immer nicht so allgemein gewürdigt wird, wie er es verdient, obgleich Deutschland nichts im Wege steht, Ergebnisse zu erreichen, wie sie in so glänzender Weise in Frankreich, Belgien und England zu Tage treten. Die bisher erschienenen zahlreichen Schriften, namentlich die des an der Einführung der Kaninchenzucht in Deutschland so hochverdienten Hochstetter, haben ohne Zweifel viel Gutes gestiftet; aber indem sich die Verfasser derselben die Bearbeitung eines Gegenstandes zur Aufgabe stellten, der ganz neu bei uns war und für den es ganz an heimischer und deshalb brauchbarer Literatur fehlte, standen ihnen fast nur ihre eigenen Erfahrungen zur Seite. Dem nun dadurch fühlbar gewordenen Mangel abzuhelfen und demgemäß ergänzend zu wirken, die fortlaufend gemachten Erfahrungen und Beobachtungen in Bezug auf alle Zweige der Zucht zum Gemeingut zu machen, daneben im Handel und Verkehr allen Schwindel und alle Unzuträglichkeiten schonungslos und unpartheiisch aufzudecken und auf deren Abstellung zu wirken, das ist die Aufgabe der „Blätter für Kaninchenzucht", die sie bisher verfolgt haben und die auch künftig ihnen zur Richtschnur dienen wird.

Briefwechsel.

Herrn Apotheker G. Schüler in Rohfelden: Ihren Beitrag mit Dank erhalten und zur demnächstigen Benutzung bereit gelegt. —

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

300 Kanarien-Hähne, Harzer Race, gute Schläger, sind von einigen Selbstzüchtern zu verkaufen.
Das Nähere zu erfragen bei
Wilh. Janken.
[749] Jessen bei Wittenberg.

Ein Graupapagei, welcher gut spricht, ist für 35 Thlr. und ein grüner (Alexander desgl.) für 30 Thlr. zu verkaufen.
Berlin, Gipsstraße 12a, 3 Tr. lks. [750]

Zebrafinken, ein Paar 4 Thlr., zwei Paare 7 Thlr., den ganzen Posten (circa 12 Paar) à 3 Thlr., incl. Verpackung, zu verkaufen oder auch gegen feine Weichfresser und ausländ. Finken umzutauschen.
Emil Kratz
[751] in Glauchau.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen folgende Thiere erhalten: 60 Graupapageien, 24 Dutzend Tigerfinken, 10 Dtzd. schwarzköpfige Nonnen, 15 Dtzd. Mustatvögel, große und kleine, grüne und rothe Edelpapageien, blaustirnige Amazonen, Unglücksheher (Perisoreus infaustus), Königskronenkraniche (Balearica regulorum), schwarze Rebhühner (Caccabis chukar), Feigenvögel (Magalaema asiatica) und an Vierfüßlern namentlich zahlreiche verschiedene Affen. [752]

Zu kaufen gesucht:

Pariser Kanarienhähne und Weibchen, reine Race, junge kräftige und nistfähige Exemplare. Offerten mit Angabe des Preises, Alters, Färbung ꝛc. an **H. Grunow,** Inselstraße 6, Leipzig. [753]

Unterzeichneter versendet unter Garantie Harzer Kanarienvögel zum Preise von 3—8 Thlr. à St. Reelle Bedienung wird zugesichert, da ich seit 32 Jahren das Geschäft betreibe und den Gesang der Vögel zu unterscheiden weiß und auch stets nur gute Vögel halte. Selbst einer der berühmtesten Liebhaber und Züchter hat mir bei seinem Hiersein für das Stück 3⅓ Thlr. geboten, aber keine bekommen, indem ich den Herren Liebhabern meiner Kanarienvögel stets nur die feinsten liefern will.

W. Wiegand,
[754] Naturalist, St. Andreasberg a. H.

Zu verkaufen.

Ueber ein Jahr gehaltene, schöne Alpendohlen, Alpenbrünetten und Schneefinken; wie ächte Holländer Kanarien, oder gegen Graupapageien und Wellensittiche zu vertauschen.

J. Stauffer's Museum in Luzern
[755] (Schweiz).

Abzugeben sind für billigen Preis:
Ein schöner junger weißer Italiener Hahn,
Ein Hahn, 2 Hühner Silberbrabanter, diesjährig,
zu besehen Berlin, Friedrichstraße 104, bei
[756] **C. Barnewitz.**

Russische Haken- und Karmingimpel und Waidenammern und Ameiseneier pro Pfd. 15 Sgr., sind zu haben bei

Brune, Vogelhändler,
[757] Berlin, Gartenstraße 62.

Harzer Roller,

von den besten Stämmen in ausgesuchten Exemplaren, das Stück 4 bis 6 Thlr., im Dutzend bedeutend billiger, empfehle von meiner Züchtung.

Dessau. **A. Zensch,**
[758] Teichgasse Nr. 3.

Abzugeben sind 1 Paar blaue Schwalbentauben für 25 Sgr., weiße Schleiertauben à Paar 25 Sgr., weiße Pfautauben à Paar 1⅓ Thlr. — Mövchen, schwarz und blaue Schilder à Paar 1 Thlr., gelb und silbern Schilder à Paar 1⅓ Thlr., roth und gelb gespitzte und gelbe Elster Tümmler (Hochflieger) à Paar 1½ Thlr., Kanarienweibchen à Stück 10 Sgr., trockene Ameiseneier à Pfd. 20 Sgr. von

August Dietz in Burg bei Magdeburg.

Auch suche ich 1 Paar türkische Enten. [759]

Schwarzplättchen, an das billigste Futter gewöhnt, sehr gute Sänger, à St. 1½ Thlr., verkauft

Friedr. Kieser,
[760] Carlstadt a. M.

Die Großhandlung exot. Vögel und Naturalien ꝛc. von

Karl Gudera,

Leipzig, Markt 3. II., Wien, Kolowratring 9,

empfiehlt alle die in Nr. 42 angeführten Vogelarten noch zu denselben Preisen, manche Arten in Folge größerer Zufuhr sogar ermäßigt. Ebenso alle Vogelfuttersorten, Affen, Reptilien, Nistgegenstände, Käfige, Naturalien ꝛc.

Neu empfangen: Cordonbleus, Helenafasänchen, bengal. Weber, Inseparables und Schönsittiche ꝛc. ꝛc. [761]

Die von Herrn Lehrer **Fr. Wiegand** in Anspach, A.-Ussingen bezogenen feinen Hohlroller haben ein so herrliches fehlerloses Lied, daß sie den Anforderungen eines jeden Kenners entsprechen.

H. Karl Weiglein, Kaufmann,
[762] Zellingen.

Zu verkaufen!

1 Jamaika-Trupial, sehr schön und gesund, guter Sänger, 8 Thlr., 1 Paar Perlhalstäubchen 2½ Thlr., mehrere Paare selbst gezüchtete Wellenpapageien 5½ Thlr. incl. Verpackung.

J. Beyschlag,
[763] Schweinfurt.

Harzer Kanarienvögel

eigner Zucht, mit sehr schöner Lachrolle, hohem langziehenden Triller, wie groben Touren und verschiedenen prachtvollen Hohlflöten ꝛc. variirend, ohne jeden Fehlton, versende unter Garantie lebender Ankunft im Preise von 3½—6 Thlr. à Stück exclusive Emballage. Weibchen derselben Race à Stück 10 Sgr.

G. Detert in Horn,
[764] Lippe-Detmold.

Zu verkaufen

2000 Pfd. sehr schöne alkonische Ameiseneier, pr. 100 Pfd. 50 Thlr. ab Altona, in jeder Quantität. Proben stehen zu Diensten.

C. G. Hattendorff.
[765] Altona, Holstein.

Zu verkaufen:

1. Ein grüner Amazonenpapagei, welcher im Sprechen Seltenes leistet, ganze Sätze spricht, auch singt, zu 65 Thlr.
2. 1 Weibchen, Grauköpfchen, zu 8 Thlr.
3. 1 Paar japanische Mövchen zu 8 Thlr.
4. 1 Paar Reisvögel zu 2½ Thlr.
5. Isabellbunte Kanarienweibchen zu 10 Sgr.

Nr. 2 und 3 haben genistet.

Ferner ein neues Etagenbauer zu 24 Thlr.

Näheres in der Expedition. [766]

Sprechende Papageien jeder Gattung werden zu kaufen gesucht. Offerten erbittet die Großhandlung exot. Vögel von **Karl Gudera, Leipzig,** Markt 3, II. [767]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Großmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 10. December 1874. Nr. 50.

Inhalt:

Ein Beitrag zum Vogelschutz. —
Züchtungs-Einrichtungen. —
Tagebuchnotizen aus der Vogelstube: Brut der Grauköpfchen. —
Unterleibsentzündung der Kanarienvögel. —
Gefiederte Welt im Osten (Fortsetzung.) —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel (das Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" betreffend). —
Anzeigen. —

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Ein Beitrag zum Vogelschutz.

Von Apotheker Schüler in Rohfelden a. d. Nahe.

Der beginnende Winter legt allen Freunden der in der freien Natur lebenden gefiederten Welt aufs Neue die Mahnung ans Herz: „Schützet die Vögel", und ich will in Nachstehendem versuchen, nachzuweisen, wie dieser Schutz nach meinem Dafürhalten am wirksamsten ausgeführt werden kann. Zahlreiche Broschüren und Aufsätze habe ich über diese Angelegenheit wol gelesen, aber wenn ich die Wahrheit sagen soll, stets sehr enttäuscht zur Seite gelegt. Das darin Gesagte bleibt meist bei dem Vorschlag, bei eintretendem Schneefall die Anlegung von Fütterplätzen nicht zu versäumen, um unsere Lieblinge im Freien vor eintretender Hungersnoth zu schützen. Und doch wie wenig ist damit geschehen, im Verhältniß zu Dem, was den Sommer hindurch im Vogelschutz versäumt wird.

Frage ich, wen wollen wir schützen? und wer bedarf des Schutzes am meisten? so sind es am wenigsten die Kunden, welche zumeist von früh bis spät den angelegten Futterplatz belagern und das beste Theil des dort Ausgestreuten für sich erwählen. Denn der frechste der Frechen, Haussperling, durchwühlt emsig mit seinem dicken Schnabel, in seinem aufgebauschten — vom Durchsuchen der vielen Aschen- und Kehricht-Haufen meist grauschwarz gefärbten Kleide so recht ungewaschen aussehend — den Futterungsplatz, damit ihm ja kein guter Bissen entgehe. Daneben kommt in ungeschickten Sprüngen, namentlich in den ersten Tagen mit unverkennbarem Mißtrauen und Vorsicht, die Goldammer um den Rand des Futterplatzes, verstohlen einige Körnchen erhaschend, um sie nach ihrer Erlangung einige Fuß weiter entfernt mit mehr Sicherheitsgefühl zu schälen und in den hungrigen Magen — der allein sie den Menschenwohnungen näher führte — hinabgleiten zu lassen. In ganz ähnlicher Weise, nur mit mehr Grazie, treibt es der Buchfink, welcher seine Ehehälfte, als den schwächeren — zarter organisirten Theil in mildere Gefilde sandte, um das Erbettelte dieses Hungerbrotes bei solcher Kälte nicht theilen zu müssen. Ab und zu kommt auch eine Meise auf ihrer rastlosen Wanderung von Baum zu Baum flüchtig herangeschlüpft, sich von erhöhtem Sitze unter einigen Verbeugungen mit lauter Stimme anmeldend. Herunterfliegen, ein Hanfkörnchen erhaschen und zurück es auf ihrem vorherigen Sitze zwischen den langbenägelten Füßen fassend, mit gewaltigen Schnabel-

hieben die äußere ungenießbare Hülle entfernend, ist das Werk eines Augenblicks. Dieses Kunststück wird wol zwei bis dreimal wiederholt, dann hält es sie jedoch nicht länger, denn ihr unruhiger Sinn treibt sie fort, um mit größter Behendigkeit jede schadhafte Stelle der älteren Bäume nach Insekten-Larven und Eiern abzusuchen, mit kräftigen Schnabelhieben die, erstere deckenden gelockerten Rindenstücke loshauend. So treibt sie ihr Tagewerk von Aufgang der Sonne bis zum Abend und wer will sie zählen die Hunderttausende von schädlichen Insekten, welche durch diese fleißige Vertilgerin unschädlich gemacht werden! Aber der Winter ist lang und die Tage sind gar kurz, und wenn dann die hohlen Baumstellen zu Ende Januar und später zum unzähligstenmal abgesucht sind, die Kälte und das weiße Winterkleid, das die Natur angezogen hat, nicht weichen wollen, dann erlahmen die Kräfte, und dick aufgebauscht dasitzend — den abgemagerten kleinen Körper in den schwachen Sonnenstrahlen zu erwärmen suchend — verhindert sie bald die zunehmende Mattigkeit den wohlgezielten Stößen der kleinen Raubvögel in früherer behender Weise auszuweichen.

Darum ist es Pflicht, gerade die Meisen in der Winterszeit ganz besonders zu verpflegen. Dies geschieht in folgender Weise am zweckmäßigsten. Man streue Hanf- und Mohnsamen dicht vor die Fenster und hänge Fleisch- und Fettabfälle, gleichviel ob roh oder gekocht, besonders Speckschwarten und Knochen, an Fäden in der Nähe eines Fensters auf. Dadurch bietet man zugleich der lieben kleinsten Jugend im Winter (wo das Haus, zu ihrer Betrübniß, der fast ausschließliche Aufenthaltsort sein muß) ein nicht geringes Vergnügen, indem sie die Kletter-Künste der bunten Vögelchen bei dem Absammeln der Fleischreste von den Knochen u. dgl. bewundern können. Daneben bietet dies Verfahren den Vortheil, daß der freche Sperling (der solche Gewandtheit nicht besitzt) diese Bissen nicht für sich beanspruchen kann. Die fetten Samen und Fettabfälle dienen aber zur Ernährung und Erwärmung der kleinen Thierchen zugleich und sind unbedingt das beste Futter für sie, wenngleich die Noth sie auch mit gekochter Kartoffel, Haferkörnern u. dgl. vorlieb nehmen läßt. Dann aber, im Frühling, hänge man möglichst viele Nistkasten aus, an die Bäume und die nach den Gärten zu liegenden Häuserwände. Doch dürfen die runden Fluglöcher an den Nistkästen höchstens $1\frac{1}{2}$ Qu.-Zoll im Durchmesser haben, sonst müssen unsere armen Meisen den ganzen Sommer ihre Brutstätte gegen den Spatz, jenen frechen Eindringling vertheidigen, der gern erntet, wo er Nichts zum Vortheil der Ernte beigetragen hat, und seine Eier einlegt, wo er nicht gebaut hat.

Einrichtungen und Züchtungen des Herrn Fabrikanten L. Nesmirak in Karolinthal bei Prag.

Die klimatischen Verhältnisse hier sind für günstige Züchtungsergebnisse nicht besonders geeignet, denn unser Winter ist so lang, daß mit der Zimmerheizung oft vor dem Mai nicht aufgehört werden kann. Dennoch habe ich mich recht günstiger Züchtungen zu erfreuen.

Ich habe einen Käfig aus Blech und Draht, welcher 4 Fuß (c. $1_{/35}$ M.) lang, 3 Fuß (c. 1 M.) breit, 4 Fuß (c. $1_{/35}$ M.) hoch und sehr geschmackvoll mit Karnissen, Gesimsen u. s. w. ausgestattet ist, in der Form eines hübschen Schweizerhäuschens. Der Kamin bildet das Wasserbehältniß, der blecherne Boden ist in 4 Abtheilungen so eingerichtet, daß jeder Theil für sich selbstständig herausgenommen und gereinigt werden kann; in der Mitte befindet sich ein Springbrunnen, der ebenfalls sehr leicht herauszuheben und so eingerichtet ist, daß ein feiner Wasserstrahl mindestens eine halbe Stunde lang 3 Fuß (c. 1 M.) hoch steigt und als feiner Staubregen in das runde Badebecken herabfällt. Hinter dem Badebecken ist ein Raum für Gewächse, welchen ich den Sommer hindurch sehr oft mit lebenden Topfpflanzen, Reseda, Kamelienstöcken, Epheu u. dgl. ausgestattet hatte, doch vergeblich, denn immer waren in einem Tage alle Blumen bis auf den letzten Stengel verwüstet. Da versuchte ich es mit anderen Gewächsen, ich wählte Nadelhölzer und festere, derbere Topfgesträuche und fand zu meiner Befriedigung, daß die Vögel diese nicht sobald beschädigen konnten, vielmehr in den Sträuchern angenehme Schlupfwinkel und gute Sitzplätze fanden, in denen namentlich die kleinen Astrilde, Goldbrüstchen u. a. sich gern vor den Verfolgungen der größeren Inwohner retteten. Die Gesträuche habe ich nach 8—10 Tagen durch neue ersetzt, die gebrauchten, von Koth verunreinigten im Garten einige Tage sich erholen lassen, um sie dann wieder zu demselben Zweck zu benutzen, und so konnte ich fortwährend lebende grüne Pflanzen im Käfig erhalten, die demselben ein schönes Aussehen geben und den Vögeln recht willkommene Tummelplätze bieten.

In diesem Raum leben nun gegen 50 Vögel in guter Gemeinschaft und zwar graue Astrilde, Halsbandfinken, Goldbrüstchen, Helenafasänchen, Schmetterlingsfinken, Amaranten, Orangebäckchen, Diamantvögel, Gürtelgrasfinken, Zebrafinken, Atlasvögel, Paradieswittwen, Papstfinken (Nonparils), Napoleonsvögel, Feuerfinken, Silberfasänchen u. a. Die Auswahl derselben danke ich dem „Handbuch für Vogelliebhaber", und habe schon viele angenehme Stunden durch Beobachtung meiner Lieblinge genossen. Früh und Mittags, wenn der Springbrunnen und das Badebecken gereinigt sind, können die Vögel die Zeit kaum erwarten, wann das Ding eigentlich losgehen wird, und kaum erheben sich die ersten Wasserstrahlen, so beeilen sich fast alle, um ihr Bad zu nehmen. Das

ist ein Plätschern, Tuschen und Pritschen! Und dann geht es ans Putzen, jedes Federchen wird sorgfältig gelegt, durchs Schnäbelchen gezogen und geglättet. Mancher Vogel geht noch 2—3 Mal wieder ins Wasser zurück, Einige lassen sich blos von den Andern beplanschen. Der Käfig ist so gut eingerichtet, daß nur der Raum des Wasserbeckens naß wird, der andere aber stets trocken bleibt.

Nun hing ich etwa 12 Stück überdeckte Nestkörbchen eines neben dem andern derart in dem obersten Raum an den Wänden auf, daß ich selbe recht gut beobachten konnte, versah sie mit hinlänglichen Miststoffen, bestehend aus feinem Heu, kleinen Wurzeln, Baumwolle, Schafwollfäden, Seidenpapierstreifen, Aloefasern u. dgl. und sah mit Vergnügen, wie die Meisten sich emsig daran machten, dasselbe in die Nester zu tragen; am fleißigsten waren jedoch die Zebra- und Halsbandfinken und binnen Kurzem hatte ich das Vergnügen, die beiden genannten Vögelarten brüten zu sehen. Leider verscheuchte ich das Zebrafinkenpaar nach etwa 10tägigem Brüten durch unüberlegtes Anbringen von Strauchwerk um ihr Nest; sie verließen dasselbe sofort, ohne sich mehr darum zu bekümmern und bauten sich in einem andern Körbchen nach ihrer Art recht lüderlich ein anderes, wo sie ungestört richtig nach 14 Tagen vier lebende Junge erbrüteten. Die Halsbandfinken brachten sogar 6 Junge glücklich zur Welt, jedoch hat das Männchen 2 Junge aus dem Neste geworfen, die auch zu Grunde gingen. Ich gab ihnen, da es bereits Ende November war, gekochte fein geriebene Eidotter, aufgequellte kleine Ameiseneier, aufquellte Sämereien und sah, daß sie damit die Jungen fütterten und diese herrlich gediehen, so daß sie in etwa 10—12 Tagen flügge wurden.

(Schluß folgt.)

Tagebuchnotizen aus der Vogelstube des Herrn Graf Yorck von Wartenburg auf Schleibitz.

(Fortsetzung.)

November.

Als im vorigen Jahre um diese Zeit meine Grauköpfchen dadurch, daß sie gestört worden, die Brut zu Grunde gehen gelassen, begannen diese kleinen niedlichen Papageien erst nach langer Zögerung wieder damit, daß sie alle Nistkästen besuchten. Da hieß es nun, Weiteres geduldig abzuwarten. Dies Abwarten nun hat sich aber belohnt. Ich bemerkte etwa um den 11. oder 12. September, daß sie sich paarten, und daß nun ein Nistkasten festgehalten wurde. Am 14. September erschien das Weibchen nicht mehr, und von nun an rechnete ich mit Bestimmtheit auf eine glückliche Brut. Das Männchen sang in dieser Zeit viel in seiner zwitschernden Weise und ging alle Morgen und Abend hin auf die Neststange, rief, bis das Weibchen kam und sich aus dem Kropf füttern ließ und eiligst wieder verschwand. Gegen Ende Oktobers bemerkte ich das Herauskommen des Weibchens öfter am Tage und daß das Männchen Ei und weiches Futter aufsuchte und von seinem scheuen Wesen bedeutend abließ. Ich paßte nun genau auf, konnte aber durchaus keinen Ton der Jungen vernehmen, und da das Weibchen immer noch nicht sich entschloß, selbst zum Fressen zu kommen, hatte ich doch die Besorgniß, es möchte eine Fehlbrut sein. Nun erschien in der gefiederten Welt die Mittheilung des Herrn Grafen Roedern, daß seine Grauköpfchen vier Fehlbruten gethan, und das bestärkte mich in meinem Vorsatz, einmal vorsichtig nachzusehen. Zu meiner Freude bemerkte ich am 3. November zahlreiche Junge in verschiedener Entwickelung, aber noch sehr klein. Später habe ich nun vor etwa 8—10 Tagen noch einmal vorsichtig nachgesehen und zählte da 5 oder 6 Köpfe; bestimmter konnte ich nicht sehen. Es waren aber prächtige Junge, und mir schien es, als ob die kleinen Männchen schon graue Köpfchen hatten, da ich aber ängstlich war, um nicht zu stören, konnte ich dies nicht genau feststellen. Gestern nun ist das erste Junge, sehr schön ausgefiedert und groß, ausgeflogen, es sieht ganz aus, wie das alte Weibchen, mir schimmert mitunter das Köpfchen etwas grau, doch weiß ich dies nicht genau zu sagen, weil ich dem kleinen Dinge, das sehr ängstlich ist, nicht sehr nahe kommen kann. Ich hoffe nun täglich, daß wieder ein anderes kleines Junges ausfliegen wird. Die Eltern sind ungemein besorgt. Die ganze Zeit hat das Weibchen nicht allein gefressen, sondern alles Futter der Jungen ist durch des Männchens Kropf in den des Weibchens gegangen und so in den der Jungen, ebenso hat das Männchen auch das Weibchen versorgt. Erst jetzt macht das Männchen Anstalt, das ausgeflogene Junge direkt zu füttern. Ein einziges Mal, wie ich annehme, gleich nach dem Auskriechen der Jungen, habe ich das Männchen in den Brutkasten hineinkriechen gesehen, sonst niemals. Ob diese Papageien, so wie im vorigen Jahre, wieder ein eingetragenes Nest haben oder nicht, habe ich, um nicht zu stören, noch nicht sehen können, werde es aber feststellen, sobald die Jungen sämmtlich heraus sind.*)

(Forts. folgt).

Ueber Unterleibsentzündung der Kanarienvögel.

Die Anfrage des Herrn F. Zivsa in Troppau veranlaßt mich zu folgenden Bemerkungen:

Die fraglichen Kanarienvögel sind auch nach meiner Ueberzeugung an Unterleibsentzündung zu Grunde gegangen; darauf deuten die mitgetheilten Krankheitserscheinungen, namentlich die krankhaften Entleerungen und der Heißhunger der Vögel hin. Ganz dieselben Krankheitserscheinungen habe ich kürzlich an einigen meiner Vögel beobachtet; einige sind mir davon eingegangen, andere wurden, nachdem sie in

*) Wir bitten die Darstellung: „Ueber das Nisten der Zwergpapageien" in Nr. 9—17 d. J. zu vergleichen. D. R.

die Nähe des Ofens gebracht waren und gegen den eingetretenen Durchfall mehrere Tage lang Mohn erhalten hatten, wieder gesund; diese mußten aber, damit kein Rückfall eintrete, noch wochenlang besonders warm gehalten werden.

Die Krankheit ähnelt in ihrem raschen Verlauf der Lungenentzündung; sie endet auch fast immer, wie diese, mit dem Tode des Vogels, wenn ihr nicht zeitig vorgebeugt wird; sie unterscheidet sich aber von derselben insofern, als die Lungenentzündung durchweg nicht von Durchfall und Freßlust des Patienten begleitet ist. Vögel, die an jener Krankheit leiden, fressen von Anbeginn derselben fast gar nicht.

Meines Erachtens hat die Ursache der Erkrankung in dem öfteren Darreichen kalten Trinkwassers gelegen; es mußte dies um so gefährlicher sein, als das letztere nicht aus Quellwasser, sondern aus Flußwasser bestand, welches sehr wahrscheinlich an sich schon etwas abführte. Je öfter die Vögel gefüttert werden, desto mehr füllen sie ihren Magen, und diejenigen unter ihnen, die nicht ganz gut verdauen, suchen das Gefühl des Hungers, welches sich dann bei ihnen einstellt, durch übermäßiges Fressen zu stillen. Das ist schon schlimm genug, es kommt aber noch hinzu, daß die Vögel nach jeder Mahlzeit häufig trinken, und sie thun es um so lieber, je öfter ihnen frisches Wasser gereicht wird; denn dieses lieben sie sehr. Gerade die geringere Pflege der Weibchen im Fragefalle war die Ursache, daß diese gesund blieben; sie fraßen und tranken weniger und das Wasser war auch, weil es nicht so oft erneuert wurde, nicht so kalt. Ich erinnere mich noch eines Weibchens, das ich vor mehreren Jahren im Einzelkäfig hielt. Es wurde wöchentlich nur zweimal frisch gefüttert und etwa drei- bis viermal getränkt; es sang dabei fast unausgesetzt und war, wie eine vorgenommene Besichtigung ergab, weder zu fett noch zu mager.

Ein öfteres Erneuern des Trinkwassers im Laufe des Tages ist meines Erachtens bei Vögeln, die in Einzelkäfigen sich befinden, durchaus nicht nöthig, auch soviel ich weiß, nicht gebräuchlich; man wird es ohne Bedenken unterlassen können, und ich möchte hierzu umsomehr rathen, als bekanntlich der häufige Genuß kalten Wassers in gewissen Städten nicht ohne nachtheiligen Einfluß selbst auf die menschlichen Verdauungsorgane ist.

Die Unterleibsentzündung ist, *wenn sie rechtzeitig erkannt wird, an älteren Vögeln* leicht zu heilen; davon hat mich namentlich ein Fall, der sich in diesen Tagen bei mir ereignete, belehrt; ich erlaube mir, ihn hier mitzutheilen. Vor einigen Tagen erkrankte bei mir ein Vogel, der im Harzer Bauerchen saß und sich erkältet haben konnte, plötzlich derart, daß ich seinetwegen in großer Besorgniß war. Er blähte sich sehr stark auf und seine Entleerungen hatten eine außergewöhnliche Größe und eine ungesunde grünliche Farbe; dabei das eigenthümliche Wippen des Schwanzes und eine starke Freßlust, ganz wie es in der oben erwähnten Anfrage geschildert ist; zum Durchfall war es noch nicht gekommen. Ich steckte den Vogel in einen gewöhnlichen Drahtkäfig, stellte diesen auf kurze Zeit auf den warmen Ofen und hing ihn dann, ganz in die Nähe desselben, oben unter der Decke auf. Am Abend dieses Tages saß der Patient zum runden Ball zusammengekauert in der Ecke seines Käfigs; er athmete schwer und wenn ihm nicht in irgend einer Weise Hilfe gebracht wurde, so war er verloren. Was war aber zu thun? Zunächst nahm ich ihn in die Hand, um ihn zu untersuchen; sehr mager war er noch nicht, aber es fiel mir besonders auf, daß Flügel und Beine des Vogels sich ungewöhnlich kalt anfühlten. Damit war denn das Mittel zu seiner Heilung gefunden. „Wir müssen den armen Kerl in Watte einwickeln, damit ein normaler Blutumlauf hergestellt werde; alles Blut hat sich zu seinem kranken Unterleibe gezogen; jedenfalls darf der Vogel heute Nacht nicht von der Kälte leiden.“ Der Kranke wurde also vorsichtig eingewickelt, damit er nicht etwa ersticke, und mit seiner Umhüllung auf den Boden des Käfigs gelegt, wobei nur darauf zu achten war, daß er mit dem Rücken nach oben zu liegen kam. Am andern Morgen saß der Vogel auf seiner Sitzstange, immer noch leidend, aber doch nicht mehr, wie im Anfange seiner Krankheit. Er hatte Tags vorher zu seinem gewöhnlichen, aus reinem Rübsen bestehenden Futter einige Körner des leicht verdaulichen Hafers und, damit er davon nicht etwa Durchfall bekomme, auch zwei Prisen Mohn erhalten. Dasselbe Futter wurde ihm nun wieder gereicht; das Trinkwasser wurde vorher etwas weniger erwärmt. Am Abend desselben Tages wurde der immer noch leidende Vogel wiederum eingewickelt; dieses Mal hielt er es nicht lange in seinem wattirten Rocke aus; das Verfahren mußte zum zweiten Male wiederholt werden, und damit der Patient sich ruhig verhalte, so wurde die Stube mit Licht nicht weiter betreten.

Am folgenden Morgen saß der Vogel wieder auf seiner Stange, dieses Mal aber ersichtlich gesunder; im Laufe des Tages machte er denn auch einige Versuche zum Singen. Am dritten Abend schien das Einwickeln nicht mehr nöthig zu sein; der Kranke wurde nur in ein anderes wärmeres Zimmer gebracht, wo er Nachts über hoch am warmen Kamin hängen blieb. Heute, am vierten Abend, hängt er an derselben Stelle; er hat im Laufe des Tages wieder fleißiger gesungen und ist in seinem Aeußern nicht mehr von einem gesunden Vogel zu unterscheiden. Ich werde den Vogel noch auf die eben beschriebene Weise füttern, bis seine Leistungen im Gesange und seine — Exkremente wieder völlig normal sind, ihn dabei sorglich vor jeder neuen Erkältung schützen.

Gegen Durchfall, wie er bei solchen kranken Vögeln in der Regel sich zeigt, ist Mohn ein vortreffliches Mittel; ich habe ihn in diesem Herbst

öfters und fast immer mit Erfolg angewandt. Wärme ist dabei aber unabweisbares Bedürfniß und deswegen schaden auch kalte Nächte hier viel; es läßt sich dieser schädlichen Einwirkung am besten steuern, wenn man seine kranken Pfleglinge einwickelt.

W. Böcker.

Gefiederte Welt im Osten.

Palmyra.

(Fortsetzung.)

Freilich gerade kein ausgezeichneter Sänger und meistens auch etwas früher eintreffend, darf ich der muntern Bachstelze hier doch nicht vergessen. Zutraulich sich zwischen den Hütten der Dörfer umhertreibend, fortwährend mit dem Köpfchen nickend und mit dem langen Schwanze wippend, ist sie ein auch von den hiesigen, sehr einfachen Bauern, gern gesehenes Vögelchen. Bei der Wahl des Nistplatzes kommt es der Stelze nicht darauf an, ob er in der direkten Nähe des Menschen, oder entfernt am einsamen Ufergebüsche liegt, ja manchmal fällt ihre Wahl auf ganz besondere Plätze, wie Folgendes zeigen mag. Vor einigen Jahren bemerkte ich tagtäglich ein Pärchen in der Nähe der Treibbete, das, wie es schien, auch nicht weit davon bauen wollte. Eines Morgens benachrichtigte mich ein Arbeiter, daß in einem Gurkenkasten, — in dem schon stark blühende Pflanzen waren — eine Stelze eingeschlossen wäre, wovon ich mich selbst überzeugte und durch Aufheben eines Fensters dem Thierchen die Freiheit gab. Mehrere Tage wiederholte sich dieselbe Geschichte, die Stelze fuhr nach Abnahme der Decken ganz toll an den Fenstern herum, und ich konnte mir dieses nicht anders erklären, als daß die Stelze auf der Jagd nach Kerfen so eifrig sein mußte, um das Zumachen der Lüftung zu übersehen, wodurch sie dann eingeschlossen wurde. Ungefähr zwei Wochen später ging ich, behufs der Abnahme der ersten Früchte, die Gurkenpflanzen genau durch; aber welche Ueberraschung wurde mir zu Theil, als ich aufs Beste, zwischen den Blättern versteckt, die Stelze brütend auf einem Neste mit 4 Eiern fand! Ich traf hierauf gleich Vorsorge, daß die Stelze Tag und Nacht durch ein seitliches Loch Ein- und Ausgang bekam. Leider that ich damit nichts Gutes; denn nachdem die Jungen kaum einige Tage aus den Eiern waren, kroch durch die gemachte Oeffnung ein Wiesel, dem zu meinem Leidwesen Mutter und Kinder zur Beute fielen. Manchmal muß die Bachstelze ihre eigene Brut zu Grunde gehen lassen, da ihr der Kukuk die Ehre anthut, sie als Ziehmutter seiner Sprößlinge zu erwählen, welche Gnade bekanntlich den Grasmücken, wie allen anderen Weichfressern zu Theil wird.

Von den Grasmücken kommt die Gartengrasmücke am verbreitetsten und dann auch das Müllerchen hier überall vor; der Schwarzkopf schon nicht so häufig, doch in jedem Garten findet sich ein brütendes Pärchen, wie auch in passenden Lagen die Sperbergrasmücke nistet.

Diese guten Sänger tragen ungemein viel zur Belebung unserer Gärten bei. Immer munter durch das dichteste Gebüsch streichend, und gleich darauf sich auf einem hervorstehenden Baume zeigend, um von dort aus ihren herrlichen Gesang vorzutragen. Ihre Niststellen befinden sich nicht, wie bei manch' anderen Vogelarten, immer nur an bestimmten Räumlichkeiten; bald im dichtesten Gebüsche, bald am Rande einer Gehölzgruppe, ist das etwas nachlässig gebaute Nest zwischen einer schwachen Zweiggabel, kaum durch einige Blätter dem Blicke verborgen, eingehängt. Auf den Eiern bleibt das Weibchen vor dem Nahenden ruhig bis zur äußersten Noth sitzen; hingegen zur Zeit der Jungen erheben beide Alten gegen den Störer ein mächtiges Gezerre und Geschak, und wenden alle List an, um ihn irre zu machen. Zwischen Beerensträucher, besonders der Stachelbeere, bauen sie hauptsächlich gern; ich finde jedes Jahr im hiesigen Garten in einer großen Anlage dieser Sträucher einige Nester. Ebenso wie in manchen Gegenden Deutschlands, werden auch hier diese Sträucher von der argen Plage der Stachelbeerraupe heimgesucht, und meine Hoffnung, daß die darin wohnenden Grasmücken und verwandten Vögel im Vertilgen dieses Ungeziefers behilflich sein würden, bewahrheitete sich schlecht; denn ohne mein Dazuthun würden die Sträucher bald kahl dastehen. Diese Vogelfamilie ist zwar allgemein bekannt als tüchtige Insektenvertilger, und die Stachelbeerraupe ist ein für alle Weichfresser nicht zu verachtender Bissen, dennoch ließen sie die Grasmücken bereits unberührt. Vielleicht ist es zur Aetzung der Jungen doch nicht die geeignete Kost, blos Blattläuse u. dgl. zartere Geschöpfe sind dazu brauchbar. Den Süßkirschen, Himbeeren, wie dem sonstigen Beerenobst sind sie gar nicht abhold, und verstehen es vortrefflich, immer die schönsten anzupicken und abzulesen. Ende Septembers sieht man nur noch hin und wieder einen von diesen Vögeln als Nachzügler durch die Gebüsche schlüpfen, blos seinen Lockton hören lassend, denn der Gesang ist schon längst verstummt. Der Hauptschwarm ist meist Anfang Septembers durch- und mitgezogen.

Neben diesen guten Sängern beehrt uns in reichlichster Zahl der Hauptgesangskünstler, der Sprosser. In allen Gebüschen läßt sich dieser herrliche Sänger, oder wenn man will Schläger hören, und immer glaubt man bei jedem Schlag einen vollkommenen Meister vor sich zu haben, so daß man vor Entzücken nicht satt werden kann, nach allen Ecken und Enden hinzulauschen. Besonders erhebenden Genuß hat man an warmen, mondhellen Abenden, wenn die Vorträge bis Mitternacht dauern, und mit dem jungen Tag auf's Neue beginnen. Leider ist der Genuß des Lauschens auch hier nur von beschränkter Zeit; Ende Juli ist selten mehr ein Vogel zu hören, allenfalls ein Junger, der das

Gehörte einzustudiren sucht, und Ende August ist kein Sprosser mehr zu sehen.

Mit dem Fange derselben beschäftigt sich hier Niemand; denn im Süden ist die Liebhaberei für Stubenvögel sehr schwach, gerade das Gegentheil von Nordrußland. Höchstens daß man einen weniger anspruchsvollen Kanarienvogel eingebauert antrifft; an einem mehr Aufmerksamkeit bedürfenden Weichfresser ist nicht zu denken. Die Sprosser müßten sich also hier — da die Jungen im anderen Jahre wieder nach ihrem Geburtsorte zurückkehren sollen — doch recht sehr vermehren; allein durch verschiedene Mißstände gehen so manche Bruten zu Grunde, und obwol der Sprosser im Verhältniß zu den anderen kleineren Sängern allerdings die vorherrschend größere Zahl bildet, so ist er dennoch in außerordentlich reicher Anzahl nicht vorhanden.

Die Bastardnachtigall, wie der Fitislaubsänger werden hier nur selten in einzelnen Pärchen getroffen, so auch das schöne Blaukehlchen, welches sich nur selten einmal in die Gärten verirrt, hingegen in den Buschwaldungen des Dnieprs häufiger zu finden ist.

Gartenrothschwänze kann man sicherlich ein oder mehrere Pärchen in den Gärten als Brutvögel finden. Den Alten macht die Versorgung der Jungen viel zu schaffen, da diese meist zu früh, lange ehe sie flügge sind, bei der geringsten Störung, aus dem gewöhnlich in Baumhöhlen befindlichen Neste hüpfen, worauf sie dann so laut und lebhaft locken, daß man glauben möchte, der ganze Garten wimmele von Rothschwänzen.

Einige Arten Rohrsänger finden sich ebenfalls in den bei den Dörfern gelegenen Teichen und Sümpfen ein, so als der Bekannteste der große Drosselrohrsänger und der kleine Teichrohrsänger, hier Rohrspatz genannt. Die beiden Arten sind so häufig, daß in jedem beschilften Wasser unaufhörlich, das zuletzt recht unangenehm klingende Geknarr, Gezerr und Gekreisch zu hören ist. Sie selber sind aber nur sehr selten zu erblicken. Mit diesem Gesang fangen sie vor Sonnenaufgang an, machen kaum während der glühenden Mittagshitze Pause und endigen erst in später Nacht, so daß man die Ufer zuletzt wegen des ewigen eintönigen Einerlei flieht.

Wenn die Rohrsänger an diesen Stellen das Ohr beleidigen, so wird das Auge hingegen durch den der zwar nicht überall reichlich vorhandenen, prachtvoll gefiederten Bienenfresser entzückt. In unserer nächsten Nähe zeigt er sich nur einzeln, hingegen entdeckte ich bei einer Entenjagd, einige Meilen von hier eine ganze Kolonie, da, wie es schien, ihnen die dortige Oertlichkeit besonders gefiel. Solche besteht in einem über eine über Stunde langen, schmalen Sumpfe, der auf einer Seite von einer schroff aufsteigenden, ziemlich hohen Lehmwand begrenzt ist. In dieser Gegend treiben sie sich in größeren Flügen, schwalbenähnlich nach Nahrung fahndend, über dem Sumpf herum. Seine Eier soll er, wie mir gesagt wurde, in Höhlungen der Lehmwand legen. Ich werde künftiges Jahr ein Paar Junge aufzuziehen versuchen, was mir hoffentlich auch gelingen wird, besonders da ich jetzt über reicheren und passenderen Futtervorrath verfügen kann, indem ich von Herrn Wenisch in Breslau durch Zusendung von Ameisenpuppen und Mehlwürmern aufs vortrefflichste bedient werde. Dieser Vogel wäre eine prachtvolle Erwerbung für die Vogelstube.

Ein weiterer sehr schön gefiederter Vogel, der in den Gärten in vielen Paaren brütet, ist der Pirol. Munter von Baum zu Baum fliegend, wiegt sich das Männchen besonders gern auf den äußeren Zweigspitzen recht malerisch im Sonnenglanze gleichsam um sein prachtvoll goldoranges Gefieder bewundern zu lassen, von dem der tiefschwarze Schwanz und Flügel herrlich abstechen, dabei sein angenehm klingendes: Bist du auch hier, rufend.

Zänkisch, neidisch ist dieser Vogel zwar im höchsten Grade. Kommt ein Anderer wenn auch größerer Vogel in die Nähe seines Nistplatzes, so fährt er mit der größten Wuth auf ihn los, als ob er ihn durchbohren wollte, daß auch der Stärkere im ersten Augenblicke sich einschüchtern läßt und die Flucht ergreift, wobei er dann krächzend vom Pirol noch ein Stück verfolgt wird. Er ist ein ausgezeichneter Baumeister. Sein Nest webt er an den äußern Zweigspitzen zwischen eine Gabel, wozu er vorzugsweise gerne Papierstreifen verwendet, sehr kunstreich ein; meist wählt er hierzu Eichen, Ulmen oder auch Weidenbäume, und bringt es bald in den obern Zweigpartien, manchmal auch blos in Mannshöhe an, doch immer im Laubwerk so geschickt versteckt, daß es nicht leicht ins Auge fällt. Seine 4 bis 5 Jungen werden mit Kerfen, besonders gern mit kleinen Heuschrecken aufgefüttert, wie er, überhaupt so lange nicht Beerenobst vorhanden, sich von Kerbthieren und deren Larven nährt; während er später durch sein unverschämtes Naschen, dort, wo er zahlreich ist, recht lästig wird. Die Jungen gleichen in der Färbung dem alten Weibchen, doch sind sie noch fahler gefärbt, in einem Gemisch von gelb, grün und grau. Aus dem Neste genommen lernen, sie schnell allein fressen. Mehrmals zog ich ein Gehege auf, hatte aber immer besonders Pech damit, indem die jungen Vögel mir im August — da ich das Flügelschneiden nicht liebe — davon flogen. Man traut ihnen viel zu viel zu, denn sie sitzen so dummgutmüthig auf ihren Stäben, rühren sich blos von der Stelle, um zum Futternapfe zu gelangen, wo sie im Leeren desselben ihre Hauptstärke beweisen, die sie folglich auch in ihrer überreichlichen Entleerung bekunden, und dabei an sich selbst im höchsten Grade unreinlich sind, so daß man genug Arbeit hat, ihnen das Gefieder rein zu erhalten. Ueberhaupt von geistiger Begabung bemerkte ich bei den Jungen sehr wenig; vielleicht kommt solche erst später mit Anlegung des schönen Kleides. Denn die Alten zeigen sich doch keineswegs als dumme Vögel. Sind die

Jungen flügge, so vereinigen sie sich zu Gesellschaften von 2—3 Familien, und verschwinden Ende August ganz. (Fortsetzung folgt.)

Bücher- und Schriftenschau.

Auch in diesem Jahre hat auf unserm Redaktionstisch eine bedeutende Anzahl von neuen literarischen Gaben sich eingefunden, welche der Empfehlung an unsere Leser harren. Wennschon wir uns sagen müssen, daß wol mancher begeisterte Liebhaber der Vogelwelt den Raum bedauern wird, welchen wir durch Bücherbesprechungen dem eigentlichen Inhalt des Blattes entziehen, so werden doch hoffentlich auch nicht wenige andere es uns Dank wissen, daß wir sie auf eine Anzahl guter neuer Schriften empfehlend hinweisen. Und die ersteren mögen dem Schriftsteller und Kritiker diese — meinetwegen Ausschreitung — zugute halten. Natürlich beginnen wir mit den Schriften, welche vorzugsweise unsere Leser interessiren, für deren Besprechung wir also keiner Entschuldigung bedürfen.

Ueber künstliche Brut von Hühnern und anderem Geflügel. Nach dem Englischen des W. J. Cantelo, im Auszug übersetzt von Robert Oettel. (Weimar, 1874. B. F. Voigt).

Der Altmeister jener nützlichen Kunde, welche man, eben nach seiner Erfindung, scherzhafter Weise Hühnerologie nennt, bietet hier ein Büchlein, welches manchen Lesern wol außerordentlich willkommen sein wird. Mindestens dürfen wir dies nach den zahllosen bei uns eingehenden Anfragen schließen. Freilich sagt Freund Oettel selber mehrmals, daß keine Bestrebung auf dem Gesammtgebiete der Liebhaberei und Zucht mit so vielen Schwierigkeiten und so großer Unsicherheit verbunden sei, als die künstliche Brut und Aufzucht des Geflügels — allein in jedem Falle ist gerade diese Kundgebung am meisten dazu geeignet, ein rechtes Licht auf diese Bestrebungen zu werfen und vor allem sie in der wirksamsten Weise zu fördern, und von diesem Gesichtspunkte aus insbesondere sei das Buch dringend empfohlen.

Praktische Anleitung zur künstlichen Ausbrütung der Eier aller Arten des Geflügels. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Von J. H. Krantz. (Berlin, 1874. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung).

Die hier bereits häufig empfehlend erwähnte und angezogene Schrift wollen wir auch bei dieser Gelegenheit nicht unerwähnt lassen, denn sie ist wol dazu geeignet, in zahlreichen Fällen erwünschte Auskunft zu geben.

C. E. Diezel's **Niederjagd.** Vierte vermehrte und verbesserte Auflage. (Berlin, Wiegandt, Hempel u. Parey).

Das bereits öfter von uns erwähnte Werk ist jetzt mit der 10. bis 12. Lieferung zum Abschluß gediehen und wir dürfen es zunächst mit voller Ueberzeugung aussprechen, daß es bis zur Vollendung redlich gehalten, was es im Beginn versprochen. Jedenfalls wird dies Buch ebenso wie uns allen Jägern und Jagdliebhabern als ein unentbehrlicher Rathgeber erscheinen. Noch sei darauf hingewiesen, daß die letzte Lieferung ein herrliches Porträt des alten biedern Waidmannes bringt. Gelegentlich kommen wir auf die uns hier zunächst berührenden Darstellungen der Jagd des Geflügels und der Raubvögel zurück.

Naturgeschichte aller Zimmer-, Haus- und Jagdvögel. (Stuttgart, Julius Hoffmann).

Das vortreffliche Werk ist bereits bis zur 5. Lieferung erschienen und indem wir diese wiederum anzeigen, weisen wir nur kurz darauf hin, daß dasselbe ganz in derselben von uns schon mehrfach rühmend hervorgehobenen Weise fortgeführt wird. Eine eingehende Besprechung werden wir selbstverständlich nach der Vollendung bringen.

Die Tropenwelt. Skizzen aus dem Natur- und Menschenleben in den heißen Gegenden der Erde. Von Dr. Georg Hartwig. Zweite vermehrte Auflage. (Wiesbaden, M. Bischkopff).

Der Verfasser ist durch eine lange Reihe von trefflichen Naturschilderungen bekannt und geschätzt. Eine gewandte, lebensvolle Darstellung, neben tüchtigen Kenntnissen befähigen ihn dazu, Bücher zu schaffen, welche ebensowol für die Anregung, als auch für die Belehrung einen bleibenden Werth haben. Dies Urtheil bewahrheitet sich von vornherein durch den Erfolg der neuen Auflagen. Unter den Werken Dr. Hartwigs dürfte aber das vorliegende nicht allein um des Gegenstandes willen das größte Interesse gewinnen, sondern auch, namentlich in dieser Auflage, durch die vortreffliche, ebenso naturwahre als künstlerisch schöne Bilderausstattung hoch obenan stehen. Sobald der zweite Halbband uns zugeht, werden wir diese vorläufige Besprechung zu einer eingehenden Beurtheilung ausdehnen. Es sei nur noch bemerkt, daß 16 Tafeln in Schwarz- und Buntdruck, nebst vielen kleineren Abbildungen das Buch zieren. Die Bilder sind ausgeführt nach den Zeichnungen hervorragender Künstler, Professor R. Hartmann, Robert Kretschmer, G. Mützel u. A.

Achter und neunter Jahres-Bericht des Thierschutz-Vereins zu Neubrandenburg, herausgegeben von W. Janell. (Neubrandenburg, B. Ahrendt).

Es gereicht uns immer zur Freude, auch auf die Jahresberichte der verwandten Vereine hinzuweisen und insbesondere der Thierschutz-Vereine, deren Interessen wir wol am kräftigsten fördern. Denn die rechte Kenntniß und sachgemäße Pflege des Thieres ist zweifellos der beste und vernünftigste Schutz.

Die Verehrer **Darwin's** seien darauf hingewiesen, daß zwei seiner Werke wieder in neuen Auflagen erschienen sind, und zwar **„Der Ausdruck der Gemüthsbewegungen bei dem Menschen und den Thieren."** Aus dem Englischen übersetzt von J. Victor Carus. Mit 21 Holzschnitten und 7 heliographischen Tafeln. Zweite, sorgfältig durchgesehene Auflage. Stuttgart, E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch). Sodann **„Das Variiren der Thiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation"**, aus derselben Verlagsbuchhandlung und ebenfalls in zweiter Auflage. Gleichviel aber, ob wir Anhänger oder Widersacher des berühmten Forschers sind, immer haben wir — und zwar alle Gebildeten — Ursache, uns der Verbreitung seiner Lehren, d. h. also der neuen Auflagen seiner Bücher, zu freuen. Denn die Werke keines andern Schriftstellers sind für das Eindringen der Naturwissenschaft in alle Kreise so fördernd gewesen, als gerade die Darwin's. Wo gäbe es wol einen Gebildeten, der sie nicht gelesen und aus ihnen erweiterte Anschauungen entnommen hätte!

The Illustrated Book of Poultry by **L. Wright.** (In Deutschland: C. C. Meinhold und Söhne, Dresden). Ein prachtvolles Weihnachtsgeschenk für alle Hühnerliebhaber. 25 Lieferungen in Großquartformat, jede mit zwei bunten Farbentafeln, enthaltend alle Rassen der in England gezüchteten Hühner, sowie auch einige Enten, Gänse, Puten und Perlhühner. Außerdem bietet der Text noch zahlreiche Abbildungen in Holzschnitt, von allerlei Einrichtungen und Werkzeugen. Unsere Leser wollen dies vorläufig nur als eine Empfehlung des Werkes zum Weihnachtsgeschenk ansehen, während wir noch eine eingehende Besprechung, bezüglich Vergleichung mit den betreffenden deutschen Werken demnächst bringen werden.

Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Als Antwort auf die vielen Anfragen, welche namentlich in der letzteren Zeit an die Redaktion und Expedition d. Bl. ergangen, kann ich jetzt endlich bekannt machen, daß die erste Lieferung meines Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel" in der Mitte dieses Monats erscheinen wird, während die übrigen in regelmäßigen, ununterbrochenen Zeiträumen folgen. Die erste Lieferung ist dann durch alle Buchhandlungen oder durch die Verlagsbuchhandlung (Carl Rumpler in Hannover) direkt zu beziehen; ebenso der Prospekt, welcher gratis versandt wird.

Dr. K. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Verkäuflich

hasengraue, reine **Normand. Kaninchen**, 4—5 Monat alt, (Nachzucht von meinen aus dem Elsaß bezogenen Zuchtthieren) auch **1 Paar** von diesen Zuchtthieren, sowie 5—6 M. alte **engl. Scheckten.** [768]

Wernborn, Post Usingen. J. Becker, Lehrer.

Als Liebhaber von Harzer Rollvögeln wandte ich mich vor einiger Zeit an Herrn Lehrer **Wiegand** in Ansbach mit dem Ersuchen, mir einige Hohlroller und Gluckhohlroller zu senden, und sehe mich jetzt, nachdem ich die Vögel gehört habe, veranlaßt, dem Herrn Wiegand öffentlich hiermit meinen Dank auszusprechen, und allen Liebhabern und Kennern die Wiegand'schen Vögel als durchaus fehlerfreie Sänger zu empfehlen.

Lingen, 30. November 1874.

[769] **O. Ohlendorf.**

Ulm. u. Dän. Doggen,

wie auch Leonberger, Bernhardiner, Pudel 2c. züchtet und verkauft billigst **A. Hieronymi**, Braunschweig. [770]

Zu verkaufen

2000 Pfd. sehr schöne alkonische Ameiseneier, pr. 100 Pfd. 50 Thlr. ab Altona, in jeder Quantität. Proben stehen zu Diensten.

C. G. Hattendorff.

[771] Altona, Holstein.

Ein **Paar Goldfasane** (1) (1) werden zu kaufen gesucht von

G. Böhringer.

[772] Nürnberg, Spitalplatz.

Ich suche zu kaufen:

Ein Pärchen Fledermauspapageien Psittacula galgula.

Offerten erbittet nebst Preisangabe

D. A. Willink

[773] in Utrecht (Holland).

---

4 Paar Zebrafinken, mit welchen in diesem Jahre mit Erfolg gezüchtet wurde, sind à Paar 3½ Thlr., sowie ein Weibchen zu 2 Thlr. zu verkaufen.

H. Th. Hauser,

[774] Nürnberg, äußere Laufergasse Nr. 8.

Um mehreren Anfragen zu begegnen, zeige ich hiermit an, daß ich wieder Lockentauben in Weiß, Blau und Rothschimmel, auch 1 Paar Rothschild, sowie 8 Paar schöne weiße Kröpfer, Wiener Elster, Purzeln, roth und gelb, Weißköpfe, weiße und schwarze Perrücken, schwarze Pfauentauben, Hühnerscheckten und Malteser vollblättige Schwalben und 6 Paar weiße Lachtauben abzugeben habe.

Franz Walhammer,

[775] München.

Zu kaufen gesucht:

1 Paar Seiden-Pfauentauben, schwarz,
1 „ „ „ „ , blau,
1 bis 2 Paar rothe „ „ , mit weißen Schwänzen,
1 „ 2 „ schwarze „ „ „ „
1 Paar Blauschilder „ „ , gehaubt, „ „
1 Stück Schwarzschild. Pfauentaube, glattköpfig, oder
1 Paar rothe Pfauentauben.

Es wird nur auf ganz fehlerfreie Rassetauben reflektirt. In Tausch könnten gegeben werden von Pfauentauben: weiße mit schwarzen oder blauen Schwänzen,) 1. Qualität
blaue und gelbe mit weißen Schwänzen)

Otto Pausch,

[776] Berlin, Ritterstr. 6.

Für Hundeliebhaber!

2 prachtvolle Bernhardiner, 1 Rude, w. mit schw. Kopfzeichen, 2½ J., 1 Hündin, schw. mit starker Doppelnase, 7 M., 75 Ctm. h., Zuchtthiere werden wegen Geschäftsaufgabe verkauft.

Stuttgart. **Christ. Großmann,**

[777] Kaufmann.

Ein Tovi-Sittich und ein großer, weißhaubiger Kakadu, beide eingewöhnt und ganz zahm, sind zu verkaufen. [778]

Reflectanten belieben sich an die Expedition zu wenden.

---

[779] Abzugeben: 1 Paar schöne brütlustige Zebrafinken für 4 Thlr. incl. Reiseb. bei **H. Burghard** in Luckau N.-L.

---

3 reingelbe, 2jährige Harzer Roller setze ich, mit 3 Hennen zusammen für 18 Thlr., einzelne Stämme 1/4 für 6½ Thlr. dem Verkauf aus.

Zugleich offerire ich 2 große Flugkäfige für 15 Thlr. und 12 Thlr., wovon Zeichnungen zu Dienst stehen, sowie eine größere Parthie Nistkasten für kleinere und größere Papageien.

Oscar Vetter,

[780] Ludwigslust.

In Tausch gebe ich gegen schwarze und weiße Lachtauben gut singende Lerchen, Kreuzschnabel, verschiedene Hänflinge, Stieglitze, Zeisige, Männchen, à Stück 3 Sgr., Kanarienhähne und Weibchen, Lachtauben. [781]

Liegnitz. **W. Langner.**

Vorzügliche Harzer Kanarienvögel werden abgegeben von

W. Boecker,
Controleur in Wetzlar.

[782]

Feine Harzer Kanarienvögel.

sind preiswerth zu beziehen von **A. Hieronymi**, Braunschweig. [783]

Gebr. Zeidler in Halle a. S., Groß-Handlung exotischer Vögel

haben auf Lager: **Amazonen-, Graspapageien, kleine Gelbköpfe** (sprechend), **Rosa-, Nasen-, kleine gelbhändige** und **Inka-Kakadu's, Pennantsittiche, Rosellas, blaue Gebirgs-Lori's, Nymphen, Karolin.-, Halsband-, Mönch-** und **Wellen-Sittiche, Inseparables, grauköpfige Sperlings-Papageien, graue Kardinäle** mit schwarzen Kehlen (selten), **Dominikaner-** und **rothe Kardinäle, Diamant-, Zebra-, Safran-, Tiger-** und **Bandfinken, Muskatvögel, Atlasvögel, Goldbrüstchen, Amaranthen, Astrilds, Paradies-Witwen** (in Pracht), **Pfaffen-Vögel, Elsterchen, Cordonbleu, Orangebäckchen, Helena-Fasänchen, Blutschnabel-, Textor-, Madagaskar-,** doppelte **Feuer-Weber, Scharlach-Tangaren-, Sonnen-Vögel, amerik. Spottdrosseln, feine Harzer Kanarienschläger.** [784]

Affen, verschiedene Amphibien, sowie einen **echten Mops** (1 Jahr alt). Nistgegenstände in großer Auswahl.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 17. December 1874. Nr. 51.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Eintheilung und Benennung der Prachtfinken. —
Ueber den Bezug fremdländischer Vögel während des Winters. —
Züchtungseinrichtungen (Schluß). —
Gefiederte Welt im Osten (Fortsetzung). —
Ausstellungen: „Canaria" in Stuttgart. —
Anfrage und Bitte. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Anzeigen.

Eintheilung und Benennung der Prachtfinken.*)

Zur leichten Auffindung eines Vogels und zum ausreichenden Kennenlernen ist eine zweckmäßige Eintheilung der Gruppen, Familien, Sippen und Arten durchaus erforderlich. Eine solche zu geben, ist freilich auf keinem Gebiete schwieriger, als in der Ornithologie, die bekanntlich in dieser Hinsicht ganz besonders krankt. In einem Werke aber, welches sich die allverständliche und wissenschaftliche Beschreibung zugleich zur Aufgabe gemacht, ist eine klare Uebersicht vorzugsweise nothwendig.

Nach Reichenbach wurden die fremdländischen Finkenvögel unter der Bezeichnung Webefinken in eine große Gruppe zusammengefaßt, und diese wurde in Prachtfinken, Witwenvögel oder Widahfinken und Webervögel eingetheilt. Seitdem man aber die ganze Familie der Finkenvögel viel einfacher in einige große Unterfamilien scheidet, erscheint die Reichenbach'sche Zusammenstellung um so mehr überflüssig, da dieselbe von vornherein den Uebelstand zeigte, daß den als Webefinken vereinigten Vögeln die innere Uebereinstimmung einheitlicher Merkmale doch eigentlich völlig mangelte. Somit darf ich hier die Prachtfinken ganz gesondert für sich als Unterfamilie innerhalb der großen Gemeinschaft der Finkenvögel hinstellen.

Auch die Eintheilung der Prachtfinken an sich ist wiederum nicht leicht auszuführen. In mannigfaltiger Weise hat man es versucht, sie in übersichtlichen Gruppen aneinander zu reihen; so wollte man sie in Streifenfinken, Kappenfinken, Gürtelfinken, Grasfinken, Rothschnäbelchen und andere, mehr oder minder wissenschaftlich begründete Sippen und Untersippen scheiden. Abgesehen aber von der doch immerhin zweifelhaften Berechtigung solcher Aufstellungen, erscheinen dieselben hier nicht allein überflüssig, sondern auch bedenklich, weil einerseits durch solche Zersplitterungen das Kennenlernen der Vögel sehr erschwert wird und weil andererseits die Merkmale solcher Scheidungen doch immer nur in den Anschauungen des Einzelnen beruhen, so daß jeder Vogelkundige von ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus seine besondere, von der des Andern völlig abweichende Eintheilung macht. Bevor es also ein befriedigendes, von allen Ornithologen übereinstimmend anerkanntes System der Vogelkunde gibt, sollten in

*) Aus dem soeben erschienenen ersten Heft des Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel" von Dr. Karl Ruß (Verlag von Carl Rümpler in Hannover), welches durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

den Schriften, welche vorzugsweise für die weitesten Kreise der Liebhaber und praktischen Züchter bestimmt sind, alle Zersplitterungen, als die Ursachen nur zu nahe liegender Verwirrungen, sorgfältig vermieden werden — und dies ist eben nur dadurch zu erreichen, daß man eine so einfache Uebersicht als möglich wählt.

Deshalb scheide ich die ganze große Gemeinschaft der Prachtfinken nur in zwei Gruppen, bei denen als Kennzeichen die Gestalt der Schnäbel maßgebend ist, und zwar in 1) die Schwach- und Kleinschnäbeligen und 2) die Stark- und Großschnäbeligen. Diese Eintheilung ist ja bekanntlich schon früher mehrfach eingeführt und hat sich dann im allgemeinen Gebrauch der Liebhaber und Händler und selbst theilweise in der wissenschaftlichen Literatur eingebürgert.

Die bisher gangbaren lateinischen Namen sind zum Theil hinfällig geworden; so z. B. die Bezeichnung Amadina*), welche in den letzten Jahren für die Prachtfinken im allgemeinen fast überall gebräuchlich war. Dies Wort entbehrt von vornherein jedes wissenschaftlichen Werthes und daher bin ich, in Uebereinstimmung mit meinen Herren Mitarbeitern, zu dem Entschluß gelangt, dasselbe und ebenso auch die lateinische Bezeichnung Astrilda für eine große Vogelgruppe ganz fallen zu lassen. An Stelle derselben wählten wir nach reiflichster Erwägung andere, passende und korrekte Benennungen. Meine Leser wollen nun also die Eintheilung der hierher gehörenden Vögel in folgender Weise beachten:

Schmuck- oder Prachtfinken (bisher Amadinae), Aeginthidae;
Schwach- und kleinschnäbelige Prachtfinken oder Astrilde**), Aeginthinae;
Stark- und großschnäbelige Prachtfinken oder Spermestinen (bisher Amadinen), Spermestinae.

Hiernach nenne ich also jeden klein- und schwachschnäbeligen Prachtfink Aegintha***) und jeden stark- und großschnäbeligen Prachtfink Spermestes. †) —

Im Sprachgebrauch kennt man einen Blut- und Karminastrild, Dornastrild, Grauastrild, Ringelastrild u. a., welche keineswegs sämmtlich zu der Gattung gehören, die bei einigen Autoren ausschließlich den Namen Astrilda*) trägt. Die Vogelkundigen sind darüber uneinig, ob man die hierher gehörenden Vögel zu einer größeren Sippe vereinigen oder noch in mehrere Untersippen theilen darf. Auch stimmen sie nicht darin überein, welche Arten sie zu diesem oder den nahe verwandten Geschlechtern zählen. Cabanis und Reichenbach führen etwa neun bis zehn Arten als Astrilde auf; G. R. Gray dehnt sein Geschlecht Estrelda über fünfzehn Arten aus; ein populärer Schriftsteller reiht in die Sippschaft der Astrilden mehr als zwanzig Arten. Durch solche Meinungsverschiedenheiten wird eine große Verwirrung hervorgerufen und ich muß die Leser sehr um Geduld bitten, wenn ich dieselbe noch in einigen Beispielen veranschauliche, indem ich die verschiedenen Benennungen der hervorragendsten Autoren nebeneinander stelle. So heißt

bei Cabanis („Museum heineanum"):
der Grauastrild — Habropyga cinerea,
das Goldbrüstchen — Sporaeginthus subflavus,
der Karminastrild — Lagonosticta minima,
der Schmetterlingsfink — Uraeginthus phoenicotis;

bei Finsch und Hartlaub („Die Vögel Ost-Afrikas"):
der Grauastrild — Habropyga cinerea,
der Karminastrild Pytelia minima,
der Schmetterlingsfink — Pytelia phoenicotis;

bei Th. v. Heuglin („Ornithologie Nordost-Afrikas"):
der Grauastrild — Habropyga cinerea,
das Goldbrüstchen — Habropyga subflava,
der Karminastrild — Lagonosticta minima,
der Schmetterlingsfink — Uraeginthus phoenicotis;

bei Reichenbach („Die Singvögel"):
der Grauastrild — Astrilda cinerea,
das Goldbrüstchen — Pytelia subflava,
der Karminastrild — Lagonosticta minima,
der Schmetterlingsfink — Mariposa phoenicotis;

bei Gray („Hand-List"):
der Grauastrild — Estrilda [Estrelda] cinerea,
das Goldbrüstchen — Estrilda [Sporaeginthus] subflava,
der Karminastrild — Estrilda [Lagonosticta] minima,
der Schmetterlingsfink — Estrilda [Mariposa] bengalus.

Selbst ein gebildeter Laie, sowie der eifrigste Vogelliebhaber wird sich in diesem Labyrinth der Benennungen nur mühsam oder gar nicht zurechtfinden können. Deshalb hatte ich mit der Vereinfachung der Namengebung bereits begonnen, indem ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, alle diese kleinschnäbeligen Prachtfinken als Astrilde und auch unter der Bezeichnung Astrilda

*) Amadina, *Swainson*, soll vielleicht von amare (lieben), abgeleitet sein; es ist jedoch durchaus sinnlos.

**) Die von dem vaterländischen Namen eines Vogels herrührende Benennung Astrild muß in der Mehrzahl Astrilde und nicht, wie fälschlich allgemein eingebürgert, Astrilden heißen.

***) Aegintha, *Cabanis*. Dies schöne aristotelische Wort eignet sich vortrefflich zur Benennung der ganzen Gemeinschaft, da es ohne besondere Nebenbedeutung einen kleinen, in Hecken, Gebüschen u. dgl. lebenden Vogel bezeichnet, auch Gelegenheit bietet, dem großen Altmeister unserer Wissenschaft verdiente Ehre zu erweisen.

†) Spermetes *Sws.*. Das Wort σπερμα bedeutet Samen. Die Endung εστης hat den Werth einer sogenannten Personalbezeichnung. Spermestes ist also ein Vogel, der vorzugsweise Samen liebt.

*) Loxia astrild *Linné*; Habropyga *Cabanis*; Estrelda *Gray*; Estrilda *Swainson*; Astrilda *Reichenbach*.

zusammenfaßte. Diese Eintheilung habe ich auch hier im größeren Werke festgehalten; nur mußte ich, um der Verwechselung zwischen den Angehörigen des wissenschaftlich aufgestellten Geschlechts Astrilda und der populären Bezeichnung Astrilde vorzubeugen, eine andere lateinische Benennung (Aegintha) für Kleinschnäbelchen wählen. —

Diese Eintheilung, die unter allen Umständen wenigstens den Vortheil hat, daß sie leicht zu behalten ist und zu Irrthümern und Verwirrungen wol kaum Anlaß geben kann, möchte ich gern von allen Freunden der Prachtfinken angenommen sehen, und ich werde sie daher von jetzt an hier in der „Gefiederten Welt" stets gebrauchen und sie so allmälig auch bei den Lesern einzubürgern suchen, welche mein größeres Werk nicht anschaffen.

Ueber den Bezug fremdländischer Vögel während des Winters.

Es ist allgemein bekannt, daß die meisten fremdländischen Vögel Kälte und Zugluft nicht gut ertragen können; gleichwol werden dieselben den ganzen Winter hindurch, und häufig sogar bei großer Kälte, oft nach sehr entfernten Orten versendet. Daß dabei eine nicht geringe Anzahl unserer gefiederten Lieblinge ihr Leben einbüßen muß, ist natürlich. Den Händlern, denen es in der Regel nur um das Geschäft zu thun ist, welches sie dabei machen, ist dies gleichgültig, vielleicht sogar erwünscht, nicht aber denen, welche die Vögel beziehen und die sich auf ihren Besitz freuen. Denn diesen wird nicht allein die Freude verbittert, sondern sie haben auch oft recht empfindliche Geldverluste zu erleiden. Soviel ich beobachten konnte — und ich habe hierzu reichliche Gelegenheit, da der Transport ausländischer Vögel vom Norden nach dem Süden über hier ein sehr bedeutender genannt werden kann — ist es vom Beginn des Frühlings bis zum Eintritt des Winters fast völlig ungefährlich, Vögel mit der Post zu beziehen; von dem Eintritt wirklicher Kälte ab erhöht sich aber die Gefahr ganz bedeutend. Man glaube ja nicht, daß sich die Vögel auf allen Poststationen einer so rücksichtsvollen Behandlung zu erfreuen haben, als dies in ihrem Interesse erwünscht wäre, denn es ist Thatsache, daß dieselben, besonders auf den größeren Postämtern, während der kalten Nächte in den ungeheizten Packräumen verbleiben müssen. Zwar soll jetzt die Anordnung bestehen, daß die Käfige mit Vögeln während des Transportes in den im Winter geheizten Theil des Eisenbahn-Postwagens aufgenommen und dort sicher untergebracht werden sollen, was sehr anerkennenswerth ist, allein dies reicht bei weitem noch nicht aus, um die Vögel vor Schaden zu bewahren, denn man bedenke nur, daß gerade in den geheizten Eisenbahnpostwagen der Temperaturwechsel ein nur zu hoher ist. Bei jeder Station wird oft eine volle Viertelstunde lang und noch darüber, aus- und eingeladen, es kann hierbei natürlich nicht umgangen werden, daß die Wärme dem Wagen entströmt und dafür eine eisige Kälte in denselben einzieht. Um diese dann zu vertreiben wird nun wieder tüchtig eingeheizt, und so geht dies von Station zu Station fort. Endlich am Bestimmungsorte angelangt, bleiben die Vögel beim Ausladen der fast auf jedem Eisenbahn-Perron vorhandenen empfindlichen Zugluft so lange ausgesetzt, bis die angekommenen Postsachen nach dem Postgebäude geschafft werden, wo sie abermals der ungeheizte Raum für Gepäckstücke aufnimmt, um erst nach mehrstündigem Aufenthalte in diesem endlich an den Empfänger abgeliefert zu werden. Letzterer erhält die armen Reisenden dann meist in einem trostlosen Zustande, namentlich wenn es junge oder schwache Vögel sind, und viele davon sterben schon in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft.

Die gefährlichste Zeit für den Vogeltransport ist jedoch unstreitig der Monat Dezember, weil schon vom 10. dieses Monats ab der Transport der Packete mit Weihnachtsgeschenken beginnt und fast bis zum Schlusse des Monats ununterbrochen fortdauert. Statt eines einzigen Postwagens giebt es während dieser Zeit oft deren drei bis vier und man kann von Seiten der Postbeamten nicht erwarten, daß sie den Vogelsendungen eine besondere Aufmerksamkeit zuwenden, denn ungeachtet des gewöhnlich verstärkten Personals sind die Ersteren von ihrem Dienste so in Anspruch genommen, daß sie die damit verbundenen Arbeiten kaum bewältigen können. Es kann unter diesen Umständen auch nicht davon die Rede sein, daß die zu versendenden Vögel gerade in dem geheizten Postwagen aufgenommen werden, vielmehr werden die Transportkäfige der Vögel untergebracht, wo sich eben Raum dafür bietet, ohne Rücksicht auf Kälte und Zug. Die Folgen hiervon bleiben natürlich nicht aus. Ich hatte im Dezember v. J. Gelegenheit zu sehen, wie in einer einzigen Woche in fünf hier durchgehenden Transportkäfigen fast kein einziger Vogel mehr am Leben war, und ich könnte noch vieler derartigen Fälle erwähnen.

Aus diesen Gründen möchte ich allen Liebhabern der Vogelwelt dringend rathen, Vögel, weder ausländische noch einheimische, bei eintretender Kälte, besonders aber während des Monats Dezember ja nicht zu beziehen.

F. Kannewurf in Eisenach.

(Im Allgemeinen stimmen wir dem Gesagten vollkommen bei; denn es ist allerdings ein Jammer, daß so viele Vögel bei den Sendungen zur rauhen Jahreszeit verloren gehen. In Betreff der Herren Händler sei aber auf den Usus hingewiesen, den Herr Karl Gudera in Leipzig eingeführt hat. „Um sich in solchen Fällen vor unerquicklichen Erörterungen und Schaden zu hüten, hat er folgende Bestimmungen ein- für allemal getroffen: Bei Sendungen nach Eisenbahnstationen Deutschlands, Oester-

reichs und der Schweiz werden die während des Transports, also vor Empfangnahme etwa gestorbenen Vögel, gegen sofortige Rücksendung des Kopfes oder Flügels oder gegen Bescheinigung des die Vögel überbringenden Postbeamten zur Hälfte ersetzt. Unter gleichen Voraussetzungen wird gegen eine im Voraus zu entrichtende Versicherungsprämie von 5 Prozent des Kaufpreises für etwa todt angekommene Vögel voller Ersatz geleistet. Mit Ablieferung der Sendung an den Adressaten hört hingegen jede Garantie auf. Sendungen solcher Vögel, welche umgetauscht werden sollen, gehen auf alleiniges Risiko des Absenders." Ausreichend ist dies freilich keineswegs, denn die meisten Vögel sterben doch erst in den nächsten Tagen nach der Ankunft. D. R.).

Einrichtungen und Züchtungen des Herrn Fabrikanten L. Nesmirak in Karolinthal bei Prag.

(Schluß).

Herr N. beobachtete nun weiter, daß ein Paar Schmetterlingsfinken, welche ein Nest frei in einem Strauch erbaut, fünf Eier gelegt, gut brüteten, aber durch die Bandfinken gestört wurden, indem diese das Material davon räuberten, so daß eines Tages die halb erbrüteten Eier aus dem gänzlich zerstörten Nest auf den Boden gefallen waren. Dasselbe wiederholte sich bei Amarantvögeln und anderen, wobei diese Vögelchen die Räuber ruhig gewähren ließen, ohne ihre Brut so wie die Zebrafinken zu vertheidigen. Amarantvögel, Schmetterlingsfinken u. a. sind gegen die Bandvögel zu schwach, während die Zebrafinken sich ihrer tapfer zu erwehren wissen.

Die Gürtelgrasfinken brachten zwei Bruten von jedesmal 4 Eiern, auf denen das Weibchen so emsig brütete, daß Herr N. dasselbe lange Zeit gar nicht zu Gesicht bekam und nach 3 Wochen sie gewaltsam aus dem Neste verscheuchen mußte, weil sämmtliche Eier unfruchtbar waren; dieselben nisten soeben zum dritten Mal. Bis jetzt hat Herr N. zwölf kräftige Junge aus drei Bruten Zebrafinken und 8 junge Halsbandfinken flügge werden gesehen, während gegenwärtig Schmetterlingsfinken, Halsband- und Gürtelgrasfinken nisten. Er fährt dann fort:

Eines macht mich recht besorgt, eine Krankheitserscheinung, die ich nicht ergründen kann. Ich hatte ein prächtiges, gut gefiedertes Tigerfinkenpärchen, nach kurzer Zeit fing das Weibchen an federlos zu werden, zuerst verlor es die Federn am Hals und Rücken, später am Bauch und noch später wurde es außer den wenigen Federn am Kopf, Schwanz und Flügeln ganz kahl und starb, obwol es ganz lustig war und immer gut fraß. Nicht lange nachher erkrankte und starb das Männchen in derselben Weise gänzlich entfiedert, und ein anderes ganz gesundes Pärchen, das ich mir darauf kommen ließ, hat ebenso in kurzer Zeit geendet. Nun dachte ich, daß eben nur diese Vögelchen für das hiesige Klima zu zart sind, und ich habe keine weiteren mehr angeschafft. Da fängt aber bei einem Amarantweibchen, das sonst ganz munter ist und sich täglich badet, derselbe Zustand an. Die Temperatur des Zimmers ist gleichmäßig 15 Grad R. und sinkt nie unter 10 Grad; ich bitte Sie, falls Sie mir hierüber einen Rath ertheilen können, meines größten Dankes im Voraus versichert zu sein. *)

Anfangs habe ich auch noch mehrere kleine Papageien, als Wellensittiche, Inseperables, Sperlingspapageien unter den anderen Vögeln in dem Bauer gehalten, habe aber bald meinen Irrthum eingesehen, denn ich mußte sie sämmtlich schleunigst entfernen. Nicht nur, daß sie alle anderen Vögel mörderisch verfolgt, haben sie auch Alles zerbissen, die Nestvorrichtungen zerstört, kurz sich sehr ungeberdig benommen; ich habe sie getrennt in kleine Bauer untergebracht, bis jetzt aber keine Ergebnisse mit ihnen erzielt. (Papageien sind immer unverträglich und bösartig gegen andere Vögel, wenn sie im zu engen Raume mit ihnen zusammen sich befinden. D. R.)

Ein Pärchen Scharlachtangaren sind ganz munter; ich füttere sie mit einem zusammengeriebenen Gemisch aus Mören, Semmel, Ameiseneiern, Feigen und grünem Salat, dazu täglich einige Mehlwürmer, Apfelschnitte, die sie mit Vorliebe verzehren, und viel Badewasser. Sie baden täglich einigemal, sind bei mir so zahm geworden, daß sie das dargereichte Futter gern aus der Hand nehmen. Obwol ich ihnen aber eine ganz günstige Nestvorrichtung im Käfig angebracht, haben sie sich bis jetzt nicht um dieselbe gekümmert.

Gefiederte Welt im Osten.

Palmyra.

(Fortsetzung).

Ein schönes Gegenstück zu dem letztgenannten Vogel ist die sich hier ebenfalls einstellende Blauracke oder Mandelkrähe. So schön das Gefieder dieses Vogels, so unangenehm ist sein Gerack, das er bald hoch oben in der Luft, bald auf einem Baume sitzend, vernehmen läßt. Bei seiner Ankunft, wie während der Brutzeit, hält er sich meist an den mit hohen Bäumen bestandenen Teichufern auf, um auf Kerbthiere, wie kleinere Amphibien Jagd zu machen. Nach dem Ausfliegen der Jungen, welche in einer Baumhöhle erzogen werden, sucht er mit denselben die Kornfelder auf, von Mandel zu Mandel fliegend, um Kerbthiere und Gewürm, auch Körner, besonders von Buchweizen zu verzehren. Die Jungen zeigen in der Färbung von den Alten kaum einen merk-

*) Bei gut gehaltenen Prachtfinken pflegt das Kahlwerden niemals vorzukommen. Sie mausern gewöhnlich so allmälich, daß man wol jahrelang den Federwechsel kaum bemerkt, und wenn ein solcher Vogel schnell die Federn verliert, so sprießen dieselben ebenso bald wieder hervor. Zwei Ursachen verlangsamen aber die Mauser so sehr, daß sie so oft tödtlich wird: Mangel an Kalk nämlich und zu geringe Wärme. Wenn Sie immer reichlich Sepia gegeben haben, so leiden Ihre Vögel entschieden in der zu niedrigen Temperatur, die für die Dauer und besonders in der Mauser kein Tropenvogel unter 12 Grad ertragen kann. D. R.

lichen Unterschied; sie sind, aus dem Neste genommen, ungemein störrig, kratzen und beißen mit ihrem starken Schnabel sehr nachdrücklich, und zeigen noch die Unannehmlichkeit, daß sie über und über voll Ungeziefer sind.

Wendehals, wie Würger zeigen sich auch manchmal zum Besuch in den Gärten, doch zieht ersterer größere Waldbestände vor, während die Würger die in der Steppe liegenden Sümpfe, welche mit einigem Erlen- und Weidengebüsch eingefaßt, erwählen. — Einer der am spätesten kommenden Gäste ist das niedliche Turteltäubchen, welches vorzugsweise sein Heim in den Gärten aufschlägt, und in den ersten Monaten sein Girren hören läßt. In Gegenden, wo sie nicht gestört werden, sind sie ungemein zutraulich, halten sich auf den Wohnungen am nächsten stehenden Bäumen auf und legen dort auch ihr Nest an. Solches ist, wie bei allen Taubenarten, recht liederlich gebaut, kaum, daß die Paar Reiser den Eiern eine Unterlage bieten; doch suchen sie die Anlage immer so einzurichten, daß hinreichend genug Blattwerk Deckung verschafft. Durch den schlechten Nestbau kommt es häufig vor, daß die Jungen herunterfallen, dann zwar, wenn sie nicht Schaden gelitten, von den Alten gefüttert werden, aber meist von einem Raubthier gefressen werden. Bald nach dem Ausflug der Jungen, schon Mitte August, ziehen sie wieder fort, nicht direkt ihre Wanderung antretend, sondern sich erst in größeren Waldungen zu anderen Gesellschaften schlagend. — Die große Ringeltaube trifft man hier und da in einem einzelnen Paare brütend in den Gärten, die gewöhnliche Wildtaube dagegen, nur in großen Waldbeständen in nicht geringer Zahl.

Von den Zugraubvögeln streichen einige Falkenarten herum, ohne jedoch ihren Horst in den Gärten aufzuschlagen.

Von den Nachtraubvögeln stellt sich eine kleine Ohreule ein, die ihre Lichtscheu theils im Laubwerk der Bäume, theils in irgend einer Giebelluke eines Gebäudes verträumt. — Um noch einen Nachtvogel zu erwähnen, darf auch die große Nachtschwalbe nicht vergessen werden, die zwar kein Raubvogel ist, sondern sich im Gegentheil durch das Wegfangen manch' schädlicher, Nachts fliegender Spanner und Falter sehr nützlich macht, und hier sehr häufig ist. —

Noch kämpft der Winter um seine Herrschaft, so erscheint schon als Eröffner des Reigens der durchwandernden Vögel, in großen spitzwinkeligen Kolonnen, mit weit hörbarem Geschnatter anrückend die Wildgans, um je nach der Witterung auf den theilweise schneelosen Saatfeldern einige Tage der Ruhe zu pflegen. Bald aber, streicht der Wind nicht mehr gar zu eisig vom Norden her, diesem entgegenziehend, um in den dortigen großen Brüchen die Sommermonate zu feiern. Mitte Oktobers kommen sie wieder zurück, halten sich dann in zerstreuten Trupps, auf den Wintersaatfeldern äsend, Nachts die Sümpfe aufsuchend, bis zum Eintritt starker Kälte auf, um hernach dann für einige Monate einen klimatischen Kurort im Süden zu beziehen.

Hinter den Gänsen folgen alsbald einige Arten aus der großen Familie der Drosseln. Als erste kündigt sich durch ihr Gerattatter die Misteldrossel an. Im Frühjahr hält sich diese nicht lange, sondern eilt sobald als möglich den nördlich gelegenen Nadelwaldungen entgegen. Im Spätherbst trifft sie wieder mit dem in der Fremde nicht verbesserten Geschnarr ein und bleibt von allen andern Drosseln am längsten; bald hoch auf den Bäumen, besonders in der Frühe, bald auf den Grasplätzen emsig nach Würmern u. dergl. suchend, selten gleich den andern Arten in den Gebüschen herumstöbernd, verschwindet sie für ein Paar Tage ganz, zeigt sich auf einmal wieder, und dies wird von den aus 6—20 Stück bestehenden Flügen hin und her so lange getrieben, bis Unwetter und Mangel an Nahrung sie südlicher zu wandern zwingen.

Bald nach dieser rücken in großen Zügen die Wachholderdrosseln an, überall, wo genug Gebüsch vorhanden, sich einige Zeit niederlassend; doch, sobald warme Sonnenblicke erscheinen, abziehend, um die Brutplätze bis weit im Norden hinauf aufzusuchen. Eine Anzahl bleibt auch hier, denn im Dnieprgebiete, wo große Flächen von Buschholz, aus Eichen und Birken bestehend, sich erstrecken, fand ich zahlreiche Brutgesellschaften auf.

Bereits mit letzterer kehren auch Stein- und Singdrossel bei uns ein. Die Singdrossel im Verhältniß zu den Andern in kleinster Zahl, doch wird sie im Dnieprthal häufig brütend getroffen, die Rothdrossel dagegen nicht.

Beim ersten Reif, mit dem der Herbst seinen Einzug hält, stellen sich auch auf einen Schlag die genannten Drosselarten, aber in bedeutend größern Scharen als im Frühjahr ein. In allen Gebüschen huscht, scharrt und lockt es sieh! und zieh! besonders die Wachholderdrossel weiß sich beim Erschrecken mit ihrem schrillen Tsiuh, tix, tix, tschack, tschack! recht bemerkbar zu machen. In der Frühe fliegen sie viel herum, die andern Tageszeiten werden mit Durchstöbern des abgefallenen Blattwerks in den Gebüschen verbracht. Oft scheint Alles ganz ruhig, kommt man aber einem dichten Gebüsche zu nahe, fährt ein Drosselschwarm gleich dem wilden Heer heraus, um nicht weit davon wieder einzufallen. Im Ganzen genommen, sind die Drosseln durch Vertilgen vieler schädlichen Kerfe und Würmer, als sehr nützliche Vögel zu betrachten; obwol die Rothdrossel in Gegenden mit Rebanlagen nicht gern gesehen wird, da sie, in großer Anzahl einfallend, in den Weinbergen immerhin erheblichen Schaden anrichten kann; man muß eben Eines ins Andere rechnen. Ende Oktobers, je nachdem die Witterung, sind auf einmal Alle, bis auf die Misteldrossel, rein verschwunden, und ist dann mit Gewißheit anzunehmen, daß in kürzester Zeit starke Kälte oder sonst Unwetter

eintreten wird, welches sich nach meinen Beobachtungen jedesmal bewahrheitete.

Zwischen den genannten Arten bemerkte ich im Herbste die eine und andere mir unbekannte Drossel. Wahrscheinlich versprengte, von den in Sibirien sich zahlreicher vorfindenden Drosselarten? Eine der bekanntesten und schätzbarsten Arten, die herrlich flötende Amsel, fehlt hier ganz. Deren Fehlen erkläre ich mir durch Mangel an Nadelgehölz, wie durch die Einförmigkeit der Landschaft.

Ein Drosselherd, wie überhaupt der Fang dieser Vögel, ist hier nicht zu finden. Selten werden im Herbst einige Misteldrosseln geschossen. Dem Bauernjäger ist sein Pulver zu kostbar, um es, noch dazu mit unsicherem Erfolge, auf so kleine Vögel zu verpuffen. —

Die Waldschnepfe weilt hier im Frühjahrszuge nur kurze Zeit und beeilt sich, nach den Waldmooren des Nordens zu kommen. Anfang Septembers kommt sie wieder zurück und der Zug dauert meist bis Ende Oktobers. Die Gärten dienen nach der Wanderung durch die Steppe als Ruheplätze, und bietet jeder Tag dann, je nach der in der Nacht herrschenden Windrichtung eine gute Jagd. Wer mit dem Terrain genau bekannt ist, hat nicht einmal den Hund nöthig, da sie gewöhnlich gewisse Plätze haben, wo sie den Tag über liegen. Auf dem Anstand, Abends beim Zuge werden sie selten geschossen. —

Früh im Jahre, sobald sich nur schneefreie Stellen zeigen, vernimmt man in den Gärten den angenehmen Gesang des zutraulichen Rothbrüstchens. Es hält bei uns nur kurze Rast, denn sowie andauernd warme Witterung eintritt, verschwindet es nach Gegenden mit kühlen Sommern, um dem Nestbau und Aufzucht seiner Nachkommenschaft obzuliegen. Ende August kehren die Rothbrüstchen aber von den Brutorten wieder zurück, erst einzeln, dann aber in solcher Anzahl, daß oft alle Büsche davon wimmeln. Das gibt ein munteres Leben; hier wird scharf gelockt, dort trägt eines seinen anziehenden Gesang vor, da huscht und raschelt es im dürren Laube nach Lärvchen suchend, immer beweglich, dabei so zutraulich, daß der Beobachter auf einige Schritte ankommen kann, während das Vögelchen ihn mit seinen großen Aeuglein neugierig betrachtet. Wie sie so schnell und ungesehen ankommen, ebenso verschwinden sie wieder, so daß Ende Oktobers nur noch hier und da ein Nachzügler zu treffen ist. —

Mit der eisiger werdenden Luft beendigt den Durchzug der europäische Kolibri, das safranköpfige Goldhähnchen. Selten sieht man das feuerköpfige. Schmetterlingsgleich schweben sie von Busch zu Baum, Aeste wie Stamm nach Lärvchen und Eiern absuchend, und auch auf dem Boden nach verborgenen Schätzen spähend. So ziehen sie, ihr feines Lockstimmchen ertönen lassend, in größeren und kleineren Gesellschaften tagtäglich in den Gärten herum, bis Eintritt starker Kälte sie nach einer etwas milderen Gegend treibt.

Wol bringt der Zug noch manch' andere Vogelarten durch unsere Gegend, die aber nicht regelmäßig jedes Jahr erscheinen, oder die Gärten nur flüchtig als Ausruhstation benützen; während wieder viele andere ihren Strich den Flußthälern entlang nehmen.

Die wenigen, dieser Gegend eigenthümlichen Standvögel allein würden unsere Landschaft im Winter nicht sehr mannigfaltig beleben, wenn nicht der höhere Norden viele, in gemäßigten Ländern als Standvögel geltende Arten, für diese Jahreszeit als Wanderer zu uns schickte, während wir hier, einer etwaigen angenehmen Temperatur wegen, auch keine besondern Ansprüche zu machen haben, sondern uns mit sehr sibirischen Nerven wappnen müssen.

(Schluß folgt).

Ausstellungen.

Die Gesellschaft „Canaria" in Stuttgart veranstaltet ihre dreizehnte allgemeine Ausstellung von Kanarienvögeln am 13. und 14. Dezember in der Liederhalle. Anmeldung nach Art, Gattung und Kopfzahl (Kanarienvögel und Kanarienbastarde) bis zum 12. Dezember, an den Hausmeister der Liederhalle, Herrn C. Holzboog. Mit der Ausstellung ist auch eine Verloosung verbunden. Alles Nähere ist aus dem Prospekt zu ersehen, welcher vom Vorstande, den Herren J. Röger, C. Bach, G. Staubitz bezogen werden kann.

(Die Benachrichtigung ist uns leider zu spät zugegangen, doch wollen wir durch diese jetzt freilich nur nachträgliche Bekanntmachung dem Verein wenigstens unsere Aufmerksamkeit und unsern guten Willen beweisen. D. R.)

Anfrage und Bitte.

Sind bei Kreuzungsversuchen ausländischer Hühnerrassen in häufigeren Fällen Neigungen zu Schnabelabweichungen (am häufigsten soll Kreuzschnabelbildung vorkommen, aber auch Biegung und Form nach Art der Raubvögel, natürlich ohne Zahn) bei den jungen Thieren beobachtet worden, so daß solche als angeboren zu bezeichnen wären? Wenn ja, bei welchen Rassen?

Erfahrene Züchter würden den Unterzeichneten zu Dank verpflichten, wenn sie etwaige Beobachtungen direkt oder durch diese Blätter mitzutheilen die Güte hätten.

Hildesheim. E. Michelsen, Direktor.

Bücher- und Schriftenschau.

Die deutsche Expedition an der Loangoküste, nebst älteren Nachrichten über die zu erforschenden Länder. Nach persönlichen Erlebnissen von Adolf Bastian. I Band. (Jena, Herrmann Costenoble). Für Gebildete bedarf es keines Hinweises darauf, daß die weitere Erforschung von Afrika gleichsam als eine deutsche Nationalangelegenheit anzusehen ist und daß es also auch gewissermaßen als eine Ehrensache betrachtet werden muß, dieselbe mit Aufmerksamkeit und Theilnahme zu verfolgen, bezüglich so viel als thunlich zu ihrer Förderung beizutragen. Dies Buch von Bastian ist vor allem dazu angethan, das lebhafteste Interesse in den weitesten Kreisen zu erwecken und in diesem Sinne sei namentlich auf den als Vorwort vorangestellten Aufruf, sowie auf den zum Schluß dieses Bandes angehängten Vortrag über die eigentlichen Zwecke der deutschen Expedition an der Loangeküste hingewiesen. Sobald der zweite Band uns zugeht, werden wir denselben ebenfalls unsern Lesern empfehlend ankündigen.

Hiernach wenden wir uns, mit besonderm Bezug auf das in der Einleitung der vorigen Nummer Gesagte, zu etwas ferner liegender Literatur.

Am Genfer See. Erzählung von Ludwig Habicht. Zwei Bände. (Jena, Herrmann Costenoble). Unter den Romanschriftstellern der Gegenwart verdient Ludwig Habicht die Aufmerksamkeit gebildeter Leser in besonders hohem Grade. Seine Romane „Vor dem Gewitter", „Zwei Höfe", „Der Stadtschreiber von Liegnitz" hat noch Niemand unbefriedigt aus der Hand gelegt, der wirklich Sinn für eine gute Lektüre hat. Die vorliegende Erzählung spielt am schönen Genfer See unmittelbar vor dem letzten Kriege und bis in denselben hinein. Sie zeichnet sich durch die Vorzüge ganz besonders aus, welche diesen Schriftsteller hoch erheben. Eine scharfe Charakteristik der auftretenden Personen, die unser Interesse von vornherein gewinnen und unsere Theilnahme so in Anspruch zu nehmen vermögen, daß wir die einfache und doch so anmuthende Erzählung gleichsam mit ihnen durchleben; die farbenreiche und lebensvolle Darstellung einer schönen Natur; vor allem aber eine Fülle von geistreichen Reflexionen und eine gewandte, hochgebildete Sprache — das sind zusammen die Eigenthümlichkeiten auch dieser Habicht'schen Schöpfung.

Deutsches Dichter-Lexikon. Biographische und bibliographische Mittheilungen über deutsche Dichter aller Zeiten. Unter besonderer Berücksichtigung der Gegenwart für Freunde der Literatur zusammengestellt von Franz Brümmer. (Eichstätt und Stuttgart, Verlag der Krüll'schen Buchhandlung.) Für alle Freunde der deutschen Literatur wird dies Unternehmen zweifellos sehr willkommen sein — und da wir unter unsern Lesern doch wol recht viele haben, welche an guten Schriften, gleichviel auf welchem Gebiete, Freude und Genuß finden, so konnten wir es nicht unterlassen, auf die soeben erschienene erste Lieferung dieses verdienstvollen Unternehmens hinzuweisen.

Gesammelte Werke von Karl Gutzkow. Erste vollständige Gesammt-Ausgabe. (Jena, Herrmann Costenoble.) Rudolf Gottschall sagt in seiner Literaturgeschichte: Gutzkow ist ein wahrhaft moderner Autor, mit religiösem Ernst von der Bedeutung der Gegenwart und der großen Aufgabe ihrer Dichter durchdrungen, und vorzugsweise befähigt, das Bild der Mitwelt mit dauernden Zügen der Nachwelt zu entwerfen. Schon in den „Säkularbildern" bewies er seine Auffassungsgabe für die feinsten Verzweigungen des Kulturlebens der Gegenwart. Doch in der That, es bedarf einer weiteren Empfehlung Gutzkow's nicht, sondern wol nur der Nachricht, daß seine Werke in einer Gesammtausgabe erschienen, um zu veranlassen, daß dieselbe den Büchersammlungen zahlreicher Familien eingereiht werde. Bis jetzt sind zwei Lieferungen erschienen à 6 Sgr. Sobald uns mehrere zugehen, werden wir dieselben stets anzeigen.

Die Erziehung der Jugend. Ein Handbuch für Eltern und Erzieher, von Friedrich Ascher (Berlin, Verlag von F. Berggeld). Ein überaus nützliches Buch, durch dessen Erwähnung wir wol hier und da uns Dank erwerben. Denn ungleich wichtiger noch als die Züchtung unserer gefiederten Lieblinge ist die Erziehung derer, die doch hoch über jenen stehen, der eigenen Kinder. In dieser Hinsicht aber ist das vorliegende Buch eine wahre Fundgrube, welche nicht warm genug empfohlen werden kann. —

Somit wäre ich für diesmal mit der Ueberschau der Schriften fertig, um deren willen ich die Nachsicht der Leser erbitten mußte. Möchte denen, welche die eine oder andere derselben für den Weihnachtstisch wählen, damit also ein guter Dienst geleistet sein!

Praktisches Kaninchen-Kochbuch. Die Zubereitung der Kaninchen in 130 Rezepten, nach eigenen Erfahrungen dargestellt von L. v. Pröpper. (Berlin, Verlag von E. Schotte u. Voigt.) Da wir unter den Lesern doch wol recht viele Kaninchenliebhaber und Züchter haben, so sei auch hier auf dies Büchelchen hingewiesen. In ihm liegt ja eigentlich das wichtigste Ziel der gesammten Kaninchenliebhaberei begründet, die dann erst wirklich lebensfähig sein kann und wird, sobald das Kaninchen in der That so zahlreich gezüchtet wird, daß sich das Verlangen nach Vorschriften für seine Zubereitung geltend macht. Für diesen Fall sei dies praktische Kochbuch bestens empfohlen.

Auch die **„Lapin-Fleischbereitung"**, mit Abbildungen der Tranchirkunst, nebst Anweisung zum Schlachten, Abziehen und Ausnehmen, von einem praktischen Koch (Neu-Ulm, Verlag von Helb) wollen wir nicht unerwähnt lassen, da es einerseits sich dem vorigen anschließt und da es andererseits bereits in zweiter Auflage erschienen ist. So möge das oben Gesagte für dies Heftchen ebenfalls gelten.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vorzügliche Harzer Kanarienvögel werden abgegeben von

W. Boecker,
[785] **Controleur in Wetzlar.**

Rudolph Schmidt,
Samen- und Vogelhandlung,
Erfurt,
empfiehlt in schöner Waare:

	Sommerrübsamen . . .	Ctr. 6½	Thlr.
	Kanariensaat	„ 11	„
	Hirse, weiße	„ 7½	„
	„ , gelbe und rothe .	„ —	—
	Mohn, blau	„ 12	„
	Hanf	„ 5½	„
	Mais	„ 5½	„
	Hafer, gespaltener . . .	„ 8	„
[786]	Ameiseneier und Sepia .	Pfd. 20	„

Gesucht wird zu kaufen:
ein älteres Inseparables-Weibchen,
ein Tigerfinken-Weibchen,
endlich ein Sonnenvogel-Weibchen, im Tausche gegen ein Männchen.

Dr. F. Franken,
[787] Baden.

Newfundländer!

Ein prachtvoller pechschwarzer Newfundländer Hund, 8 Monate alt, ist preiswürdig zu verkaufen beim Buchhändler **H. Fiedler** in Agram. [788]

Abzugeben sind in vorzüglichen Exemplaren: Zebrafinken d. P. 3½ Thlr., 1 gr. Elsterchen, M., 2 Thlr., 1 Bartfink, W., 3½ Thlr., 1 Ringelastrild, W., 5 Thlr., 1 Schönfink (A. formosa), M., 3 Thlr., 1 Ceresfink, W., 4½ Thlr. — Auskunft giebt die Exped. d. Ztg. [789]

Zu kaufen gesucht:

1 Paar Seiden-Pfauentauben, schwarz,
1 „ „ „ , blau,
1 bis 2 Paar rothe „ , mit weißen Schwänzen,
1 „ 2 „ schwarze „ „ „ „
1 Paar Blauschilder „ , gehaubt, „ „
1 Stück schwarzer Pfauentaubert, glattköpfig, oder
1 Paar rothe Pfauentauben.

Es wird nur auf ganz fehlerfreie Rassetauben reflektirt. In Tausch könnten gegeben werden von Pfauentauben:
weiße mit schwarzen oder blauen Schwänzen, } 1. Qualität
blaue und gelbe mit weißen Schwänzen }

Otto Pausch,
[790] Berlin, Ritterstr. 6.

3 reingelbe, 2jährige Harzer Roller setze ich, mit 13 Hennen zusammen, für 18 Thlr., einzelne Stämme 1/4 für 6⅔ Thlr. dem Verkauf aus.

Zugleich offerire ich 2 große Flugkäfige für 15 Thlr. und 12 Thlr., wovon Zeichnungen zu Dienst stehen, sowie eine größere Parthie Nistkasten für kleinere und größere Papageien.

Oscar Vetter,
[791] Ludwigsburg.

Harzer Kanarienhähne der edelsten Rasse giebt unter Garantie eines schönen fehlerfreien Gesanges ab **F. Schröder** in Parchim (Mecklenburg), Berlinerstr. [792]

Ein sehr schöner grauer Papagei 8 Thlr.

A. Weyland, Techniker,
[793] Hannover, Nelkenstraße 16.

Wegen Mangel eines geeigneten Winterlokales sind zu verkaufen:

1 Weibchen, bl. Gebirgslori, schönes Exemplar, 15 Thlr.,
1 Paar Grauköpfchen, Zwergpapageien, bereits
2 Mal genistet . . . . 15 "
Wellenpapageien, alte Zuchtpaare . . . à 7 "
do. junge . . . à 5 "

Carl Sülzner,
[794] Naumburg a. S.

Ein Paar nistende Nymphen habe ich preiswerth abzugeben, event. gegen kleine Exoten zu vertauschen.

[795] **W. Babikow,** Demmin.

Zur Nachricht.

Den geehrt. Bestellern die Mittheilung, daß Kanarienhähne fortab nicht mehr zu haben sind, und daß ich Bestellungen auf Flugbauer vorläufig auch nicht mehr ausführen kann.

Zuchtweibchen à St. 12½ Sgr. sind noch in kl. Partien abzugeben. Ebenfalls Nistkästchen und Gimpelbauer zu den bekannten Preisen.

St. Andreasberg, 7. Dezember 1874.

[796] **C. Lange.**

Zwei sehr schöne rosa Kakadu à 8 Thlr., Hüttenfänger Paar 5 Thlr., Nonpareil Paar 4 Thlr., Wellensittiche, zuchtfähige, Paar 7 Thlr., ferner Harzer Kanarienhähne, feine Roller, 2—5 Thlr., sowie diverse einheimische Singvögel, Eulen u. s. w. empfiehlt

[797] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

Die Vogelhandlung

von D. Dufour, Behrenstrasse 51
Passage-Gebäude,

empfiehlt die schönsten Papageien, grau und grün, zahm und gut sprechend, alle ausländischen kleinen Vögel, gutpfeifende Dompfaffen, die schönsten Harzer Kanarienvögel, Lichtschläger, schlagende Nachtigallen, Affen, kleine Damen-Hunde und eine Auswahl von Vogelkäfigen zu soliden Preisen. [798]

Die Vogelhandlung von **F. Schmidt,** Berlin, Friedrichstr. 93, empfiehlt: größte Auswahl von grauen und grünen Papageien, Loris, Kakadus, Perrüschen, Wellensittiche, kleine ausländische Vögel, rothe Kardinäle, Kalanderlerchen, Steppenlerchen, Kappenammer, Karmingimpel, gelernte Dompfaffen, Harzer Kanarienvögel, Pariser Kanarienvögel, das Paar 5 Thlr., Goldfische, zahme Affen, Vogelkäfige und alle Arten Muscheln zu billigen Preisen. [799]

An Sommerrübsen gewöhnte **echte Harzer**

Kanarien-

Roller ohne Fehlton à St. 3½ bis 4 Thlr., **Zebrafinken** à Paar 4 Thlr., **Schwarzamseln** à St. 1½ Thlr., **Lerchen** à St. 1½ Thlr., **Wachteln** à St. 2 Thlr., **Lauftauben** à Paar 1 Thlr., **Plattmönche** à St. 2 Thlr. empfiehlt unter Garantie des mobilen Eintreffens beim Adressaten resp. Besteller, selbst bei Kälte

[800] **F. Sennhenn** in Cassel.

Wellenpapageien,

à Paar 5 Thlr. excl. Versandkäfig versendet gegen Nachnahme

[801] **Ferdinand Becker,** Naumburg a. d. Saale.

Die Abtheilung für Kanarienvogelzucht in Hannover offerirt ausgezeichnete gute, fehlerfreie **Roller,** von allen Sorten, bester Qualität, von 4—10 Thlr. pro Stück excl. Verpackung. [802]

Bestellungen nimmt entgegen der Abtheilungsvorsitzende Herr Hof-Knopfmacher L. Müller, Marktstraße 26.

NB. Die bestellten Vögel werden von der Ankaufskommission geprüft und für die Echtheit garantirt. Für die Abtheilung A. Weyland, Techniker, Nelkenstraße 16.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen folgende Thiere erhalten: 50 Paar weiße japanesische Mövchen, 25 Paar Wellensittiche, Bandfinken, Atlasvögel, Belgische Kanarienvögel, Inseparables, Bandsittiche, weißbäckige Bülbüls, violette Organisten, 85 Graupapageien, Blauraben; außerdem 1 Paar Lamas und verschiedene Affen, unter denen 10 Marmosets; sodann Goldkarpfen von China. [803]

Wellensittiche,

40 bis 50 Paar, hat abzugeben à Paar 5 Thlr.

[804] **Friedr. Seer, Rostock in Mecklenburg.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 1 Thlr. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

III. Jahrgang. Berlin, den 24. December 1874. Nr. 52.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Mit dieser Nummer schließt der Jahrgang 1874. Das Inhalts-Verzeichniss wird mit einer der nächsten Nummern ausgegeben.

Inhalt:

Beobachtungen über einige der besten einheimischen Sänger: I. Der Sprosser (Schluß). —
Zoologischer Garten in Düsseldorff. —
Gefiederte Welt im Osten (Schluß). —
Aus den Vereinen: Stettin. —
Ausstellungen: „Cypria" in Berlin. —
Anfragen und Auskunft: Nachtigal. —
Berichtigung. —
Anzeigen.

Beobachtungen über einige der besten einheimischen Sänger.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz (Böhmen).

I. Der Sprosser.

(Schluß.)

Die ersten Sprosser erscheinen in unserer Gegend gewöhnlich in den letzten Tagen des Monats April. Giebt es in dieser Zeit warmes und schönes Wetter, so ertönt auch überall schon ihr Schlag. Bei kalter und trüber Witterung dagegen läßt sich nicht einmal ein Lockruf aus irgend einem Gebüsch vernehmen, so daß man meinen könnte, sie wären noch nicht angekommen. — Unsere Stadt liegt auf einer bedeutenden Anhöhe an den Ufern des Prutflusses. An demselben erstrecken sich meilenweit dichte Weidenpflanzungen, welche an manchen Stellen einen waldartigen Charakter annehmen. Die Stadt selbst ist reich an vielen Laub- und Obstpflanzungen. Nun bleibt es eine merkwürdige Thatsache, daß der Gesang der Weidensprosser sich merklich von dem in dem Weichbilde der Stadt nistenden unterscheidet, und zwar in dieser Weise, daß der Weidensprosser jedenfalls ein vorzüglicherer Sänger zu nennen ist. Diese Weidenpflanzungen werden um die obengenannte Zeit von einer solch' riesigen Zahl Sprosser bezogen, daß fast in jedem zweiten Weidenbusche ein Sprosserpaar sein Nestgebiet sich erwählt, und bei einem Spaziergange über die Prutbrücke um die neunte Abendstunde kann man ein tausendstimmiges Sprosserkonzert hören. — In diesem Massengesange läßt sich aber wieder der Stümper und Anfänger vom vollendeten Künstler bei einiger Aufmerksamkeit erkennen und die Vogelfänger pflegen auch gewöhnlich des Abends die Vögel zu verhören, merken sich dabei einen bestimmten Busch, aus welchem ein vorzüglicher Sänger sein Lied erschallen läßt, wo sie dann zeitlich des Morgens ihre Falle legen. Es bleibt aber jedenfalls schwer, einen guten Sänger zu erhalten und dies aus folgenden Gründen. Die beste Zeit, einen Sprosser zu fangen, ist gleich nach seiner Ankunft, bevor er sich noch ein bestimmtes Nistgebiet erwählt. Es ist aber eine so ziemlich ausgemachte Thatsache, daß zuerst die jüngeren, vorzüglich einjährigen männlichen Vögel anlangen, während die Weibchen und älteren Vögel später, oft erst nach 10 bis 14 Tagen erscheinen, dafür aber

auch viel später wegziehen. Beginnt man also mit dem Fange gleich, sowie sich die ersten Sänger vernehmen lassen, so wird man bestimmt bloß junge einjährige Vögel erhalten, welche einen noch sehr unvollständigen Gesang haben. Solche Vögel sind sehr schlank gebaut, haben sehr dünne fleischfarbene, fast durchscheinende Beine, einen lichtern Schnabel und eine licht aschgrau gewölkte Brust, sind sehr feurig, schlagen oft schon in dem Korbe, in welchem sie nach dem Fange nach Hause getragen werden, gehen sehr leicht ans Futter und sind sehr fleißige, aber wie gesagt höchst unvollkommne Sänger. Ihr Gesang ist vor Allem ein zu hastiger, überstürzter. Die schönen Anfangsstrophen Pilip, Pilip — oder Tarák, Tarák — David, David fehlen und statt derer bringt der Vogel mehrere Male einige eigenthümliche ziehende, zischende oder gnatschende Töne hervor, an welchen sich gleich die abschlagende und das Lied beendende, aber schon ganz deutlich ausgebildete Strophe tak, tak, tak, im schnellsten Feuer vorgetragen, anschließt. Hier und da gelingt ihm auch ein Davidruf, aber man merkt aus seinem Gesange, daß er die höhere Schule noch nicht durchgemacht hat und dem Vogel jeder Ernst und die Fertigkeit abgeht, eine Strophe selbst zu dichten. Und in dieser Kunst ist ein alter guter Wildfang Meister. — Beginnt man aber mit dem Fange 10 bis 14 Tage später, so wird man unter 20 Wildfängen wiederum gute Zweidrittheile Vögel fangen, welche schon gepaart sind, die aber sämmtlich zu Grunde gehen, trotz aller angewendeten Vorsicht, sie zu bereits eingewöhnten Vögeln zu geben, ihnen blos lebende Mehlwürmer vorzusetzen u. s. w. So ein gepaarter Vogel tobt nicht so stürmisch im Käfige; er steht vielmehr eine Zeitlang sinnend, wie betäubt auf dem Boden desselben; nähert man sich ihm, so stürzt er einer bestimmten Richtung im Käfige zu, um dann wieder wie betäubt dazustehen. Er nimmt auch Mehlwürmer und frische Ameisenpuppen zeitweise zu sich, wird aber mit jedem Tage mißmuthiger und aufgedunsener. Die Kopffedern sträuben sich bedeutend auf, so daß der Kopf viel dicker aussieht, und eines schönen Morgens findet man ihn todt auf dem Rücken liegend mit ausgestreckten Beinen. Es scheint also, daß alle Vögel schon unterwegs sich mit ihren Weibchen vereint haben und wenn sie dann ein bestimmtes Nistgebiet sich erwählt haben, so sind sie schon geparte Vögel, welche die Trennung nur sehr schwer ertragen und darüber zu Grunde gehen. — Eine andere Schwierigkeit ferner, einen alten Wildfang zu erhalten, liegt in dem Umstande, daß alte Vögel viel vorsichtiger sind und nicht sobald in die Falle gehen wollen. Endlich muß ich noch bemerken, daß alte Vögel in viel geringerer Anzahl überhaupt vorhanden sind, als jüngere. Wenn ein Vogel in der Gefangenschaft 10 bis 15 Jahre und manchmal noch länger aushält, so zweifle ich doch sehr, ob auch die Sprosser im Freien ein solch' hohes Alter erreichen. Wenn dem so wäre, so müßte die Zahl solcher Vögel in der Natur in auffallender Weise zunehmen, während man wenigstens bei den Weichfressern das Gegentheil bemerkt. Meine Ansicht ist diese, daß ein Sprosser im Freien höchstens 3 bis 5 Jahre alt werden kann. So ein alter Wildfang also, der sich noch mit keinem Weibchen vereint hat, beginnt manchmal schon nach 8 bis 10 Tagen in der Gefangenschaft zu schlagen und der Kenner wird bereits nach den ersten Tönen wissen, was für einen Vogel er vor sich hat. Er ruft nicht nur deutlich Pilip, Pilip — Tarák, Tarák — David, David, er repetirt sogar dieselbe Strophe dreisilbig, also Pipilip, Pipilip — Talarak, Talarak — Dadavid, Dadavid u. s. w. Ueberhaupt unterliegt der Vortrag seiner Strophen einem steten Wechsel und der Gesang ist nie einförmig nach einer bestimmten Leier, sondern voller reizender Abwechselungen, welche eben von der Stimmung des Vogels und daher von der Pflege und seinem Wohlbefinden abhängen. Doch fehlt der Vortragsweise im ersten Jahre der Gefangenschaft noch Kraft und Feuer, welche er erst im nächsten Jahre inne hat. Sehr viele Wildfänge schlagen gar nicht im ersten Jahre der Gefangenschaft, sondern müssen erst im Käfige überwintern, wo sie dann im Januar, spätestens März, anfangs leise, mit dem Größerwerden des Tages aber immer deutlicher und kräftiger schlagen. Jeder Sprosser, auch der einjährige, wird in der Gefangenschaft im Laufe der Jahre ein immer besserer Sänger und mancher Sprosser entzückt seinen Pfleger mit einer langersehnten und gewünschten Tour erst im 2. oder 3. Jahre der Gefangenschaft. Die meisten Sprosser sind ferner auch Nachtschläger, aber nur unter gewissen Bedingungen. Er muß nämlich ausschließlich mit frischen Ameisenpuppen gefüttert, an's Fenster gestellt und die Frontseite des Käfigs verhängt werden. Vor's Fenster soll man einen Sprosser aber nicht eher bringen, als bis die Nächte im Monate Mai schon ganz warm sind. Dabei muß man aber noch diese Vorsicht gebrauchen, den Käfig vor der Gesangszeit und auch im Beginn derselben von Zeit zu Zeit, etwa alle vier Wochen, an eine andere Stelle zu hängen.

Im Freien schlagen fast alle Sprosser im Beginne ihrer Gesangszeit auch des Abends und während der Nacht. Dieser Nachtgesang scheint bei den meisten Sprossern so lange zu dauern als das Gelege noch nicht vollendet ist. Wie einmal das Brüten beginnt, hört bei den meisten Sprossern der Nachtgesang auf und auch der Gesang bei Tage wird nicht mehr so eifrig ausgeübt. — Bei den Sprossern und Nachtigalen nämlich wechselt das Männchen mit dem Weibchen im Brüten ab und es ist mir wol schon vorgekommen, daß ein während der Brutzeit eingefangenes Männchen, im Käfige sich im Sande eine Mulde einscharrte, und sich in derselben so zurechtsetzte, als ob es brüten würde, ganz in der Weise wie Kanarienhennen, denen man die Eier aus dem Neste wegnimmt,

auch noch einige Zeit hierauf im leeren Neste brüten. — Manche Sprosser dagegen lassen sich auch noch während der Brütezeit des Nachts sehr fleißig vernehmen und es scheinen dies ungepaarte oder mit einem ganz besondern Gesangsfleiß begabte Individuen zu sein. Der eigentliche Gesang der Sprosser im Freien dauert bei uns bis 15. Juni. Von dieser Zeit an lassen sich noch durch 2 bis 3 Wochen hier und da einzelne abgebrochene Strophen hören. Es ist dies der Zeitpunkt, wo das Pärchen mit der Auffütterung der Jungen beschäftigt ist. Mit dem Flüggewerden der Jungen beginnt auch schon die Mauser, welche im Freien kaum 3, höchstens 4 Wochen zu dauern scheint, und Mitte August beginnt die Zugzeit. Der Zug der Sprosser ist höchst interessant. Sie ziehen nämlich nicht in Schwärmen hoch in den Lüften, sondern einzeln streichen sie von Gebüsch zu Gebüsch, halten sich auch einige Zeit in denselben und in der Nähe derselben am Boden auf, lesen fleißig alle möglichen Räupchen und Insekten ab, nehmen auch von Zeit zu Zeit mit Beeren, besonders Hollunderbeeren vorlieb, besetzen alle möglichen auch die kleinsten Pflanzungen, erscheinen auch in großer Zahl in den Gemüsegärten, vorzüglich in Kohl- und Krautpflanzungen und so geht es fort bis Mitte Septembers, indem immer die wegziehenden durch andere von nördlicheren Gegenden ersetzt werden. In der ersten Hälfte der Zugzeit sind nur junge Vögel zu sehen. In der zweiten Hälfte und vorzüglich gegen Ende derselben ziehen die älteren Vögel und es bleibt daher der Monat September als die beste Zeit, einen guten alten Wildfang zu erhalten. Um diese Zeit lassen die alten Vögel im Freien wieder einzelne Strophen ihres Gesanges ertönen (doch niemals bei Nacht) und verrathen sich dadurch sehr leicht dem Vogelsteller. Die um diese Zeit gefangenen alten Wildfänge gehen sehr leicht an's Futter; dasselbe muß ihnen aber sehr knapp gereicht werden, weil die Herbstsprosser ohnehin sehr fett sind und dann im Käfige bei zu reichlicher Fütterung fettige Degeneration der Eingeweide erwerben können. In den letzten Tagen des Monats September ist bei uns im Freien kein Sprosser mehr zu sehen. — Es bleibt mir noch übrig ein Wort über hiesige Verhältnisse der Vogelpflege und Vogelliebhaberei zu sprechen. — Dieselbe bewegt sich wie überhaupt in ganz Oesterreich so auch hier in sehr engen Grenzen. Ich kann sagen, daß mir kein Liebhaber in der ganzen Provinz bekannt ist, der außer mir auch exakt Vögel pflegen und züchten sollte. Erst durch mich werden Proselyten hier geschaffen. Dagegen werden inländische Vögel schon mehr gehalten und besonders Körnerfresser. Unsere Liebhaber rekrutiren sich hier vorzüglich aus dem niederen, besonders Handwerkerstande, und diesen Leuten erscheint das Pflegen von Weichfressern zu kostspielig und auch unbequem. Trotz ausgedehnter Waldungen lassen sich sehr schwer Leute finden, welche sich mit dem Sammeln von Ameiseneiern abgeben sollten, und ich bin genöthigt, für meine Vogelstube Ameiseneier von auswärts zu beziehen. Vogelhändler im eigentlichen Sinne des Wortes, giebt es hier keine, wol aber einige und wieder besonders dem Handwerkerstande angehörige Leute, welche meistens ohne alles Verständniß für die Güte eines Vogels, sich mit dem Vogelfange beschäftigen und ihre Gefangenen dann an den Liebhaber um einen gewöhnlich gering zu nennenden Preis losschlagen. — So wurden namentlich sehr viele Sprosser mir gebracht, von denen die meisten beim Abhören sich als Stümper, junge Vögel oder gar Weibchen ergaben. Der gewöhnliche Liebhaber begnügt sich mit jedem Sprosser — er soll nur überhaupt schlagen. — Endlich fällt noch dieser Umstand in die Wagschale, daß die österreichischen Postämter in der Regel Vögel zum Versenden nicht annehmen wollten; doch für Czernowitz ist es mir bereits gelungen, die Annahme lebender Vögel auf dem hiesigen Postamte zur Weiterbeförderung durchzusetzen. — Vorläufig wurden blos Sprosser ausgeführt.

Zoologischer Garten in Düsseldorf.

Der Verein „Fauna" hatte uns einen Aufruf zugesandt, welchen wir soeben aufnehmen wollten, als uns Herr Dr. Schönfeld die erfreuende Nachricht zugehen ließ, daß dies nicht mehr nöthig sei — da das zur Errichtung des zoologischen Gartens in Aussicht genommene Kapital bereits gezeichnet worden. Zu diesem schönen Beginn sprechen wir unsere aufrichtigsten Glückwünsche aus und entnehmen dem Aufruf nun wenigstens noch das Folgende. Das Grundkapital beträgt 150,000 Thaler. Was könnte unseres Interesses würdiger, sagt der Aufruf, was lohnender sein, als nach den Mühen des Tages und dem rastlosen Treiben der Zeit, die Stunden der Erholung mit einem anregenden Zweck zu verbinden, wie ihn die Beschäftigung mit der Natur gewährt. Sie bietet ja Dem immer neue Gaben und Genüsse aus ihrem unerschöpflichen Schooße, der ihr mit empfänglichem Sinne nahe tritt. Sie erschließt ihm ja auch ihre geheimnißvollen Wunder in so dankbarer, verschwenderischer Fülle, daß er sie immermehr zu verwerthen und dem Wohle der Menschheit nutzbar zu machen befähigt wird . . . Jedem Stande, jedem Alter und Geschlecht wird ja unser gastlicher „Faunagarten" etwas bringen. Diesem freundliche Stunden behaglicher Ruhe nach der Arbeit, jenem Belehrung und wissenschaftliche Befriedigung, der Jugend Liebe zur Natur und Pietät vor ihrem Schaffen und Walten. Jedem aber, der dem Unternehmen hülfreiche Hand geboten hat, den nachhaltigen Dank aller Bewohner unserer Stadt, wie der kommenden Geschlechter. Und in der Einsicht von der Wahrheit dieser Worte hat die Bewohnerschaft der Stadt Düsseldorf in überraschend kurzer Zeit das Bestehen des Unternehmens gesichert.

Gefiederte Welt im Osten.

Palmyra.

(Schluß).

Schon im August kommt aus der Familie der Meisen, gleichsam als Quartiermacher, die ewig unruhige, große Kohlmeise an. Mit pink, pink und schüt, schüt, bald in größeren und kleineren Rudeln das Baumwerk nach Kerfen absuchend, am Stamm bis in die obersten Zweigspitzen kletternd, hinter jeder Rindenschuppe nach einem Lärvchen spähend, an den kleinern Zweigen sich in allen erdenklichen Stellungen aufhängend, um zu den in Blatt- und Augenwinkeln verborgenen Leckerbissen zu gelangen. So treibt sie es den ganzen Winter, immer fröhlich, trotz Kälte und manchmal auch Hunger, mischt sich dann sogar unter die Sperlinge, um zwischen den Wohnungen nach einem Bissen zu fahnden. Auf diese folgt bald die niedliche Blaumeise; ebenfalls in gleicher Weise, in Rudeln von 10—20 Köpfen, wie auch einzeln zwischen Kohlmeisen, sich herumtreibend. Im März verlassen sie uns wieder, um nach den entfernteren Nadelwaldungen zu ziehen. Selten finden sich einige der kleinen Kohl-, wie der Sumpf- oder Aschmeise oder der nahen Verwandten, der Spechtmeise, ein. Hingegen beehren uns Züge von 20—50 Köpfen der Schwanzmeise; aber blos in denjenigen Wintern, wenn die Eichen und Ulmen der Parkanlagen in der Raupennesterblüte stehen.

Diese sogen. Blütezeit kann ich nicht umhin, mit einigen Worten näher zu erklären. Die Raupennester gehören dem Goldafter (oder auch große Nesterraupe genannt) an, sind faustgroße Gespinnste, die von den, zu Ende Sommers aus den Eiern gekrochenen, noch ganz kleinen Räupchen dieses Schmetterlings an den äußern Zweigspitzen der Eichen und Ulmen zu Winterquartieren gesponnen werden, wodurch, wenn diese Nester — wie es alle 3—4 Jahre vorkommt — massenhaft vorhanden sind, die Bäume im Winter ein ganz merkwürdiges Aussehen, gleich als ob sie blühen würden, erhalten.

Kommt nun ein großer Theil dieser Raupen durch den Winter, so sehen im Mai die Bäume traurig aus, denn diese Raupe entblättert mit ihrer staunenswerthen Gefräßigkeit ganze Waldungen! Dank der Mutter Natur dafür, daß sie uns als Helferin die Schwanzmeise, wie noch manch' andere wirksame Mächte sendet, da der Mensch allein, diesen Feindeslegionen gegenüber ohnmächtig dasteht.

Also diese Meise besucht auf ihren Winterzügen blos die Gegend, wo eine gute Raupenernte voraussichtlich ist. Man sieht sie dann zu bestimmten Tageszeiten in gewissen Richtungen, zirlend von Baum zu Baum schwirren, in allen möglichen Stellungen sich an den Nestklumpen aufhängend, mit dem spitzen Schnäbelchen, mit ganz bewunderungswürdiger Kraft auf die Nester loshacken, daß die Fetzen wie Schneeflocken herumfliegen und den Kern, in den kleinen Räupchen bestehend, mit großem Wohlbehagen verzehren. Die beiden erstgenannten Arten gehen diese Nester zwar auch an, doch ist ihr Auftreten mit letzterer nicht zu vergleichen, die ihren Strich ohne Abweichen durchzieht und morgen wieder von vorn beginnt, wogegen Kohl- und Blaumeise die Sache viel zu leichtsinnig betreiben, in jeder Minute wo anders hinflattern. Hat diese Raupe einmal ihr Gespinnst verlassen, so wird sie außer dem Kukuk von keinem andern Vogel mehr gefressen. Alle behaarten Raupen, und besonders diese, kann der Mensch nicht ungestraft berühren, indem die Haare, mit der Haut in Berührung kommend, die unangenehmste Entzündung hervorrufen. —

Von dieser großen Vogelfamilie (den Meisen) kommen in unsere Gegend nur sehr wenige Arten. Diese leisten aber im Vertilgen von Insekten unter allen Kerbthierfressern das Meiste, so daß sie also bei der Aufzählung der nützlichen Vögel unbedingt den ersten Rang einzunehmen haben und daher ohne Frage die größtmögliche Schonung und Hegung verdienen.

Der so hurtig, mäuseartig durch das Gebüsch huschende Zaunkönig kommt gewöhnlich mit den Meisen an, jedoch nur in einzelnen Exemplaren, und erfreut in hellen Wintertagen das Ohr oft mit seinem, um diese Zeit doppelt angenehmen Gesang.

Ebenfalls als Insektenvertilger vom reinsten Wasser sind zwei Spechtarten, der Grün- und der kleine Buntspecht zu den einrückenden Gästen zu zählen. Stamm und Aeste der Bäume werden in spiralförmigen Windungen, behufs der Kerbthierjagd abgeklettert, dabei, um recht gründlich zu sein, wird meist unten am Stamme angefangen. Bei diesem Klettern, oder man muß es vielmehr ein schnelles Laufen nennen, wissen sie sich ausgezeichnet des steifen Schwanzes als Stützpunkt zu bedienen. Jede hinter Rinde oder Splint verborgen liegende Larve eines Bohrkäfers wird gewittert, worauf mit dem starken, spitzen Schnabel gleich einem Holzhacker darauf losgezimmert wird, um den Gang bloßzulegen und der Insasse, wenn auch nicht sichtbar, wird dann mit der dehnbaren, wurmförmigen Zunge aus seiner Einschachtelung herausgeangelt. Der Grünspecht sucht gern die Holzwände der Gebäude nach Kerfen ab und läßt regelmäßig bei seinem surrenden Abfliegen den weithin schallenden Lockton hören. Mit Beginn des Lenzes verschwinden auch sie wieder.

Nicht alle Jahre stellt sich für den Winter in den Gärten, der auch im Süden, wo Eichenwaldungen vorhanden, als Standvogel lebende Eichel- oder Holzheher ein. Sie erscheinen nur in denjenigen Parkanlagen, wo Eiche der vorherrschende Baum ist und es ihnen also nicht an Eicheln fehlt. Ich glaube kaum, daß sie aus Nahrungsmangel die Gärten aufsuchen, eher der Lust des Vagabundirens wegen. Es zeigen sich meist blos vier bis sechs Stück. Diesen Vogel in seinem possirlichen Treiben zu beobachten, macht vielen Spaß; alle Augenblicke entfaltet er neue Reize. Ich möchte ihn den Affen unter den europäischen Vögeln nennen. Von jung aufgezogenen

Hehern werde ich später einmal berichten, denen man trotz aller ausgeführten Lumpenstreiche nicht böse sein könnte. —

Nimmt der Herbst bald Abschied und macht hier und da schon einem winterlichen Tage Platz, so wird man von einem neuen Gast, dem Gimpel oder Dompfaff mit seinem melancholischen „duh, duh" begrüßt. In der Frühe, wie auch um die Mittagszeit an hellen Tagen, sieht man sie in Gesellschaften von 10 bis 30 Köpfen herumstreichen, da und dort auf einem einzelnen Baum einfallen, dabei neben dem Lockton, den nicht von Jedermann ansprechend genannten Gesang hören lassend, der in einigen Strophen allerdings dem Gequikse eines ungeschmierten Schubkarrens ähnelt. Die übrige Zeit wird auf der Erde Nahrung suchend zugebracht, wobei er sich etwas plump benimmt, wie überhaupt der ganze Vogel ein ziemlich plumpes Aussehen hat. Vorzüglich halten sie sich gern unter und auf Ahornbäumen auf, und es ist zu komisch mit anzusehen, wie die ganze Gesellschaft, mit der ernstesten Miene die gefiederten Samen kauend, dasitzt. Wenn auch sein Naturgesang nicht jedem Liebhaber ansprechend dünkt, so entschädigt er im Käfig reichlich durch sein zutrauliches, liebenswürdiges und dabei anspruchsloses Wesen; besonders wenn mehrere Paare im geräumigen Käfig zusammengehalten werden, ist es reizend, mit anzusehen, wie fortwährend gekost, geschnäbelt und gefüttert wird. Im März zieht auch er wieder nach den nördlicher gelegenen Nadelwaldungen. Von den in Nordrußland lebenden schönen Gimpelarten dringt selten einmal einer bis zu uns herunter.

Auch der Buchfink ist sehr wenig zu treffen; er wie seine nahen Verwandten, der Grünfink, der Bluthänfling und Birkenzeisig, zählen zu den spärlich erscheinenden Wintergästen. Der Birkenzeisig kommt in manchen Wintern in größeren Schwärmen nach den Gärten und scheint mir in den Erlen- und Birkenbeständen, die bei größeren Sümpfen zu finden sind, auch als Standvogel zu leben, da ich auf Jagden im August daselbst eine beträchtliche Anzahl zu sehen Gelegenheit hatte.

Stieglitz und Leinzeisig machen die überwiegend größere Zahl aller bei uns im Winter erscheinenden Vögel aus. Vom Stieglitz sind Flüge von über 100 Köpfen tagtäglich zu beobachten. Sie streichen beständig hin und her und halten sich am liebsten in der Nähe großer Wirthschaftsgehöfte auf, denn dort finden sie die dem Namen Distelfink entsprechende Nahrung in Hülle und Fülle. Gewöhnlich liegen neben diesen Gehöften große, unbebaute Flächen, oft von solchem Inhalt, daß Mancher in Deutschland, als Eigenthümer derselben, sich als Gutsbesitzer fühlen würde. Auf diese Ländereien werden alle möglichen, unbrauchbaren, meist pflanzlichen Abfälle hingefahren, wozu auch der Dünger gehört, der in der hiesigen Landwirthschaft, der vorhandenen unübertrefflichen Bodenkraft wegen, keine Verwendung findet, auch im Verhältniß zum großen Viehstand nicht sehr reichlich erzeugt wird, da das gesammte Vieh, wenn nur die Witterung nicht zu schlimm, sich im Freien herumtreibt. Auf diesen Strecken entstehen dadurch ganze Humuslager, auf denen sich den Sommer über, gleich tropischen Gebilden von riesigen Dimensionen, verschiedene Distelarten entwickeln. In diesen Distelwaldungen findet der Stieglitz im Winter sein Eldorado. Hunderte und abermals Hunderte sieht man dann herumklettern, mit dem Enthülsen der Samenköpfe beschäftigt, und mit einmal fliegt der ganze Schwarm mit Gedidel und Gezwitscher davon. Der ganze Flug liebt dann nach Sättigung, sich auf einem einzeln stehenden Baum nach einigen graziösen Umkreisungen niederzulassen, und dann geht ein Gesurr und Gezwitscher los, sodaß von dem sonst ganz guten Gesange des Stieglitzes nichts mehr herauszufinden ist. Dieser Vogel ist so ziemlich der einzige, der in hiesigen Bauernstuben als Gefangener angetroffen wird; meist aber blos den Winter hindurch, denn diejenigen, die das Frühjahr erleben, wissen sich dann meistens selbst in Freiheit zu setzen, da sie gewöhnlich in der Stube frei herumfliegend gehalten werden.

Der Leinfink kommt in gleich großen Zügen, als der Distelfink, vom Norden an, und findet seinen Tisch so gut gedeckt, wie Jener, da neben diesen Disteln noch eine Fuchsschwanzart gedeiht, dessen feiner Samen ihm vorzüglich zu munden scheint. Ist die Witterung günstig, so hält er sich mehr an den durch die Steppe führenden Wegen auf, wo ihm links und rechts verschiedene Unkrautsämereien reichlich Nahrung liefern. Treten starke Schneestürme ein — deren Wucht man erlebt haben muß, um sie zu verstehen — so geht es diesen kleinen Vögelchen oft recht kümmerlich, da sie dann hinter dem Unkrautgebüschen Schutz suchen, und dabei oft buchstäblich in kurzer Zeit vom anwehenden Schnee verschüttet werden. —

Aus der Familie der Ammern bevölkert in großer Menge alle Gehöfte und Wegränder der Goldammer. Neben diesem treffen hier und da noch einige der sibirischen Arten hier ein, doch meist nur vereinzelt.

Selten, seit meinem Hiersein erst zweimal, bekamen wir aus dem hohen Norden von dem schön gefiederten Seidenschwanz, in Trupps von 6—16 Köpfen, Besuch. Von Baum zu Busch streichend, nach Beeren und dergleichen suchend, macht er sich gleich durch seinen zirpenden Lockton bemerkbar, den er gern im Fluge, wie beim Aufflug vernehmen läßt. So dumm und plump als er, scheint mir kein anderer Vogel zu sein; in jede, wenn auch noch so selbstverrätherische Falle geht er, und im Augenblick ist der ganze Trupp in die Hände zu bekommen. Den Käfig ziert dieser Vogel allerdings durch sein wahrhaft prachtvolles Gefieder; sonst entfaltet er aber sehr wenig Anziehendes. Fressen und Misten machen seine Hauptbeschäftigung aus. Im Letztern hauptsächlich entwickelt er ein großes Virtuosenthum, so daß ich fast vermuthen

möchte, seine Ausgabe ist größer, als die Einnahme. Nach meinen Erfahrungen an zwei Pärchen scheint er niemals gegen seinen Pfleger zutraulich zu werden, und im Ganzen genommen sehr wenig geistige Begabung zu zeigen. Im Sommer müssen sie, will man sie nicht schnell verlieren, vor zu großer Wärme, d. h. Sonnenhitze, sehr in Acht genommen werden; auch über die Mauserzeit bedürfen sie vorsichtiger Pflege, da sie diese schwer durchzumachen scheinen.

Mit diesem Vogel will ich meine Schilderung schließen, obgleich mir bewußt ist, daß ich so manches Interessante nicht erwähnte. Der gütige Leser muß entschuldigen, wenn ich nicht viel Neues geboten haben sollte. Ist die Mannigfaltigkeit der Vögel hier auch der in manchen andern Ländern nicht gleichzustellen, so treten dafür die meisten Arten in bedeutenderer Anzahl auf. —

Schließlich kann ich nicht umhin, in der so oft schon beregten Frage über Vogelschutz auch einige Worte anzufügen. In verschiedenen Fachschriften (d. h. landwirthschaftlichen und gärtnerischen) kommen Aufsätze über dieses Thema, mit verschiedenen Ansichten über den Vogelschutz vor, oder es wird vielmehr über das Wie und Warum der Abnahme der nützlichen Vögel gepredigt, und da finde ich nicht selten, daß die Schuld der Abnahme allein dem Vogelfang und der Liebhaberei der Käfigvögel in die Schuhe geschoben wird. Was den Vogelfang — das ist in welcher Art er betrieben wird — anbelangt, so hat es größtentheils seine Richtigkeit, und derselbe verdient allerdings ganz verboten oder doch in gewisse Formen eingedämmt zu werden; denn wenn oft Hunderte der nützlichsten Vögel gefangen, um für die Küche hingemordet zu werden, so trägt solches Verfahren ohne Zweifel zu einer Abnahme der Vögel bei. Auch der Fang der Käfigvögel sollte meines Erachtens nur zu gewissen Zeiten betrieben werden dürfen. Erst lasse man die Vögel ihre Brut vollenden, und dann schaffe man sich die gewünschten an; dadurch wäre dann die Verminderung der Vögel geringer, als wenn der Fang schon im Frühjahr vor der Vermehrung geschieht. Doch wird die geringe Anzahl Vögel, die der Liebhaber der Freiheit für den Käfig entnimmt, bei genauer Untersuchung, niemals als Ursache der allgemeinen Abnahme der Vögel gelten können; im Gegentheil, der Liebhaber ist es, der das meiste Verständniß für diese lieben Geschöpfe hat, und nicht allein seine Gefangenen pflegen, sondern auch den Freilebenden den größtmöglichsten Schutz angedeihen lassen wird!

Wie aus meiner Darstellung zu ersehen, sind wir hier an nützlichen Vogelarten gar nicht arm, dennoch haben wir oft über den verheerendsten Raupenfraß zu klagen. Diese Angabe bitte ich aber nicht zu mißverstehen, als ob ich den großen Nutzen der Vögel unterschätze; im Gegentheil, in meinem Fache wurde mir oft Gelegenheit genug zu Theil, die Nützlichkeit vieler Vogelarten eingehend würdigen zu lernen. Daß die Vögel allein aber nicht Alles bewältigen können und noch manche andern Mächte am Vernichtungskampfe Theil nehmen müssen, das weiß ja Jeder, der sich ein bischen um den Haushalt der Natur kümmert. Alles ist wohlweislich geordnet, die Vögel werden nicht allein wegen der Insekten, und die Insekten nicht allein der Vögel wegen da sein.

Um auf den Hauptgrund der Abnahme vieler Vogelarten zu kommen, so dürfte dieser eher darin zu suchen sein, daß, wie in allen Ländern, wo die Kultur auf hoher Stufe steht, jeder unnütze Baum und Strauch weggefegt wird, um aus diesem, wenn auch kleinen Fleck, einen lohnenderen Ertrag zu ziehen. In diesem Punkt schafft der Fortschritt selbst an der Verminderung seiner treuen Gehilfen; dieselben sehen sich ihrer natürlichen Brutstellen beraubt, verlassen eine Gegend, und der oberflächliche Urtheiler gibt die Schuld dem Liebhaber.

Keine kleine Anzahl von Vögeln aller Arten geht durch Menschen und verschiedenes Raubzeug zu Grunde, und zwar ebensowol von den Abziehenden am schwarzen Meere und Griechenland, als auch von Denjenigen, die aus Deutschland den Strich durch Italien nehmen. Im Verhältniß zu solcher Massenvernichtung ist keine Abnahme zu bemerken; im Gegentheil glaubt man wenigstens bei uns in jedem Jahre eine größere Anzahl einrücken zu sehen. Warum? Weil es ihnen nirgends an den erwünschten Brutstellen fehlt!

Das ewige Hin- und Herstreiten um den Schutz der Vögel nimmt sich, von der Ferne angehört, da keine allgemeine Einigung zu Stande zu kommen scheint, ganz unbegreiflich aus. Meiner und gewiß vieler Anderer Ansicht nach wäre es doch wol das Beste, daß einmal sämmtliche tüchtige Ornithologen aller Länder zusammentreten, um eine feste allgemeine Verständigung in dieser Sache anzubahnen, welche dann durch die Gesetzgebung aller Staaten als allgemeines Vogelschutzgesetz angenommen und aufgestellt werden müßte. Damit Punktum, weiter will ich nichts gesagt haben, um am Ende keine bösen Geister gegen mich heraufzubeschwören!

E. Lieb in Palmyra,
Rußland.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Stettin.

Außerordentliche Generalversammlung vom 25. November. Zum ersten Vorsitzenden wird Herr A. Reimer und zum dritten Schriftführer Herr Fabrikbesitzer Dupont gewählt. Beide Herren nehmen die Wahl mit einigen Worten des Dankes an. — Herr Freese spricht über das in unserer Provinz hinsichtlich seines Nutzens vielfach verkannte Perlhuhn, und giebt eine ausführliche Beschreibung desselben. Der Charakter des Perlhuhns gehört allerdings nicht zu den sanftesten, es ist beim Futternapf zänkisch, indeß kaum mehr als manche Hühnerrassen und auf einem größeren Geflügelhofe wenig auffallend. Jedenfalls sind die Perlhühner von dieser Seite in allen Fachschriften zu schwarz geschildert, und ebenso ist dies der Fall hinsichtlich ihres

unmelodischen Geschreis. Die genannten kleinen Unannehmlichkeiten werden jedoch durch ihren Nutzen vollständig aufgewogen. Die ausgestellte Henne war fast die fleißigste Eierlegerin auf dem Geflügelhofe des Redners, sie fing sehr frühe im Jahre damit an und hörte erst im Spätherbste auf. Das Ei hat die Größe eines kleinen Hühnereies, ist von vorzüglichem Geschmack und großem Dotter. Da die Henne es liebt, die Eier möglichst versteckt zu legen, so muß man sie jeden Morgen sorgfältig untersuchen, sie eingesperrt halten und ihr Nest aus Strauchwerk herrichten lassen. Das Fleisch des Perlhuhns ist von sehr angenehmem Geschmack, und ähnelt dem des Rebhuhns. Redner spricht am Schlusse seiner Schilderung den Wunsch aus, daß seine Empfehlung dazu beitragen möge, diesem vielfach falsch beurtheilten schönen Thiere zu größerer Anerkennung zu verhelfen. — Herr Prütz hält einen längeren Vortrag über Schwirrvögel.*) — Herr Conradt hatte einige der in hiesigen Blättern ausgebotenen sogenannten norwegischen Riesenkrammetsvögel ausgestellt, die jedoch als Misteldrosseln (Turdus viscivorus) bestimmt wurden. — Die Vorbereitungen zu dem von und unter den Mitgliedern der Abtheilung für Singvögel am 20. Dbr. zu veranstaltenden Kanarienvogel-Markte wurden den Herren Maader, Quandt, Cohn und Tincauzer übertragen. — Die von den Herren Brandner und Grimm der Versammlung überwiesenen Vögel, sowie die obigen Krammetsvögel gelangen auf Wunsch der Geber zur Gratisverloosung. — Herr A. Mellin zeigt sogenanntes Eierbrot vor, ein vorzügliches Hülfsmittel zur Aufzucht von Prachtfinken, wenn dasselbe gerieben und mit getrockneten, gequellten Ameiseneiern gereicht wird. In Wasser eingeweicht und ausgedrückt, fressen es alle Prachtfinken und Papageien, vorzugsweise auch die Kanarien gern. — Aufgenommen wurden 3, angemeldet 4 neue Mitglieder. Sitzung vom 9. Dezember. In der sehr zahlreich, auch von auswärtigen Mitgliedern besuchten Versammlung fand der Vortrag des Herrn Hauptmann Bödicker über „Krähenhütte und Raubvogeljagd"*) die ungetheilteste Anerkennung, welche ihm durch Erheben von den Sitzen ausgesprochen wurde. Von den im Monat November eingesandten 140 Raubvögeln der verschiedensten Arten war eine große Anzahl in naturgetreuester Stellung präparirt und zur Ansicht ausgestellt. Besondere Aufmerksamkeit aber erregte der dem Vereine gehörige lebende Uhu, der im Laufe dieses Winters seine praktische Verwendung auf einer zu erbauenden Krähenhütte finden wird.

Ausstellungen.

Die dritte Ausstellung des Vereins **„Cypria"** in Berlin findet in den Tagen vom 5. bis einschließlich 9. Februar 1875 in den glänzenden Räumen der Passage (Kaisergallerie), Eingang Behrenstraße, statt. Die Anmeldungen müssen bis zum 25. Januar dem Herrn Sekretär Wagenführ, Zoologischer Garten von Berlin, eingesendet sein. Eine Verloosung findet statt, à Loos 1 Mark, in 5000 Loosen; die Gewinne werden in kostbaren Taubenrassen, feinen Stämmen Hühnern, großen und kleinen Papageien wie verschiedenen fremdländischen Vogelarten bestehen. Dieselbe findet den 10. Februar, Vormittags 11 Uhr statt. Entree zur Ausstellung am 5. und 6. Februar für die Person 1 Mark, an den drei anderen Tagen ½ Mark. Prämien: silberne und bronzene Medaillen des landwirthschaftlichen Ministeriums, ferner 15 große silberne und 20 große Bronce-Vereinsmedaillen (neuer Stempel). Zwei Komité's sind erwählt; ein Festkomité für die Dekoration nach innen und außen, bestehend aus den Herren Kaufmann Brebeck, Geh. Rath Keller, Hoflieferant Schneider, Fabrikant Pausch, Baumeister Wegener und Sekretär Wagenführ; sodann ein Ausstellungskomité aus den Herren Rentier Koppe, Verlagsbuchhändler Moeser, Sekretär Wagenführ. Als Preisrichter sind erwählt für die

I. Sektion Tauben: von hier die Herren Direktor Dr. Bodinus, Haushofmeister Meyer, Klempnermeister Petzoldt; Stellvertreter Rentier Koppe; außerhalb die Herren Pepys-Köln, du Roy-Braunschweig, W. Birk-Wiesbaden, Ortlepp-Magdeburg und Springer-Altenburg. Die ersteren drei haben leider bereits abgeschrieben, deshalb bleiben nur die beiden Herren Ortlepp und Springer.

II. Sektion Hühner: von hier die Herren Dr. Bodinus, Meyer, Rentier Kuntze; Stellvertreter Koppe; von außerhalb die der ersten Sektion, also Ortlepp und Springer.

III. Sektion Ziervögel: von hier die Herren Dr. Bodinus, Dr. Ruß und Wagenführ; von außerhalb die Herren Graf Rödern Breslau und Graf York von Wartenburg auf Schleibitz.

Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Sekretär Wagenführ, sowie vom Herausgeber dieses Blattes Dr. Karl Ruß in Steglitz zu beziehen ist.

*) Diesen Vortrag bringen wir hoffentlich zum Abdruck und lassen daher das darauf Bezügliche im Bericht fort.
D. R.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Ich bin im Besitze einer Nachtigal, welche ein Geschwür an dem rechten Auge hat. Ich stach dasselbe schon einmal auf, daß der Unrat herauslaufen konnte. Es wurde jedoch immer schlimmer, so daß sich jetzt das Geschwür um das ganze Auge herumzog und der Vogel den Schnabel nur zur Hälfte zumachen kann. Da ich eine ähnliche Krankheit in keinem meiner Bücher beschrieben finde, so möchte ich bitten, mir Ihren ärztlichen Rath zu Theil werden zu lassen.

Antwort. Wenn die Anlage zu Geschwüren nicht bereits, vielleicht durch unnaturgemäße Fütterung, den Körper des Vogels durchdrungen, so können Sie dasselbe wol unschwer durch Bepinselung mit einer sehr verdünnten Auflösung von Höllenstein in destillirtem Wasser (aus der Apotheke zu holen) beseitigen und heilen. —

Berichtigung.

In Nr. 11 des Jahrgangs 1874 dieser Zeitschrift sind von mir zwei Staare Acridotheres cristatellus und cristatelloides besprochen worden. Nachträglich habe ich durch Vergleichung der auf dem Museum der Berliner Universität vorhandenen Exemplare festgestellt, daß ich beide, einander sehr nahe stehenden Arten verwechselt habe. Der von mir erwähnte kleinere Vogel ist A. cristatelloides Hogd., der größere der ächte cristatellus, Vieill., Cab. (philippensis, Bonap).
v. Schlechtendal.

*) Wir hoffen dasselbe. D. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Einen meiner vorzüglichsten Sprosser gebe ich in Tausch für zwei Paare nistfähiger, kräftiger und bewährter Wellensittiche.

Dr. Lazarus
[805] in Czernowitz (Oestreich).

Billige Kanarienvögel!

Um schnell mit meinem Vorrath zu räumen, verkaufe ich Harzer Kanarienhähne à 2 Thlr. pr. Stück, Harzer Kanarienweibchen à 7½ Sgr. pr. Stück.

Ad. Spindler
[806] in Hilden.

Verein der „Vogelfreunde" zu Nürnberg

erlaubt sich den Herren Geflügelbesitzern zur vorläufigen Kenntnißnahme unsere

IV. Große Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit Verloosung und Preisvertheilung hiermit anzukündigen und zwar für die Tage vom 24.—31. Januar 1875. Dieselbe wird im Saale des **Fiskaltszwinger** stattfinden. Das Programm erfolgt später.

David Schmidt,
[807] Komitévorsitzender.

Die Vogelhandlung

von D. Dufour, Behrenstrasse 51
Passage-Gebäude,
empfiehlt die schönsten Papageien, grau und grün, zahm und gut sprechend, alle ausländischen kleinen Vögel, gutpfeifende Dompfaffen, die schönsten Harzer Kanarienvögel, Lichtschläger, schlagende Nachtigallen, Affen, kleine Damen-Hunde und eine Auswahl von Vogelkäfigen zu soliden Preisen. [808]

Die Abtheilung für Kanarienvogelzucht in Hannover offerirt ausgezeichnete gute, fehlerfreie **Roller,** von allen Sorten, bester Qualität, von 4—10 Thlr. pro Stück excl. Verpackung. [809]

Bestellungen nimmt entgegen der Abtheilungsvorsitzende Herr Hof-Knopfmacher **L. Müller,** Marktstraße 26.

NB. Die bestellten Vögel werden von der Ankaufskommission geprüft und für die Echtheit wird garantirt. Für die Abtheilung A. Weyland, Techniker, Nelkenstraße 16.

Kaninchen,

Scholtische Schecken, rein und Kreuzung, 4 Monat alt, à Paar 2 Thlr., hat abzugeben

Dessau. **W. Bergmann,**
[810] Zerbsterstraße 23.

Schleunigst zu kaufen gesucht: 1 Weibchen, Stockente, dies- oder vorjährig. Offerten nebst Preis incl. Verpackung erbeten in der Exped. d. Bl. unter: Stockente. [811]

Ein sehr großer Kanarien-Heckbauer und hochgelbe Kanarienhähne sind zu verkaufen

[812] **Gneisenaustr. 11,** vorn 2 Tr.

Für Kenner

von Harzer Vögeln gebe gute Roller (Abendschläger) à 10 u. 15 Thlr. ab. Verpackung unentgeldlich. [813]

C. **Weygandt,** Pfarrer zu Eschbach bei Usingen.

Ein Paar rein weiße Japanesische Mövchen, sehr zahm und zuchtfähig, für 10½ Thlr. incl. Verpackung zu verkaufen.

[814] **E. Seyd** in Cassel.

Eine Parthie sehr schöner Goldfische habe abzugeben, das Hundert mit 12 Thlr. excl. Emballage ab hier, pr. Cassa oder unter Nachnahme.

Auch versende ich unter gleichen Bedingungen kleinere Parthien von 10 Stück aufwärts und berechne das Stück zu 6 Sgr.

Emballage nehme auch franco retour.

[815] **F. Zivsa,** Troppau.

Wegen Mangel eines geeigneten Winterlokales sind zu verkaufen:

1 Weibchen, bl. Gebirgslori, schönes Exemplar,		15 Thlr.,
1 Paar Grauköpfchen, Zwergpapageien, bereits 2 Mal genistet	. . .	15 „
Wellenpapageien, alte Zuchtpaare	. .	à 7 „
do. junge	. .	à 5 „

Carl Sülhner,
[816] Naumburg a. S.

Zu kaufen gesucht:

1 Paar Seiden-Pfauentauben, schwarz,
1 „ „ „ , blau,
1 bis 2 Paar rothe „ , mit weißen Schwänzen,
1 „ 2 „ schwarze „ „ „
1 Paar Blauschilder „ , gehaubt,
1 Stück Schwarzschild-Pfautauber, glattköpfig, oder ein Paar,
1 Paar rothe Pfautauben.

Es wird nur auf ganz fehlerfreie Rassetauben reflektirt. In Tausch könnten gegeben werden von Pfauentauben:
weiße mit schwarzen oder blauen Schwänzen, } 1. Qualität
blaue und gelbe mit weißen Schwänzen }

Otto Pausch,
[817] Berlin, Ritterstr. 6.

Christiane Hagenbeck's

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

hat vorrätbig: hellrothe, dunkelrothe und gelbe Araras; kleine und große gelbhaubige, Nasen- und Rosa-Kakadus; doppelte Gelbkopf-, Amazonen-, Surinam-, Neubelländer-, kleine Gelbkopf- und Graupapageien, weißstirnige und Gelbkopf-Porteritos, Bluemountains, Rosellas, Pennants, Paradiessittiche, Vielfarbsittiche, Springsittiche (von letzteren drei nur Weibchen), Kakadillen, Halbmond- und Gelbwangensittiche, Mönchssittiche, Brotogerys tovi und Brotogerys tirica (letztere beide sehr beliebt, lernen leicht sprechen), das Paar 4 Thlr. 15 Sgr., rothe und graue Kardinäle, blaue Bischofs, Indigovögel, Zebrafinken, schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen, Bronzemännchen, bunte japanische Mövchen, Silberschnäbelchen, Bandfinken, Reisvögel, kleinste Elsterchen, Tigerfinken, Astrilde, Atlasvögel, Paradieswittwen (nicht in Farbe), Goldweber, Fuchsweber; Flammenfinken, Feuerfinken, Napoleonsvögel, Madagaskarweber, Rothkopfweber, Ploceus bengalensis, Ploceus hypoxantus; amerikanische Spottdrosseln, Baltimorevögel, Trupiale, Katzenvögel, schwarze und weißbrüstige Bül-Bül, Gartentrupiale, Sonnenvögel, Blaubeber, 1 sprechender Bey; Kalifornische Wachteln, Bartmeisen; und als seltenere Vorkommlinge:
1 Platycercus splendens, Pionias violaceus, kleine und große Schwarzpapageien (Psittacus vaza und Psittacus niger), die so ausgezeichnet sprechen lernen, sowie auch die so sehr gesuchten grauköpfigen Inseparables, (Psittacula cana) von Madagaskar
à Paar 9 Thlr. [818]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. — Druck: W. Elsner, Berlin, Wilhelmstraße 32.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt der Verlagshandlung von Carl Rümpler in Hannover, Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel" betreffend, bei.

e welt. 1874

94754

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00996 1830